



12

13 D

11K

12

13

A

31





Se 1



Inchoy orna
in fol.
edit fuit

Barileg

MDXLII

De Historia Nippon
commentarij insignes maximis
impensis et vigilijs elaborati
adiectis earundem vivis
plusquam quingentis imagi-
nibus, nunquam antea ad
naturę imitatione artificis-
sime efficti, et expressi
a Leonardo Sachio
medico hac nostra etate
doctissimo —



Leiden. Batav.
S. Brunschw.

— 1551 — vel 1596 —



• T Y P O G R A P H U S
L E C T O R I .

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE



El hac una ~~Exemplar~~ commentariorū
editione, quam superiori adiungimus
Lector beneuole, testatam habueris,
& comprobata nostram, in nostrorū
Ciuium, studijs, aut prouehendis rationem, aut iu-
uandis studiū: à quo me hercule, vt dicam quod qui-
dem ingenuè possum, quod res est, labor depulsauit
me nunquā, nunquā me sumptus distraxit . Quod
& ex priori deprehendi potuerat, quam nos eò ita
cœgeramus, vt vili magis cōparari, facile magis ad
quotidianos, & pene horarios vsus circumferri
posset: adeò vt apud omnes ad vnum studiosos, præ-
stabiles etiam, & principes viros melius audierit
multo, quàm ea, quā, vel qui opus cōgessit, digesse-
rat. Iā nascitur tibi, editio plane noua, vt quæ suā,
habeat cuilibet plantæ gallicam nomenclationem,
suam annexam figuram quam ausim dicere, si ex-
emplar germanicū, magnitudine nō æquet, suis non
concedere numeris . Id enim curauimus sedulo vt
quæ contractior esset, absoluta minus videri nō pos-
set. Effeci saltem vt in eo mecum quis exposulare
iure nō possit: quin fateatur ingenuè illā Gallorū
quæ dicebatur aut lāguescere, aut obmutescere in-
dustriam reuixisse propemodū, vel certe aliquando

At

ij

tandem



tandem respirasse. Cæterum hoc te scire volumus
annotationes illas, quas vir quispian non indoctus
singulis capitibus præfixerat, nos idem in priore
exemplari, nos ad calcem remisisse, Mirum enim,
mirū inquam videri debuerat, ut qui quod aut pro
bandū aut comprobandum suscepisset, id statim in
ipsa quasi prothasi, confutaret, & improbaret.
Adde, quod et te scire oportuit, nos Indicē Græcū
substraxisse, ut qui mole sua impediret plurimum,
prodesset nihil: quum singula græca suo ordine, ni-
mirum alphabetico, digesta reperire sit, adeò ut
ordo ille constanter, & perpetuò observatus, Indi-
cis græci tollat necessitatem. Porro recipimus nos
quem Latinū damus commentarium, gallicū factū,
primo quoq; tempore daturos, & eū (ut absit in-
uidia) horridum fortassis, non magis & incultum
quam qui tibi prima foetura, vel ex ipsius auctoris
gremio prodiit. Quod quantum conferre possit, alio-
rum fuerit iudicium: Id ego, hac ratione, omnes ara-
bum, Græcorum omnes thesauros, quos sibi vel pe-
culiariter arrogabant, ciuibus nostris non minus ele-
ganter, quā fideliter reclusum iri, constanter affir-
marim. Id tibi si polliceare, experiere tandem ali-
quando neque tua te expectatione, neque mea fide
& pollicitatione falsum. Bene Vale.

ILLVSTRISSIMO ET CHRISTIANISSIMO

*Principi ac Domino, Domino Ioachimo, Sacri
Romani imperii electori, Marchioni Branden-
burgensi, Stetinae, Pomeraniae, Cassuborū,
Sclauorumq; Duci, Burggraui No-
rimbergensi, necnon Rugia Prin-
cipi, Domino suo longè cle-
mentissimō, Iussu
medici-
cua. S. P. D.*



VANQVAM vniuersa medicina nul-
lis non seculis gloriosa & diuina sit habi-
ta, Illustrissime ac generosissime Prin-
ceps, tamen in hoc eius summo splendore
semper plus laudis admirationis ac pon-
deris, ea illius pars quæ naturas stirpium
vestigat rimaturque obtinuit: idquæ partim quod vetusta-
te, cuius Maxima semper apud omnes autoritas & venera-
tio fuit, esset antiquissima: partim etiam quod iucunda, vti-
lis & necessaria eius esset cognitio. Nam cum reliquæ pro-
pemodum omnes artes, simulatque à Deo opt. maxi. crea-
tus est homo, inuentæ sint, ac subinde multorum industria
auctæ: solæ herbæ post condita statim elementa, nulloquæ
adhuc existente homine, vnâ cum diuinis suis viribus, ita
iubente Deo, è terræ latebris eruperunt. Vt hoc nomi-
ne nullius rei aut artis inuentio verius quàm medicinæ &
stirpium Deo assignetur. Cuius rei Moses in sua Genesi
testis, omnium qui aliquid scripserunt vetustissimus: & nō
minus profanis quàm nostris admirabilis atque veneran-
dus. Testes item sunt poetæ Græcorum antiquissimi, Or-
pheus, Musæus in Polij laudibus, Hesiodus in ijsdem, &
Malux & Asphodeli viribus, Homerus in Nepenthe, Lo

to, Moly herba Mercurio inuenta, Latinis autem Ouidius dum medicinæ inuentionem Appollini tribuit: Vergilius, dum passim Dictamni & aliarum herbarum naturam miscet. Plantas autem atque adeò plantarū ipsarum vires omnes, tum à primis qualitatibus profectas, tum quas tota ipsarum substantia occultas tegit, methodo experientiaque pernouisse, quàm sit non iucundum modò, sed etiam vtile ac necessarium, ad sanitatem (qua nihil homini prius & optatius esse possit) vel præsentem tutandā, vel absentem reuocandam, abundè prodit veterum etiam regū in eam rem studium nobile ac strenuum, quo horum quisque tū de posteris bene mereri, tū nomen suū apud eos immortale reddere conatus est, suo nomine platis à se inuentis impertito. Hinc Gentiana, Lyfimachia, Mithridatia herba, Scordium etiam dicta, à potentissimis regibus, Illyriorum Gentio, Macedonum, Lyfimacho, Ponti & Bithinię Mithridate apellatæ sunt, vt à Teucro Teucrium, ab Achillæ Achilleia, à Chirone Centauro Centauriū, ab Artemisia Cariæ regina, Artemisia: & aliæ ab alijs plurimæ & inuentæ & dictæ fuerint. Quin & Mithridates idem, Attalus Pergami, Salomon Iudæorum, Euax Arabum, Iuba Mauritanix rex plātarum notendarum non studiosi modò fuerunt, sed horū plerique de his accuratè quædam scripserunt, alij composita ex his non pauca medicamenta miscuerunt, magno mortalium cōmodo. Adde quòd Romani Reges pariter ac Imperatores in multis regionibus herbarios magno sumptu alebant, vt simplicium medicamentorum, sed optimorum notitia & sibi esset vsui, & ad posteros vsque permāneret. Idem quoque studium Philosophos tenuisse, his colligas licet, quòd Pythagoras Bulbos, Chrysippus Brassicam, Zeno Capparim, Aristoteles rem herbariam volumine iusto celebrauit. Quàm vellem huius ætatis Reges ac Principes alios in idem studium incumbere, vel saltem viros bonos rei plantarię studiosos sumptu iusto iuuare. Quàm vellem quoque huius tempestatis medicos hanc medicinæ partem diligentius tractare, neque totam Pharmacopolis & rusticis mulierculis permittere. Iam enim & morbis
ratio

ratione certa mederi scirent : iam medicamenta methodo componere, iam compositorum vires expendere, iam compositis rectè uti profectò possent. Quem verò lapidem nō mouerunt Theophrastus, Dioscorides, Galenus, ut plantarum non modò historiam, sed vniuersam quoque naturam nobis exprimerent? Quo, Deus bone, studio Hermolaus Barbarus & Ioannes Ruellius Plinij exemplo ex varijs veterum libris rem plantariam restituere conati sunt? Ut eo nomine vterq; hac ætate doctissimus de posteris præclare sit meritus, ut etiam me non pudeat apertè fateri, Ruellii commentarios multùm mihi profuisse, ut idem de Hermolai, & Marcelli, & Othonis Brunfelsij, Euricij Cordi, Hieronymi Tragi scriptis pollicear. Quorum longè doctissimorum virorum studium imitatus, hos de historia stirpium commentarios maximis cum vigilijs, tum sumptibus confeci. Primum vniuersam cuiusque stirpis historiam breuiter & ordine optimo complexus. Deinde singularū imagines viuas proximas, quàm cæteri omnes artificiosius expressi, ut etiam vulgares quasdam nō prætermittēdas censuerim, ne olim à posteris ignorentur, quomodo plurimæ Dioscoridis seculo notiores, quàm ut eas putarit describendas: hodie etiam doctissimis & diligentissimis ignorarētur. Addidimus quoque vulnerarias præsertim plurimis chirurgis vsu quotidiano cognitissimas, quas ineptis nominibus exprimere quàm tacere maluimus, dum quod nomen apud Græcos, aut Latinos germanū sunt sortitæ, si tamen sunt sortitæ, ignoretur. Appinximus & arbores aliquot, id quod ad earum folia sæpius Dioscorides herbarum quoque folia comparat. Quas porrò plantarum vires ex Dioscoride, Galeno, Actio, Paulo, Simeone, Plinio recensemus, si vno ore ab omnibus confirmantur, suscipiēdæ: Si in his dissentitur, Galenus tibi præter cæteros imitandus, ut qui methodo inuentas plantarum facultates experientia longa comprobauit. In his autem describendis, Galenū, Actium, Paulum sequutus, literarū Græcarum ordinem tenui, nō cum Dioscoride cōgeneres passim herbas cōnexui, quod hæc in idem tempus nō incidant perfectæ, quales nobis ad viuas repræ-

sentare in animo fuit, ob id umbris pictorum libidini consuetis abstinere volumus, ne veram plantæ formam obscurarent. Quum verò vſitato more patronum aliquem ijs nostris commentarijs quererem, nobilitate & virtutum splendore excellentem, nemo omnium cui iustiùs quàm tibi, Illustrissime Princeps Ioachime, clarissimo heroi, hos dedicandos esse putarem occurrebat. Nam si generis tui vetustatē atq; nobilitatem specto, nemo te hodie Principum aut melior, aut præstantior, vtpote cuius maiores à Guelfis (quæ vix vlla in Germania vetustior est nobilitas) ortos esse cōstat. Quod si eorundem virtutes expendo, nullam prorsus virtutem magnis et bonis Principibus dignam illis defuisse video. Proinde cū in spem certissimam adduceremur, nostras has vigilias non vulgarem gratiam ex amplissimi nominis tui inscriptione apud candidos & æquos inuituras, foreq; vt eam ob causam maledicorum conuiciatorum petulantia perfringeretur: te quidem in tanto ornatissimorum Principum numero mihi delegi, cui potissimum has ipsas consecrarem. Quare cū eas suscipies, illustris Princeps, commendari tibi defensionem & cōsecrationem huius partis medicinæ quæ stirpiū naturas inquirir, statues. Quam vt cupidè & libenter in te recipias, multa, scio, monebunt: potissimum verò hoc ipsum, quod vix ex vlla alia re magis diuina præsentia & benignitas eluceat, quam ex tam varia stirpium tum forma, tum natura: dum scilicet omnes illas ad vſum hominis conditas à Deo ipso perpēdimus. Si quid igitur aliud, herbarum certè diligens contemplatio exuscitat, imò confirmat in animis nostris opinionem hāc, quod homines Deo curæ sint, qui tam anxie laborant in ijs iuandis ac tuendis: dum tot elegantissimis, atque præstantissimis stirpibus quibus illi tam varios morbos propulsare possunt, terram exornant. Non parum etiam ad eam suscipiendam curam te præclarissimorum tum Regum tū Principum exempla, quæ suprà recitauimus, hortabuntur. Sed omnium maximè immensa commoditas quæ ex istius partis medicinæ consecratione ad vniuersos perueniet. Ad herbariæ denique medicinæ tum amorem tum defensionem,

mira

mira quoque incunditas, quæ in contemplandis tot herbarum generibus animum subibit tuum, inuitabit. Quid enim iucundius quid delectabilius quam intueri stirpes, quas Deus opti. maxi. tot, tamq; varijs pinxit coloribus, tot elegantissimis redimiuit floribus, quorum colorem nullus vnquam pictor satis exprimere potuit: tot denique seminibus & fructibus, quorum & in culina & in medicina vsus est maximus, ornat? Verum non est cur te pluribus in admirationem huius partis medicinæ pertrahere coner, utpote qui antea studio & amore eius sic tenearis, ut vix sit aliud quod te magis delectet. Nunquam enim in extruendis hortis tot arboribus atque herbis confitis, tantum operæ & impensarum poneres, si non illuc te rei iucunditas ac singularis amor pertraheret. Reliquum nunc est illustris. Princeps, ut pro tua excellētī humanitate, quæ vestrę familię cognata est, munus hoc nostrum tanquam specimen & testē mei erga C. T. amoris & obseruantię exporrecta lætāq; fronte accipias, atque me tuo fauore complectaris, & autoritate ab inuidiorū calumnijs defendas. Bona autem spes est hūc hortum quem donamus C. T. fore longē gratissimū, non tantum quod in eo omnis ferē generis herbas elegantissimē pictas reperire queas, verum etiam quod inde ad quæuis morborum genera remedia decerpere liceat. Deus opti. maxi. te, tuamque ditio-
nem incolumen seruet, ut Reip. Chri-
stianę atq; literis diutissimē pro-
desse possis. Tubingæ, Ca-
lendis Martijs, Anno
à nato Christo.
M. D. XLII.

LATINARVM AP- PELLATIONVM INDEX.

A Brotonum	7	Apies	137
Absinthium	1	Apparine	49
Acanthus vel Acantha	5	Apiastrum	483
Acorum	12	Apium saxatile	623
Aconitum	90	Apolinaris	790
Adiantum	84	Apium montanum	551
AiZoom	32	Aquilegia	107
Aiuga vel Abiga	839	Arum vel Aris	69
Alcibiadicum	270	Aristolochia	93
Alchimilla	584	Arnoglossum	37
Alcea	82	Artemisia	44
Alisma	42	Asarum	10
Allium	695	Asclepias	134
Alliari seu Alliaria	108	Ascirum	76
Aloe	143	Asphodelus	120
Althaa	18	Asparagus	56
Amaracus	634	Aster Atticus	139
Amarantus	104	Atriplex	124
Amaracum	556	Atracilus	127
Anagallis	19	Auena	185
Anagallis aquatica	686	Auricula muris	22
Androsimum	77	B Alamine	188
Anethum	30	Ballote	270
Anisum	61	Baptifecula	419
Angelica	130	Barba capri	182
Anonis	59	Barba hircina	779
Anthemis	25	Batrachium	162
Aphace	114	Bellis seu Bellius	153
Apiu hortenfe aut Satiuu	702	Beta	765
Apium palustre & rusticu	71	Beta syluestris	457
		Beta	44

INDEX.

Betonica seu Vetonica	344	ris	221
Betonica altera	347	Centum morbia	395
Blattaria	184	Cepa seu Cepe	421
Blitum sine Blitum	177	Cerasus	417
Boiris	8	Chamacyparissus	828
Bonis lingus	149	Chamamelon	25
Brassica sativa	405	Chamaleon	835-837
Brassica canina	434	Chelidonium maius	820
Bubula lingua	149	Chelidonium minus	822
Buglossum	149	Cicer	267
Buglossum magnum	335	Cicerbita	640
Bulbus agrestis	350	Cicuta	359
Bulbus sylvestris	172	Cinara	751
Buphtalmum	150	Cinnamalis	84
Bursa pastoris	583	Cinoglossum	401
Buxus	612	Citrageo	483
		Clematis Daphnoides	353
C Alamintha	425	Chrysanthemum	833
C Caltia seu Calthula	377	Cnicus sylvester	127
Callitrichum	84	Coma hircina	779
Campanula	424	Colubaris seu Columbina	565
Cannabis	387	Colytea seu Colutea	436
Capillus terra	84	Corion seu Coriannon	337
Capillaris	755	Coronopus	438
Capsella	302	Corona regia	511
Cardiaca	390	Consolida media	386
Carduus	751-837	Conuoluulus	260
Carduus Maria	53	Crocus	432
Carduus veneris	223	Cruciata	412
Casta herba	202	Cunila	301
Cassuta	342	Cucumis seu Cucumer	668
Castanea	371	Cucumis anguinus sylvestris	661
Careum	391	erroscus	661
Caron	391	Cucurbita	562
Caryophyllata	379	Cucurbita sylvestris	366
Centaureum minus	571	Cyanus	419
Centunculum seu Centuncula		Cyperus seu Cyprius	444
		Dama	

INDEX.

D Amasonium	42	Genistella	119
Daucus	130	Genista	213
Daphnoides	225	Gentiana	100
Digitalis	239	Geranium	206
Dracunculus maior	233	Gingidium	216
Dulcis radix	191	Gith	488
E Biscus	17	Gossipium	528
Echion	270	Gramen	140
Elenium	243	H Edera	413.831
Elleborus niger adulter.	276	Helxine Cissapelos	260
Elleborus candidus	272	Helxine	278
Ephemerum	240	Hemionitis	292
Equisetum	317	Herba S. Barbara	705
Erica	257	Herba pulicaris	842
Eruca	263	Herba trinitatis	763
Eringium	294	Hiberis	320
Ernum	549	Hirundinaria	395
Eupatoriū seu Hepatoriū	245	Hieraceum	315
Eupatoriū adulterinum	266	Hordeum	429
Euphrasia	247	Hyacinthus	793
F ABA	383	Hydropiper	799
Farfaria	146	Hyosciamus	790
Febrifuga	381	Hypericum	788
Fel terre	381	Hyssopus	798
Ficus sativa	711	I Biscus	17
Filicula	561	Illecebra	760
Filix	568	Inguinalis	139
Feniculum	485	Intubus	642
Fontalis	620	Inula	243
Flos sancti Iacobi	791	Iouis Glans	371
Flos tinctorius	768	Irium	258
Fœnum Græcum	757	Iris	312
Frumentum Turcicum	782	Iris sylvestris	240
Fumaria	332	Isatis	326
Fragaria	807	Iuglans	373
G Allium	196	Iunonis rosa	358
Geminalis	519	Iuniperus	79

Labrum

INDEX.

L <i>Abrum veneris</i>	222	<i>Mentha</i>	286
<i>Laclaria herba</i>	770	<i>Mercurialis fylueftris</i>	434
<i>Lacluca</i>	296. 770	<i>Mercurialis</i>	464
<i>Lanium</i>	438	<i>Millefolium</i>	556
<i>Lanaria herba</i>	739	<i>Milum</i>	403
<i>Lapathum</i>	451	<i>Mirice</i>	496
<i>Larix feu Larex</i>	480	<i>Morus</i>	505
<i>Lafer feu Laferpitium</i>	721	<i>Morfus Gallina</i>	22
<i>Lathyrus</i>	446	<i>Myrrhis</i>	509
<i>Lauer</i>	686	N <i>Apus</i>	179
<i>Laurus Alexandrina feu Idea</i>	237	<i>Nardus fylueftris</i>	811
<i>Lens & Lenticula</i>	814	<i>Nafturtium aggreffe</i>	320
<i>Lepidum</i>	471	<i>Nafturtium fatium</i>	356
<i>Leporinus pes</i>	479	<i>Nerium</i>	526
<i>Lichen</i>	462	<i>Nigella</i>	488
<i>Liguftrum</i>	468	<i>Nummularia</i>	395
<i>Lilum</i>	358	<i>Nux auellana</i>	392
<i>Lingua tanina</i>	401	<i>Nux regia</i>	373
<i>Lingua ferpentina</i>	555	<i>Nux perfica</i>	373
<i>Limonium</i>	457	<i>Nymphaea</i>	519
<i>Linum</i>	460	O <i>Cimum</i>	846
<i>Lithofpermum</i>	475	<i>Ocimaftum</i>	850
<i>Lolium</i>	132	<i>Oenanthe</i>	542
<i>Lunaria minor</i>	469	<i>Olaus atrum</i>	823
<i>Lupus faliclarium</i>	169	<i>Ononis</i>	59
<i>Lupinus fatius</i>	305	<i>Ophru</i>	545
<i>Lyfimachia</i>	476	<i>Ophiogloffum</i>	555
M <i>Ala infana</i>	517	<i>Orchu</i>	537
<i>Malus canina aut terre-</i>		<i>Origanum vel origanum</i>	534
<i>ftis</i>	514	<i>Orminum</i>	347
<i>Maiorana</i>	634	<i>Ofirin</i>	531
<i>Malus Perfica</i>	576	<i>Oxiacantha</i>	530
<i>Malua</i>	491	<i>Oxiu</i>	544
<i>Malus cotonea & cydonia</i>	568	P <i>Aconia</i>	202
<i>Marrubium</i>	563	<i>Panicum</i>	255
<i>Melilotus</i>	511	<i>Papauer fatium</i>	501
		<i>Papa</i>	60

INDEX.

Papaver erraticum	499	Pseudonardus	844
Parthenium	556	Pulegium	197
Papaver Corniculatum	504	Pulmonaria	608
Papaver nigrum	488	Q Vercus	227
Pastinaca	647	Q Quinquifolium	595
Pedicularis	744	R Adix & radícula	628
Peplos	577	R Radícula alia	739
Persicaria	602	Ranunculus	162
Perfoliata	603	Raphanus	628
Pes Leonis	584	Raphanus silvestris	137
Personata	74	Rapum	442
Pes Cornicu	438	Rhodia radix	633
Pes Anserinus	621	Rhododendron	526
Petasites	613	Ribes	632
Petroselinum	623	Ricinus	333
Petroselinum sylvestre	551	Rosmarinus	466
Peucedanus	572	Rosa	625
Psilothrum	99	Rubia	280
Phu	811	Rubus	157
Pilosella	579	Rumex	451
Pimpinella	581	Ruta	587
Piperitis	692	S Abina seu Savina	155
Piper Indianum	692	S Sagminalis herba	565
Pisum	599	Salix	328
Pituitaria	744	Salix equinalis	317
Plantago	37	Salinaris	610
Polytrichum	600	Salvia	249
Plytrichum Apul.	84	Sambucus	64
Polygonatum	559	Sanguinalis	585
Polypodium	561	Sanguinaria	438
Porrum	604	Sanguisorba	748
Portulaca	116	Sanicula	638
Potamogeton	620	Sardiana glans	371
Potentilla	592	Satyrrium trifolium	675
Proserpinaca	585	Satyrrium regium	676
Prunella	594	Saxifraga maior seu Alba	706
Prunus	396	Saxifraga lutea	707
		Saxi	

INDEX.

Saxifragiū vel Saxifraga	691	Sorgi	640
Scandulaceum	302	Sorbus	553
Scabiosa	679	Spartum	717
Scilla	741	Sphatula foetida	753
Scordium	735	Spina alba	53
Secale	728	Spinacea seu Spinaceum olus	
Sedum maius, minus, mas, &	536		
fœmina	321	Spina mollis	335
Seminalis	585	Statiotes millefolia	688
Semen	283	Stachys	726
Sempernium	32	Stichas vel Stachas	737
Senecio	285	Strobilus	752
Senses	157	Succisa	678
Septifolium	262	Supercilium terra	84
Serapias	540	Symphytum	658
Seris	642		
Serpillum	252	T Amarix	496
Serpentaria	395	Tanacetum sylvestre	
Sertula campana	512	592	
Seseli Maßiliense	746	Terra corona	831
Seseli creticum	769	Telephium	760
Sideritis prima	729	Teucrium	786
Siliquastrum	692	Thlaspi	302
Sinapis & sinapi	522	Tymbra	301
Sifer	708	Thymus	784
Sisymbrium	683	Tilia	817
Sium	686	Tintinabulum terra	457
Smilax lenis	682	Tithymalus	770
Smilax aspera	680	Tordylon seu Tordylion	769
Smilax hortensis	672	Trichomanes	755
Smyrnum	718	Triorchis	540
Solidago	386.658	Triticum	617
Solidago Sarraceni:a	690	Trissago	824
Solis oculus	556	Trifolium odoratum	774
Solanum	650	Trifolium pratense	777
Sonchus	740	Trixago palustris	735
		Tussila	

INDEX.

<i>Tussilago</i>	146	<i>Vitis</i>	87
<i>Typha</i>	780	<i>Vitis alba</i>	99
V <i>Eratrum album</i>	272	<i>Vitis nigra</i>	102
<i>Verbascum</i>	241	<i>Vmbilicus terra</i>	442
<i>Verbenaca seu verberna</i>	565	<i>Volucrum maius</i>	615
<i>Veronica</i>	170	<i>Vrceolaris</i>	278
<i>Vicia</i>	176	<i>Vrtica</i>	110
<i>Viola</i>	448	<i>Vrtica labeo</i>	193
<i>Viola alba</i>	473	<i>Vua crispata</i>	186
<i>Viola muraria vel purpurea</i>		X <i>Anthium</i>	527
308		<i>Xylon</i>	528
<i>Viola matronalis</i>	310	Z	
<i>Viscum</i>	324	<i>Aca</i>	283

INDEX APPELLA- TIONVM QVIBVS

PHARMACOPOLAE,
& vulgus vtuntur.

A

A Brotonum	7	Assa foetida	728
Abſinthium	1	Aſarum	10
Acetoſa	452	Aſpergula	49
Acorum	11	Aſprella	317
Acus paſtoris	106	Attriplex	124
Acutella	59	Auena	185
Affodillus	120		
Agripalma	390	B Alſamita	684
Agriſmonia	245	Baſilicon	846
Alchimilla	584	Bardana	74
Alleluja	544	Baucias	79
Alliaria	108	Bedegar	53
Allium	695	Belzuinum vel Beniinum	
Alkakengi.	650	713	
Aloe	143	Benedicta	379
Altaraxacon	644	Betonica	344
Altercum	790	Berberis	530
Amaracus	734	Bipennula	581
Amcos	67	Biſmalua	17
Anethum	30	Biſtorta	733
Aniſum	61	Bombax, ſeu Bôbaſum	528
Apium hortenſe	702	Bonifacia	232
Apium aggreſte	162	Bonus henricus	452
Aquilegia	107	Borrage	149
Archangelica	458	Branca vrfina	51
Ariſtologia	93	Brufcandula	169
Artemiſia	44	Brionia	99
Articocalus	751	Buchiden	676
Articols	ibidem.	Bugloſſa	335
Articoclus	752	Burſa paſtoris	303. 583

b b Cala

INDEX.

C		Colubrina	738
C Alamentum	425	Consolida maior	658
Calendula	377	Consolida minor	153
Camomilla	25	Consolida media	383
Canapus	387	Coriandron	337
Candela regis	82	Corrigiola	595
Capilli veneris	84	Cotula non foetida	150
Caprifolium	615	Cotula foetida	556
Caputicaules	406	Cotum	528
Cardiaca	390	Crassula maior	760
Cardo fullonum	222	Crescio	356
Cardopatium	834	Crocus	432
Carduus benedictus	128	Crocus hortensis	402
Carota	647	Cuculus	650
Cartafilago	690	Cucumis & Cucumer	661
Cartamum	402	Cucumer asininus	668
Carni	391	Cupressus	828
Castrangula	194	Cuscutha	342
Cataputia maior	333	Cynoglossum	401
Cataputia minor	446	Cyperus	444
Cauda equina	317	D	
Caulis	405	D Ens Leonis	644
Centauria minor	381	Diapensia	637
Centum capita	294	E	
Centum morbia	304	E Lleborus albus	272
Centum nodia	585	Endiuvia	643
Cepa	421	Enula campana	243
Chamædris	824	Esula	770
Chelidonia	826	Esula rotunda	577
Cheiri	448	Eruca	263
Cherrefolium	216	Euisus	17
Cheruilla	708	Euphrasia	247
Cicer	267	Eupatorium adulterinum	
Cichorea	643	266	
Cicuta	399	F	
Citonia	368	F Aba	383
Coloquintida	366	Faba crassa	760
		Fasco	

INDEX.

Fascoli	672	Hordeum	429
Ficus sativa	711	Hirundinaria	134
Ficaria	192	Humulus	169
Filago	386	Hypericum	788
Filipendula	542	Hysopus	798
Filix	568	I	
Fistula pastoris	42	I Arum	69
Flamula	162	I Iris	312
Flos amoris	104	I Iringus	294
Flos Februarij	473	I Iuniperus	79
Fœniculum	485	I Iua muscata	839
Flos omnium mensiu	377	I Iulquianus	790
Fœnu-græcum	757	K	
Fœniculus porcinus	572	K Erim	473
Fortis seu sortis herba	386	K Kerua	333
Fumus terræ	332	L	
Fuga demonum	788	L Actuca	296
Funis arborum	682	L Lactucella	640
G		Lappa maior	74
G Allitricum	547	Lappa minor	527
G Genista & Genistra		Lappa inuicisa	527
218		Lapatium acutum	452
Gentiana	200	Larga	480
Glastum	326	Lanaria	802
Gratia dei	207	Laureola	225
Guadum	326	Lens & Lenticula	814
H		Leuisticum	718
H Edera terrestris	831	Lingua bouis	335
H Hepatica	462	Lingua ceruina	292
Herba diui Ioannis	788	Lilium inter spinas	615
Herba Roberti seu Robertia		Lilium album	358
na	207	Lilium couallium	240
Herba S. Barbaræ	705	Linaria	531
Herba Trinitatis	763	Linum	460
Herba S. Iacobi	701	Liquiritia	291
Hermodactylus	350	Lupinus	305
		Lupulus	169
		bb ij	Lupa

INDEX.

Luparia	92	Oculus bouis	150
		Oleander	526
M		Origanum	534
Maiorana	634	Orobum	549
Malua	491	Osatis	306
Maluaniscus	17	Osteritium	711
Mandragora	514		
Marrubium nigrum	160	P	
Marrubiastrum	160	Aconia	202
Mater sylua	615	Pagana lingua	237
Matricaria	45	Palma christi	333.676
Melilotus	511	Panis porcini	441
Melissa	483	Panis cuculi	544
Mentha	286	Papauer rubeum	499
Mercurialis	464	Papauer satium	502
Millefolium	688	Papauer cornutum	504
Millemorbia	194	Parietaria	278
Milium	403	Pastinaca	708
Milium	475	Pata lupina	276
Mora bacci	158	Penthada cylon	33
Mora vaticana	157	Perfoliata	603
Morella	650	Perforata	788
Morsus diaboli	678	Perfica malus	576
Morsus gallinae	22	Perficaria	602
Morus celsi	505	Pes anserinus	621
Muralis	278	Pes columbinus	206
Muscata	206	Pes corui	162
		Pes leonis	584
N		Pes vituli	69
Nasturtium aquaticum	684	Petroselinum	551
Nasturtium satium	556	Pilosella	579
Nasturtium tectorum	503	Pimpinella	581
Nenuphar	519	Piperitis	471
Nigella	488	Pisum	599
Nux	373	Plantago	37
		Podagra lini	342
O		Polipodium	561
Ocimum gariophyllatū	846	Politrichon	755
		Porru	

INDEX.

Porrum	604	Salvia vita	621
Portulaca	126	Sambucus	84
Potentilla	592	Sana munda	379
Prasium	563	Sanicula	638
Prasium foetidum	160	Sanguisorba	749
Prunus	396	Saponaria	789
Prunella	592	Satureia	301
Pfillum	342	Saxifraga rubea	542
Pulegium	197	Saxifraga maior	706
Pulmonaria	608	Saxifraga lutea	707
Pyrethrum	610	Scabiosa	679
Pyrola	457	Scariola	643
Q		Scolopendria	292
Q Vercus	227	Scordium	735
Q Quercula	824	Scrophularia maior	193
Quinquefolium	595	Scrophularia minor	822
R		Semperuium	32
R Aphanus	628	Sene	437
R Rapistrum	258	Serpillum	252
Rapum	212	Serratula	824
Rapunculus	212	Sigillum salomonis	559
Remora aratri	39	Siler montanum	746
Refta bouis	59	Sinapi	522
Rhabarbarum monachoru		Solatrum	650
452		Solatrum mortale	651
Ribes	632	Sorbus	553
Rosa	625	Sparagus	56
Rosmarinus	466	Sphatula foetida	753
Rosmarinus aculeatus	220	Spelta	283
Rostrum ciconie	206	Spica nardi	844
Rostrum porcinum	644	Spinacia	636
Rubea tinctorum	280	Squilla	741
Ruta	587	Scaphisagria	744
S		Stechas Arabica	737
S Abina vel Sauina	255	Stichas citrina	104
Salicaria	476	Stramonia	654
Salvia	249	Succus cyrenaicus	723
		bb ij	Taina

INDEX.

T		Veronica	170
Amariscus	496	Vicia sylvestris	114
Tanacetum	45	Vinca peruviana	35
Tapsus barbarus	802	Vincetoxicum	134
Taraxacum	644	Viola	308
Testiculus canis	537	Virga pastoris	222
Testiculus vulpis aut sacer-		Viscum	324
doris	675	Vitealis	260
Thymus	784	Viticella	99
Tilia	817	Vngula cabalina	146
Tormentilla	262	Volubilis maior	680
Trifolium	774	Volubilis media	260
Trifolium acetosum	544	Vrinalis herba	531
Trifolium pratense	777	Vrtica	110
Triticum	617	Vrtica mortua	458
Tunica	347	Vua crispa	186
Turcicum frumentum	782	Vua lupina	650
V		Vua Vulpis	650
Aleriana	811	Yulularia	237
Verbena	565	Z	
Veratrum album	272	Inziber capinum	693
Vernix	80		

FINIS.

FRANCOYS.

A Bſince	1	Barbe de bouc	183.779
Ache	702	Barbue	488
Ache de maretz	271	Baſilic	845
Ache large	323	Baſilic ſauuage	850
Acheramin	163	Baſinet	362.163.706
Agoure de lin	342	Bec d'oye	592
Aguille de bergier	206	Beniouin	722
Aigremoine	245	Benoſte	379
Aigrum perſil	703	Berberis	330
Ail	695	Berle	586
Aloyne ou Alayne	1	Betoinc	764
Alkanges	650	Bette	344
Ançolie	107	Bette ſauuage	344.457
Anet	30	Biftorte	733
Angelique	130.742	Blanc d'eau	519
Angelique ſauuage	130	Blaucole	420
Anis	61	Blé de Turquie	782
Arreſte bœuf	59	Blé Barbu	731
Armoyſe ou Arſemiſe	44	Blette ou bette d'Eſpaigne	
Armoyre	347	177	
Arroche de iardin	124	Bluet	420
Arroche ſauuage	124	Bon henry	452
Artichault	751	Bonne dame	124
Artichault ſauuage	835	Bouillon blanc	802
Aſperges	56	Bouillon noir	802
Aſpic	844	Bourrache	149
Aubiſſon	420	Bourſe à paſteur	583
Auellane franche	392	Branche vrſine	51
Auellane ſauuage	392	Bruyere	257.496
Aulnee	243	Bugle	386
Auoyne	185	Bugloſſe	335
Auronne	7	Bugloſſe ſauuage	270.555
B		Bugraue	59
Agucnaudier & bague-		Buys	611
naudes	436		

I N D I C E.

C		& marin	
C Abaret	10	Coucombre sauage	662. 663
Calament	426	Consire ou Consoulde	153.
Camomille	25	386. 668	
Camomille sauage	151	Coquelicoc	499
Campanette	260	Coqueret iaune & blae	163
Capriole	438	Coquu masle et semelle	805
Carline	835	Cordiale	390
Carottes	230. 647	Coriandre	337
Centaure	381	Cormier	553
Cerisier	417	Corrigiole	585
Cersueil	216	Coton	523
Chanure	387	Couille de prestre	32
Chardon argentin	53	Couillon de chien	537
Chardon à carder	212	Couleuree	99
Chardon cent teste	294	Courle ou Courge	362
Chardon benit	127	Courle sauage	366
Charpentaire	741	Cresson Alenoys	356
Chardonnette	838	Cresson de ruisseaux	685
Chastaignier	371	Cruciate	411
Chelidoine	826	Curage	602. 806
Chesnette	825	Ciprés	826
Cheruy	708	D	
Cheruseille	615	D Ent de chien	140.
Chiche sauage	137	438	
Chiennée	350	Dent de Lyon	644
Cichoree	643	Domte venin	134
Cicrotin	760	E	
Cigue ou cocue	399	E Llebore blanc	272
Citrule	664	E Llebore noir bastard	
Choux crespes, rouges, & ca	276		
bus.	405. 406. 407	Ers	549
Cognier ou Cognacier	363	Erculisse	191
Coloquinte	366	Eclere	820. 823
Commin	688	Espargoute	557
Coucombre commun, ture,		Esparges	36
		Espy d'eau	620
		Espi	

INDICE

Espinars	637	Goutte de lin	342
Es purge	446.770	Grace dieu	207
Estrangle loup	90	Grassette	761
Estrangle liepard	90	Gratteron	527
Eupatoire	245	Gremil	475
Eupatoire des Arabes	266	Gripaulme	320
Euphrasie	247	Groselier	186.632
F		Guesde	326
Febue	384	Guy	327
Fenoil	485	Guymauue	12
Fenegrec	757	Guymauue sauuage	82
Feu ardent	799	Guynce	693
Fiel de terre	381	Gyroslees	311.473
Figuier	711	Gyrolles	708
Filipende	542	H	
Flambe	312	Hanebané	790
Flambe bastarde	12	Haste Royale	127
Fleur d'amour	104	Hepatique	462
Fort	1	Herbe au poulmon	608
Fongere ou fouchiere	569	Herbe à foulon	739
Fraiser & fraises	808	Herbe à iauoir	768
Frument	617	Herbe au charpentier	459
Fumeterre	332	Herbe aux charz	154
Fustet	530	Herbe aux ladres	170
G		Herbe aux perles	475
Galliot	379	Herbe aux poulx	744
Gans nostre damie ou		Herbe aux pulces	843
Gantelee	424	Herbe des aulx	108
Garance	280	Herbe des pattei	147
Garderobe	7	Herbe de la Trinite	763
Genet	218.714	Herbe de S. Iehan	44
Geneure	79	Herbe de S. Jacques	708
Gentiane	200	Herbe de S. Barbe	709
Germandree	735.787	Herbe forte	690
Glaveul	312	Herbe de l'Estaille	139
Glaveul iaune de riuere	12	Herbe portant fraises	808
Gleteron	74	Herbe qui tue les brebis	395
		bb v	Herbe

INDICE.

Herbe Robert	207	Lumillette	247
Herbe velue	221	Lupin	305
Hiebles	64	M	
Houblon	169	Adriettes	90
Hyacinthe	793	Mandragore	514
Hysope	798	Marguerites	153.834
I		Mariolaine	635
Aloufie	12	Mariolaine bastarde	534
Iaunet d'eau	519	Mariolaine d'Angleterre	784
Iotte	764	Marone	635
Ioubarbe	37	Marrubin noir	161
Iue arthetique	839	Marroquin puant	161
Iusquiam	798	Marrouchin	563
L		Matricaire	557
Aict de nostre dame	53	Marteau	780
Laiçeron	646	Maulue	491
Laitue	296	Melilot	511
Langue de beuf	315	Melisse	483
Langue de Cerf	292	Mente	286
Langue de chien	401	Mente aquatique	684
Langue de serpent	555	Mercuriale masle & femelle	464
Lapatience	452	Mercuriale sauage	435
Laparitoire	428	Merueille	188
Lauande	844	Mil ou Millet	403
Laureole	226	Mille fueille	688
Lentille	841	Mille graine	281
Leuesse ou Lineche	718	Mille pertuis	76.789
Lierre	413	Morelle	650
Lierre terrestre	831	Mourier	505
Limoine	457	Morgeline	22
Lin	460	Mouron	19.22
Lin iaune sauage	532	Mors de diable	678
Lis	358	Mort au chien	350
Lis d'estang	519	Mort aux vers	2
Liser ou Liseron	260.682	Mouffe	601
		Mou	

I N D I C E


Mouſtarde	322	Paſtenades	647
Muget	139.196.241	Parelle & patience	452
N		Paulme Dict	333
Napolier	74	Panot	501.504
Narde	844	Peaulte	283
Nanet ou Naueau	179.112	Peuette	579
Nafitor	356	Penſee	763
Nafitor ſauuage	320	Pepon	664
Nielle	332.488	Perroquet	143
Noyer	373	Percepierre	542
Noyſette franche & ſauua-		Perſil	623.702
ge	392	Perſil de montaigne	552
O		Perſil d'afne	509.
Oeil de bœuf	151	Peruenche	353
Oeillets	347	Pefchier	575
Oignon	421	Phaſcoles	672.686.682
Orge	429	Pied d'Alouette	511
Origan	429	Pied de colomb	207
Orpin	760	Pied de Geline	332
Ortie	110	Pied de lars	622
Ortie morte ou blanche		Pied de lieure	479
458		Pied de lyon	584
Ouale	547	Pied de pigeon	206
Ozeille	452	Pied de poul	89
P		Pied de veau	69
Pain à coqu	544	Pimpenelle	580.749
Pain de pourreau	441	Piſſenlitt	151
Palays au lieue	640	Piuoine	203.315
Panets	230.647	Plantain	37
Panic ſemblable au millet		Plantain aquatic	42
255		Pois	599
Parietaire	278	Pois cichea	267
Pas d'afne	147	Politrich	755
Paſſerage	310.471	Polliot	252
Paſſeuclours	104	Pollypode	561
Paſquettes	153	Pourette	488
Pafſel	326	Pommes d'amours	517
		Pon	

INDICE.

Ponceau	499	Rheubarbe des moyne	452
Pourrette	488	Rue	587
Pourree blanche & noire		S	
765		Saffran	432
Porrion	172	Saffran sauage	462
Pourreau	604	Saffran bastard	127
Pourpier, Pourchaille, ou Salette			
Pourceline	116	Salmille	216
Preudhomme	547	Sanguinaire	438
Prunier	396	Sanicle masse & femelle	
Pulege	197	638	
Pulege sauage	426	Sarrasine longue & ronde	
Pyrethre	609, 610	93.94	
Q		Sarriette	308
Q Veue de cheual	318	Satirium à trois fueilles	775
Q Queue de pourreau		Satirium royal	679
572		Satirium à trois coillôs	540
Quinte fueille	595	Sauge	249
R		Sauge franche	ibide
R Aisfort	137. 628	Sauue vie	691
R Ratelou	94	Scabieuse	649
Raue	187. 212. 613	Sauinier	155
Regalice	191	Saulx	328
Reparce	764	Seigle	728
Reponces ou Repöchon	212	Senegré	775
Relise	379	Seneslon	288
Réueille matin des vignes		Senecue	522
577		Senecue sauage	258
Riebles	49	Serpentaire ou serpentino	
Romanie	233		
Ronce	158	Serpouillet	252
Roquette	258. 264	Seseli	746. 769
Rosage ou Rosagine	526	Signet de Salomon	559
Rose	625	Sorbier	563
Rose nostre dame	203	Soulsie ou souls	377
Rosier d'Inde	47	Sphatule puante	753
Rosmarin	466	soucher	444
		stipol	

INDICE.

Sripoulle	741	V	Aciet	793
Stæcados citrin	737		Valeriane	811
Soucy d'eau	476		Verge à berger	222
Surcau, Seu, Suyer	64		Verueine	565
T			Vesse	176
T Annee	46		Vesse sauuage, vesseron	114
Taure	470		Vigne	87
Tilier	817		Vincibosse	615
Tinou Thym	734		Vinette	452.530
Tithymale	770		Violette blanche	473
Tormentille	262		Violette de mars	303
Tortelle	258		Violier	448
Toute bonne	547		Viorne	102
Trefle	777		Vit de prestre	69
Triquemadame	32		Vit de chien	69
Troefne	468		Vitreole	260
Trucheran	777.738	Y	V	
V			Y	
			Vraye	212







PLANTARVM

HISTORIA PICTVRIS

elegantibus expressa

Medico Autore.

De Absinthio. Cap. I.

NOMINA.



Ἀψινθιον Græcè, Absinthium Latinè appellatur. In officinis tuam appellationem retinuit. Germanicè [Gemeiner vuermuot Eltz] Gallicè, *Aloyne*, *Absince*, ou *Fort*, quasi prohibens hilaritatem & alacritatem, ob iminentiam suam amaritudinem, nominatur. No-

Absinthii unde dictum.

men hoc Græci ab *ἀψινθου*, id est contritudo: per *ἀντιφασιν* deflexerūt quod nullū animal, ob eximiam amaritudinem, hanc herbam attingat. Veteres Græci Comici *ἀψινθιον* quoque conformi etymo, quasi impotabilem dixerunt, quod hanc nemo, propter insignem amarorem, bibere possit.

GENERA.

Absinthij genera sunt tria, Galeno & Dioscoride testibus. Vnum quod Romanū, vulgare, seu commune vocāt: & est id quod passim in Germania nascitur: quod Allobroges retēto nomine vocant, *la romanie*. Officinis etiam absinthiū Romanum dicitur. Huius generis est quod à Pōto regione, in qua nascitur, Ponticum cognominatur: estque cæteris multo præstātius. Alterum genus est marinū, quod Seriplium nomināt. Tertium Santonicum, à Santonibus Gallix populis, apud quos plurimū gignitur, dictum est. Hinc nonnulli eius semen corrupta voce Sanctū. quoniam Santonicum dicēdum esset, appellant. Nisi id nominis ob insignem eius efficaciam, quam in necādis lumbricis obtinet, illi imposuerint. Hodie semē lumbricorum nuncupant Gallicè *Mort de vers*, ou *Barbotine*.

Vulgare Absinthium.

Ponticum

Seripliū. Santonicū.

A

Forma.

*Absinthium ponticum.**Absinthium vulgare.*

Absinthium vulgare, herba est caule ramoso, folijs incanis, multipliciter sectis aureo flore, semine rotundo, racematum coherente.

Absinthiū ponticū siue Romanū ex Galeno xj. methodi medendi, est tum folio tum flore longe quam cetera *Absinthia* minore: odor quoque huic non modo insuavis verū etiam aromaticū qd preferēs reliquis oībus planè est sœdus.

Seriphiū vero herba est prætenuis ramos circosve habens minori similis *Abrotono*, exiguis referta seminibus, subamara & graui odore. Siquidē herba est tenuibus cirris, *Abrotono* fœminæ similis semine in silijs paruo, grauius odorata, & subamara *Santonicum* simile est *Absinthio*, sed non adeo copioso semine scatens, & subamarū.

LOCVS.

Nascitur, *Oribasio* & *Apuleio* autoribus, locis cultis, montosis & saxosis: plurimum autē p̄stātissimūque, in Ponto, Cappadocia: & Tauro mōte. *Seriphiū* passim circa itinera,

nera, macerias vinarū & sepes prouenit: vt verū sit quod à Plinio dictū est, plerasque herbas pedibus cōculeamus, quarū si nobis virtus perspecta esset, eas in cœlū laudibus ferremus. Sātonicū in Gallia vt diximus: copiosē gignitur.

TEMPVS.

Colligendum in fine Iulij mensis, ac in vmbra exsiccā dum: quo etiā tempore floribus & semine prāgnās est.

TEMPERAMENTVM.

Pōticum minus calefacit, quod astringionis multā sit particeps. Minus etiā cæteris generibus extenuat, nō minus tamē resiccāt. Galeno itaque autore calidū in primo gradu & siccum in tertio statuitur. Succus autē eius longē quā herba ipsa calidior est. Vulgare quē astringentiā amarā & acrem qualitatem obtrinet, haud secus atque Ponticum. In hoc tamen ab eo differre videtur, quod in illo maior sit amaritudo, quā adstringitio. Quāuis neque Pōticū modicē amarū sit, quod Ouidius satis ijs inuit versibus: *Turpia deformes gignunt Absinthia campi, Terraque de fructu quam sit amara docet.*

Loquitur autē de Pōto. Seriphium ipsum Abrotono minus est calidum, verum Absinthio calidius. Santonicum in extenuando, & calefaciendo, desiccādōve, Seriphio paulo imbecilius.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Absinthium calfacit, adstringit, bilēque stomacho & vētri inhærentē expurgat. Vrinās cit. Crapulā psumptū arcet inflationibus, vētrisq; & stomachi doloribus, cū Sciseli & Nardo Gallico potū pdest. Fastidia discurrit. Morbo regio correptos, dilutū aut decoctū eius p singulos dies cyathis tribus haustū sanat. Menses cū melle sumptū aut appositū cuocat. Strāgulationibus fungorū ex aceto potum subuenit. Ixiæ, cicutæ, muris aranei moribus, & draconi marino cū vino aduersatur. Anginis cū melle et nitro inungitur. Contra epynictidas ex aqua, sugillata vero & oculorū caligines cū melle, similiter auribus ex qbus manat sanies, illinitur. Decocti eius vapor suffitūve, dētium auriumq; dolores lenit. Decoctū cū passō dolētibus oculis oblinitur. Hypochondrijs, iccinori, & stomacho dolenti,

ac longo tempore affecto, cū cerato Cyprino tritum illinitur. Stomacho autem cum rosaceo subactum. Cum ficis nitro, & farina loliacea, aquę inter cutem, lienosis que subuenit. Præterea vestiarijs arcisq; inditū Absinthiū, vestes ab erodentium iniurijs seruat. Culices, cum oleo perūctū à corporibus abigit & arcet. Atramentum librariū ex diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Par est etiam succum hæc omnia facere, attamē in potionibus improbat, stomacho enim obest, & capitis dolores adfert. Seriphium verò per se, vel cum oriza decoctum, & cum melle sumptum, ascaridas & rotundos lumbricos necat, aluum simul leuiter subducens. Eadem potest præstare cum Sapa aut lenticula decoctum. Santonicū eadem quæ Seriphium potest.

EX GALENO.

Absinthiū adstrictoriā, amarā, & acrem simul qualitatem possidet, exalfaciens pariter & extergēs, roborans & desiccans. Proinde biliosos ventris humores per egestionē infernā propellit, ac per vrinā euacuat. Magis verò quod in venis est biliosum per vrinas expurgat. Ideo contētam in vētre pituitam, sumptū nihil iuuat. Sic neque sit in thorace aut pulmone contineatur: nā adstringēs in eo facultas, quā amara, valentior est.

ABSINTHII PONTICI VIRE.

Ex eodem. xj. Methodi medendi.

Cū aut duplex in omni Absinthio facultas & qualitas sit, velut in libris de medicamentis est traditū, utiq; in Pontico adstringendi facultas non parua est. In reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò (quā saltem gustu agnoscas) aut planē obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde Ponticum ad iocinoris & ventris phlegmonas eligi præstat.

EX PLINIO.

Stomachū corroborat, & ob hoc sapor eius in vina trāsfertur. Bibitur decoctum in aqua, & postea nocte & die refrigeratum sub dio, decoctis sex drachmis foliorū cum ramis suis in cœlestis aquæ sextarijs tribus. Oportet & salē addi

addi. Tritum, vt aiūt, raro in vlu est, sicut & succus expres-
sus. Bibitur & madefacti dilutū. Exprimitur autem cū
primū semē turgescit, madefactū aqua triduo, recēs, aut sic
cum septem diebus, deinde coctum in æreo vase ad tertias
decem heminis, in aquę sextarijs quadraginta quinque, ite-
rūmq; percolatum, herba cicēta: lētē coquitur ad crassi-
tudinē mellis, qualiter ex minore Cētaurio quæritur suc-
cus. Sed hic Absinthij succus inutilis stomacho capitiq;ue
est, cū (vt tradunt) sit illud decoctū saluberrimū: nam sto-
machum adstringit, bilēmq; detrahit, vrinam cit, aluum
emollit, & in dolore sanat, vētris animalia pellit. Malaciā
stomachi & inflationes cū exiguo Sili & Nardo Gallico,
addito aceto discutit. Fastidia abstergit, cōcoctiones adiu-
uat. Cruditates detrahit cum ruta, & pipere, & sale. Anti-
qui purgationis gratia dabāt cū marinæ aquæ veteris se-
xtario, seminis sex drachmis, cum tribus salis, & mellis cya-
tho. Efficacius purgat duplicato sale. Quidam in polenta
dedere supra dictum pōdus addito Pulegio. Alij cōtra pa-
raly sin. Alij pueris folia in fico, sic vt amaritudinem falle-
rent. Facile thoracem purgat cū Iride sumptum. In regio
morbo crudum bibitur cum Apio, aut Adianto. Aduersus
inflationes calidū paulatim sorbetur, ex aqua, iccinoris caū-
sa cum Gallico Nardo, lienis cum aceto, aut fico sumitur.
Aduersatur fungis ex aceto. Item visco, cicute ex vino, &
muris aranei morsibus, draconi marino scorpionibus. Ocu-
lorum claritati multum confert. Epiphoris cū passo impo-
nitur sugillaris cum melle. Aures eius decoctum vaporis
suffitu sanat: aut si manat sanies, cum melle tritum. Vrinā
ac menses eiunt tres quatuor ve ramuli, cum Gallici nardi
radice vna, cyatis aquæ 6. menses priuatim cū melle sum-
ptū, & in vellere appositum. Anginis subuenit cū melle &
nitro. Epinyctidas ex aqua sanat: vulnera recentia, priui-
quā aqua tangātur impositum: prętereaque capitis vlcera
peculiariter ilibus imponitur: cū cypria cera, aut cū fico. Sa-
nat & priuitus. Nō est dādū in febris. Nauseas maris arce-
it nauigationibus potū: inguinū tumore in ventrali habi-
tum. Somnos allicit olfactū, aut in scio sub capite positū.

Vestibus insertum tineas arcet. Culicēs ex oleo perūctis a bigit, & fumo si vratur. Atramētū librariū ex diluto eius temperatū, literas à musculis tuetur. Capillū denigrat Ab sinthij cinis, vnguēto rosaceoq; permixtus. Marinū, quod quidam Seriphium vocāt stomacho inimicū, Aluū mollit pellitq; animalia interancorū. Bibitur cū oleo & sale, aut in farinæ trimestris sorbitione dilutum. Coquitur quātū manus capiat, in aquæ sextario ad dimidias.

VINI ABSINTHITIS VIRES, EX DIOSCORIDE.

Absinthites vinum stomacho accōmodatum est, vrinā eit. Tardē concoquētibus vtile: iccinorosis itidem, nephriticis & regio correptis morbo. Cibū non appetentibus, & stomacho male affectis, & longis præcordiorū distensionibus ac inflationibus, rotūdis lumbricis, & suppressis mensibus auxiliatur. Cōtra ixiæ venena hausta, copiosius potum, & vomitionibus redditum prodest.

CONFECTIO.

Varie vini absinthitis sunt confectiōes, vt ex Dioscoride cōstare potest. Optimum tamen fit, si tusæ Pōtici absinthij drachmæ octo, linteo raro ligatæ, in amphorā vini conijciuntur. Mustum deinde mittitur, relicto vno vasis spiraculo ne effervescens foras exiliat.

APPENDIX.

Semē lumbricorum. Santonici, quod vt commemoratum est, hodie semē lūbricōrum vocant, præcipuus hoc tempore ad lūbricos ex corpore pellēdos & enecandos vsus est. Et si genuinū est, magna efficacia cū melle assumitur tā à pueris, quàm adultis. Seriphium quoq; aduersus lumbricos à multis cōmēdatur, eoque nomine Mors vermiū appellatur. Sūt etiam qui lumbricorum semen nomenclant.

ADNOTATIO.

Absinthium officinis Romanum idem cum Pontico rectē sentis à vulgari autem id esse diuersissimum ex Galeni Methodo abundē probatur. Santonicū à Santonia regione prope Burdegalam albius Romano est, folio non multo latiore. Vtrūque enim & Seriphium est tenui folium, cum vulgare sit latifolium Aloine nobis dictum ab insigni Aloes amaritudine.

De Abrotono. Cap. II.

NOMINA.

Aβροτον Græcis, Abrotonum Latinis nominatur. Officinæ antiquum nomē retinuerūt Gallis. *Auroñe*, ou garde robe appellatur. Hoc autem nomē sibi vſurpauit vt Nicandri testatur interpres, *διὰ τὸ πρὸς τῆς ἀβροῦ καὶ ἡ πικρὸν φαίνεται ἁπλῶς καὶ διὰ τὸ δύσπνοον εἶναι* hoc est, quod conspectu tenerū, molle & delicatum appareat, aut quod grauem, acrēmve & difficilem halitum prospiret.

GENERA.

Abrotonum duorum est generum, veterum & recētiorum omniū sententia, mas & fœmina. Plinius lib. xxj cap. xxj. Marē quidem campestre vocat Abrotonum, fœminā vero montanum. Vulgus, syluestre cypressum, à similitudine & odore foliorum eiusdem nomenclaturæ herbæ frutisue vocat. Gallicè *Cypres*.

FORMA.



Abrotonum mas.

Abrotonum, quod masculum appellamus, fœmētosum, minutis folijs, minus albū quā fœmina: tenui semine ac numeroſo vti Absinthium. Semē aut nō quouis tēpore pducit, sed ad septēbris dūtaxat mēſis initia quo ſi diligēter obſeruabis tempore, ſemine pgnās eſſe cōperies. Rectē igitur *αβροτωναριον* in Dioscoride legitur, huic lectioni non ſolum veterum codicum fide, verum etiam ſenſu ſuffragante.

a iiij

Fœmina

Œmina frutex est, arboris speciem habens, radicibus
folijs, Seriphij modò minutim circũ ramulos incisis, flori-
bus refertus, in summo auri fulgore comantes. corimbos
obtinens, odoratus etiam cum grauitate quadã. Huius fi-
guram. in cap. de camæcy pariflo inuenies.

LOCVS.

Max passim apud Germanos in hortis, & in campestri-
bus nascitur, Œmina verò in collibus & montibus sua spõ
te prouenit.

TEMPVS.

Floret vtrumque Augusto. Colligitur autem in autũ-
no, potissimum Septembri mēse, hoc enim tempore semē
vt diximus profert.

TEMPERAMENTVM.

Abrotonum calidũ & siccum, inq; tertio ordine seu re-
cessu post media situm est, id quod amaritudo eius, quam
gustu præ se fert facillè monstrat.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Vtriusque Abrotoni semē seruēfactũ, & crudum tritũ
cum aqua potum, non nisi recta ceruice spirātibus ruptis,
cõuulsis, ischiadicis, vrinæ difficultatibus, & suppressis mē-
sibus auxiliatur. Potum in vino exitialium venenorũ an-
tidotum est. Cum oleo rigentibus illinitur. Serpētes lecto
instratum & suffitum fugat. Cũ vino potum aduersus eo-
rundem morsus, peculiariter autem scorpionum & phalā-
giorum, prodest, Oculorum inflātionibus cum coto-
neo cocto, aut panē illitum subuenit. Tritum cum farina
hordeacea decoctũque tubercula discutit. Admiscetur iri-
no vnguento.

EXGALENO.

Non instrenuè excalfacit & desiccatur. Nã siue comã cũ
floribus (reliqua enim eius palea inutilis est) cõtusam vleo-
ri puro illinas, mordax & irritās videbitur: siue eo in oleo
macerato, caput aut ventrē perfūdere voles, admodũ cale-
facere reperies. Quin & si qui per circuitũ rigoribus capi-
untur, eos ante inuasionem rigorum hoc voles cõfricare,
minus vtique rigore cõcutientur, imò & sensus confestim
vbi ad

ubi admodū fuerit ipsum calefacere percipit. Porro quod lumbricos interimat par est, nimirum quum sit amarum. Protinus vero quodd & digerēdi & incidendi vim habeat scies. Præterea Abrotonū vstum calidum & siccum facultate est, magis etiā quā cucurbita sicca vsta & anethi radix. Illa enim vlceribus humidis simul & citra phlegmone callo in duratis profunt, ac proinde maximē vlceribus ijs quę in pudendorū præputijs sunt, competere videntur at cinis Abrotoni vlceribus omnibus mordax est, ac idcirco cum oleo tenuium parcium, Cicino scilicet, aut Raphanino aut Sycionio veteri, potissimum Sabino, ad alopecias confert. Barbam etiam segnius tardiūque enascentem cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed nec minus illis lentiscino maceratum. Rarefaciendi enim vim, eod quodd tenuium est partum, verum inimicum stomacho existit.

EX PLINIO.

Vfus est folijs, sed maior semine, ad calefaciēdum, ideo nervis vtile, tussi, ortonōipſis, vrinæ, torminibus, cōuulsis, ruptis, lumbis. Datur bibēdum manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyatis bibitur. Datur & semen tusum in aqua drachmæ pōdere. Prodest & vuluæ. Concoquit panos cum farina hordeacea, & oculorum inflātionibus illinitur cotoneo malo concocto. Serpentes fugat. Contra ictus eorum bibitur in vino, illiniturq; Efficacissimum contra ea quorū veneno tremores & frigus accidunt, vt scorpionum & phalangiorum, & cōtra alia venena. Prodest quoquo modo algētibus, & ad extrahenda ea quę inhaerent corporibus. Pellit interancorum mala. Ramo eius si subijciatur puluino, venerē stimulari tradunt: efficacissimāque herbam esse contra omnia veneficia, quibus coitus inhibeatur.

ADNOTATIO.

Pro semina abrotono Absinthium Romanum videris pictura exprimere, quamquam id vulgo sylvestre cypressum a similitudine & odore foliorum eiusdem appellari scribit. Quam postea ex Plinio chamaecypressum pingui, quibusdam videtur Abrotonum semina.

De *Asaro*. Cap. III.

NOMINA.

Aσαρὸν Græcè, Asarum latinè dicitur. Offinis hodie nomè retinet Corruptè autem Asara Bacchara, vulgago Germanicè [hasel wurtz] Gallicè *du Cabaret*, Asarū autem dictum est, quod in ornatum nō veniat, vel vt Plinius lib. xxj. cap. vj. inquit, quoniam in coronas atq; festa nō addatur: vel quòd manualibus scopis, quæ odori gracia gestantur, minimè solitum sit inseri.

FORMA.

*Asarum.*

Folia hædere similia habet longè tamen molliora, rotundioraque, Flores inter folia ad radicem purpureos, odoratos Hyoscyami cytino similes, in quo semen acino non dissimilè. Radices multas, geniculas tenues, obliquas, grauimini pèrsimiles, longè tamen graciliores, odoratas, caletaciètes, & linguā admodum erodentes. Ceterum hic admonendum esse lectorem duximus omnia Dioscoridis exemplaria hoc in loco deprauata esse preperaque ha-

bere vel *πικρὸν τι* vel *μικρὸν τι*, cum potius scribèdum sit, *μαλακώτερον* id quod p̄tuit Plinij testimonio, partì etiā iudicè sensu ipso cōprobari pōt. Plinius siquidè li. xij. ca. xij. Asarū sic depingit: Est hederæ folijs rotundioribus tātū, molliori

horibúsque. Si quis verò ea de re ad iudicè sensum referat, Afarūque cūm hederā cōferat, Afari certè folia neque densiora, neq; minora heredæ folijs esse comperiet, quā Afari folia maiora multò sint quā hederæ. Proinde cūm folia hederæ illorum comparatiōe multo minora sint, euidentissimum est pro *μακρότερα* legendum esse *μαλακώτερα*, huic nimirum lectiōi ad stipulantibus Plinio & sensus indicio, vt dictum est: ad tactum enim, huius folia lōgè sunt hederæ molliora. Accedit quòd ab vna dictiōe in aliā facilis sit transitus. His itaque rationibus motus. Afari folia *μαλακώτερα*, hoc est, molliora hederæ folijs esse dixi, vt reuera etiam sunt.

L O C V S.

Nascitur in vmbrosis locis, mōtib; potissimum & syluis, aspera enim macræve & sicca loca amat.

T E M P V S.

Bis anno, vere nimirum & autumno floret. Colligēdū in fine Augusti, à die videlicet decimoquinto eius mensis vsque ad octauum Septembris.

T E M P E R A M E N T V M.

Afarum in calefaciendo & exciccando ordinis tertij existit, radices potissimū eius.

V I R E S E X D I O S C O R I D E.

Radices Afari calefaciunt & vrinam mouent. Hidropicis & ischiadicis diuturnis prosunt. Ducūt menses pondere drachmarum sex cum murso potæ. Purgāt ellebori albi modo. Ruptis præterea, conuulsis, tussi veteri, difficultati spirandi, & vrinæ conferunt. Cum vino potæ ferarū moribus salutare. Folia adstringunt. Illita capitis doloribus, oculorum inflammationibus, ægilopis incipientibus mammis à partu tumētibus, ignibusq; sacris prosunt. Coma somnum etiam conciliat. Sic Crateias herbarius de Afaro proditum reliquit.

E X G A L E N O.

Afari radices vtilis sunt facultate similes radicibus Acori, intensiores tamen. Itaq; ex ijs, quæ de illis prodita sunt hic faciendā coniectura.

E X

EX PLINIO.

Nardi vim habet Asarum, quod & ipsum aliqui sylvestre Nardum appellant.

EX MARCO AEMYLYO.

Est Asaron Græcè Vulgago dicta Latine.

Hæc calida & sicca virtutibus dicitur esse.

Tertius est illi gradus, ut dicunt, in utroque.

Prouocat urinam, potatæque menstrua purgat.

Hocque modo iecoris medicatur sumpta dolori,

Hydropicisque iuuat, schiasim fugat hausta frequenter.

Et vuluæ morbi decoctio subuenit eius.

Dicitur ictericum potata repellere morbum.

Elleboriq; modo vomitu præcordia purgat.

Sed non est huius purgatio tam violenta,

Nec metuenda quidem, si fiat taliter illa:

De folijs eius triginta recentia tollens,

Adde mori tantum quo possint cuncta recondi.

Tota nocte mero facias macerentur in illo,

Mane terens, vino quo sunt macerata resoluæ.

Tunc olus excoctum cum pingui carne recenti

Porcina, prius agroso da sufficienter.

Et sumat vini vult quantum fors & albi.

Sic Asari succum colatum trade bibendum.

Fortibus & magnis est hic numerus foliorum

Sufficiens, reliquis, ut diximus, est minuendus

Iuxta quod vires, ætas, & cætera poscunt.

APPENDIX.

Lixiuum in quo Asarum decoctum est, si eo caput laetur, cerebrum roborat, & memoriæ. Succus etiam eius cum Pompholyge, caligantibus oculis confert.

ADNOTATIO.

Asarum seu bacca nobis per methatesin Cabaret.

De Acoro. Cap. III.

NOMINA.

Aκορον Græcè. Acorum Latine appellatur, Officinis nomen retinet. Germanice, [Geel Schvvertel.] Gallicè Flâme bastarde ou glaienl de Riuere, ou de mare vocatur.

ACO

Acoron aphrodisiam quasi venerē Græci etiam vocant. Apuleius, quicumque ille fuerit, in cōmentario quod de ali quot herbis scriptum à se reliquit. Piper apium dictam fuisse hanc herbam testatur, quod ea in alucarijs inspersa, nū quam diffugiant apes.

FORMA.



Acoron gladiolus luteus.

Folia Iridis habet, angustiora tamen. Radices non dissimiles, implicatas, neque in rectum enatas, sed obliquas & in superficie existētes: geniculis seu internodijs distinctas, subalbas, gustu acres, odore non ingratas. Præstat densum, candidum, non cariosum, plenum & odoratum, cuius modi est in Colchide & Galatia. Ex qua sanè Dioscoridis descriptione satis liquet, Acoron nostrum, quo hodie officinæ vtuntur, etsi non verum sit, tamen aliquā saltem Acori speciem esse Iridis enim folia obti-

net, angustiora tamen. Radices quoque similes, implicatas & inuicem adnatas, non in rectum, sed in oblicum tendētes: non in profundo delitescētes, sed in superficie existētes, & modico cespite tectas: denique geniculis seu internodijs interceptas. Neque etiam in colore ab eo quem Dioscorides pingit, variare videtur: nostrum enim Acoron nō raro *λευκόν* hoc est, subalbas seu candicantes radices habere conspicitur. Accidit autem ut & rubentes intus habeat radices, quæ tamen cum candicantes passim intercur-

ren

rentes venas obtineant, rectè subalbæ dici possunt, quod nimirum neque vere rubescant, neque candidum etiam prorsus colorem referant, sed eum potius qui ex rubro & candido mixtus sit. Cæterum radices Acori quæ intus cædicant, foris vt plurimum subrubent. Hinc est quod Serapion in Acori descriptione Dioscoridis verba referens, *ἐπολιεύς* dictiōem ita vertere voluit: Et color radicū exterior tendit ad rubedinem. Proinde qui hac sola ratione, quod Acori radix intus interdū rubescat, mouentur: vt diuersum nostrum prorsus à Dioscoridis credant, ij non vtūtur argumēto quod tanti momenti sit, vt quod conantur persuadere alijs possint. Cum enim Dioscorides Acori radices *ἐπολιεύς* hoc est, albicantes faciat, noster certè nunquam non tales habere deprehenditur: vel enim verè cædicantes sunt, vel subrubētes, quas etiam *ἐπολιεύς* rectè dici posse iam ostendimus. Perro quamuis odoratæ nō sint eius radices, tamen nihil ob stare posset odor, quò minus nostrum verum esse putaremus Acorum, quum abūdè cōstet illum haud aliter quàm colorem, secūdum diuersas regiones in eadē sæpe herba mutari: si non esset aliud, quod vt diuersum certo crederemus nos vrgeret: hoc nēpe, quod nostri Acori radices gustu acres non sint, quod tamen oēs veteres vno ore de Acoro affirmant, sed potius adstringētes. Quapropter & si tota ferè descriptio illi respondere videatur, tamen quia acris non est, vires eas quas vero Acoro tribuūt veteres, habere non potest: vt hoc nomine vehementer errent qui à solis descriptionibus tantum pēdent. Nec minus hallucinantur officinæ quæ ad vrinas mouēdas, aut menses euocandos, lienēsve minuendos eo vtūtur Perperam etiam Diacori compositionem ex eodem faciunt. Curet itaq; vt verum Acorū habeāt, quod iā in multis Galliæ officinis prostare puto. Nā radix illa quæ à non nullis seplasiarijs nūc sub nomine maioris Galangæ veditur, si cetera etiā respondeāt, haud dubie radix veri Acori est. Et debēt seplasiarij ea vti, quoties in compositionibus medicamētōrū Acori sit mētio, præcipuè aut in Diacori compositione apparanda, quod hæc calefaciēdo cōcoctio

nem

nē stomachi supra modū iuuet. Et hoc eō cōfidētius faciē-
dum esse hortor, quod Galangā maiorem veri Acori radi-
cem esse existimē geniculis enim scatet, foris subrubra, in-
tus subalba gustu acris: odore non ingrata, vt hoc nomī-
ne illa tutō & sine errore officinæ pro Acoro vti queant.

LOCVS.

Apuleius locis cultis, pratis ac hortis nasci, ratāq; inuē-
tu herbam hanc tradit. Nostrum Acorum iuxta omnes, &
pafsim in aquosis & palustribus locis prouenit.

TEMPVS.

Legitur radix Acori æstatis initio, & siccatur in vmbra
digitalibus frustis.

TEMPERAMENTVM.

In calefaciendo & desiccando tertij est ordinis. Nostrū
quidem desiccat, at citra calefactionem.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Acori radix calefaciēdi vim habet. Decoctū eius potū.
vrinā cit. Prodest lateris, thoracis & iccoris doloribus: tor-
minibus, ruptis, cōuulsis. Lienes minuit. Vrinæ stilicidio,
& venenatorū morsibus subuenit. Incessu, quemadmodū
Iris, ad muliebria utilis est. Succus radicis caligines oculo-
rum discutit. Antidotis præterea radix utiliter miscetur.

EXGALENO.

Acori vtimur radice, quæ gustu acris est, & modice ama-
ra, odorēq; non iniucunda. Hinc manifestū est hanc faeu-
tate calidam, & consistētia tenuium partium esse. Huic cō-
sentaneum est, vt vrinā moueat, & lienes induratos iuuet,
tum coruæ mēbranæ crassitiē detergeat simul atq; exte-
nuet. Ad hoc autem melior est ipsius succus. Omnino ve-
rò siccificum esse clarum est.

EXPLINIO.

Vis ei est ad calefaciēdum extenuandūq; efficax, con-
tra suffusiones & caligines oculorum succo eiusdem potō:
contraq; serpentes. Pectoris doloribus subuenit, & ideo
antidotis miscetur. Iecinori medetur, thoraci quoque &
præcordijs. Vrinam cit eius decoctum, & omnia vesicæ vi-
tia sanat. Testium tumores radix decocta in vino, tritāq;
& il

& illita mitè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat, decocto huius herbæ fouentibus. Contusis & euerfis pota duobus obolis in mulsi cyatis tribus radix prodest. Acoron quoque utile est interioribus fœminarum morbis.

ACORI OFFICINARVM VIRE.S.

Acori adulteri-
ni facultates.

Gustus abundè monstrat eius radicem immensam adstrigendi facultatem obtinere. Hinc est quod diuersam planè à veri Acori radice vim sortita sit. Nam vt hæc tenui-um est partium & facultate calida, atque adeò detergit extenuat atque discutit: ita illa consistètia crassarum partium, at facultate frigida constringit, dēfat, cogit & contrahit. Quare vrinam non cit, vt verum Acorum, nec mēses euocat, sed potius suppressit. Sanguinem etiam vndecunq; manantem cohibet. Proinde rectè Pandectarum autor scribit, eum qui secū Acori radicem gestet, à nullo sanguinis profluuio corripī. Et ex recentioribus aliqui hanc facultatem Acori nostri obseruarunt, atque hinc adeò tradunt eius succum igne expressum, menses nimium promanantes cōstringere posse, id quod certè de Acoro vero affirmare vanissimum erit. Ex ijs itaq; intelligent iam seplasiarij, quis vsus nostri etiam in medicina sit Acori nec cōmittent, vt fanatici cuiusdam (qui nuper Morophrasti impudentis hominis pestilentissimas nugæ & ineptias tegere, atque adeò epistola aliqua operi illius temerè præfixa commendare, ac præ illo monstro reliquos omnes medicos, si dijs placet contemnere ausus est) consilio obsecuti, hoc prorsus abijciant, cum illius immensa sit abstringendi, quod demonstraui-
mus, facultas.

ADNOTATIO.

Acorus officinarum gladiolus aque, vulgo dicitur flore luteo non vtendus, sed indicus, vulgo galanga maior, qua verus esse Dioscoridi Acorus videtur.

De

De Althea. Cap. v.

NOMINA.

Aλθαία, ἡ ἰβίσκος, ἡ ἰβίσκος Græcè: Althæa, Ebiscus, Ibiscus
 Latine dicitur Officinæ, q̄ vt plurimū barbaris vocibus gaudet, Bismaluam, Maluiscum, & simpliciter Eufiscum nomināt. Maluauisci autē vox corrupta est, ex malua nimirum & eufisco cōposita, quasi dicat aliquis Malua ebiscus, hoc nomine illam ab alijs maluis, quæ sanè multæ sunt segregās. Germanice, [Eibisch.] Gallicè *Guymaulues*. Althæa vero à multiplici remediorū potestate & vsu, vel vt Plinius ait, ab excellētia effectus nominata est. Siquidē αλθαία Græcis idem valet, ac si à medendo medicam simpliciter dicas. Nam αλθαίνει, illis mederi significat, αλθεῖς vero remedium & medicinam.

Bismaluam
Maluauiscum
ca.

Althæa
unde dicta.

FORMA.

Sylvestris Maluæ genus est, cui folia vt Cyclamino rotunda: lanuginosa, flos rosaceus, caulis cubitorum binum, radix lenta viscosaque, intus candida.

LOCVS.

Locis humetibus, pinguibusque gaudet.

TEMPVS.

Radices, vt reliquarū ferè herbarum omnium inter autūni initia, hoc est, in fine Augusti, & Septēbris mēsis principio

b pio



Althæa.

pio, legendæ. Folia verò & semen in æstate. Floret Iulio & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Folia & flores calidi & sicci primo excessu seu ordine Radices verò in principio secundi.

VIRÈS EX DIO- SCORIDE.

Radix in aqua mulsa aut vino cocta, aut per se pota, ad vulnera, parotidas, strumas, abscessus, mammarum inflammationes, sedis contusiones, inflationes, neruorum distensiones, efficax est. Si quidem discutit & maturat, aut rûpit & ad cicatricem perducit. Cocta quo dictum est modo, & cû adipe anserino aut suillo, vel therebinthina subacta, ad vteri inflammationes & præclusiones vtiliter admouetur. Decoctum eius idem præstat, secundasq; à partu relictas educit. Decoctû radiceis cum vino potum, vrinę difficultati, calculosorû cruditati, dysentericis, ischiadicis, tremulis & ruptis succurrit. Dentium mitigat dolorem cû aceto decocta, colluto inde ore. Semen aut viride siccûmq; tritum, cum aceto in sole perunctum alphas extergit. Cum aceto & oleo inunctum, à venenatorû morsibus præseruat. Valer ad dysenteriam, sanguinis reiectionem & alui fluores. Seminis decoctû in posca aut vino, contra omnes apum & minutarum ferarum ictus bibitur. Folia cum exiguo oleo morsibus & ambustis illinuntur. Addensat aquam sub dio radix trita & admixta.

EX GALENO.

Digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, coquendi coctu difficilia tubercula facultatē obtinet. Porro radix eius & semen cætera quidē pari herbę viridi modo agunt, verum tenuiorum partium, magisque exciccatoriam, ad hæc magis extersoriam quàm illa facultatem ostēdunt, vt & alphas detergant, & semen renum calculos costringat. Radiceis autem decoctum dysenterię, alui pfluuii & sanguinis reiectioni vtile est, nempe cum astringentem quandam facultatem possideat.

EX

EX PLINIO.

Althææ contra omnes aculeatos ietus efficacior vis, præcipuè scorpionum, vesparum, similiùmq; & muris araneis. Quin & trita cum oleo, hac perûcti ante, vel habentes eâ, non feriuntur. Eius radix præcipuè conuulsis ruptisq; efficax est. Cocta in aqua aluum sistit. Ex vino albo strumas & parotidas, & mammarum inflammationes, & pauos in vino folia decocta & illita tollût. Eadem arida in lacte decocta, quamlibet perniciosæ tussi citissimè medentur. Hippocrates vulneratis, sitietibusq; defectu sanguinis, radice decoctæ succum bibendum dedit. Et eam vulneribus cum melle & resina, item conuulsis, luxatis, tumientibus, & musculis, neruis, articulis imposuit. Et astmaticis ac dysentericis in vino bibendam dedit. Mirum, aquam radice ea addita addensari sub dio, atque elactescere. Efficacior autem quò recentior.

EX THEOPHRASTO.

Vsus eius ad rupta, & tusses è vino dulci, & ad vlcera in oleo. Alias si carnibus concoquas, in idem aggregare, ac veluti conglutinare posse affirmant.

De Anagallide. Cap. VI.

NOMINA.

A^{ναγallis} Græcè, Anagallis Latinè, Officinis insitata, Germanicè [Gauchhey], oder Colmark raut.] Gallicè *Mouyon*. Hoc nominis fortè à Germanis inditū est, quod Anagallis in limine vestibuli suspensa, maleficiorū introitum pellere credita sit. Errât qui morsum gallinæ seu Passerinam vulgo dictam herbam, Anagallida putant, haud secus atque ij, qui Auriculam muris pro Anagallide depictam ostendunt herbarij.

GENERA.

Duo duntaxat Anagallidis esse genera, veterum omnium testimonio constat, marem scilicet & fœminam quæ sanè nullo nisi florum discrimine distant. Mas enim puniceo, Gallicè. *Μουyon ποικυ*, Fœmina vero cœruleo flore

b ij con

conspicitur. Gallicè *Mouron violet*. Proinde hallucinari iuniores ac barbaros medicos euidentissimum est, qui plura duobus Anagallidis genera constituunt.

FORMA.

*Anagallis mas.**Anagallis fœmina.*

Frutices sunt Anagallidis parui, in terra iacentes, folia in quadrangulis caulibus pusilla habentes, & modicè rotunda ad Helxines similitudinem. Semen gerunt rotundum. Non quicquam sanè certius hac scriptorum pictura respōdet: cum duplex sit in flore color, puiceus nimirum & cœruleus, quadranguli caules per terram sparsi, folia nō toto ambitu rotunda, & semen coriandro nō dissimile circinatum. Non est tamen quod sic humi prostratos hos frutices intelligas, ut prorsus non suppullulent. Nam in altum etiā surgunt,

furgunt non tamen altius,quam ipsa tibi examusim pictura monstrat.

LOCVS.

Pedibus in aruis vincisque vbique calcatur, neq; quæ nunc Anagallide despectius est, cum tamen in antiqua medicina multus eius fuerit vsus. Licet autem ubiq; ferè proueniat, in vliginosis tamen lætior.

TEMPVS.

Per æstatem vtriusque prouentus maximus est, potissimum autem mense Augusto. Florent autem à Maio mense vsque in Autumnum.

TEMPERAMENTVM.

Anagallidis vterque sexus calidam & siccā facultatem obrinet, quod scilicet extergere possint. Mulieres namque quæ asperiores & decolores à natura cutem acceperūt, ad læuorem nitorēq; vultus, harum succo vtuntur, vt hac ratione errare necesse sit, qui Anagallidas frigidas & humidas esse statuunt.


Error
quorūdā
detegitur

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vtraque mitigandi facultatem habet, inflammationes arcent, surculos extrahunt, vlcera serpentia cōpescūt. Succus earum gargarissatus pituitā capitis purgat. Per nares infusus dolorem dentiū lenit, si in contrariam narē iniicitur. Argema cum Attico melle emendat, & oculorum caligines iuuat. Cōtra viperarum morsus, renum & iecinoris vitia, ex vino potus prodest. Tradunt nonnulli eam, quæ cœruleum florem habet, prociduum sedem reprimere: quæ vero puniceum, illitu euocare.

EX GALENO.

Anagallis vtraque, tam ea quæ florem parit cœruleum, quàm ea quæ puniceum, admodum extergendi facultate obtinent. Quendam etiam calorem attractorium possident, ita vt impactos corpori refigant aculeos. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. Et vt summam dicatur, exiccatoriam citra mordicationem facultatem habent, quamobrem vulnera glutinant, & putrida adiuuant.



EX

EX PLINIO.

Vtriusque succus oculorū caliginem discutit cum melle & ex ictu cruorē, & argema rubens, magis cum attico melle inūctus. Pupillas dilatat, & ideo hoc inunguntur antē, quibus paracentesis fit: umentorū quoq; oculis medētur. Succus caput purgat per nares infusus, ita vt deinde vino colluatur. Bibitur & cōtra angues succi drachma in vino. Mirum, quod fœminā pecora vitant, at si decepta similitudine (flore enim tantū distant) degustauere, statim eā q̄ Asyla vocatur, in remedio quærūt. Ea à nostris ferus oculus nuncupatur. Præcipiunt aliqui effossuris, ante solis ortum priusquam quicquā aliquid locantur, ter salutare eā tūc sublatā exprimere, ita præcipuas esse vires. Vrinā cient Anagallides, Iecinori mirē prosunt, cohibēt quas nomas vocāt. Vtiles & recentibus plagis præcipuē senum corpori. Ad recētia quōque vulnēra tanta traditur vis, vt sanient ossibus extrahant. Anagallis cœrulea procidentia sedis retro agit, è diuerso rubens proritat.

ADNOTATIO.

Anagallis vtraque in hortis frequens, parvula arboris tamen habitu, caule quadrato. Mouron petit & quarré nobis dicitur.

De Alsine Cap. VII.

NOMINAT

Aλσιν Græcè, Auricula muris Latinè, Morsus gallinæ vulgò appellatur. Pauerina Italicè, quod paueris id est, iunioribus anseribus gratū pabulum subministret. Auiculas caueis inclusas, cum fastidiunt escā, aucupes hac herba recreare solent. Germanicè [Hounerderm.] Gallicè *Mouron* alijs *Morgeline* vocatur. Alsine autem dicta est, q̄ lucos, quæ Græci *ἄλση* nominant, nemorosaq; & vmbrosa loca amet. Auricula verò muris, quòd musculorum auri- bus folia similia habeat.

GENERA.

Quamvis Dioscorides & alij vnā tantū Alsinen faciūt

Nos tamen tria eiusdem genera, licet plura adhuc inueniantur, damus. Primum genus Alsinen maiorem vocauimus, quod scilicet vera sit Alsine, & alijs maior. Gallicè *Mouron* nominatur. Alterius generis plantam Alsinē mediam appellauimus, Gallicè *moyen Mouron ou bastard*. Hæc quod ad flores attinet, qui cœrulei sunt, à descriptione variat: eiusdem tamen cum priore facultatis. Tertiij generis herbam, Alsinen minorem vocauimus. Hæc quidem, vt prima pulchrè descriptioni respondet, Gallicè *petit ou menu Mouron* nuncupatur.


FORMA.



Alsinæ primum genus.

Cauliculis serpit rotundis, è quorum geniculis exiles ramuli profiliunt, folijs Helxines minoribus minùsque hirsutis, flore exiguo, candido, foris herbaceo. Hæc cum teritur, cucumeris odorem refert. Non autem illam Peponis maturi iucunditatem, sed herbaceum cucumeris odorem, subolet. Porro cum Dioscorides Helxine similem esse Alsinen tradit, non de ea Helxine, quæ vulgò Parietaria, sed ea potius quæ alio nomine Cissam pelos dicitur, intelligas oportet: hæc enim fo-

lia Hederæ haud dissimilia obtinet. Adeò vt liquidò iam constet, Alsinen esse eam herbam, quam pascim hodie Morsum gallinæ appellant. Huc accedit quòd facultates



Alfines alterum genus

Alfines tertium genus.

ut ex sequentibus patebit, quas vulgus Morfui gallinæ tribuit, ab Alūnes viribus nihil varient.

LOCVS.

Nasceitur in lucis, hortis, & maximè in parientibus, marcerijs, opacisque locis.

TEMPVS.

Incipit à media hyeme: arcescit autem æstate media. Cū proreperit, musculorum aures imitatur folijs.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerantem & humectantem haud secus quàm Helxine obtinet facultatem: est ei in aquæ essentia frigida quæ: quare & circa adstrictiorem refrigerat.

Alfi

VIRES EX DIOSCORIDE.

Alſine refrigerandi facultatem obtinet. Oculorum inflammationibus cum polenta illita conuenit. Succus eius aurium doloribus inſtillatus prodeſt. In vniuerſum eadem quæ Helxine poteſt.

EX GALENO.

Ad ſeruantes phlegmonas, & mediocria eryſipelata competit.

EX PLINIO.

Uſus eius ad collectiones inflammationeſque. Quin emendat omnia quæ Helxine, ſed infirmius. Epiphoris peculiariter imponitur: item verendis vlceribusque cū farina hordeacea. Succus eius auribus inſunditur.

APPENDIX.

Eaſdem facultates herbis quas Morſus gallinæ vulgò nominant, noſtri temporis herbarij tribuunt, quod ſcilicet ad ſeruantes inflammationes, ac eryſipelata proſint. Omnes enim vt dictum eſt, refrigerant atque humectant. Hinc eſt quod minorem aliqui Germanorum [Fieber-eraut] vocent, quia ſcilicet febribus accommoda & utilis ſit.

ADNOTATIO.

Alſine omnis Mouſſon nobis dicitur, à baccarum ſimilitudine ſolano.

De Anthemide. Cap. VIII.

NOMINA.

AΝΘΙΣ, ἢ καμαμιλλος Grece, Anthemis, Chamæmelō Latinè, Officinis corrupto nomiſe Camomilla dicitur, Germanicè [Camillè] Gallicè *Camomille*: Chamæmelō quoniam odorem habeat mali, appellat, id quod de primo genere potiſſimum intelligendum venit.


GENERA.

Tria eius genera, floribus tantū diſtancia, inueniuntur. Hi enim etſi intus aurei ſint, tamen foris per ambitum il-

lis adiacent folia aut cādida, aut lutea, aut purpurea. Quæ foris in orbem caudida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκάνθιμον, & vulgò hodie Camomilla vocatur. Gallicè *Camomille blanche*. Quæ vero luteis per ambitū folijs cōstat ea haud dubiè est, quā priuatim Dioscorides à suis floribus χρυσάνθιμον nominat, Germani autem pulchrè ad Græcā appellationē alludētes, [Goldtblumē, Gelcamillen, Streichbloumē,] appellāt Gal. *Camomille jaune*, & herba sanctę Marię nūcupatur vulgò. Tertia species chamæmeli, quæ nimirum purpurea per orbem folia habet, nulla alia est nisi ea quam hodie vulgus medicorum, Consolidam regalem, Germani autem à similitudine calcaris, cui respondet flosculus eius herbæ, & à colore lepidoregióque, qui aspectari nūquā satis potest, [Rittersporn] vocant, Dioscorides peculiariter ὑρανθιμον, eo quod vere floreat dici tradit. Tria itaque in vniuersum Anthemidis seu Chamæmeli genera sunt: quorum sanè primum Chamæmelon leucanthemon, alterum Chamæmelon chrisanthemon, tertium Chamæmelon Eranthemon Dioscoridi nominatur. De duobus primis generibus neminem dubitare, quin vera & legitima sint, arbitramur quod nihil in ijs sit quod Dioscoridis descriptioni, quam mox subiiciemus, nō respondeat. Tertium fortè nonnullis, qui morosius omnia obseruant, minimè genuinum Chamæmeli genus esse videbitur, ideóque quibus simus argumentis & coniecturis impulsus, vt tertium Anthemidis genus credamus, necesse erit ostendere. Potissimum autem quod nos in hanc sententiam pertraxit, est, quod singula in Dioscoridis descriptione illi congruāt: rami scilicet palmum nō excedentes, fruticosi, multas alas habentes parui & exigui, capitula rotunda, aurea, foris purpureis folijs magnitudine in nullo alio genere Rutæ folijs magis similibus circumdata. Deinde sententiā hanc nostram confirmavit antiquissimus codex manuscriptus, in quo pictura exquisitissimè Regalem dictam consolidam refert, quam ijs sanè verbis describit. [Herba est quam quidā Monachellam siue Capuciarium vocant, à cucullo haud dubiè monachorum quem flores illius herbæ referunt, nomen imponen

antes) Dioscorides Eranthemon appellat, & est vna species Anthemidis, quæ folia instar Camomillæ habet, nigriora tamen: florem autem violæ similem. Hæc ille. Quibus omnibus illud etiam accedit, nostram de hac herba sententiam mirifice corroborans, quod vulgus hodie medicorum Cōsolidam regalem calculeosis, & oculis prodesse tradat, adeo vt illius etiam conspectum multos ex oculis laborantes sanasse dicant. Atque hinc fit vt studiosi passim eam herbam in suis museis suspensam habeant, oculis hæc ratione consulere volentes. Has autem omnes facultates, vt ex sequentibus patebit, Eranthemo suo Dioscorides etiam adscribit. Quamobrem nihil certius est, quam Cōsolidam regalem tertium esse Anthemidis genus, id quod argumenta nostra iam adducta palam euincunt.


FORMA.



Chamamelon Leucanthemon



Chamamelon Aureū.

*Consolida Regalis.*

Rami palmum non excedunt, frequentes alas habentes parui, tennes & multi, capitulis rotundis. Flores intus aureos continent, foris verò per ambitum candidos, aut luteos, aut purpureos, foliorum Rutæ magnitudine.

LOCVS.

Nascuntur in aspero secco macroque solo, & iuxta semitas atque itinera.

TEMPVS.

Colliguntur verè in calidis potissimum regionibus, in nostris inter æstatis initia, hoc est Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & desiccant in primo ordine.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Vim habet radices, flores, & herba calefaciendi, extenuandique. Potu & incesione menses, fœtus, calculos, & vrinam pellunt. Aduersus inflationes, & tenuis intestini, dolores bibuntur. Bile suffusos expurgant, & ictericis medentur. Decocto earum vesicæ vitia fouentur. Efficacius ex omnibus generibus est, quod florem fert purpureum, cæterisque maius existit, idque propriè Eranthemum vocatur. Quod verò Leucanthemon & Chrysanthemon cognominant, vehementius vrinam ciunt. Aegilopijs illitæ medentur. Commanducata oris vlcera sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terentes ipsas ad pellendos febrium circuitus. Folia & flores re
poni

poni debent, & separatim contusa in pastillos conformari. Radix quoque siccatur, & vsu poscente interim partes duas herbæ, floris aut radice modò vnam interim contra floris duas, & herbæ vnam alternis diebus duplicantes pondus, dare conuenit. Bibere autem oportet in vino diluto mulso.

EX GALENO.

Tenuinum est partium, quam obrem digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet. Est itaque Chamæmélon tenuitate Rosæ pertimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, animali familiares, & temperatas. Quapropter lassitudinibus, vt si quid aliud, confert, dolorésque mitigat. Præterea tensa remittit & laxat, quæque mediocriter dura sunt, emollit, quæque cōstipata condensatæ sunt, rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris alicuius inflammationem infestant, dissoluit, præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate consistunt. Qua de re & ab Aegyptiorum sapientissimis Soli consecrata est, febriumque omnium remedium putatur. Verùm hac quidem in re à veritate aberrant: solas enim quas diximus febres sanare potest, easque quæ iam concoctæ sunt. Iuuat autem pulchrè reliquas etiam omnes quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex visceris inflammatione prognatæ: nam & harum remedium Chamæmelum vel streuissimum est, vbi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondrijs, vt si quid aliud, gratum existit.

EX PLINIO.

Medici vere folia tusa in pastillos digerunt, item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ vnius ponere contra serpentum ictus. Pellit mortuos partus, item menstrua in potu, & vrinam, calculosque, inflationes, iccinorum vitia, bilem suffusam ægilopia. Commanducata, vlcera manantes in ore eruptiones sanat. Ex omnibus in generibus ad calculos efficacissima est quæ florem purpureum, habet, cuius & foliorum, & fruticis amplitudo maiuscula est. Hanc propriè quidam Eranthemom vocant.

ADNOTATIO.

Chamamelum leucanthemum nomen nobis retinet, *Chrysanthemum* quod pinguis, mihi quòd sciam non est visum. Erant *hemum*, quia verè floret in calcaris effigiem, in ambitu purpureum, cornuta nobis dicta pingitur, qua tamen floret mensibus.

De Anetho. Cap. IX.

NOMINA.

A ^{υανθος} in officinis Græcè, *Anethum* Latine appellatur. Nomen in officinis genuinum retinet. Germani. [Dyllen, & Hochkraut, (Gallicè *Anet* nominatur.

FORMA.

*Anethum.*

Anethum sesquicubitali proceritate assurgit, multicaule ramosum, exilitate folij in staminis penè modum extenuata, luteolo flosculo, semine lato & quasi foliato, radice lignosa, neque adeo prolixa, umbella scæmculi, cui cognatum quasi genus, propter similitudinem videri potest.

LOCVS.

In hortis scitur: interdum & sponte scæniculi: modo, prouenit.

TEMPVS.

Floret in æstate, Iunio & Iulio mensibus.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Anethum ad eò calefacit, vt habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exsiccantium verò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Vstum autem tertij tum calefacientium, tum desiccantiũ ordinis sit.

VIRES EX DIO-
SCORIDE.

Anethi aridi comæ seminisque decoctum potum lac euocat. Tormina & inflationes sedat. Alium leuésque vomitiones sistit. Vrinam cit. Singultus lenit. Oculos hebetat; & genituram assidue potum extinguit. Decoctum eius mulieribus præfocatione vuluæ laborantibus ad insidendum vile. Semen eiusdem vstum & illitum condylomata tollit.

EX GALENO.

Anethum in oleo decoctum digerit, sedat dolores, somnum conciliat, crudos & incœctos humores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies pus monentibus, & maturantibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tum calidius, tum tenuiorum partiũ est, atque ad eò digerendi facultate præditum. Vstum vlceribus admodum humidis illitum prodest, potissimùm ijs quæ in pudendo cõsistunt. Quæ autem in præputio sunt inueterata, ijs probè cicatricem inducit. Cæterum viride humidius est, & minus calidum, itaque magis concoquit sicco, & somnum conciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres coronis ex eo concinnatis in sympo-
sij vfi esse.

EX PLINIO.

Anethum ructus mouet, & tormina sedat, Aluũ sistit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua vel vino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptum ex aqua sedat cruditates. Cinis eius vuam in faucibus leuat, oculos & genituram hebetat.

EX SIMEONE SETHI.

Ad crassorum humorum inflationes prodest. Quidam sanè ipsum stomacho bonum esse, alij, verò minimè, di-
xerunt

xerunt. Illi quidem ad eius caliditatem, & facultatem quæ humiditatem concoquit, & flatus qui sunt in ventriculo discutit, respexerunt: ij verò ad substantiam eius, quæ cras-
sarum est partium, concoctu difficilis, & nauscosa. Oleo incoctum discutit, & somnum conciliat. Inunctum tu-
mores crudos concoquit. Inflationes quoque quæ in ven-
triculo generantur, digerit. Corpus ex immodico labore defatigatum curat. Renes verò, vt quidam aiunt, lædit.

De Aizoo. Cap. X.

NOMINA.

A Eijsop Græcè: Aizoon, Sedum, Semperuium Lati-
nè nominatur. Postremum nomen officinæ obti-
nuerunt. Vulgò Iouis barba. Germanicè [großz hausz
vvrtz] Gallicè *de la Ioubarbe* dicitur, quòd scilicet non-
nullis locis plebis animos iam pridem inuasit opinio,
non feriri fulmine domum in cuius tegulis vireat Sedum.
Porro Aizoon & Semperuium appellant, quod perpe-
tuo, tam æstate quàm hyeme vireat, nec vllis frigoribus,
aut cœli iniuria quantumuis frigida emoriatur.

GENERA.

Aizoon Dioscoridem sequentes tria eius genera statuimus.
maius. Primum Aizoon seu Sedum maius, quòd folia latiora
Aizoon habeat. Alterum Sedum minus, quod Græcis etiam
minus. *τρίδακτε*, quia ter floreat in anno, vocatur. Vulgò Ver-
Vermicu- micularis, à similitudine foliorum, quæ rotunda sunt,
laris. & figuræ oualis, vt vermiculos putes, & Crassula mi-
Crassula nor nominatur. Huius iterum duo sunt genera: alterum
minor. enim mas est, quod nimirum floribus luteis spectatur, &
Tertium (Gallis *Triquemadame*, *Ioubarbe*, & *Rabauit* appellatur.)
genus. Alterum fœmina, quod pallidis seu candidis conspici-
Aizoi, tur floribus. (*Ioubarbe à petite feuille*) Tertium genus est
quod Aizoon sylvestre. Gallicè. (*Couille de prestre.*) Ab
alijs, Portulaca sylvestris, aut Illecebra minus rectè &
impropriè dicitur. Nam Portulaca sylvestris diuer-
sa ab hoc tertio sedi genere herba est, vt suo dicemus
loco

loco. Illecebræ autem nomen alij debetur herbæ, quæ Telephion vocatur, vt in eiusdem historia docebimus. Nomina verò hæc generi illi indiderunt, seducti errore eorum qui portulacæ syluestrem cum tertio Aizoo apud Dioscoridem confunderunt, atque adeò quæ debentur Portulacæ & Telephio nomina, Aizoo temerè assignarunt. Vt enim viribus diuersa est Portulacæ syluestris ab hoc genere tertio Aizoi, ita etiam nomine & forma. Quare meritò reprehendendi sunt qui duo hæc capita sic sibi temerè miscuerunt. Vulgares herbarij Vermicularem minorem vocant. Galli Pain d'Oyseau.

FORMA.

*Sedum maius.**Sedum minus.*

c Semp

*Sedum minus* fœmina.*Sedum tertium* genus.

Semperuium maius caules profert cubitales, interdum etiam maiores, pollicis crassitudine, pingues, egregiè virentes, incisuras Characiæ Tithymalli instar habentes. Folia pingua, pollicis magnitudine, in cacumine lingue similia, alia in terram resupinata, alia in capite inuicem contracta circulo oculi figuram circumscribunt. Minus Aizoon caules ab vna radice exeuntes multos habet, tenues, folijs plenis, rotandis, pinguibus, parvis, in summo acuminatis. E-mittit autem è medio caulem palmi altitudine, umbellâ & flores pallidos luteosve sustinentem. *χλωρά* enim hoc loco, vt alias sæpe, pro *ἀνερ* accipitur, id quod ex Serapione etiam abundè constare potest, qui hunc Dioscoridis locū ita reddidit. Et habet virgam in medio longam, circa longitudinem palmi, super quā est capitellum, in quo est flos citri

vietrinus, subtilis. Eam autem Semperuiui minoris speciem quæ flosculis luteolis spectatur, dilucidioris doctrinæ, gratia, marem appellauimus, Alteram verò quæ candidos obtinet flores, tæminam. Tertium semperuiui genus, syluestre dictum, foliola habet pinguiora, ad Portulacæ figuram accedentia, & hirsuta, breuorique cacumine. His verbis exquisitè admodum Dioscorides & Plinius tertium Aizoi genus, quod vermicularem minorem hodie appellant, delinearunt. Habet enim pingua admodum foliola, ad Portulacæ syluestris formam nonnihil accedentia, hirsuta, & breuiori quàm in Aizoo minori cacumine. Reliqua quæ sequuntur in quibusdam Dioscoridis exemplaribus, manifestè adulterina sunt. Neque ijs plura habet Aldinum exemplar, & alia quæ paulò sunt castigatiora.

LOCVS.

Maius nascitur in montanis & testeis. Nonnulli autem in tectis domorum conferunt. Minus Aizoon in muris & petris, maceris vinearum, parietibusque prouenit. Tertium in petrosis locis, sepulchris umbrosis, oppidorumque fossis.

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio mensibus maius & minus. Tertium autem genus in Maio tantum floribus ornatur luteis.

TEMPERAMENTVM.

Aizoon vtrunque, tam maius quàm minus, desiccât modicè, vehementer autem refrigerant: sunt enim ex tertio ordine & recessu refrigerantium. Tertium genus calidum esse, Dioscoridis & omnium veterum testimonio constat. Gustus etià minimè reclamationat: si enim gustaueris, linguam vehementer vrit.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Maius vim obrinet refrigerandi & abstringendi. Conferunt ad erysipelata, herpetas, nomas, oculorum inflammationes, ambusta, podagras, folia per se, & cum polenta illita. Succus verò cum polenta & rosaceo, capiti in doloribus infunditur. Datur à phalango morbis in potu, diar-

rhæa laborantibus, dysentericisq̃. Teretes lumbricos cum vino potus excutit. Subditus in pello, muliebres fluxiones sistit. Succus etiam lippigntibus à sanguine vtiliter inungitur. Minoris folia antedicto eandem facultatem habent. Tertium genus calefaciendi vim habet, acrem & exulcerantem. Cum axungia illitum strumas discutit.

EX GALENO.

Semperuiuum vtrunque tam maius quàm minus deficit quidem modicè, quandoquidem & mediocriter adstringat omnis alterius vehementis qualitatis expers: quare in eo aquicà essentia abundat. Refrigerat nō mediocriter, idcōque ad erysipelata, herpetas, & à fluxione natas phlegmonas prodest.

EX PLINIO.

Vtriusquevis eadem, perfrigerare & adstringere. Medentur epiphoris folia imposita, vel succus inunctus. Purgant enim vlcera oculorum, explētque, & ad cicatricem perdunt. Palpebras deglutiunt. Eadem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum ictibus, aconitoverò, maius Aizoon præcipuè. A scorpionibus quoque feriri id habentem negant. Medentur & aurium dolori.

APPENDIX.

Errat non parum hodie magna medicorum pars, qui Se di genus tertium refrigerare, asserere haud verentur. Et mirum sanè cur ab eo errore illos Dioscorides non reuocet, qui disertè ait, hoc ipsum calefaciendi, & exulcerandi facultatem habere. Sed fortè non magnopere laborant, quid de hac planta Dioscorides tradat. Debuisset tamen erroris huius admonuisse eos saltem Germanica eius plantæ nomenclatura. Neque enim alia ratione [Maurpicffer] nostris Germanis dicta est, nisi quòd in muris proueniat, gustuq̃ acris, vt piper, admodum fit.

ADNOTATIO.

Sedum maius nobis Iouii barba, minus mas Triquemadame, bortense est acetarijs expetitur: alia duo filuestria quorum postea

rius vermicularis nobis dicitur, calida multum herba, non autem teneo aliud.

De Arnoglossō. Cap. XI.

NOMINA.

A *Πυλασσορ* Græcis: Arnoglossum, Plātago Latinis nō minatur. Nomen latinum Plantaginis officinæ retinuerunt. Gallicè, *Du Plantain*, Germanicè [Vvegrich Scazungen] quod nomen Græco pulchrè respondet, dicitur. Arnoglossum, quòd eius folia agninx linguæ similia sint, appellarunt Græci. Latini autem Plantaginem, ducto à planta vocabulo, nuncuparunt. Sunt tamen qui à multitudine neruorum, quibus quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sunt, Polyneuron vocant.

GENERA.

Duo Plantaginis sunt genera, veterum omnium sententia, maior & minor. Maior, quam peculiariter à septenis quæ in folijs apparent costis, Græcè *ἑπταπλευρον*, id est, Septinerviā vocant Germanis nostris à foliorum latitudine. [Grosser oder breyter vvegrich] nominatur. Gallicè *Grand Plantain*.] Minor, eo quòd eius folia fibris quinque tanquam neruis distincta sunt, *πεντάνευρον*, id est, Quinqueneruia dicitur. Officinæ, quoniam solum artius desinit in acumen, & velut in lanceæ mucronem fastigiatur, Lanceolatam, vulgus autem Lanceolam appellat. Germa. [Klein oder spitziger vvegrich] quia scilicet acuminator & longior est & ab equinæ costæ similitudine, [Roszripp] vocatur, Gallicè *Plantain petit*.

scriptiones hæ Dioscoridis pulchrè picturæ respondent. Antiquus etiam herbarius easdem pro maiori & minori Plantagine herbas exhibet.

FORMA.

ADNOTATIO.



Lanceolata.

Quam pingit Fuchsius Plantaginem minorem nos mediam putamus, eandemque quinqueneruiam, officinis autem Arnoglossam sed corruptè: Minori autem plantaginì, quam nos Lanceolatam dici putamus, nunc primum figuram damus.

LOCVS.

Maior in palustribus potissimùm nascitur. Vtraque autem circum sepes, aggeres, prata, & lacunosa loca.

TEMPVS.

Herba & flores in æstatis initio. Maio & Iunio mensibus, semen verò

Augusto carpitur mense.

TEMPERAMENTVM.

Mixtæ est temperaturæ Plantago, habet enim quiddam aqueum frigidum: habet verò & austerum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaque refrigerat simul & desiccatur, & in utroque secundi recessus à medijs est.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Vim habent folia exiccatoria & adstringentem, idcirco ad omnia vlcera maligna, elephantica, quæ humore scatēt

c in j & for

& sordida, conferunt. Eruptiones sanguinis, nomas, carbūculos, herpetas, epinyctidasque cohibent, Vlcera vetera & inæqualia cicatrice obducunt. Medentur & ijs quæ Chironia nuncupantur. Sinus glutinant. Morsibus canis, ambustis, inflammationibus, parotidi, panis profunt. Strumis & ægilopis cum sale illita conferunt. Olus coctū cum aceto & sale dysentericis & cæliacis sumptum subuenit. Datur & in locum Betæ cum lenticula coctum. In leucophlegmatia post aridas epulas in medio herba decocta datur Comitialibus & asthmaticis data proficit. Foliorum succus oris vlcera continua collutione purgat. Cum cretacicimolia & cerusa ignibus sacris medetur. Fistulas infusus sanat. Aurium doloribus & lippitudinibus succus instillatus & collyrijs additus prodest. Gingiuis sanguinolentis, & sanguinem reijicientibus potus confert. Dysentericis subter per aluum iniicitur. Bibitur contra tabem. Aduersus vteri strangulationes in lana apponitur: item vuluæ fluxiones. Semen cū vino potum alui fluxiones, & sanguinis excreatiōes sistit. Radix decocta collutione, & commanducata, dentium dolores sedat, Eadem cum folijs in passo ad vesicæ renūmq; vlcera præbetur. Ferunt tres radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ potas, tertianis auxiliari, & quatuor quartanis. Sunt qui radice è collo suspensa ad strumas discutendas vtantur.

EX GALENO.

Quæcunque medicamenta cum hoc quoddam refrigerant vnâ etiâ adstringunt, ea & ad vlcera maligna omnia, & ad fluxiones, & putredines profunt, atque adeo etiam ad dysenterias: nam & sanguinis eruptiones sistunt, & si quid aduratur refrigerant. Sinus quoque glutinant, & alia vlcera recentia simul & vetera. In omnibus serè id genus medicamenti primas tenet, aut certè nulli secundū est Arnoglossum, idque temperaturæ symmetria. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem quæ nondum obstupesciat, Semen eius & radix similis sunt facultatis, attenuamen siccioris, & minus frigidæ. Semen etiam subtilium est partium, radices autem crassiorum Et huius herbæ folia
exsiccata

exsiccata subtilioris & minus frigida facultatis sunt, nempe diffilato ex eo ac digesto excremento aqueo. Hac ratione radicibus vtuntur ad dentium dolores, tum manducantes, tum collationibus incoquentes. Præterea ad iccinoris & renū obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoque & multo magis semen: hæc enim quandam abstergendi in se facultatem habent, quā & in herba viridi inesse satis conijci potest, verum ab humiditatis copia vinci.

EX PLINIO.

Vis mira in siccando densandq; corpore, cauterij vicē obtinens. Nulla res æque sistit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Stomachum corroborat Plantago per se sumpta in cibo cum lentæ alicæue sorbitione. Strumis medetur. Semen eius in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, aut alica ex succo eius sumpta dysentericis datur. Lichenis fædo malo medetur trita. Vitia sedis & attritus celerrimè sanat. Ex aqua mulsa duabus horis ante accessionem pota duabus drachmis, tertianas leniores facit, vel succus radicis madefactæ vel tufæ, vel ipsa radix trita in aqua ferro calesacta. Quidam ternas radices in tribus cyathis aquæ dederunt. Idem in quartanis quaternas fecerunt. Hydropicos sanat in cibo cum prius panem siccum comederint sine potu. Folia podagras refrigerant, & in primo impetu podagræ rubentis, hoc est, calidæ, conueniunt. Oris vlcera succus emendat, & folia radicisque commanducata, vel si rheumatismo laboret os. Vitio reiectionis sanguinis idem medetur. Phthisim sanat si bibatur, & ipsa decocta in vino cum sale & oleo à somno matutino refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollunt folia tusa, addito sale modico. Fistulis infusus succus auxilio est. Sanguinis profluuium sistit semen, si ore reijciatur, siue aluo fluat siue sæminarum vtero. Succus vomentibus sanguinem datur. Cõtufis, euer sis omnibus modis ipsa sumitur. Medetur omnium generum vlceribus, peculiariter sæminarum, senum, & infantium, igne mollita, melior & cum cerato.

ADNOTATIO.

Plantago hac triplex omnibus nota, & qua speciatim præter
c v has

has Arnoglossum dicitur, rotundioribus folijs, Lanuginosis, sessilibus, & su frequentissimo officinarum celebris.

De Alismate. Cap. XII.

NOMINA.

Aλίσμα, ἢ δαμασκωνίον Græcè: Alisma, Damasonium Latine nominatur. Sunt qui eam herbam esse putent, quam herbarij & vulgus nominant Barbam sylvanā, & Plantaginem aquaticam, nonnulli verò eam, quam multi pastorem fistulā vocant, prior Germanis [Vvasser Vuegrich, & Froschloffel, Gallicè *Plantain aquatique*.] scilicet in palustribus nascatur, ubi frequentes sunt ranæ. Altera vero ijsdē [Hirteupsciff] nominatur Offici. fistula pastoris

Plantaginem autem aquaticam ob natales & similitudinem quæ illi cum vera Plantagine est, dixerūt: quemadmodum fistulam pastorem, quod singulari scapo rudi fistulæ & longitudinem & effigiem quandam videatur imitari. Quæ verò nostra de ijs sit sententia, paulò post indicabimus.

FORMA.

Alisma folia Plantaginis similia habet, angustiora tamen & in terram reflexa, demissā quæ, Caulis illi est tenuis simplex, altitudine cubitum excedente, Thyrsus similis, capitula habens. Flores tenues candidos



*Alisma, siue Plantago
aquatica.*

didos & aliquatenus pallidos obtinet. Radices vt Ellebori nigri tenues, odoratas, acres, modicęque pingues, Ex qua quidẽ delineatione satis constat, neutram herbarum quarum picturas damus, esse Alisma. Nam herba quam hodie Plantaginem aquaticam vocant, non per omnia historię respondet. Vt enim alia præteream, radix eius neque odorata, neque acris est. Alterius autem, quam pastorem fistulam nominauimus, & si radix odorata sit, minimè tamen acris existit, Quicquid tamen sit, hac potius quam altera pro Alisma vtendum esse censeo. Eius effigiem suo loco dabimus.

LOCVS.

Aquosa amat loca, in quibus passim nascitur.

TEMPVS.

In æstate colligi potest tum enim floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse hanc herbam satis monstrat radices, quas acres esse constat. Absterforiam etiam quandam in se facultatem obtinent.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix vnius aut alterius drachmę pondere cum vino pota, his qui leporem marinum deuorarunt, prodest: & quos rubeta rana momorderit, quique opium hauerunt. Torminibus & dysenterię per se, aut cum Dauco pari pondere pota confert. Conuulsis itidem & vteri stragulationibus. Herba sistit aluum, menses ducit, & œdemata illita lenit.

EX GALENO

Damafonium aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, quod radix eius epota dysenterias facit & aluum sistat, atque œdemata mitiget. Nos verò ea experti non sumus. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit, pota comminuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quod absterforiam quandã facultatem obtinet.

EX PLINIO.

Vfus in radice aduersus ranas & lepores marinos. Lepo-
ri marino aduersatur in vino potū. Strumis imponitur ex
aqua cœlesti folium tritum, vel radix cum axungia tusa,
ita vt imposita folio suo operiatur. Sic & ad omnes cerui-
cis dolores, tumoresque quacunq; in parte.

De *Artemisia*. Cap. XIII

NOMINA.

A *ἄρτεμις* Græcis, *Artemisia* Latinis, Germanis [Bey-
foufz. Bucken, S. Iohās, gurtel Sonnenuend gurtel
oder, Grosser reinfarn] Gallicè *Armoise*, *Arsemise*, ou l'herbe
de saint Iehan appellatur. Officinæ veterem appellationē
retinent. Nomen herbæ inditum putant ab *artemisia* vxo
re Mausoli regis, quæ sibi hanc herbam adoptauit, cum an-
te Parthenis, id est virginis, quod virgo dea illi nomē de-
derit, vocaretur. Non desunt qui ab *Artemide* cognomina-
tam arbitrentur, quod priuatim scēminarum malis, quibus
— *ἄρτεμις*, hoc est, Diana præest, medeatur. Nomen Germa-
— nicum [S. Iohans gurtel.] quasi diuis Ioannis zonā dicas
— à supersticiosulis nonnullis monachis & mulierculis herbę
— huic impositum est. Nam fuerunt qui non coronas dunta-
— xat, sed etiam zonas ex ista herba confecerunt, quas tādē
— in ignem, qui in die diuo Ioanni baptistæ sacro, in singulis
— plateis vrbiū succendebatur, nescio in quem cūctum, pro-
— iccerunt, haud dubiè hac herba in deserto diuum Ioannem
— cinctum fuisse somniati.

GENERA.

Artemi- Tres sunt, Dioscoride teste, *Artemisix* species, quæ etiā
fia latifo- hodie apud nos passim reperiuntur. Prima *πλατυφύλλον*.
lia. Latine *Artemisia latifolia* dici potest. Ea autem est quę sim-
Artemi- pliciter hodie *Artemisia* vocatur. Huius iterū duo sunt ge-
fia tenui- nera colore duntaxat distantia: vnum caule & floribus ru-
folia. bens, Germanis [Rotbucken, vel Rotbeyfutz] dicitur *Alte*
Matrica- rum candicans caule, floribus verò flauis, Germanicè [Vu-
ria. eiszbucken] appellatur. Altera Græcè *λεπτόφυλλον*, Latine
vero *Tenuifolia* nominatur: quod quidem genus vulgus
hodie




hodie Matricariam Germani [Mutterkraut & Mettram,] Gallicè de l'Esparagouette. quòd vteri quem matricem vocant morbis medeatur. Tertia species Artemisia monoclonos dicitur, Tanacetum corrupto nomine pro Tagetem hodie nominant, Germani [Reinfarn,] quòd filicis ferè specie referat, & in aquarum ripis nascatur, alio nomine [Vvutmkraut,] quoniam lumbricos è ventre pellat. Esse verò hanc herbam aliquam artemisiæ speciem, vel hinc etiam constare potest. quòd primam speciem, vt diximus, nonnulli Germanicè [Groslen reinfarn] vocant hac enim nomenclatura manifestè docent & eam, quam Tagetem appellant. Artemisiæ esse congenerem, quòd scilicet eandem habeat appellationem. Huius haud dubiè generis est herba, quæ elegantissimos profert flores, garyophillos Indos vocatos. Nulla enim in re nisi floribus, qui sunt elegantiores & longè maiores, ab hac nostra distat: odore tamen nostram hæc etiam vincit. Hinc est quòd Tagetem indicam appellauerimus. Germanicè autem [Indianisch negelen.] His autem herbis tribus conuenire Dioscoridis descriptiones faciliè vnusquisque ex ijs quæ paulò post dicemus, cognoscet. Esse autem Artemisiæ genera ex manuscripto codice, quem ob vetustatem lubens cito, manifestè colligi potest. Is enim pithas ordine tres iam commemoratas herbas ita ob oculos ponit, vt nemo qui illas vel semel saltem viderit, nò agnoscat. Picturæ accedunt descriptiones, & nomenclaturæ hodie etiam vsitatæ. Primam enim Artemisiam, alteram, Leptophyllum & Matricariam, tertiam verò Tagetem, quo nomine Apuleius vsus est, & Tanacetum appellat, ita vt nemo deinceps quin vera sint Artemisiæ genera dubitare debeat, aut meritò possit.

FOR



Artemisia latifolia.



Artemisia tenuifolia.

Prima species quæ priuatim Artemisia dicitur, fruticosa est herba, Absinthio similis, maiora tamen & pinguiora folia habet quæ supernè ex nigro virescunt, subter autè candicant, crebrò etiam resecta sunt. Flos illi tennis, & semen rotundum. Altera, folia tenuiora obrinet, flores exiguos, tenues, albos, & grauiter olentes. Porrò Sampsuchi odorem confricata eius folia & flores referunt. Quæ vtique descriptio ita matricariam vulgò dictam herbam exprimit vt nemo non nisi talpa cæcior sit, hanc esse alteram Artemisiz speciem videat. Fruticota enim herba est Matricaria, folijs quàm sit Artemisia propriè dicta gracilioribus, floribus tenuioribus, per ambitum albis, (intus enim lutei existunt) grauitor cum vniuersa herba olentibus. Halluci-

nan

*Artemisia Monoclonos.**Tagetes Indianus.*

nantur itaque qui Serapionis interpretem secuti, Dioscoridis Parthenium esse putant, ut suo loco abundè demonstrabimus. Tertia *μονοκλωνος*, hoc est, unicaulis dicta, simplici caule confurgit, folijs minutim scissis. Caulis in summo floribus luteis & tenuibus abundat. Hæc odoris iucunditate priorem vincit. Quæ sanè descriptio pulchrè herbam Tanacetum appellatam hodiè, designat, ita ut tertiam esse Artemisiæ speciem nemo dubitare debeat, aut saltem iure queat. Tagetes Indica caule exurgit rubescente, ramulis multis brachiato, folijs tenuibus, minutim scissis, & grauius odoratis, floribus in summo caule luteis, & croci terè colorem referentibus, elegantia nulli alteri cedentibus.

LOCVS.

Prima nascitur in aquosis, incultis, asperisq; locis. Altera in hortis, locis, siccis & lapidosis. Tertia in aquarum ripis atque vinearum aggeribus passim prouenit vnde Germanicè appposito vocabulo [Reinfarn] vocatur. Indica Tagetes non nisi sata prouenit in Germania.

TEMPVS.

Singula genera tria æstate, potissimum cum vna matu rescit, tunc enim abundant floribus, colliguntur. Indica paulò tardius in nostra regione floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & modicè desiccant, & sunt, quòd ad calefactionem attinet, ordinis secundi: quòd verò ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sunt etiam modicè tenuium partium.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Excalfaciunt & extenuât. Feruēfactæ prosunt ad incensus muliebres, ducēdos mēses, secundas, & fœtus. Vteri præclusionem atq; inflammationem iuuant, lapides frangūt, & vrinæ suppressionē tollunt. Herba ipsa imo ventri illata copiosa mēses mouet. Succus eius cū myrrha subactus & admotus, ex vtero elicit quæcunque & infessio. Bibitur etiam coma trium drachmarum pondere, corundem ducendorum gratia. Si quis stomacho laborans Artemisiam leptophyllon contuderit probè cum oleo amygdalino, & veluti malagma confecerit, stomachoque imposuerit, sana bitur. Nervorum quoque dolore si quis affectus fuerit, ac succum eius cum oleo rosaceo miscens inūxerit, curabitur.

EXGALENO.

Ad renum calculos mediocriter, & ad vteri fomentationes prosunt.

EXPLINIO.

Artemisa priuatim fœminarum malis medetur. Eandem quoque secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, bestiâve vllam, ne solem quidem. Bibitur & hæc ex vino aduersus opium. Alligata priuatim potens traditur potâve aduersus ranas. Alligatam qui habet viator, negatur lassitudinem sentire.

APPENDIX.

Præter dictas facultates vsu compertū est, flores Tanacetī ueris ex vino vel lacte datos, mirificè ex ventre lumbricos pellere, ideòque Germanis herba lumbricorum, vt paulò ante diximus, appellata est hæc Artemisiæ species.

ADNOTATIO.

Artemisia vulgaris, nobis nomen retinet. *Tenuifoliam pingiā* quam *matricariam* vulgò vocamus. *Monoclonum* verò *Tanacetum* seu *Athanasiam* vulgò dictam, *Tagetem* verò quem *oculum Indicum* vocamus.

De Aparine. Cap. XIII.

NOMINA.


Aπαρίνη, ἢ ὀμφαλόκαρπος, ἢ φιλάκροπος Græcè, Aparine Latinè, [Klebkraut] German. Gallicè Riebles ou Grateron, nominatur. Omphalocarpos ab umbilici similitudine quam semen eius refert, rectè dicta est. Philanthropos autem vox humanitatis, amoris & comitatus illi imposita est, quòd blanda, comis, & hospitalis herba sit, nec aliter prætereuntium vestes apprehendat, quàm solent amici & hospitaliores à se discedentes comprehensa veste retinere, aut si id nequeant, aliquandiu sequi. Quam appellationem pulchrè Germani exprimentes, [Klebkraut] nominant. Est enim illis [Kleben,] quòd Latinis tenaciter adhærere, Officinæ & herbarij nonnulli Aspergulam hodie vocant, rectius tamen vna detrita litera nominarent Asperulam, quòd asperitate sua attingentium vestimentis pertinaciter hæreat.

ADNOTATIO.

Errant qui putant legendum esse ὀμφαλόκαρπος, nam Dioscoridis & Pauli exemplaria castigatiora omnia habent ὀμφαλόκαρπος, Cui sanè lectioni & ratio ipsa subscribit, cum sic nominata sit ab umbilici specie, quā fructus eius refert. Quare cum altera lectio ratione omni destituta sit, immeritò ab Orosio Hispano Hermolaus, Marcellus, & Ruellius Dioscoridis interpretæ ὀμφαλόκαρπος legentes, taxantur.

d Ramu

FORMA.

*Aparine.*

Ramulos habet Aparine multos, exiguos, quadrángulos, & asperos. Folia per ambitum orbémve Rubiæ modo per interualla circumposita. Flores albos. Semen durum, candidum, rotundum, à medio, vmbilici modo, leniter cōcauum. Ipsa herba vestibus adhærescit.

LOCVS.

Nascitur in frumentario agro, aut hortis circa sepes & maceries.

TEMPVS.

Colligitur æstate dum semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Aparine modicè extergit & desiccatur, habetque nonnihil tenuium partium: vnde satis constat hanc aliquā etiam caloris in se portionem habere.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Aperines seminis, caulium & foliorum succus cum vino potus phalangiorum & viperarum moribus auxiliatur. Infusus doloribus aurium medetur. Herba ipsa cum axungia trita coacta, strumias discutit.

EX

EX PLINIO.

Efficax Aparine contra serpentes, semine potō ex vino drachma: & contra phalāgia. Sanguinis abundantia ex vulneribus reprimunt folia iposita. Succus auribus infunditur.

ADNOTATIO.

Aparine Rebulus.

De Acantho. Cap. XV.

NOMINA.

Aκανθος, ἡ ἀκανθα Græcis, Acanthus siue Acantha Latinis dicitur. Officinæ à similitudine, quam eius folia cum anterioribus vrsorum pedibus habent, Brancam vrsinam vocant. Gal. Branche vrsine. Ad quam etiam similitudinem respicientes Germani. [Bernclavv, oder Berntatz] nominant. Illud non prætereūdum esse putavi, hanc herbam olim etiam Romanis Marmorariam esse dictam: quæ vox in omnibus Dioscoridis exemplaribus deprauata est, ac in Mamolariam detorta: quod eius folia columuarum maxime Corinthiarum capitulis insculpebantur, quarum identidem tam scapi quam vertices marmore splendebant. Antiqui etiam Acantho pateras pingebant.

GENERA.

Duo Acanthi genera damus. Primum quidem legitimā Acanthū nominauimus, quod scilicet descriptioni per omnia respondeat. Germanis dicitur [Vuelsch bernklaun.] Alterum Germanicam, quod nimirum in Germania officinæ omnes pro Acantho hanc vsurpēt herbam. Germanis simpliciter [Bernclavv] vocatur. Gal. Branche vrsine sauage.

FORMA.

Folia habet multò quam Lactuca latiora, & longiora, Erucæ modo incisuris diuisa, nigricantia, pinguis, læuis. Caulem lēuem, binum cubitorum, digitali crassitudine, ex interuallis sub ipsum vsque verticem foliolis quibusdam oblongis veluti nucamentis, aculeatis, ex quibus candidus promittitur flos. Semen illi est oblongū, luteum, caput thyrsi specie. Radices subsunt glutinosæ, mucosæ, rubentes, longæ. Hactenus Dioscorides. Si autem veri Acanthi picturā diligenter spectare volueris, huic descriptioni prorsus qua

*Acanthus vera.**Acanthus germanica.*

drare videbis, ita ut nulla sit nota quæ illi non ad amissim respondeat. Neque impedit quòd Acantha spinam significet, spinosa enim & hæc quidem herba est, sed mollibus duntaxat spinis prædita, ideòque à Vergilio mollis Acanthus dicitur. Germanicam tamen Acanthum ad Dioscoridis picturam non penitus accedere, est evidentissimū. Potest tamen in prioris inopia, huius etiam commodus esse usus, ut ex ijs quæ paulò post dicemus, patebit.

LOCVS.

Nascitur vera in hortis, petrosis & humèribus locis: Germanica in hortis & pratis vndique.

TEMPVS.

Colligitur in æstate dum floribus & semine abúdat, Iunio præcipue & Iulio mensibus,

TEM

TEMPERAMENTVM.

Folia Acanthi mediocriter digerentem facultatem obtinent. At radix exsiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium. Hanc vim Acantho etiam Germanico inesse gustus abundè monstrat. Folia enim eius modicè amara, radix autem subacris est.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Acanthi radices vstis & luxatis illitæ profunt. Potæ vrinam mouent, & aluum sistunt. Tabidis, ruptis, conuulsis, mire vtilis sunt.

EX PLINIO.

Radices Acanthi vstis luxatisque mirè profunt. Item ruptis, conuulsis, & phthisin metuentibus incoctæ cibo, maxime prisana. Podagris quoque illinuntur tritæ & calefactæ calidis.

APPENDIX.

Et si nostræ Branchæ vrsinæ facies picturæ Acanthi non vndequaque respondeat, tamen eius radicem eandem habere cum Acanthi veri radice facultatem est euidentissimam. Cùm enim gustu subacris sit necesse est vt exsiccet, incidat, & tenuium sit partium. Errât itaque nostræ ætatis medici, qui neglecta prorsus radice, folijs tantum vtût ur, quæ quidem mediocriter discutere valent.

ADNOTATIO.

Acanthus Brancha vrsina. Acanthus Germanica nobis non visa.

De Spina alba. Cap. XVI.

NOMINA.

A *Κανθα λευκή* Græcè, Spina alba Carduus mariæ Lari-
nè, Officinæ Bedegarim seu Bedeguar Pœno nomi-
ne appellatur, Germani [Vveiszdistel oder Gtechkraut.]
Gall. *Chardon ou laiçl de nostre Dame, ou Chardon argentin, ou*
Artichaut sauvage. Nomen herba hæc ab albis folijs seu la-
cteis maculis, quibus folia conspersa sunt, accepit.

d iij

Quam

G E N E R A .

Quamuis Dioseorides spinę albę duntaxat vnum faciat genus, tamen cum plures inueniantur apud nos herbę quę descriptioni respondent, plura etiam vt illius statuamus genera necesse est. Vñ itaque genus est, quod hodie vulgò Carduus Marię dicitur, Germanis verò. [Mariendistel, oder Frauendistel.] Gallicè vero, *Chardon, ou laisel de nostre Dame, ou chardon argentin.* nominatur. Nos spinam albam hortensem, quòd nimirum in hortis tantum proueniat, appellauimus. Alterum genus syluestre est, proximè ad Dioseoridis delineationem accedens, ideòque à Germanis [Vuciszvvegdistel,] gallis autem, *Artichaut sauvage, ou chardon commun* vocatur. Cæterum vidimus herbam peregrinam siccam, quę haud dubiè vera spina alba erat, & descriptioni prorsus conueniebat. Picturam eius, quòd viridi destituebamur, dare non potuimus.

F O R M A .

Folia albo Chamæleonti similia habet, angustiora tamen & candidiora, subdēsa, subasperave, & aculeata. Caulē binos cubitos excedentem; digiti magni aut minoris crassitudine, subalbum, intus cauum. In cacumine eius caput est aculeatum, Echino marino non absimile, minus tamen & oblongum. Flores purpureos, in quibus semen Cni ei forma, sed rotundius. Quę descriptio in vniuersum quadrare videtur herbę quę vulgò Carduus Marię appellatur. Folia siquidem Chamæleonti non dissimilia, angustiora, candidioraque (albis enim maculis vndique conspersa, vnde tam Græcum quam Latinum, adde etiam Germanicum nomen [Vucisz distel,] vt diximus, illi impositum est) subdensa, subasperave, & minimè mollia, & mirum in modum aculeata sunt, ita vt contrētata inmodicè pungant. Caulis eidem supra bina cubita altus, digiti maioris aut minoris crassitudine, & inanis. In summo vertice Echino marino hāud dissimile caput aculeatum obtinet. Flores denique

*Spina alba hortensis.**Spina alba sylvestris.*

nique purpureos, in quibus semen Cnico simile, sed rotundius habet, id quod ex vtriusque seminis collatione pulchrè deprehendes. His accedit, quòd facultates quas albæ Spinæ Dioscorides tribuit, similes sint ijs quæ Carduo Mariæ à nostris hodie herbarijs assignantur, vt ex sequētibus innotescet clarius. Sylvestri sic quadrat descriptio vt nihil magis. Nam, vt cætera omittam, radix desiccatoria est, & modicè astringens, atque adeò genuinas Spinæ albæ facultates obtinet.

LOCVS.

Nascitur in montibus & syluosis locis. Hodie in hortis
 d iij pas

passim etiam plantatur, vt alia quædam Carduorum genera Syluestre in locis incultis & arenosis prouenit.

TEMPVS.

Colligenda est herba in æstate dum semine prægnans est. Floret autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius desiccatoria est, & modicè adstringens, Semen verò tenuis essentia, & calidæ facultatis.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix huius pota, sanguinem excreantibus, stomachicis & cæliacis prodest. Vrinam cit. Oedematis illinitur. Decocto eius dentes in dolore colluuntur. Semen potum conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Ferunt etiam quòd amuletum ex eo venenatas bestias abigat.

EX GALENO.

Radix, cæliacis & stomachicis succurrit. Sanguinis reiectiones cohibet, & oedemata illita contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluantur. Semen potum ijs qui conuelluntur, prodest.

ADNOTATIO.

Spina alba hortensis Cardum beate Maria, Syluestre, palasium leporis.

De Asparago. Cap. XVII.

NOMINA.

Aσπαργος Græce, Asparagus Latinè vocatur. Officinæ extrita priore litera Sparagum nominant, Germani [Spargen] Gallicè *Asperge*, ou *Esperge*. Sic autem potissimum altis satiùsque, de quo nobis hic sermo est, nominatur, eò quòd cauliculos hos, qui prima germinatiõe prodeunt è terra, præcipuos habeat.

For

FORMA.

*Asparagus.*

tè prouenit.

E radiculis Thyrsus primum exilit, cacumine in torulos turbinato, quod tandem increescens explicatur in prægrâdes ramos quibus insunt folia cappillamenti modo & vt Fœniculi tenuata, quæ per vetustatem occullescunt in spinulasq. Florem fundit paruulû, quo decusso baccæ depēdent primû virides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus repletæ. Radices spongiosæ, longæ & rotundæ.

LOCVS.

In hortis seritur & plantatur, inque nonnullis locis lapidosis spō

TEMPVS.

Thyrso primum cū ver appetit emicante viret, spicatum cibis expetita. Recentes hos thyrsulos in voluptatem gulæ verterunt belluones. Hodie decoctus in iure Asparagus, aceto, sale, & oleo conspersus, magno gulæ delectamēto comeditur, & in principum delitijs est. Semen suo legitur tempore, nimirum æstate.

TEMPERAMENTVM.

Abstergendi facultatem habet Asparagus, idque citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Asparagi cauliculi cocti & comesti aluum molliunt, & urinam mouent. Radicum verò decoctum, difficultati vrinæ, regio morbo correptis, nephriticis, ischiadicis: cum vino autem idem decoctum phalangiorum moribus auxiliatur. Si decoctum super dente retineatur, eius dolori medetur. Facit ad eadem omnia semen etiam potum. Ferunt mori canes decoctum eius bibentes.

EX GALENO.

Renes ac iccur infractū liberat Asparagus, & maximè herbæ ipsius radices & semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam vel maximè dentes requirunt.

EX PLINIO.

Vtilissimus stomacho cibus, vt traditur. Asparagi. Cumino quidem addito inflammationes stomachi coliq; discutiant. Idem oculis claritatem adferunt. Ventrem leniter molliunt, Pectoris & spinæ doloribus, intestinorūque vitijs profunt. Vīno cum coquūtur addito, lumborum & renum dolores mitigant. Venerem stimulant. Urinam cient vtilissimè, præterquam quòd vesicam exulcerant. Radix quoque plurimorum prædicatione trita, & in vino albo posita, calculos exturbat. Quidam ad vuluæ dolorem, radicem cum vino dulci propinquant. Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit. Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus negant.

EX SIMEONE SETHI.

Asparagus olerum omnium maximè nittit. Proinde si quis dicat eius naturam positam esse mediam inter olera & carnes non procul à vero aberrabit, propter nutriendi facultatem plantarū & carniū, quæ similiter se habet. Urinam quoque cit, & obstructions iccoris & renum aperit: id quod manifestum ex eo quòd vrinæ odorem in suum trāsmutat, vt hunc qui aliquantulum eius ederint, sentiāt. Neque quispiam admiretur illum statim vrinæ suam qualitatem inderenam & rubea tinctorum si manibus continetur, urinam in suum colorem trāsmutat: quod paradoxum etiam esse videtur, vt extrinsecus impositum urinam

tin

tingat. Asparagi colicis & renum affectibus, qui à pituita
proueniunt, auxiliantur, semen genitale augment, & cele-
rius quàm reliqua olera in sanguinem mutantur. Menfes
ciunt. Cordis palpitationibus succurrūt: dentibus profunt
sed non semper stomacho boni sunt, propterea garo & o-
leo conditis, cum mediocriter cocti sunt, ijs vti oportet.

De Anone. Cap. XVIII.

NOMINA.

Aνανη & ανωνη Græcis. Anonis & Ononis Latinis ap-
pellatur: Vulgus herbariorum Restam bouis, quod
in opere arantes boues subinde sistat, nominare solet. Nō-
nulli Remoram aratri, quod altis & duris radicibus in agris
ararum remoretur, appellant. Sunt qui Acutellam vocēt,
quod suis scilicet spinis ingredientium pedes pungat & of-
fendat: Germanis [Hanvvechel] nuncupatur, & [Oche-
senbrech,] quia crebris inter folia aculeis: haud secus ac in-
strumentum hoc quo mulieres linum carminant, & à cras-
siore purgant stuppa, horreat: vel quod ligone ad aculea-
tam hanc herbam eruendam & extirpandam cum in altū
agitur, & sese propagat, opus sit. Gallicè *Bugraues ou Arre-
ste bouis* nūcupatur. Equites Germani [Stalkraut,] sed quod
decoctum eius meiere nequeuntibus equis offeratur, vocāt.
Binominis autem antiquis est scriptoribus, vna tantum li-
tera mutata. Sunt enim qui Ononim, vt Theophrastus
& Galenus: sunt etiam qui Anonim, veluti Dioscorides &
Plinius, nominent. Anonis haud dubiè à non inuando,
quod nullo iuuamine polleat, dicta est. Siquidem aratori-
bus inimica est, viuaxque nimis fruges opprimit, suisque a-
culeis nocet. Ononis verò quod asinos, quos Græci *ἄνονες*
vocant, sese terentes ad illam scabentesque inuet. Complu-
res quoque Graij herbam sic appellare prodiderunt, quod
in ea se volutantes, spinis eius dorsum libenter affricent &
scabant. Officinis prorsus ignota. & inusitata.

FOR

*Anonis.*

Ramos habet palma-
res, aut maiores, frutico-
sos, frequentibus genicu-
lis cinctos, cauis alarum
multis, capitula rotun-
da. Folia exigua, te-
nuia ceu Lentis, ad Ru-
tæ, aut fœnarij Loti fi-
guram accedentia, sub
hirsuta, odorata, nec in-
iucundè olentia. Ramu-
li acutas spinas, spiculis
acuminatis similes, soli-
dâsque gerunt. Radice
candida nititur. Theo-
phrastus toto caule folia
tam esse tradit, vt veluti
coronam ex interuallis
tota species repræsentet.
Florem quoque illi esse
minutulum, & in fili-

qua non vndique septum scribit. Quæ sanè singula pul-
chrè picturæ respondent, & Anonim esse hanc herbam,
quam Restam bouis hodie herbarij nominant, euidenter,
nulla reclamante nota, ostendūt. Nam hæc ramos spargit
fruticosos, palmo longiores, frequentibus cinctos articulis
à quibus alæ fiunt. Capitula exerit orbiculata, folia
Lentis parua, ad Rutæ vel pratensis Loti figuram acceden-
tia, hirsuta iucundum odorem expirantia, inter quæ nocen-
tiores, & mucronatæ cuspidis aculei quasi spicula subrigun-
tur. Flos ferè Pisi dilutiore micat purpura, in siliqua non
vndiquaque septus. Radix in nigro candicans.

LOCVS.

Nascitur culto solo, pingui, & glutinoso, præcipuè autè
in segetibus & aruis, inimica agricolis, viuaxque supra mo-
dum. Cum enim altam lætâme nacta tellurem fuerit, pro-
tinus

tinus in altum agitur, & singulis annis, furculis in latus emissis, rursus anno postero deorsum versus acta pluribus ramis luxuriat, ideoque runcanda & radicitus extirpanda venit.

TEMPVS.

Aestate germinare incipit, à frugibus perficitur, autumno sui incrementi finem faciens. Floret autem Iulio mense, & Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Ononis radix tertio quadamtenus ordine exalfacit.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Antequam spinosa sit sale conditur, & est cibis gratissima. Radix eius calefacit, & extenuat, cuius cortex cum vino potus vrinam ciet, calculos rumpit, crustasque abstergit. Decocta radix in posca, dentium dolorem collutione mitigat. Huius decoctum potum, hæmorrhoidas sanare creditur.

EX GAIENO

Radicis cortex maximè vtilis est, habens quippiam abterforium & incisorium. Proinde non tantum vrinam ducit, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas confestim detrahit. Vtuntur quoque ea ad dentium dolores in posca decoquentes, & collui decocto eius iubentes.

EX PLINIO.

Radix decoquitur in posca dolori dentium. Eadem cum nelle pota, calculos pellit. Comitialibus datur in oximelite, decocta ad dimidias.

ADNOTATIO.

Anonis, Bubu graui & Arresta bonu dicitur.

De Aniso. Cap. XIX.

NOMINA.

ANISON Græcè, anisum Latinè vocatur. Officinis nomen genuinum retinuit, Germanicè [Anisz] Gallicè *Anis*, appellatur.

For

*Anisum.*

Figura hac locū præcedentis Capituli sibi uendicat, & uicissim altera huius.

Anisum caule, folio flore, Apio par esse videtur. Caulem nanque tenuiter striatum, rotundum, multisque ramulis brachiatum obtinet. Folium ubi primum enascitur, rotundum sed deinceps Apij modo dissectum. Florem candidū, mûscarium Fœniculi. Tota herba, haud aliter quàm semen, odorata est.

LOCVS.

Ex Syria originem habet, iam autem passim satum in Germaniæ hortis prouenit.

TEMPVS.

Iunio ac Iulio mensibus floret, semineque prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccat in tertio ordine.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Anisum in vniuersum calefacit, exsiccatur, *ισχυρον* rectius mea sententia interpretabitur pro eo quod est, facile spirare facit. Oris halitum iucundiores facit. Anodinum est, dolorémue leuat. Urinam cit. Diffundit. Hydropicis potum sitim arcet. Prodest ad veneniata animalia, & inflationes,

Al

Aluum & album fœminarum profluuium sistit. Lac ad mās elicit, & venerem stimulat. Suffitum naribus capitis dolorem sedat. Tritum, cumque rosaceo instillatum, auriū medetur rupturis.

EX GALENO.

Anisi semen maximè vtile est, acre & subamarū, vt propè ad vrentium accedat caliditatem. Proinde & vrinam citè & digerit, atque ventris inflationes sedat.

EX PLINIO.

Anisum aduersus scorpiones ex vino bibitur, à Pythago-
ra inter pauca laudatum, siue crudum, siue decoctum. Item
viride aridū ve, omnibus quæ condiuntur, quæque intin-
guntur desideratum. Panis etiam crustis inferioribus sub-
ditum. Saccis quoque additur. Cum amaris nucibus vina
commendat. Quin ipsum oris halitum incindiorem facit,
fœtorēque tollit manducatum matutinis cum Smyrneo
& melle exiguu. Mox vino collutum, vultum iuniorē præ-
stat. Insomnia leuat suspensum in puluino, vt dormientes
olfaciant. Appetentiam ciborum præstat. Dolores capitis
leuat suffitum naribus. Epiphoris oculorum radicem eius
tusam imponit Iollas: ipsum cum croco pari modo & vino,
& per se tritum cum polenta, ad magnas fluxiones, extra-
hendaque si qua in oculos inciderint. Narium quoque car-
cinodes cōsumit illitum ex aqua. Sedat anginas cum melle
& Hysopo ex aceto gargarizatum, Auribus infunditur cū
rosaceo, Thoracis pituitas purgat tostum, cū melle sum-
tum melius. Cum acetabulo Anisi nuces amaras quinqu-
aginta purgatas tere in melle ad tussim. Præcipuū autem est
ad ructus, ideo inflationibus stomachi & intestinorū tor-
minibus, & cœliacis medetur. Singultus & olfactū decoctū
potūq; inhibet. Potū somnū concitat. Calculos pellit. Vo-
mitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorum
vitijs, neruis quoque quibus succinctum est corpus, utilissi-
mum. Prodest eius & capitis doloribus instillari succū cum
oleo decocti. Non aliud vtilius ventri & intestinis putant,
ideo dysentericis & tenuasms datur tostū. Daliō herbarius
dedit bibendū cū anetho parturientibus. Phreneticis quo-
que

que illinunt recens cum polenta. Sic & infantibus comitia-
le vitium aut contractionem sentientibus. Pythagoras qui-
dem non corripit vitio comitiali in manu habentes, ideoq;
quàmplurimum domi ferendum. Parere quoque facilius ob-
factantes. Sosimenes contra omnes durities ex aceto vsus
est. Semine eius poto, lassitudinis auxilium viatoribus spo-
ndit. Strangulationes vuluæ, si manducetur & linatur
calidum, vel si bibatur cū castoreo in aceto & melle, sedat.
Vertigines à partu cum semine cucumeris & lini pari men-
sura trinundigitorum, vini albi tribus cyathis, discutit. V-
rinam ciet. Venerem stimulat. Cum vino sudorem leni-
ter præstat. Vestes quoque à tinea defendit.

EX SIMEONE SETHI.

Prodest ad vetustos ex frigore iccoris affectus, & ad spi-
randi difficultatem quæ ex pituita proficiscitur. Flatus qui
in ventriculo sunt digerit. Obstructiones tollit, & lactis
copiam facit.

De Acte. Cap. XX.

NOMINA.

Aκτὰ Græcis, Latinis Sambucus nominatur. Reliqua
nomina dicemus paulò post, ubi huius genera indica-
bimus. Sābucus porro videtur ab anthore appellata, cui
nomen Sambix fuit: vel à fabuca musico instrumēto, quod
alii pectida nominant. ali, magadin. Atque hinc est quòd
Sabucus potius quàm Sambucus, si Serenio Quinto credi-
mus, scribendum sit.

GENERA.

Duo eius genera. Vnum arborefcit, quod priuatim offi-
cinæ Sambucum, Germani [Golder] à concavitate vocāt
Gallicè *Sureau*, Sen *Suyet*. Alterum Græcis χαμνιάκτι, qua-
si humilis, & coactæ breuitatis Acte nominatur, Latinis
Ebulus Germanis [Attich, vel niderer holder,] Gallis
Hyeble.

FOR

FORMA.

*Sambucus.**Ebulus.*

Sambucus in arborem assurgit, virgis harundinum modò rotundis, subcaulis, candicantibus, proceris. Folia tria, aut quatuor, aut quinque, aut sex, aut septem per interval la circa virgas obtinet, nucis iuglandis similitudine, granulolentia, pluribus incisuris, in summis ramis siue caulibus umbellas rotundas ferentia. Flores albos, fructum acinúmvē Terebinthi in nigro purpureum, racemosum, sucosum, & vinosum.

Ebulus humilis minórque est, herbaceo generi propin-
as accedens, quadrangulo caule, densis geniculis. Folia ex
intervalis circa singulos geniculos Amygdalæ similia a-
læ instar expanduntur, per ambitum serrata, longiora gra-
nulolentia. Umbellam in summo fert Sambuco similem, flo-
res itidem & fructum. Radice nititur longa, digitali cras-
situdine.

LOCVS.

Vtrumque genus in opacis, asperisque potissimum locis, & iuxta aquas emicat. Ebulus verò in agris etiam quibusdam prouenit.

TEMPVS.

Parum ante Solstitium æstiuū floret Sâbucus. Tardius autem Ebulus, Iunio nimirum & Iulio mensibus. In Augusto vero baccas suas profert.

TEMPERAMENTVM.

Sambucus vterque calefaciendi ac desiccandi facultatem habet, id quod amicitudo, & adstrictio modica abundè monstrant.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Eadem vtriusque facultas, & par vsus, exiccans scilicet aquam educens, stomacho nocēs. Folia olerum modo decocta, pituitam & bilem purgāt. Quinetiam teneri caules in olla cocti, eadem præstant. Radix in vino decocta & in cibis data hydropicis auxiliatur. Eodem modo pota viperarum morsibus subuenit. Vuluas emollit & aperit, & quæ circa eas sunt affectiones, decocta cum aqua in fessione corrigi. Fructus cum vino potus eadem efficit. Illitus capillos denigrat. Folia recentia ac tenera cum polenta illita inflammationes mittigant. Ambustis etiam, & canis morsibus illita succurrunt. Profunda & quæ in cauernas dehiscunt vlcera agglutinant. Podagricis, cum taurino hircinove adipe illita, auxiliantur.

EXGALENO.

Vtraque Sambucus, & arborefcens & herbacea, exiccandi, conglutinandi, modicæque digerendi facultatē obtinet.

Paulus Aegineta hæc adiicit: Potæ & manducatæ aquæ per aluum educunt.

EXPLINIO.

Vtriusque decoctū in vino veteri foliorū, vel seminis, vel radicis, ad cyathos binos potum stomacho inutile est, alio detrahens aquā. Refrigerat etiā inflammationem, maxime recentis ambusti: & canis morsum cū polenta, mollissimis foliorū illitis. Succus cerebri collectiones, priuatimq; mem-
branæ,

branz quæ circa cerebrū est lenit infusus. Acini eius infirmiores quàm reliqua: tingunt capillum: poti acetabuli mensura, vrinam mouent. Foliorū molissīma ex oleo & sale eduntur ad pituitam bilēque detrahēdā. Ad omnia effica cior quæ minor. Radicis eius in vino decoctæ duo cyathi poti, hydropicos exinaniunt, vuluas emoluiunt foliorū decocto incidentiū. Caules teneri minoris Sambuci in patinis cocti, aluum soluunt. Resistunt folia serpētum ictibus in vino pota. Podagris cum seuo hircino vehemēter profunt cauliculi illiti. Idēque in aqua macerātur, vt ea sparsa pulices necentur. Foliorum decocto si locus spargatur, muscæ necantur. Boa appellatur morbus papularum, cum cubēt corpora, Sambuci ramo verberatur. Cortex interior tritus, ex vino albo potus, aluum soluit. Ebuli fumo fugātur serpentes. Tenerum cum folijs tritum ex vino potum, calculos pellit. impositū testes sanat.

*Ammi.**De Ammi.*

Cap. XXI.

NOMINA.

Aμμι Græcis, Ammi
Latinis, Ameosoffi
cinis corruptè, Germanis
[Amey] appellari potest.

FORMA.

Ammi caule rotūdo
& herbaceo cōstat, surculis multis & exiguis:

e ij

folio

Inflationes & tormina discutit. Vrinā & menstrua ciet. Sugillata & oculorum epiphorās mitigat. Cum lini semine scorpionum ictus in vinō potum drachmis duabus: priuatimq; ceraſtarum cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque bibentium ſimiliter mutat in pallorem. Suffitum cum vna paſſa, aut reſina, vuluas purgat. Tradunt facilius concipere eas, quæ odorentur id per coitum.

ADNOTATIO.

Ammi in hortis pariſiorum paſſim luxuriat.

De Aro. Cap. XXII.

NOMINA.

Aρον, ἄρλεαρον Græcè, Aron & Aris Latinè dicitur. Officinæ corrupto, vt ſolent, vocabulo, Iarum appellant. Quidā, quodd folium effigie bubuli veſtigij prodeat, Pedem vituli vocarunt. Galli. *Pied de veau*. Alij, quodd dracunculum æmulatur, ſola magnitudine diſcrepans, Serpentariam minorem appellant, neque id ſane temerè. Videtur enim Aron eſſe Dracunculus minor, cui Dioſcorides folia κισσούδι, hoc eſt, Hederæ ſimilia eſſe dicit, quæ proſus Ari ſunt, niſi quodd paulò ſint longiora. Plinius etiam Aro eas facultates tribuit, quas Dioſcorides Dracūculo minori. Vt hinc conijcere liceat, Arum cum Dracunculo minori miſcuiffe veteres. Vulgus, quodd piſtillum promit exerti ferè genitalis effigie, Sacerdotis virile nominat. Id quod & Germani noſtri faciunt, qui ſua lingua [Pfaffenpini,] Gall. *Vi de preſtre, vit de chien, ou Chicotrin* nuncupant. Alias Aron, & ob vehementem acrimoniam, [teuſchen ingber] vocant.

FORMA.

Folia emittit Dracūculo ſimilia, ſed longiora & minus maculata, caulem dodrātalem, purpureſcentem, piſtilli figura, à quo croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo ſimilis, quæ quodd minore acrimonia eſt, cocta comeditur. Hæ vtrique delineationes ad amuſſim, nulla reclamāte nota, noſtro Aro conueniunt. Siquidem folia pro



Aron, & Aris.

mit Dracunculi, longiora, & pauciorib. maculis respsa, caulem dodrantem altum, in purpuram leniter tendentem. Ante seminis partū, sagaci naturæ artificio dignum, erumpit innolucrum & cuculū, quod mucro nata in turbinem vaginula pistillum cōplectitur, & suo fouet sinu. Verū ubi fructu prægnans fatiscit in hiatum, solida pistilli facies dilutior purpura rutilās emergit, & anfractu penitus tandem patente, primum vi

ridia dein crocea spectātur semina, quæ in coronæ modum concinnè contexta, imam eius partē ambiunt. Radicem etiam obtinet albam, ad Dracunculi radicem accedentem, vt pictura graphicè monstrat. Neque obstat quòd Galenus radicem Ari elixam mandiscribat, nostri autem tam acris sit, vt vix gustari ob miras & diutinas, quas in lingua ac palato excitat puncturas possit, tantū abest, vt edendo esse queat. Siquidem Galeno libro secundo de alimentorum facultatibus teste, non parem in omnibus regionibus acrimoniam obtinet, sed in nonnullis minimam, vt Cyrenis. Et Plinio quoque lib. xix. cap. v. teste, in Aegypto Aron nascitur radice mollioris naturæ, quæ etiā cruda editur. In quibusdā, vt Germania nostra, maximā. Verba Galeni paulò post in facultatum commemoratione citabimus. Hinc discēdum erit, multa nobis in scriptoribus rei

rei

rei herbariæ, primo statim obtutu pugnautia videri, quæ si ad cœli regionumque diuersitatem respexerimus, nihil prorsus pugnatiæ aut absurditatis habebunt. Quod nisi diligenter animaduertas, multas genuinas herbas pro adulterinis abijcias necesse erit. His accedit quod Galenus non simpliciter dicat mandi Ari radicem, sed elixam. Non est autem mirum si acria etiam edendo fiant, si elixentur. Bis enim aut ter in aqua decocta, Galeno lib. ij. de alimēt. facul. cap. vltimo teste, acrimonia spoliatur. Porro si ista scio lis quibusdam haud satisfecerint, dicendum planè erit Arū Germaniæ nostræ esse Arisaron, quod gustu, Dioscoride & Galeno autoribus, acrius est. Quauis ego cum Ruellio diligētissimo earum rerum inquisitore Arisarō ab Aro differre haud putem, quod scilicet forma vtriusque eadem sit. Cuius etiam rei fidem facit ipsa nomenclatura, quæ vtriusque retinuit appellationem: duobus tandem vocabulis in vnum coalescentibus, dici cœpit Arisarō. Apud veterrimos enim Aris primum dein posterioribus, copulatis vnâ nominibus, Arisaron confectum est nomen.

LOCVS.

Nascitur in syluis, locis vmbrosis, humidis & frigidis.

TEMPVS.

Folia statim in Martio, inter primas herbas veris exiliūt, in Iunio dispereunt, ita vt haud facilè hoc nomine herba ipsa reperiri queat. Semen Iulio & Augusto mensibus reperitur, primum, vt diximus, viride, mox croceum.

TEMPERAMENTVM.

Arum Galenus in calefaciendo & desiccando primi ordinis esse statuit. Et locutus est de Aro, quod nō vehemēti acrimonia pollet. Nostrū haud dubiè in tertio ordine calidū & siccum est, ob multam, qua peditum, est acrimoniā.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Radix, semen, & folia Ari eadē cū Dracūculo vires habent. Radix priuatim cum simo bubulo illita podagricis prodest. Dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniā edendo est.

EX GALENO.

Arum tetrena essentia constat, sed calida. proinde extergendi facultatem possidet, verum non valentem, sicut Dracontium. Radices eius maximè sunt vtilis. Siquidem comestæ crassitiam humorum mediocriter incidunt, adeo ut excretionibus ex pectore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontium. Et in libro secundo de alimentorum facultatibus, sic de Aro scribit: Ari radix rapi modo mandatur. Quibusdam autem in regionibus acrior nascitur, ut Dracontio ferè similis sit. Dum rectè parare voles, prioris decoctionis aqua effusa, repentè in alteram calidam iniicere oportet, ut in Brassica & Lente dictum est, Cyrenis contra quam in nostra regione planta se habet: nam illic minimum medicamentosi, minimumque acrimonie habet, adeo ut vel rapis vtilior reputetur: idcirco radicem quoque in Italiam comportant: ut quæ absque ut putrescat aut regerminet, longo tempore perdurare possit. Perspicuè vero est alendis corporibus hanc accommodatiorem esse. Si quis autem in thorace ac pulmone collectos crassos lentosque humores extulsire studeat, acrior ac medicamentosior magis conueniet. In aqua elixa estur cum sinapi aut aceto ex oleo & garo, Quinetiâ cum opsonijs, & sale, & ijs quæ cascico constant, sumitur. Haud verò obscurum est, succum eius, qui in iccur ac vniuersum corpus diffunditur, quo vno animal nutritur, crassiores esse, idque maximè quum radix, quem admodum sunt quæ Cyrenis aduehuntur, medica vicarnerit. Apud nos nanque in Asia, pleræque Ari radices aciores sunt, & medicamentosam iam vim obtinēt.

EX PLINIO.

Arum miris laudibus extulere Græci, primum in cibis
 † *Alia sœ* † sœminarum præferentes, quoniam mas dulcior esset. & in
 † *minam.* † coquendo lètior, pectoris quæ vitia expurgaret: aridum in
 portione inspersum, aut celigmate, urinam & menses cicret.
 Sic & in oxymelite potum, stomacho, intercanis exulceratis ex lacte ouillo bibendum, ad tussim in cinere coctum ex oleo dedere. Alij coxere in lacte, ut decoctum biberetur.

Epip

Epiphoris elixum imposuere : item sugillatis , tonfillis. Ex oleo hemorroidum vitio infundere, lentigines ex melle illinentes. Laudauit Cleopantus & pro antidoto contra venena, pleuriticis, peripneumonicis quoque & tussicentibus. Semen intritum cum oleo aut rosaceo infundens, aurium dolori Dieuches, Cleopantus tussicentibus, aut suspitiosis & orthopnoicis, & purulenta excreantibus, farina permixtum in pane cocto dedit. Diodotus phthysicis è melle ecligmate, & pulmonis vitijs, ossibus etiam fractis imposuit. Partus omnium animalium extrahit naturæ circùlitum. Succus radicis cū melle Attico, oculorum caligines, ac stomachi vitia discutit. Tussim decocti ius cum melle vlcera omnium generum, siue phagedænæ sint, siue carcinomata siue serpant, siue polypi in naribus, succus mirè sanat. Folia ambustis prosunt ex vino & oleo cocta. Aluū inaniunt ex falle & aceto sumpta. Etiam luxatis cocta cum melle prosunt. Item articulis podagricis cum falle, recentia vel sicca. Hippocrates ad collectiones cum melle imposuit. Ad menses trahendos seminis vel radicis drachmæ duæ in vini cyathis duobus sufficiunt. Eadem potio, si à partu non purgatur, & secundas trahit. Hippocrates & radicem ipsam apposuit. Dicunt & in pestilentia salutarem esse in cibis. Ebrietatem discutit. Serpentes nidore cū crematur, priuatimque aspides fugat, aut inebriat, ita vt torpentes inueniātur. Perunctos quoque Aro, vt laureo oleo fugiunt, ideo & contra ictus dari potu in vino nigro putant vtile. In folijs Arica-
scus optimè seruari traditur.

Posteriores medici Aron discutiendi, extenuandi, extergendi que facultatem habere tradunt: ideoque tumoribus aurium sicubus, strumis, scirrhisque mederi, faciei deformitatem cunctisque auferre, eius denique radicem in puluerem redactam supererescenscentem in vulneribus carnem minere scribunt. Id autem posse præstare, acrimonia ipsa vehemens quæ gustu sese exerit, abundè monstrat. Dioscorides etiam Arisaron acrimonia haud exigua præditum scribit, ideoque illitum nomas sistere, collyriaque efficacissima ex eo contra fistulas fieri. Denique radicem cuiuscun-

*Recetiores
quas sa-
cultates A
ro tribuāt*

que animalis pudendo impositam, id corrumpere tradit. Plinius quoque Arisarum vlceribus mederi manantibus, item combustis & fistulis scriptum reliquit. Præterea commixtum collyrio nomas sistere ait,

ADNOTATIO.

Ariscani priapus.

De Arcio. Cap. XXIII.

NOMINA.

Aρχίο, ἡ προσώπιον ἢ προσώπιε Græcis, Personatia Latinis dicitur, Officinæ Lappam maiorem, vulgus Bardanam vocat, Germani [Groszkletten] Gallicè *Gletero*, ou *Glouteron*, ou *Napolier*. Personatia hac quondam ad personas utebantur, quoties in theatris alijsve locis qui cognosci à populo nolent, egisse quidpiam volebant. Est enim foliorum eius tanta amplitudo, ut tota humana facies ijs tegi

possit: atq; hinc haud dubiè tam Græci quàm Latini, nomem illi *Prosopij* & *Personatiæ* indiderunt.

FORMA.

Personatia folia Cucurbitæ similia habet, maiora tamè, duriora, nigriora & hirsuta, Caulè subcandidum, interdum nullum. Radicem grandem candidam intus, foris nigram. Ex qua descriptione nemo non intelligit, Personatiam esse eam herbam quam hodie vulgus Bardanam vocat, quæ folio cõstat omnium lapparum maximo, parte aucta



Personatia sine lappa maior.

auerſa berbido, aduerſa cano, caule in purpureo albicante, grādibus lappis, quę tranſeuntium veſtibus adhærent, in quibus flos purpureus naſcitur, non euidēs, ſed occultus intra ſe germinans, radice grandi, intus candida, foris atra.

LOCVS.

Naſcitur vbique, potiſſimum circa margines pratorum, & agrorum.

TEMPVS.

Menſe Iulio lappas cum floribus ſuis producit Perſonatia.

TEMPERAMENTVM.

Digerit ſimul & deſiccat, ſed & adſtringit nonnihil.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Radix Perſonatię drachmę pondere cum pineis nuci- bus poſta, ſanguinem & purulenta excreātibz auxiliatur. Articulorum quoque dolores, qui ex membrorum fra- ctio- nibz collisionibz ſue fiunt, trita & illita ſedat. Quinetiam folia vetuſtiſ vlceribus vtiliter illinuntur.

EXGALENO.

Arcinm quod proſopida vocāt, cuiuſq; folia Cucurbitę ſimilima ſunt, niſi quatenus tum maiora, tū duriora, diſcu- eit ſimul & deſiccat, ſed & adſtringit mediocriter: quam- obrem folia eius veteribus vlceribu mederi poſſunt.

EXAPVLEIO.

Perſonatię herbę ſuccus cum vino veteri in potionem datus, omnes morſus ſerpentium mirificè ſanat. Eiufdē ſo- lijs cinges febricitantem, & ſtatim febrem mitigat, calo- rémq; ſanat. Vulnuſ, etiam ſi cancer erit, cum aqua decoctionis foliorum eius foueto: deinde ipſam cum ni- tro & axungia, cum aceto tere, & in panno inducito & imponito. Ad canum rabidorum morſuſ, radix cum modi- co ſale trita imponitur morſui, & ſtatim æger liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, vrinam pro- uocat, & veſicę dolorem tollit. Puluiſ ſeminis eius eam vi no optimo per quadraginta dies datus, iſchiadicos mirabi- liter ſanat. Folia trita cum albumine oui & impoſita, am- buſta mirificè curant.

Ex

EX L. COLVMELLA.

Venena viperæ pellit super scarificationem ferro factâ herba Personata trita & cum sale imposita. Plus etiam eiusdem radix contusa prodest contra Serpentes. Ex vino bibitur duum denariorum pondere. Strumis radix eius medetur: item cum axungia operitur folio suo imposita.

De Ascyro. Cap. XXIIII.


NOMINA.

Aσχυρον, ἡ ἀσχυροῖς Græcè, Ascyron Latinè nominatur. Officinis ignotum. Germanicè [Harthocvv,] id est durum fœnum appellatur. Gallicè, *Millepertuis*, *Trucheran*, dicitur: gallis autè veteribus *Iannette*, dicta est. Græci à contrario, huic herbæ nomen imposuisse videtur *oxypos*

enim illis asperitatem significat. Pulchrè igitur ad Græcam appellationem Germanica alludere videtur.

FORMA.

Hyperici species est Ascyron, magnitudine differens, maioribus ramis, fruticosius, puniceo colore rubens. Flores fert luteos, semen Hyperico simile, odore Resinæ, quod cum atteritur digitor ferè cruentat.



Ascyrum.

LOCVS.

Incultis & asperis locis provenit.

TEMPVS.

Aestate, potissimum verò Julio & Augusto mensibus,
floreſcit.

TEMPERAMENTVM.

Essentia tennē est, ideoque calefacit & deficcāt.

VIREN EX DIOSCORIDE.

Semen Ascyri potum in hydromelitis heminis duabus, ad ischiadicos prodest dolores: biliosa enim multa excrementa ducit. Sed assidue dari oportet donec conualescant. Præterea illitum ad ambusta conducit.

EX GALENO.

Semen eius purgatorium. Foliorum verò facultas modice extergens & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Cæterum in vino austero decocta, vinum ipsum magnorum vulneryum glutinatorum efficiunt.

EX PLINIO

Vfus feminis ad ifchiadicos, potus duabus drachmis in hydromelitis sextario Aluum foluit, bilem detrahit. Illinitur & ambuftis.

ADNOTATIO.


*Ascyron androsamum, Hypericum, nomine postremo omnes vul-
gò appellantur.*

De Androsæmo. Cap. XXV.

NOMINA.

Aνδρῶν Græcis, Androsæmon pariter Latinis dicitur. Officinis incognitū. Germanis [kunrath] quasi Græcè dicas Thrasibula, nominatur Gallis vero, Millepertuis large, vel Trucheram large appellatur. Dictum Androsæmon, quòd aut coma, aut floribus eius tritis, hominis sanguinem referat.

For

*Androsæmon.*

Differt ab Hyperico
& Ascyro Androsæmō.
Frutex est prætenuibus
ramis, furculosus, puni-
ceo colore, rubentibus
virgis, folijs, triplo qua-
druplōve maioribus
quàm Rutæ, quæ contri-
ta sanguineū succum e-
mittunt. Alarum caua
habet plura, in summo
alarum auiū modo pen-
nata expansæve, circa
quas flosculi pusilli lu-
tei. Semen in calyce, ni-
gro papaueri similis, ve-
luti punctis depictum
distinctumve. Coma tri-
ta resinofum odorem
reddit.

LOCVS.

Locus iisdem quibus Ascyron prouenit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur.

VIRES EX DIO-
SCORIDE.

Androsæmi semen tritum, potumque duarum drachma-
rum pondere, biliosa alui excrementa ducit. Ischiadicis
autem potissimum medetur, sed à purgatione aquam sor-
bere oportet. Herba illita ambusta sanat, & sanguinem
compescit.

EX GALENO.

Eadem cum Ascyro facultates obtinet.

Ex

EX PLINIO.

Vfus ad purgandam aluum tufæ cū femine, potēq; matutino, vel à cæna duabus drachmis in aqua mulfa vel vino, vel aqua pura, totius potionis sextario. Trahit bilem, prodeft ifchiadicis maximè. Sed poftera die, capparis radicem refinę permixtam deuorare oportet drachnæ pondere, iterumque quatruidi interuallo idem facere. A purgatione autem ipfa robuftiores vinum bibere, infirmiores aquā. Imponitur & podagris, & ambuftis, & vulneribus, cohibēs fanguinem.

De Arcentho.

Cap. XXVI.

NOMINA.

Aρκυτθον, ἢ ἀρκυθις Græcè, Iuniperus Latinè vocatur. Officinæ Latinam appellationem retinuerunt Germanicè [Vueckhoder kramather] id eft, turdorum baccæ vocantur, quòd fructibus eius turdi pinguefcant. Gallicè, *Genèvre*. Iuniperus autem dici videtur, quòd iuniores & nouellos fructus pariat: fola enim ferè arborum fœtus fuos in biennium prorogat, qui ne maturefcunt quidem, nouis superuenientibus.

GENERA.

Iuniperus Diofcoridi duplex eft, maior & minor, fola arboris & feminis magnitudine inter fe differentes. Minor humidis eft, fefilibus in terra ramulis, baccis minoribus, radicibus fummo cefpite fuffis. Maior altius adolefcit & in iuftam arboris magnitudinem exurgit, caudice procerò, cortice fragili, ligno fuluo, odorato, latioribus ramulis, aculeorum aceruo ftipatis, baccis alteri fimilibus, maioribus tamen.

For



Juniperus.

Vtriusq; facies horrida, coma virent perpetua, spinaq; potius quã folio sed herbacea vestiuntur., Cortex illis membranaceus, fragilis, nec difficiulter fatiscens, maceries fulua, quæ si ignibus dicatur, non iniucũdum fumũ expirat, qui odoris suauitate grassantia pestilentia contagia depellit. Ex ea etiam, vt recentiores Græci tradunt, æstiuis temporibus lachryma, thuris odorem atque colorem emulans sudat, quæ caloris officio durat, coeat in gummi. Arabum fa-

milia non sine magna confusione nominum. Sandaracham appellat. Officinæ verò Vernicem vocant. Baccas ferunt primũ virentes, deinde per maturitatem nigras, quæ biennio antequam matureſcant in ramis pendent. Hinc sunt qui baccas in ijs esse ternas eodem tempore dicant, anni proximè exacti nondum maturas, & tertij ante præsentem iam maturas, tertias nouas & recentes. Cæterũ non desunt qui nostram, Juniperum non genuinam putent, quod baccæ eius ad Dioscoridis magnitudinem, quæ nucis est ponticæ aut fabæ, non accedant. Sed cogitent locum in causa esse cur minores producantur: vt plurimum enim omnia quæ in Germania proueniunt, ijs quæ in Græcia nascuntur minora sunt. Nobis etiam Juniperi grana aliũde allata visa sunt, quæ nucis auellana quãtitatẽ æqua

æquabant, ob id vt magnitudinem ac formam eorundem etiam ex primeret pictor, curauimus.

LOCVS.

Amant Iuniperi mōtes, & maritima loca, in planisq; & cultis nasci recusant.

TEMPVS.

Autumno fructus Iuniperorum decerpuntur, sed ad bi-
matum prorogati.

TEMPERAMENTVM.

Iuniperus calida & sicca, vtrinque tertij ordinis. At fru-
ctus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus,
verum in hoc primi fuerit ordinis. Vernix calefacit & exie-
cat secundo recessu.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Acris vtraque est, calefacit, & vrinā mouet. Incensæ sus-
fitu serpentes fugāt. Earum fructus, hic quidem sabæ, alius
vero nucis ponticę magnitudine inuenitur, rotundus, odo-
ratus, in mandando dulcis, & subamarus. Modicē calefacit
& adstringit, stomacho utilis. Potus ad vitia thoracis, tusses
inflatōes, tormina, et venenata, prodest. Vrinā cit. Cōuul-
sis, ruptis, & vuluæ strāgulationibus cōfert. Folia acria ob-
tinet Iuniperus, ideoq; tam ipsa quā eorum succum ex vi
no contra viperarum morsus illini & bibi prodest. Cortex
præterea crematus & cum aqua illitus, lepras eximit. Ra-
mentum verò ligni deuoratum, interficit.

EX GALENO.

Iuniperi fructus iccur renēsq; expurgat, nimirum cras-
sos & glutinosos humores extenuando, eaq; de causa salu-
bribus medicamentis immiscetur. Per exiguum corpori hu-
mano alimetum ex eo apponitur. Assatim sumptus hic fru-
ctus stomachum mordicat, caputq; calefacit: ex quo illud
quandoque implens, dolore diuexat. Alui excremeta nec re-
tinet, nec propellit. Vrinam ciet mediocriter.

EX PLINIO.

Vtraque excafcit & extenuat. Accēsa serpentes fugat.
Semen stomachi, pectoris, laterisq; doloribus vtile, In-
f
flatio

flationes languoresq; discutit, tusses concoquit & duritias. Illitum tumores sistit: item aluum baccis ex vino nigro potis: itē ventris tumores illitis. Miscetur & antidotis oxyporis. Vrinās cit. Illinitur & oculis in epiphoris. Datur conuulsis, ruptis, torminibus, vuluis, ischiadicis cum vino albo potum pilulis quaternis, aut decoctis viginti in vino. Sunt & qui perungant corpus ē semine eius in serpentum metu.

VERNICES VIRES EX RECEN-
TIORIBVS GRAECIS.

Profluentem ē naribus sanguinem sistit, si ex candido oui liquore trita temporibus & fronti illinatur. Eadem vomitionem ex polline thuris & oui albo excepta suppressit. Item profluentem aluum cum eisdem illita firmat. Stomachum in biliosos vomitus effusum, deuorata in ouo sorbili polēta eius, cohibet, crustāque alui proluuiem retinet. Distillationes suspendit suffitæ nidor, arceatq; ne præcipites ad ima decumbant. Pituitam quæ in stomacho aut intestinis coijt, digerit. Humorem etiā coerceat, qui pernix à cerebro deuoluitur, Tæniās & cætera vētris animalia necat. Vliginosos fistularum sinus indita resiccat. Menstruos cōtinet fluxus. Grauedini suffitus eius auxiliatur. Hiantibus manuum & pedū rimis illitu succurrit. Et in summa, Succus nī pollet viribus, sed paulō efficacioribus: quæ si desit, duplo pondere in vicem substituitur.

ADNOTATIO.

Alius est Iuniperus, idēque spectatissimus, ē monte Tandro quē Lugduni habemus.

De Alcea. Cap. XXVII.

NOMINA.

Alex Græcis, Alcea Latinis vocatur. Officinis ignota: Vulgares herbarij et Empirici, Simeonis herbā, germani nostri [Sigmarskraut, oder Sigmundszvurtz: & Hochleuchthen. [Galli. *Guillaume saunage, ou rustique*.] appellant.

FOR



Syluestris maluæ species est Alcea, folia verbenacæ modo secta habēs. caules ternos aut quater nos, corticem Canabi similem obtinentes, Florē exiguum Rosæ similē. Radices albas, latas quinque aut sex cubitales.

Alcea.

LOCVS.

Nascitur in pingui loco, nec sicco.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Ex emplasticorum medicamentorum numero esse Alceā, & folia, quæ glutinosum quid ac lentorem quandā præseferunt, & radix ipsa quæ glutinosa: dulcis, & modicè adstringens apparet gustantibus, abundè mōstrant. Hinc satis cōstat Alceam extra omnem insignem tum caliditatem, tum frigiditatem siccare, ac plenè emplasticorum cōsistentiam obtinere. Vide Galenum lib. iij. de simp. medi. facult. cap. iij. & sequenti.

f ij VIRES

VIREs EX DIOSCORIDE.

Alcæ radices in vino aut aqua potæ, dysentericis & ruptis medentur.

EX PAVLO.

Alcea sylvestris malnæ genus est. In vino pota dysentericæ & rupturis medetur, potissimum ipsius radix.

EX PLINIO.

Vfus radices Alcæ ex vino vel ex aqua, dysentericis, aluo citæ, ruptis & conuulsis.

APPENDIX.

Celebratur ad caliginem oculorum ab Empiricis, ita vt non desint qui credant radicem Alcæ è collo suspensam, aciem oculorum supra modum acuere, & tueri posse.

ADNOTATIO.

Alcea ruri frequens, Monoclonos ferè est nō malua modo fruticosa & fermentosa, flore althea.

De Adianto. Cap. XXVIII.

NOMINA.

Aδαντον, ἢ πολύτριχον, ἢ καλίστριχον, ἢ ἰσχυρίχον, Græcè, Adiantum, Polytrichum, Calitrichum, Cinninalis, Terræ capillus, & Supercilium terræ, Latine appellatur. Officinæ hodie Capillum Veneris vocant, quo etiam nomine appellari Latinis Apulcius testatur. Germani [Fravvenhar. vel Iunckfravvenhar.] Adiantum nomen ab euentu accepit, quod foliū eius persusum aqua ob *disidivari*, id est, non madeat, sicco semper simile, vt autor est Theophrastus libro septimo de plantarum historia, capit. xiiij. Id quod nomine intelligendum erit de mersione longiore in aqua: nam diutius mersum ac irrigatum, æquè ac alię herbe madescit. Quare rectius de imbre descendente è cælo, cuius stillicidium folijs eius non insidet, vt testis est in Thieriacis Nicander, accipiendum venit. Vel quod magis aridet, ab interioribus puteorum parietibus, & fontium marginibus quas coronat, dictum est Adiantum, quod nimirū quasi sitiens illorum aquas, quas tamen odit & respuit, quærat. Polytrichon autem quasi multicomum, quod capillos multos

multos ac densos faciat, eiusque defluuia expleat. Callitrichon verò quasi pulchricomum quòd capillos tingat, pulchriorèsq; reddat. Nec alia ratione Capillus Veneris hæc herba dicta est, quàm à speciosis reddēdis capillis: nec alio nomine Veneris vox adiecta est, quàm quòd hæc pulchricoma pingatur. Hinc patefit maximus pharmacopolarum nostri temporis error, qui sub tribus nominibus, vnam & eandem duntaxat herbam significantibus, tres diuersas herbas designatas esse putant. Aliam enim Polytrichum, aliam Callitrichum, quam tamen corrupto vocabulo Gallitrichum vocat: aliam etiam Capillum Veneris esse herbam existimant. Quales autem herbæ sint, Polytrichum, & Gallitrichum illis nominatæ, suis locis ostendemus.

*Capillum
Veneris
cur dicta
Pharmaco-
polarum error*

FORMA.



Adiantum.

Folia albicantia Coriandro similia habet, in summo incisuris diuisa. Caules ex quibus nascuntur prodeuntve, nigros, admodum tenues, dodrantales, nitentesque. Neque florem, neque semen creat. Folijs verò Coriandri iam quidem erumpentis, vel paulò antea enati, necdum caulescentis, quæ quidem in infima eius parte quodammodo lata sunt, & in extremitatibus incisa, consistere Adiantum sciendum erit. Ex qua nimirum descriptione manifestissimum est, eam herbam qua ferè oēs Officinae pro Capillo Veneris

f ij

vru

vtuntur, & quam nos à muris in quibus prouenit, Germanicè [Maurauten: & Steinrauten] vocamus, non esse verum Capillum Veneris, aut Adiantum: caules siquidē eius non sunt nigri, sed virides, neque admodū tenues, sed pro herbæ quantitate crassi: neque splendentes. In summa, neque figura, neque magnitudo, neque color, nec natales etiam respondent, quia in ficis & soli expositis muris nascitur, in humidis contra Adiantum.

LOCVS.

Locis opacis, palustribusque, & humentibus muris, & prope fontes nascitur. In Germania tamen nostra, quod sciam, non prouenit: copiosè autem in Narbonensī Gallia, & Italia.

TEMPVS.

Aestate virescit, bruma non marcescit.

TEMPERAMENTVM.

Adiantum in caliditate quidem & frigidityte symmetrū est, verū deficcatur.

VIRE EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius herbæ potum, asthmaticis, difficultate spirandi laborantibus, ictericis, lienosis, & vrinæ difficultatibus auxiliatur. Calculos conterit, & aluum cohibet, Venenatorum moribus, & stomachi fluxionibus cum vino potum prodest. Menses cit & secundas. Sanguinis reiectionem sistit. Cruda herba ad venenatorum morsus illinitur, Alopecias capillis explet. Strumas dissolvit. Furfures & achoræ cum lixiuio exterit. Cum ladano, myrtino & fusino, aut hyssopo & vino, capillos defluentes continet. Decoctū eius cum lixiuio & vino abstergit. Gallinaceos & coturnices cibis eorum additum pugnaciores facit. Scribitur & magna vtilitate circa ouilia.

EX GALENO.

Extenuat Adiantum & discutit. Alopecias capillis vestit, strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum. Viscosorum crassiorūque ex thorace pulmonēque excreationibus non mediocriter confert, & ventris fluxiones sistit.

EX PLINIO.

Vide infra caput de Trichomane.

ADNOTATIO.

Adiatum duplex Theophr. triplex Dioscoridi, nobis quadruplex.

De Vite vinifera. Cap. XXIX.

NOMINA.

Aμπιλος βινοφόρος καὶ ἕμπος Græcè, Vitis Vinifera & sativa, seu culta Latinè appellatur, Germanicè [V vine] Gallicè *Vigne cultivée*.] Vitis autem, quòd interpretetur ad vuas parietendas, dicta esse primò videtur.

GENERA.

Innumera viti um reperiuntur genera, quæ singula persequi superuacaneum esse videtur. Si quis tamen illa disquirere desiderat, rei rusticæ scriptor, Pliniúmque lib. xiiij. naturalis historiz, qui diligentissimè de ijs scripsit, legat.



Vitis vinifera.

FORMA.

Vitis caduca est, & nisi sit fulta, fertur ad terram. A radice eius caudex vñsus contortus exit qui in ramos frequentes scinditur. Multiplici cæstice cingitur, rimoso, flagellis longè latèque vagantibus, quibus se quasi suis manibus erigit, & quicquid nata est complectitur. Sarmentis folijs latis: & in extremitatibus incisís, lasciuientibus. Floribus fru-

f. iij. etum

Etum ambientibus lanugineis. Vua cōpluribus acinis aceruata, qui interdum purpurco: nōnunquam roseo, aliquando viridi colore fulgent. Seminibus tunica clausis.

LOCVS.

Pasim & in multis Germaniæ nostrę regionibus nascitur: & vix hortum inuenies in quo non proueniat.

TEMPVS.

Floret solstitio vitis, autumno autem vuas maturas profert.

TEMPERAMENTVM.

Omnium partium vitis temperamētum ex facultatum enarratione patescet. Vuæ tamen immaturæ & acerbæ frigida & sicca sunt: maturæ verò calidæ & humidæ in primo gradu, autore quidem Simeone Sethi.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vitis viniferæ folia capreoliq̃ue trita & illita capitis dolores, stomachiq̃ue inflammationes & ardorem cum polēta mitigant. Folia etiam per se imposita, vt pote quæ refrigerant & adstringunt, Succus ex ipsis potus dysentericis, sanguinem expuentibus, stomachicis & citra laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua capreoli & poti eadem efficiunt. Lachryma verò eius quæ veluti gummi in caudicibus concrefeit pota cum viuo calculos pellit. Illita lichenas, scabie & lepras sanat. Oportet tamen locum antea nitro confricasse. Eadem cum oleo frequenter inuncta, pilos denudat potissimum ichor, aquosusve humor, qui ex incensis viridibus sarmentis exudat. Hic etiam myrmecias inunctus eiecit. Cinis sarmentorum & vinaceorum circa sedem quæ antea ablata amputatæ sunt condylomata & thymia, cum aceto illitus sanat. Confert luxatis & viperarum morsibus. Lienis inflammationibus cum rosaceo, & Ruta, & aceto illitus. Vua recens quæuis aluum turbat, & stomachum inflat. Minus horum particeps quæ aliquandiu decerpta pependit quòd in eo copia humoris exaruerit. Stomacho accommodata est, appetentiamque cibi excitat. & imbecillis conuenit. Quæ autem in vinaceis, aut è vinario vase seruatur sunt, ori & st.

Stomacho gratæ sunt. Alium fistunt, vesicam tamen & caput tentant. Profunt sanguinem excreantibus, Similes ijs sunt quæ in mustum coniectæ sunt. Quæ vero sapa aut musto conditæ stomachum magis infestant. Reponuntur & cœlesti cum aqua prius passæ factæ, minúsque vinosæ fiunt, siticulosi, ardentibus & longis febribus vtilis. Vina cœli earum reconditi, inflammatis, duris, turgētibusque mēmis cum sale illinuntur. Vinaceorum decoctum dysentericis, cœliacis, & fluxui muliebri infusū confert. Ad incessiones quoque ac clysteres assumitur. Nuclei acinorum adstringunt, stomacho grati. Tosti autem, & triti & pro fariña illiti, dysentericis, cœliacis & stomachore solutis profut. Vua autem passa alba magis extenuat. Caro illarum comesta, arteriæ, tussi, renibus ac vesicæ confert. Est in dysenteria per se cum nucleis. Admixta milij & hordei farinæ & ouo, ac cum me friza, & per se etiam sumpta, atque cum pipere commanducata, ad capitis pituitam purgandam valet. Testium inflammationes sedat, cum fabarum & cumini farina illita. Epynictidas, carbunculos, fauos, & in articulis putredines & gangrenas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita, sanat. Podagræ cum oppopanace illita auxilia tur. Mobiles vngues illita celeriter adimit. Vini facultates tu ipse ex Dioscoride, Galeno, & Plinio pete: superuacuum enim, imò tædio plenum esset, eas in vniuersum omnes commemorare.

Vide Galenū lib. j. de alimentorū facul. triplicem hunc seruandarū vuarum modū explicantē.

† Serapio legit adstringit.

EX GALENO.

Vitis fatiuræ & cultæ adsimilis facultas est syluestri, sed ad omnia imbecillior. Vitis verò syluestris racemi, extergendi vim obtinent, vt ephelus & næuos, & id genus quæ cūque in cutis superficie fiunt, curare possint. Habent verò & adstrictionē quandam ipsi, & extrema germina, quæ & sale condiri assolent. Plura de vuis habet idem Galenus lib. 2. de Aliment. facul. cap. de vuis.

EX SIMEONE SETHI.

Vuæ plus nutriunt reliquis oporis, minus tamē sicis: neque mali succi sunt, si maturæ fuerint exquisitæ. Tamē his non robusta, nec densa, sed laxa & flaccida caro gignitur.

f v Maxi

Maximum quidem harum bonum, ait Galenus, quòd celeriter subeunt, atque ideo si retineantur, lædunt: nec enim tunc probè concoquuntur, sed crudum gignunt humorè qui non faciliè in sanguinem transmutetur. Nucleorù natura, sicca & quodammodo adstringens est. Pertrāscentur igitur omnia intestina, non alterati. Pensiles verò vix, neque sistunt ventrem, neque proritant, cæteris autem facilius concoquuntur. Neque vuarù parua est in dulcedine, & austeritate: & aciditate differentia. Dulces quidem calidiorè habèt succum, austerè verò & acidæ, frigidù. Aluum subducunt dulces, & maximè quādo humidæ fuerint. Omniū itaque tutissimus vsus est quando carnosæ fuerint & maturæ, & mediocriter q̄s ipsas assumat. Vix quæ albe sūt, magis subducunt aluum, quàm nigræ. Omnes verò ciborum appetentiam excitant, & venterem, Conuenit cum eduntur membranam & nucleos expuere, quòd difficulter conficiantur. Quæ immaturæ sunt, ventrem sistunt, & stomacho bonæ. Caliditatē à flaua bile ortam sedant. Minus verò nutriunt. Oportet autē non solum vix, sed etiam omnes fructus molli cortice præditos humidos, ante reliquos cibos apponere.

De Aconito. Cap. XXX.

NOMINA.

Aκόνιτον Græcis. Aconitum Latinis, Gallis autē *Estrangle Liepard*. dicitur. Sic autē Theophrasto libro nono de plantarù historia teste, non ἀπὸ τῶν ἀκόντων id est, à canibus, ab Aconis Periandynorum pago, ad Herachiam Pontis sito, vocatum est. Alij quòd vis eadem in mortem esset, quæ cotibus adferri aciem detrahendā, statimque admota velocitas sentiretur. Sunt qui aliā ob causam quā refertur minimè necessarium duco, sic nominatum fuisse existiment.

GENERA.

Duo Aconiti sunt genera: vnum Græcis Pardaliāches dictum, quòd pardi eo necentur. Gallicè *Estrangle Liepard*. Vocatur etiam Scorpionium, quòd radicem Scorpionis similè habeat. Vulgus herbariorum Vuam versam, vulpinam.

Ger

Germa. [Vvolffsbeer & Dolvvurtz] nominât. Alterû Lycostonon Græcis dicitur. quoniâ deuoratum lupos cōfestim interficit. Vulgus Lupariâ, Germani [Vvolffs vvurtz] appellât Gal. L'herbe au loup, ou Estrangle loup, ou Madriettes.

FORMA.



Aconitū Pardalianches. *Aconitum Lycostonō.*

Pardalianches folia habet tria aut quatuor Cyclamino vel syluestri Cucumeri similia, minora tamē, & subaspera Caulem dodrantalem. Radicem scorpionis caudę similem alabastri modo nitentem. Ex hac descriptione omnibus li quidd̄ apparet, herbam eam quam Vuam versam aliqui nominant, cuiusque hic picturam exhibemus, primū esse Aconiti genus: habet enim tria aut quatuor folia, eaque Cyclami

clamini specie. Caulem palmi altitudine, & radicem incur-
nam, scorpionum caudæ similem, alabastrique modo splē-
dentem. Quibus etiam accedit quòd manuscriptus & vetu-
stissimus herbarius planissimè eam herbam, quam hic da-
mus pro Aconito pingat. Germanica etiam nomenclatura
satis indicat hanc herbam ob suam facultatem perniciosam,
esse Aconiti speciem. *Lycostonon* Platani folia habet, ma-
gis tamen incisa diuifave, longiora & nigriora. Caulem
veluti filix, cubiti altitudine, aut maiorem: pediculum gla-
brum. Semen in siliquis aliquatenus longis. Radices citris
marinarum squillarum similes, nigras. Vnde iterum con-
stat *Luparia*. stat *Lupariam* vulgò appellatam, esse alteram Aconiti spe-
ciem: ea enim folia Platani, quæ Cici aut Vitis folijs similia
sunt, multas habentia diuifuras, obtinet. Caulem Filici si-
milem, pediculum glabrum. Florem oblongum, luteū, post
quem longæ proueniunt siliquæ, in quibus est semen. Ra-
dices etiam nigras, vt nemo subinde quin verum sit Aconi-
tum, dubitare possit.

LOCVS.

Primum Aconiti genus passim in nemoribus & colli-
bus quibusdam nascitur: alterum autem in montium valli-
bus altissimis. Magna autem illius copia est circa montem
haud vltra vngam lapidem à Tubinga situm, quem Germa-
nica voce [Farrenberg] nominant.

TEMPVS.

Aconiti primum genus Maio mēse potissimū erūpit,
Alterum autem æstate, Iunio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Erosione & putrefactione enecant Aconita, ideo toto
genere letalia sunt.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Ferūt Aconiti primi radicem scorpioni admotā enim re-
soluere, & è diuerso admoto elleboro excitari. Ocularibus
medicamentis dolorem tollentibus miscetur. Enecat pardos
fues, lupos, & feras omnes, carnibus impositū & obiectum.
Alterius radice ad luporum venationes vtuntur. Insertæ
carnibus crudis, & à lupis deuoratæ, eos enecant.

EX GALENO.

Aconitum Pardaliāches putrefaciendi facultatem obtinet & lætale est, itaque in cibo potūque fugiendū: attamē ad putrefaciendum colliquandūve quēdam extra corpus aut circa sedem, idoneū est. Herbe verò radix ad hæc utilis est. Alterum similem priori facultatem habet, sed peculiari ter lupos, sicut illud pardos, interficere consuevit.

EX PLINIO.

Constat omnium venenorum ocysimum esse Aconitum, & tactis quoque genitalibus scēminini sexus animalium, eodem die inferre mortem. Hoc tamen in vsus humanę salutis vertere, scorpionum ictibus aduersati experiendo, Aconitum datum in viño calido ea est natura vt hominem occidat, nisi inuenerit quod in homine perimat: cū eo solo colluctatur, velut pari intus inuēto. Sola hæc pugna est, cū venenum in visceribus reperit: mirūmque exitia lia per se ambo cū fuerint, duo venena in homine commoriuntur, vt homo supersit. Imò verò etiam ferarum remedia antiqui prodiderunt, demonstrando quomodo venenata quoque ipsa sanarentur. Torpescūt scorpiones Aconiti tactu, stupētque pallētes, & vinci se confitētur. Auxiliatur eis elleborum album, tactu resoluēte: ceditque Aconitum duobus malis, suo & omnium. Taugunt carnes Aconito, necāt que gustatu earū pantheras, ob id quidam Pardalianches appellauere.

ADNOTATIO.

Aconitum Pardalianches quadrifolium, quod qui tam putauerunt Asters, recte pingis, in syluis frequens.

De Aristolochia. Cap. XXXI.

NOMINA.

Aristoloxia Græcis, Aristolochia Latinis, Barbaris & Officinis corrupta voce Aristologia. Quemadmodū etiā Germanis [Holuurtz & Osterlucy] Gallicè *de la Sarrafine* nominatur. Dicta autem est Aristolochia, quòd ἀρίστη τῶν λοχίων, id est, optima puerperis sit, vt pote quæ remora eos menses, hærentes secundas, & reliquias omnes à partu expellat.

GENERA.

Aristolochiæ Dioscorides & alij Græci tria esse genera statuunt. Vna est quæ rotunda & fœmina dicitur. Gallicè *Sarrasine ronde*, Altera lōga & mascula. Gal. *Sarrasine longue ou ratelou*. Tertia clematidis, quasi dicas sarmentaria, appellatur. Harum certè nullam præter longam officinæ Germaniæ nostræ agnoscunt. Nām qua sub Aristolochiæ rotundæ nomine vtuntur herba, minimè genuina est vt paulò post euidentissimis argumentis ostendemus. Plinius tribus ijs generibus addit quartum, ac Pistolochiam vocat, quæ certè ea est, quam nostræ officinæ Aristolochiam rotundam, & Germani [Runde Holvvurtz] falsò appellant vt in eius descriptione fusius docebimus.

FORMA.

*Aristolochia rotunda.**Aristolochia Longa.*

Aristolo

Aristolochia rotunda folia Hederæ similia habet, cum acrimonia odorata, subrotunda, tenera, cū multis in vna radice germinibus: sarmenta illi sunt oblonga, flores candidi pilcolis similes, in quibus quod rubet graniter odoratū est. Radix illius rotunda, rapo similis. Ex ijs quidem verbis sole clarius fit, Aristolochiam rotundam officinarum, & qua communiter omnes vtuntur, non esse eam quam Dioscorides atque alij veteres pingunt. Hæc enim non Hederæ folia, sed Rutæ potius, maiora tamen habere deprehenditur. Neque etiam odorata, neque subrotunda sunt. Grauis etiā qui ex floribus exhalat odor, in nostræ Aristolochiæ floribus nusquam apparet, Radix denique etsi rotunda sit, tamen quia concava est, globiq; formam obtinet, rapo, quod solidum est & oblongum, similis dici non potest. Nō latet tamen interdum etiam reperiri eius generis radices prorsus rotundas ac solidas, vt altera pictura monstrat, verū cū reliquæ Dioscoridis notæ absint, legitima Aristolochia esse haud potest. His accedit, quod manuscripti herbarij pictura planè hanc Aristolochiam Hederæ folia habere doceat, vt hinc etiam euidentissimum sit nostram non esse genuinam.

Aristolochia rotunda.

Aristolochia longa, folia quā rotunda longiora habet. Ramulos tennes, altitudine dodrātales. Florē purpureum, grauiter odoratū, qui cū defloruerit pyro similis fit. Radicē digiti crassitudine dodrantalem, aut longiorē. Tā huius verò quā prioris radix colore buxco, gustū amaro, & odore viroso est. Hæc sane descriptio non abhorret à nostra Aristolochia, quæ Hederæ etiā folijs cōstat, ramulisq; tenuibus. Neque obstat quod hæc non purpureos, sed luteos potius flores habeat: nā vt in Symphito magno vberius dicemus, non vbiq; terrarum, earundem etiam herbarum flores similes esse euidentissimum fit, in Boragine, & Consolida maiore hodie nominatis herbis. Quamuis autem lutei sint grauiter tamen odoratos esse constat. Dein vbi flos nostræ etiam Aristolochiæ defloruerit, tum pyro similis fit vt pictura etiam pulchrè monstrat. Sed hic obtrudet nobis quispiam Dioscoridem, qui Gentianæ radicem Aristolochiæ

Aristolochia longa.

*Obiectio-
nis dissolu-
tio.*

*Earūdem
etiam her-
barum flo-
res nō vbi-
que terra-
rum esse si-
miles.*

longæ

longæ similem, crassamque esse scribit: huius autem nostræ nedum digiti crassitudinem obtinet, tantū abest, ut quantitate Gentianæ radici similis esse queat. Respondeo hæc quidem vera esse, sed nihil mirum esse si apud nos minor reperiatur: variatur enim in vna etiam & eadem herba iuxta regiones diuersas radicū magnitudo. Sic visa est nobis radix Aristolochiæ rotundæ multò, quam sit maximus digitus, maior & crassior. Hæc tamen in Italia prouenerat. Neque dubiū est quin nostræ etiam radix maior futura sit. vbi cultus, & terra apta admodū accesserit. Nam ut Theophrastus lib. 1. de histo. plan. cap. 5. autor est, quædam obculturam diuersa efficiuntur, atque à sua natura discedūt. Sic Malua in altum se attollit, & arborefcit, atque in longitudine & crassitudine instar hastæ grādescit. Quid multa? cū nostra maxima etiam prædita sit amaritudine, tutò illa pro vera & genuina, nihil obstantibus floribus luteis & radice minima, uti licebit. Clematicis tamulos habet tenues, folijs subrotundis, minori Semperuino similibus, plenos: flores Rutæ haud dissimiles. Radices longiores, tenues, corticem crassum habentes, & odoratum. Pistolochia à Plinio lib. 25. cap. 8. ijs pingitur verbis. Est & quæ Pistolochia vocatur, quarti generis, tenuior quàm tertia, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrhizon cognominant. Ex ijs autem verbis nemo non intelligit, Aristolochiam rotundam vulgò vocatam, esse Pistolochiam: hæc enim supra modum tenuis, vel ut apertius dicam, tenera herba est. Radix etiam multis capillamentis vestita, crassioris etiam iunci magnitudine, atque adeò concaua, ut pictura monstrat. His accedit, quòd hæc quæ rotunda vocatur, cauis vlceribus profit, quam etiam facultatem Pistolochiæ, ut paulo post patebit, Plinius tribuit. Et quid multis opus est verbis? Nomen ipsum abundè docet esse Pistolochiam: creditur enim, quamuis reuera nō sit, esse Aristolochia hodie quoque, haud secus quàm Plinij temporibus. Hæc, ut totam eius faciem teneas, caulem habet rotundum, læuem, folia Rutæ hortensis, latiora tamen, flores ferè Eranthemii,

purpureos: illa candidos, vt pictura quę vtrōsque vnā com-
plectitur, pulchrē monstrat: quibus abscūtibz, siliquas pro-
fert refertas semine atro, lentibus haud dissimili: radices, vt
ostensum est, hęc rotundam & cauam, illa verò rotundam
at omni tempore solidam obtinet, colore subcroceam.

LOCVS.

Vera rotunda, quod sciam, nusquā in Germania nostra
nascitur. Longa passim in vineis, ac hortis alijs prouenit.
Pistolochia in syluis & locis vmbrosis.

TEMPVS.

Lōga Iunio & Iulio mēsisbus floret. Pistolochia in Mar-
tio & Aprili, quo pręterito statim etiam disperit.

TEMPERAMENTVM.

Cū supra modū amarę & subacres sint Aristolochię,
calidas & siccas esse in secūdo, vel quod magis credibile est,
in tertio ordine rectē statuemus.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Rotūda contra alia venena valet. Longa verò drachmę
vnius pondere cum vino pota & illita, aduersus serpētes &
letalια. Menses, secundas & fœtus omnes in vtero cōsisten-
tes cum myrrha & pipere pota pellit. In pessō subdita eadē
potest. Rotūda ad eadē omnia ad quę prędicta conducit:
ampliusq; asthmati, singultui, rigori, leni, ruptis, cōnulsis,
laterisq; doloribus ex frigida aqua pota auxiliatur: furem-
los & spicula extrahit. Squamas ossium illita educit. Putre-
scencia excarificat, & sordida vlcera expurgat. Caua cū Iri-
dē & melle explet. Exterit gingiuas & dentes. Creditur &
Clematidis ad eadē prodesse, efficaciam tamen prędictis mi-
nor inferiōrque est.

EXGALENO,

Aristolochiæ radix ad medicationes vtilissima est, ama-
ra & subacris. Sed ex illis tenuissima est rotūda, & in omni-
bus efficacior. Aliarū verò duarū Clematidis vocata magis
odorata est: ita quę ea ad vnguenta vtuntur vnguentarijs:
sed ad sanationes infirmior. Longa verò minus quidem
tenuis est quā rotunda, sed nec ipsa inefficax, verū ab-

De Ampelo Leuce. Cap. XXXII.

NOMINA.

Aμπελος λευκη, ή Βρυωνία, ή φιλωθρονί. Græcè: Vitis alba, Psilothrum Latine appellatur. Officinis & herbarijs Bryonia. Vulgus, Viticillam nominat. Germanicè [Stick vurtz, Schiefz vurtz, Raszvurtzel: Hunds kurbz: Roemitchroub, Vuilder zirvvan, Teufelskirsz.] Gallicè *De la Couleuree, Feu ardant, ou Courle sauvage.*] vocatur. Vitis alba verò dicta, non quòd vitis sit, sed quòd viti similis existat. Sic etiam Viticella, Psilothrum quòd ex eius acinis coria depilari ac confici possint. Bryonia verò à *Βρυο* fortè, quod est pullulo atq; adeò extollo, & exalto, eò quòd in adiacentes sibi frutices scandēs se exaltet atq; latè pullulet.

FORMA.

Sarmēta, folia, capreoli, satiusq; viti similia sunt hirsutiora tamē omnia. Propinquis fruticibus se implicat capreolis apprehendēs. Fructum habet racemosum, rubentem, quo coria depilant. Radix alba, crassa & magna.



Vitis, Alba siue Bryonia.

bibiturq; cum aqua mulsa ad eadem, pituitam ducens. Fructus eius ad psoras & lepras illitus & inunctus facit. Lactis abundantiam efficit succus eius fructus, si cum tritico decocto sorbeatur.

EX GALENO.

Vitis albæ, quam etiam Bryoniam vocant, prima quidē germina ab omnibus pro more per ver edūtur: utpote edulium stomacho, eò quòd adstringat, gratum. Habent enim amaram & modicè acrem adstrictionem, quare urinam moderatè mouent. Radix autem abstergentem nonnullam, desiccantem & tenuium partium, ac moderatè calidā vim obtinet: quamobrem & lienes induratos liquefacit, tum epota, tum foris cum ficibus imposita. Psoram etiam ac lepram sanat. Racemosus eius fructus pelles tingentibus utilis est.

EX PLINIO.

Bryoniæ asparagi decocti in cibo, aluum & urinā cient. Folia & caules exulcerant corpus: utique vlcera phagedænis & grægrænis, tibiærumq; tædio cum sale illinuntur. Semen in vua raris acinis dependet, succo rubente postea croci. Nouere id quī coria perficiunt: illo enim vtuntur. Psoris & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit coctum cum tritico, potumque. Radix numerosis vtilitatibus nobilis: contra serpentium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie, varosque & lentigines, & surgillata emēdat, & cicatrices. Eadēque præstat decocta in oleo. Datur & comitibus potus. Item mente commotis, & vertigine laborantibus, drachmæ pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquanto, purgat sensus. Illa vis præ clara, quòd ossa infracta extrahit in aqua imposita, ut Bryonia: quare quidam hanc albam Bryoniam vocant. Suppurationes incipiētes discutit, veteres maturat & purgat. Cit menses & urinam. Eclegma ex ea fit suspiriosis, & contra lateris dolores, vulsis, ruptis, Splenem ternis obolis pota trīginta diebus consumit. Illinitur eadem cum fico & pterygijs digitorum. Ex vino secundas fœminarū apposita trahit: & pituitam, drachma pota ex aqua mulsa. Succus radi-

cis colligi debet ante seminis maturitatem: qui illitus per se & cum cruo, latiore quodā colore & cutis teneritate man-
gonizat corpora: serpentes fugat. Tunditur ipsa radix cū
pingui fico, erugātque corpus, si statim bina stadia ambu-
lentur. Alias vrit, nisi frigida abluatur.

ADNOTATIO.

*Bryonia nobis colubrina, quod sub huius umbrā densiori stabu-
itare ament colubri, alijs ignis ardens dicitur à caustica vi bacca-
rum rubentium.*

De Ampelo melena. Cap. XXXIII.
NOMINA.

Αμπελὶς μελανα Græcis, Vitis nigra Latinis nomina-
tur. Officinis incognita. Germanis. [Vualdreben, o-
der Lynen, oder Lenen.] Gallicè *Especce de Couleuree, ayant*

les racines & semences
noire, ou viorne, vocatur.

Nigra verò vitis dicta
est à radice nigra, & q̃
vitis similitudinem ob-
tineat.



Vitis nigra.

FORMA.

Folia Hederæ simi-
lia habet, magis tamen
ad Smilacis folia acce-
dentia, cui & caules si-
miles obtinet: maiora ta-
men eius folia quàm il-
lus sunt, Clauiculis hæc
etiam arbores amplecti-
tur. Semen racemosum,
initio herbaceum, cum
maturuit deinde ni-
grum. Radicem foris n-
gram, intus buxci colo-
ri

coloris. Ex qua delineatione omnibus constat herbam hanc cuius picturam exhibemus, esse vitem nigram. Folijs enim Hederae, maioribus tamen, Smilaci proximioribus, caulibus quoque cognatis. Clauiculis suis arbores perinde atque adminicula comprehendit. Semen racematim cohaeret, inter principia virens, post maturitatem nigrescens. Radix foris atra, intus buxeo colore nitet. Flores eius, quod omisit Dioscorides, sunt candidi, & odorati, quibus deciduis seminem subnascitur plumis quasi vestitum, aut barbae canae effigiem praebens.

LOCVS.

In frutetis & dumetis potissimum nascitur.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, Augusto vero semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod vitis alba temperamentum habet.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Huius caules in prima germinatione olerum modo manduntur, urinae & mensibus ducendis utiles. Idem henes minunt. Comitibus, vertiginosis, & resolutis accommodati sunt. Radix eadem praestat quae vitis albae, minus efficax tamen. Folia cum vino illita ad iumentorum ceruices exulceratas conducunt. Quinetiam luxatis eodem modo imponuntur.

EXGALENO.

Vitis albae ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

EXPLINIO.

Asparagi eius in cibo urinae eiendae, lienique minuendo utiles. Radix ossa infraeta efficacius extrahit quam supraeta. Caeterum eidem peculiare est, quod iumentorum ceruicibus vnicè medetur. Aiunt si quis eam in villa extruxerit, fugere accipitres, tutasque fieri aves villaticas. Aliter eadem in iumento hominemque phlegma aut sanguinem qui secretur, talos circumligata sanat.

ADNOTATIO.

Tua vitis nigra videtur esse viburnum, etiam vulgo Gallorum Virgilio dictum.

De Amaranto. Cap. XXXIIII.

NOMINA.

Aμαρανθος Græcis, Amarantus Latinis dicitur, Medicis & herbarijs nostræ ætatis ex amore & anthos dictiōnem componi credentibus, Flores amoris vocant. Hāc appellationem vsurpantes Germani [Floramor] nominant, aliās [Samatbluom, & Taufentschoen], Gallicè. *Passerevelours* appellatur. Amarantus autem nō alio nomine dici cœpit quā quod flos eius nunquam marcescat. Hinc est quod puellæ hyemales sibi corollas ex eo conficiant: id quod Erfordiæ, vbi non solū æstate, verumetiam hyeme gestant coronas, fieri potissimū solet.

GENERA.

Duplex est Amarantus: vnus luteus, qui Dioscoridi *ταχυσπορος* Galeno Amarātus, officinis & imperitis Stichas citrina, vel, vt ipsi loquuntur, Sticados citrinum, Gallis *Passerevelours iaulne*. Germanis [Rheinbluomen], quod in regionibus quæ Rheno adiacent, potissimum verò quæ intra Spiram & Vuormaciam sunt, proueniat: [oder Mottemblum, oder Iungling] appellatur. Helichryson dictum, quod ad solis repercussum comantibus in orbem florum folijs, fulgorem auri præ se ferat. Alter purpureus, qui hodie. Flos amoris vulgò, & Germanis [Floramor oder Samatbluom] vocatur, vt paulò antè à nobis dictum est. Gallis autem *Passerevelours rouge, Fleur D'amour, ou Jaloufie* dicitur.

FORMA.

Amarātus luteus qui Helichryson alio nomine dicitur, virgam habet tenuem, virentem, rectā, solidāque. Folia angusta ex intervallis, Abrotono similia. Comam orbiculatam, auri modo fulgentem. Umbellā rotundam, veluti corymbos arcescentes. Radicem tenuem. Ex qua descriptione planum fit eam herbam quam hodie officinæ solæcisimo vrentes, Stichada citrinam nomināt, esse Helichryton,

Est e

*Amarantus luteus.**Amarantus purpureus.*

Est enim herba surculosa, exilibus ramulis, folio vt Hyssopus angusto, gustu amaro, & instar Abrotoni albicante: eo ma orbiculari, auri modo splendente: umbella rotunda veluti corymbos arescentes: radice gracili. Et, vt paucis dicā, non est nota quæ illi nō aptissime quadret, Purpureus vero pedali altitudine surgit, caule purpurascēte, folijs Ocy-mo similibus, maioribus tamen & longioribus, spica purpurea verius quā flore, inodora, qua nihil gratius aspectu cernitur.

LOCVS.

Nascitur in asperis, sabulosis, siccis & conuallibus locis luteus. Alter autem in hortis & fætilibus seritur.

TEMPVS.

Helichryson Iunio & Iulio mensibus floret, Amaranthus

verò purpureus æstate, potissimum autem Augusto mēse.
TEMPERAMENTVM.

Luteus calidus & siccus haud dubiè est, id quòd amaritudo in gustu & facultates eius abundè demonstrant. Purpureus autem recentiorum herbariorum sententia, frigidus est & siccus.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Coma Helichrysi cum vino pota difficultatibus vrinæ, serpentium ictibus, coxendicium doloribus, & ruptis auxiliatur. Mēses ducit, & sanguinis grumos in vesica aut aluo enim oxymelite pota liquefacit, Destillationem trium obolorum pondere cum vino diluto albo ieiuno data cōpescit. Reponitur etiam cum vestibus, quas ab erosione integras seruat. Vnde iterum colligere licebit, herbam quam [Rheinbluomen] vocāt, esse Helichrysum, quòd illam hac facultate vt vestes à tinea tucatur peditam esse, omnibus in confesso est.

EX GALENO.

Amarantus, luteus nempe, facultatis est incidentis & extenuantis. Quapropter coma eius cum vino pota menses educit, & sanguinis grumos liquare creditur, non solum in ventre, sed & in vesica. Sed tunc potius illam cum mulso bibere conuenit. Omnes verò simpliciter fluxiones pota desiccet, stomacho tamen aduersa.

EX PLINIO.

Helichrysum ciet vrinæ à vino pota, & menses. Duritias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle inponitur. Contra serpentium ictus & lumborum vitia bibitur. Sanguinem concretum ventris ac vesicæ absumit cum mulso. Folia eius trium obolorum pondere sistunt profluvia mulierum in vino albo. Vestes tucetur odore non ineleganti.

APPENDIX.

Recentiores purpureum Amarantum vehementer siccare tradunt, ideoque cum vino sumptū alui fluxiones sistere scribunt: sed, vt aiunt, stomacho aduersatur. Lutei floribus in vino decoctis, ad lumbricos educendos vtuntur: & ad pediculos enecandos in lixiuio coctis.

ADNOTATIO.

Amarātus luteus in Xantonia & Gallia Narbonensi frequens est, in officinis propè omnibus stachadij citrea nomine Amarantus purpureus nobis Passe velours, quòd immortalis colore etiam villum purpureum vincat.

De Aquilegia. Cap. XXXV.

NOMINA.

QUæ Aquilegia vulgò ab omnibus appellatur herba, et Germanis. [Ackeley, Agley, & Ageley.] Gallis autem Ancolie nominatur. Quo verò nomine Græcis aut Latinis medicis vocata sit, nobis nondum constare potuit. Non esse enim Græcorum Aegilopa, ut non solum vulgares herbarij, verumetiam magni nominis medici putant, notius est quàm ut demonstrari à me debeat. Nam nihil in vniuersa Aegilopis, quæ alterum Auenæ genus est, histo-

ria reperitur, quòd ad Aquilegiā referri queat. Neque enim tã ab anguilla cancer, quàm Aegilops ab Aquilegia dissidet: ut hoc nomine errare toto cælo euidentissimum sit, qui Aegilopa esse Aquilegiam arbitrantur.

FORMA.

Folia Chelidoniij maioris habet, sed paulò rotundiora, ac molliora. Caulem cubitalem, & interdum proceriorem, in cuius summo flores purpurei sunt, ex caudis quibusdam veluti muliebres loculi propendentes. His decidentibus ca-

picu

*Aquilegia vulgaris.*

pitula subnascuntur, haud secus atque in Melanthio, in quibus semen atrum est. Radix eius crassa.

LOCVS.

Nascitur passim in hortis, & pinguibus quibusdam pratis. Inuenitur etiam in montibus syluosis, & interdum in petris & muris.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

In gustu dulcedinem quandam præ se ferre videtur, ut hoc nomine mediocriter calidam esse, ac modicè digerendū vim habere verisimile sit.

VIRES EX RECENTIORIBVS.

Recentiores omnes, tū herbarij, tum medici, Aquilegiæ omnes Aegilopis facultates tribuunt, at quàm rectè, ipsi viderint. Neque enim verisimile est herbæ quæ subacris non est, tantam discutiendi inesse facultatem posse. Quū verò modicè digerat & exiccet, scabiei & fistulis, potissimū si illi farina commisceatur triticea, conferre potest.

ADNOTATIO.

Aquilegia alijs Angelica, Ancolie vulgo Gallorum, florum omnium pulcherrimus, præsertim qui duplex est.

De Alliaria.

Cap. XXXVI.

NOMINA.

NONDVM constat quo nomine veteribus Græcis & Latinis herba hæc appellata sit. Vulgò tamen eo, quòd trita eius folia ingratum ac planè alliaceum odorem redolent, Alliaris & Alliaria nominatur. Germanicè [Knoblockkraut: oder Leuchel: oder Saszkraut.] Gallicè autem *l'herbe des aulx*. Pandectarum author Pedem asininum vocat.

FOR

FORMA.

*Alliaria siue Alliaria.*

Folia eius cū primū
 emicant subrotunda sūt
 violæ similitudine, ali-
 quantulū tamen maio-
 ra. Adulta autem in an-
 gulos exeunt. Herba ip-
 sa bicubitali proceritate
 consurgit, caule tereti,
 folijs Vrticæ, nisi quod
 leniora sunt, parcius sin-
 briata, & à pediculo la-
 tiora. Alij odoratu cū
 teruntur, flore lacteo al-
 bōve, exili in siliquis se-
 mine, atro colore, radice
 ob longa, eiusdem cum
 folijs odoris.

LOCVS.

Pasim propè sepes & agrorum margines prouenit.

TEMPVS.

Folia statim primo vere, atque ad eò Martio ipso erum-
 punt. Floret autem æstate, atque deinceps semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Quum prorsus suboleat Allium, necesse est vt tempe-
 ramento eodem prædita sit. Calefacit igitur haud du-
 biè & desiccatur, non tamen perinde atque Allium in exces-
 su quarto.

VIREs.

Easde propè Allij facultates habere vel hinc conijci po-
 test, quod nonnulli in iuribus tortiuusq; succis pro Allio
 substi-

substituant. Proinde corpus calefacere, crassos humores in eo extenuare, glutinosos incidere potest. Omnia tamē hęc minori quā Allium efficacia. Semē eius cum aceto emplastri modo mulieribus strangulatu vteri laborantibus impositum, & vulnæ admotum prōdest, ac easdē excitat. Et summatim, omnia quæ Nasturtij semē, sed minori efficacia, potest.

ADNOTATIO.

Alliaria vulgè Scordosū ab odore Allij, herba qua sunt haellenus malē vsi pharmacopai loco Scordij nunc notissimū.

De Acalyphe. Cap. XXXVII.

NOMINA.

Aκαλύφη, ἡ κνίφη Græcis, Vrtica Latinis nuncupatur. Officinæ Latino nomine vtiūtur, Germanis [Nessel] Gallicè *Ortie* appellatur. Acalyphe verò dicta est, Achatæ autore, quod iniucūdo sit tactu, & pruriginem cieat. Cnide autem, quod vellicet, pungat, ac suo morfu sensum laceſſat, à verbo κνίσω, quod pungere & vellicare significat. Vrtica ab vrendo, quod pruritus pustulæque igni similes excitet.

GENERA,

Dioscorides duo facit genera. Vnā asperam, quam hodie græcam siue Romanam vocant, & est ea quam pictādamus. Huius quidem semine in officinis vtendum, non aliterius quæ passim in sepibus ac dumetis nascitur. Germanicè [Vuelschnessel] Gallicè *Ortie griesche pour greque* appellatur. Alteram minus asperam, quam ob id mollem nominant. Hanc nondum videre potuimus. In Germania nostra præter hęc genera, alia duo inueniuntur. Vnum maius, quod Germanicè [Heyternessel] Gallicè autem *Ortie commune* nominant, alterum minus, Germanicè [Brennessel,]

fel,] vel [Habernessel,] quod nimirū in aenea nascatur, appellari solet. Gallicè *Ortie gresle*. Harū etiā picturas adijcere placuit, quod non prorsus inefficaces esse putemus, quando quidem haud secus atque Romana pungere videantur.

FORMA.

*Urtica Gracilis seu Romana.**Urtica maior.*

Romana caule est rotundo & aspero, sylvestrior etiam & asperior, latior & nigrior folijs, semine haud dissimili in globulis quibusdam semini lini, sed minore. Altera priori similis est, nisi quod non similiter aspera est, tenuiusque semen habet.

LOCVS.

*Vrtica minor.*

Romana apud nos
non nisi sata prouenit,
non secus atque mollis
vocata vrtica. Vulgares
passim in dumetis ac se-
pibus gignuntur.

TEMPVS.

Semen messibus colli-
gi oportet.

TEMPERAMEN-
TVM.

Subtilium est partiū,
& temperaturæ siccae,
non tamen tantum ha-
bet caliditatis vt iam
mordicet.

VIRESEX DIO-
SCORIDE.

Vtriūsq; folia cum sale illita, canis morsibus, gangrenis,
malignis vlceribus, cancris, sordidisque, luxatis, tuberculis,
parotidibus, phygetlis, & abscessibus medetur. Lienosis cū
cerato imponuntur. Profluuia sanguinis ex naribus cū suc-
co trita & imposita sistunt. Cum myrrha trita & imposita
mensēs mouent. Recentia admota vteri procidentias emen-
dant. Semē cum passo potum venerem stimulat, & vuluas
aperit. Cum melle linctum orthopnoeas, pleuritidas, & pe-
ripneumoniā iuuat. Ea quæ in thorace sunt educit. Misce-
tur & excedentibus medicamentis. Folia cum conchulis de-
cocta aluum molliunt, vrināsque mouēt. Cum ptisana de-
cocta ea quæ in thorace sunt educunt. Decoctum foliorum
cum exiguo myrrhæ potum, menses elicit. Succus gargaris-
satus, vnam inflammatam reprimat.

EX GALENO.

Herbæ semen & folia, nā hæc potissimum in vsum adhibentur, digerentis sunt facultatis, adeo vt tubercula & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinēt, quo & Venerem extimulant, maximè vbi cum passo semen bibitur. Porro quod non vehementer calefaciat, sed admodum tenuium sit partium, testatur crassorum viscosorum-que humorum ex thorace & pulmoneeductio, tum quod partes quas contigerit, pruriant. Cæterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta est, dum concoquitur, nascitur: nō enim actu flatuosa est, sed potentia. Ventrem autem mediocriter subducit ipsa dūtaxat abstersione, ac veluti titillatione, non purgatione. Gangrænosa & cancrosa, & in totum quæ exiccati citra mordacitatem postulant, ea conuenienter sanat.

EX PINIO.

Vrtica plurimis scætet remedijs. Semen eius Cicutæ contrarium esse Nicander affirmat. Item fungis, & argento viuo. Apollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinibus. Item aduersari Hyoscyamo & serpentibus, & scorpio-nibus. Quin illa ipsa amaritudo mordax, vuas in ore, proci-dentēque vuluas, & infantium sedes, tactu resilire cogit. Lethargicos expergisci tactis cruribus, magisq; fronte. Ea, dem canis morsibus addito sale medetur. Sanguinem trita naribus indita sistit, & magis radice. Carcinomata & for-dida vlcera, sale admixto: item luxata. Sanat & panos, pa-rotidas, carnesq; ab ossibus recedentes. Semen potum cum Sapa, vuluas strangulantes aperit, & profluuiâ narium si-stit impositum. Vomitiones in aqua mulsâ sumptum à cœ-na, faciles præstat, duobus obolis. Vno autē in vino potio, lassitudines recreat. Vuluę vitijs tostum, acetabuli mensu-ra. Potum in sapa, resistit stomachi inflationibus. Ortho-pnoicis prodest cum melle, & thoracem purgat eodē ecleg-mate. Et lateri medetur cum semine lini, addūt hyssopum & piperis aliquid. Illinitur lieni. Difficilem ventrem tostū cibo emollit. Hippocrates vuluam purgari potio co pronū-
h impoff

imposito cum succo malue. Intestinatorum animalia pelli cū hydromelite & sale. Desfluuiā capitis, semine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia cum vrsi no adipe trita imponunt. Ad eadem radix tusa cum aceto, non minus utilis. Item licni. Et cocta in vino discutit panos, cum axungia vetere salsa. Eadem pilothrum exiccat, Cōdidit laudes eius Phantias phisicus, vtilissimam cibis coctam conditamve professus arterig, tussi, vētris destillationi, stomacho, panis, parotidibus, pernionibus: cum oleo sudorem, coctam cum conchulis cicre alnum, cum ptisana pectus purgare, mulierumque menses cum sale, vlcera quę serpunt cohibere. Succus quoque in vsu est. Expressis illitusque fronti sanguinē narium sistit, potus vrinam ciet, calculos rumpit. Vnam gargarissatis reprimat, Si quadrupedes fœtum non admittant, vrtica naturam fricandam monstrant.

ADNOTATIO.

Vrtica Romana nobis mas dicitur, semine in globulis ceu lini sed minori. Maior in sepibus hortorum, minor agria nobis dicitur. Ortie griefche.

De Aphace.
Cap. XXXVIII.

NOMINA.

Aphace Græcis, Aphace Latinis, vulgò Sylvestris Vitia & Osmundi Germanis [Vuidvicken: oder S. Chri stoffelszkrout] Gallicè *Vesse saunage ou vesseron*] vocatur. Alia est ab Aphaca Theophrasti, quæ sylvestrium olerum genus est, de qua suo loco plura dicemus.

FOR

*Aphace.*

FORMA.

Exiguus frutex est, lenticula altior, tenuioribus folijs. Quæ nascuntur in ea siliquæ læte maiores, terna aut quaterna semina nigriora & minora continent.

LOCVS.

In aruis spontè nascitur.

TEMPVS.

Maior mense floret, & subinde semen in siliquis producit.

TEMPERAMENTVM.

Moderati caloris est, valentius autem desiccatur.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Semina adstringendi vim habent, quapropter stomachi & alui fluxiones tosta, fracta, & decocta lentis instar sistunt.

EX GALENO.

Aphace facultatem obtinet adstrictoriam, sicut & ipsa lenticula. Se d & similiter ut lenticula edi solet: cæterum ætius quàm illa concoquitur. Aluum retinet.

h ij EX

EX PLINIO.

Natura ei ad spissandum efficacior quàm lenti. Reliquo
vfu eodẽ effectus habet. Stomachi aluiq; fluxiones sistit
semen decoctum.

ADNOTATIO.

Aphace ubique hic frequens.

De Andrachne Cap. XXXIX.

NOMINA.

Aνδραχνη Græcis, Portulaca Latinis & Officinis, Ger-
manis [Burtzelkraut,] dicitur corrupta tamẽ voce, cū
efferendū esset [Portzelkraut,] ac si porcellorum herbam
dicerent. Aliàs [Savvbon] iisdem appellatur. [Gallicè, *Pon-
pier, Pourchaille, ou Pourceline*, nuncupatur.]

GENERA.

Portulaca in duas distribuitur species: vnam hortensem
& alteram sylvestrem, quæ non est tertium Aizoigenus, vt
aliqui seducti mendosis Dioscoridis exemplaribus credūt.
Nam quòd plerique nomina harum duarum plantarum
confuderint, factum subinde est vt multa adulterina, quæ
scilicet tertij generis Aizoo debentur, capiti de Portulaca
sylvestri inserta sint, quæ omnia prorsus expungenda ve-
niunt, vt paulò post clarius monstrabimus. Hortensem
Germani simpliciter [Burtzelkraut,] & [Galli *Ponrpier ou
Pourchaille*] Sylvestrem verò *Vuild oderackerburtzel.* vo-
cant. [Galli autem, *Ponrpier ou Pourchaille sauvage.*]

FORMA

Hortensis caules habet crassos, pingues, teretes, in altum
erectos, lentè vergentes in puniceum, folia pinguia, à tergo
candida, flores exiguos, luteos, semina nigra in herbaceis ca-
lycibus contenta. Sylvestris folia oleæ obtinet, minora ta-
men multò, numerosiora & tenera, rubentes cauliculos ab
vna radice multos in terra scissiles, qui commanduca ti suc-
co abun-

*Portulaca hortensis.**Portulaca sylvestris.*

co abundant glutinosiq; , & sapore salsi sunt, Hæc est genuina apud Dioscoridem Portulacæ delineatio: reliqua vero omnia sunt adulterina, & ab imperito aliquo rerum ex capite de tertio Aizoo excerpta, & huic sine omni iudicio inserta.

LOCVS.

Prouenit in hortorum areolis, vineis, & alijs cultis locis hortensis. Cæterum sylvestris in petrosis & incultis etiam nascitur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus carpenda folia & flores: semen vero sequentibus.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat vtraque quidem in tertio ordine à téperatis ac medijs, humectat vero in secundo. Quare viribus etiam

h iij non

non distant: hinc quæ in Dioscoride leguntur, nō sunt propriæ, sed Aizoi tertij generis, & à sciolo aliquo temerè Portulacæ syluestri attributæ.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Portulaca vim habet adstrictoriam. Cum polenta illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, & aliarum partium, stomachi ardoribus, erysipelatis, & vesicæ doloribus auxiliatur. Commanducata dentium stuporem, stomachi & intestinorum æstuationem fluxionesque sedat. Renes erosos & vesicam adiuuat. Veneris impetus exoluit. Pari effectu & succus eius prodest potus, & in febribus etiam valens. Contra rotundos lumbricos, sanguinis excretionē, dysenterias, hæmorrhoidas, profluvia sanguinis, percocta efficax. Contra Sepis morsus. Ocularibus medicamentis vtiliter commiscetur. Intestinis fluxione laborantibus, aut vulua erosionē affecta infunditur. Contra dolores capitis ex vstione cum rosaceo, aut oleo ex alto destillatur. Exanthemata in capite cum vino exterit. Vulneribus ad syderationem spectantibus ex polenta illinitur.

EX GALENO.

Portulaca frigida & aquea temperamento est, paucæ eiusdem austeritatis particeps. Proinde fluxiones reprimat, maximè biliosas & calidas, cum eo quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerās. Hac ratione & estuant, ut si quid aliud, adiuuat, tum vetricis osculo imposita, tum totis hypochondrijs, potissimum in hæcticis febribus. Præterea dentium stuporem sanat, nempe quæ ab acidorum contactu asperè exiccata fuerant, leniens atque replens, ut potius cum viscosam habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaque non foris modò impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanè & toti herbæ comessæ accidit. Quoniā autem adstringit, vtiliter dysentericis editur, & in muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc multò quædam efficacior est herbæ succus.

EX PLINIO.

Portulacæ memorabiles vsus traduntur. Sagittarum venena, & serpentium hæmorrhoidum & presterum restrin-

git, pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Item hy-
 oscyamo potio, è passoq; expresso succo. Cum ipsa nō est,
 semen eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum vi-
 tijs, capitis dolori, vlcerebusq; in vino tusa & imposita. Re-
 liqua vlcera cum melle commanducata sanat. Sic & infan-
 tium cerebro imponitur, vmbilicōq; prociduo. In epipho-
 ris verò omnium, fronte temporibusq; cum polenta. Sed
 ipsis oculis, è lacte & melle. Eadem, si procident prodest, fo-
 lijs tritis cum corticibus fabæ. Pustulis cum polenta & ta-
 le, & aceto ac cera. Et vlcera oris tumorēq; gingiuarum
 commāducata cruda sedat. Item dentium dolores. Tonsil-
 larum vlcera succus decoctæ. Mobiles dentes stabilit com-
 manducata, Cruditates sedat, vocēq; firmat, & sitim ar-
 cet. Ceruicis dolores cum Galla & Lini semine, pari men-
 sura sedat. Mammarum vitia cum melle aut cimolia creta.
 Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stoma-
 chum in acetarijs sumpta corroborat. Ardentibus febribus
 imponitur cum polenta. Et alijs manducata refrigerat e-
 tiam intestina. Vomitiōes sistit. Dysenterix & vomitis da-
 tur ex aceto, vel bibitur cum Cumino. Tenasmiis autem co-
 cta, & comitialibus cibo vel potu prodest. Purgationibus
 mulierum, acetabuli mensura in Sapa. Podagris calidis, cū
 sale illita, & sacro igni. Succus eius potus renes iuuat & ve-
 ficas. Ventris animalia pellit. Ad vulnereum dolores, ex o-
 leo cum polenta imponitur. Neruorum duritias emollit.
 Venerem inhibet, Venerisque somnia. Prætorij viri pater
 est, Hispanix princeps, quem scio propter impatibiles va-
 uæ morbos, radicem eius filo suspensam è collo gerere, præ-
 terquam in balneis, & ita liberatum incommodo omni.
 Quinetiam inueni apud autores, caput inde litum destil-
 lationem toto anno non sentire. Oculos tamen hebetare
 putatur.

ADNOTATIO.

*Portulaca vtraque nobis cum Sereno pulla pes vourle pied, cor-
 ruptè pourpier dicitur.*

De Asphodelo. Cap. XL.

h iij

Nomi

NOMINA.

Asp^hu^la. Græcis, Asphodelus Latinis, Officinis corrupta voce Affodillus, Germanis [Goldvvurtz] nominatur.

GENERA.

Duo esse Asphodeli genera, vtrunq; vno contentus sit Dioscorides, testatur Plinius libro xxj. cap. xvij. marē nimium & fœminam. Mas propriè Albucus nominatur, fœminavero Hastula regia, quod scilicet dum floret, prorsus regij sceptri effigiē referat, Germanicè [Goldvvurtz]. Marē depingit Dioscorides, & radicem eius acrem atque adeo cibo inutile esse tradit. Fœminæ Theophrastus libro vij. de historia plantarum, cap. xij. & Hesiodus mentionem facere videntur, quandoquidem eius vsum in cibo quotidianum fuisse scribunt. Hoc enim de mare dici haud posse, radicis mirifica acrimonia facit. Galenus etiam libro secundo de aliment. facult. Asphodelum fœminam cognouisse videtur dum scribit, Asphodeli radicem Scyllæ radici, magnitudine, figura & amaritudine quadamtenus similem esse. Hæc enim de Dioscoridis Asphodelo verè dici nō possunt, cuius quidem radix nō Scyllæ, sed Pœoniæ potius similis est. Denique nō est vt fœminæ amara, sed acris. Neq; obstat quod nostra Hastula regia tantā amaritudinem, quātam ei Galenus tribuit, nō habeat. Nam neq; ea quā Hesiodus suo carmine tantōpere celebrauit, tantā prædita fuit amaritudine: alijs enim citra cocturam multā, cuius tamen ille non meminit, cibo quotidiano idonea esse nō potuisset. Et certè vt Arō nō in omnibus regionibus patem acrimoniā obtinet, ita nec Hastula regia parē amaritudinem omnibus in locis sortitur. Adeo vt dubium non sit Hesiodum de nostra Asphodelo, quæ fœmina est, loquutum esse. De fœmina autē loquutum esse Hesiodum, confirmat qd alibi tradat in syluis nasci Asphodelum. Quod certè de ea quam fœminam fecimus, rectè dici potest, quando raro alibi quam in syluis nascatur. Sententiam nostram firmare videtur Apuleius ille, qui in libro suo de herbis inscripto, seorsum & Asphodelum, & hastulam regiam describit.

Forma

FORMA.

*Asphodelus femina.*

Asphodelus mas folia habet, Porro maiori similia. Caulē leuem in summo florem ferētem, Anthericum vocatum. Radices sublongas, rotūdas, glādibus similes, gustu acres. Nos marē hac vice habere non potuimus.

Fœmina folia habet oblōga, angusta, leuiter lenta, Plantagini minori non dissimilia: caulem leuem, in summo non vnum, sed plures flores pingues retrorsum incuruos, plenos puniceis maculis: radicem itidem bulbosam, capillis Allij instar multis sub bulbo

enascētibz: comatam, gustūque glutinosam.

LOCVS.

Mas non prouenit in Germania, nisi in hortis culta & plantata. Fœmina verò in mōtibz & syluis sua sponte æ copiosē nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense florent.

TEMPERAMENTVM.

Maris radix calida & sicca est. Fœminæ folia cum amara nō nihil sint & acria, itidem calida & sicca esse, quemadmodum etiam radicem, constat.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Radices Albuci vim calefaciendi obtinent, vrinas & mē
scs

ses potæ mouent. Lateris doloribus, tussibus conuulsionibus, ruptionibus, drachmæ pondere ex vino potæ medentur. Cômāducata astragali mensura vomitiones adiuuat. A serpente demorsis datur vtiliter triū drachmarum pōdere. Illinire autē oportet morsus folijs, radice, & floribus cū vino. Itē vlcera fordida, & depascentia. Māmarū quoque & testīū inflāmationes, tubercula & furūculos, decocta in vini sæce radice, ad recentes autē inflammationes cum polenta. Radicis succus, adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquā vtile sit oculis medicamentum. Ad purulentas aures per se, & cū thure, melle, vino, & myrrha tepesfactus prodest. In contrariam aurem per se infusus dētiū dolorem mitigat. Cinis ē radice cremata illitus alopecias capillis explet. Oleū in excauatis radicibus igni decoctum, illitum ex ulceratis pernionibus, & ambustis igni conducit. Dolori auriū instillatus auxiliatur. Candidā vitiliginē linteo antea perfrictā in sole, illita radix emēdat. Semē & flores in vino poti, scolopendræ & scorpionum venenis egregiè aduersantur. Aluum quoque deiciunt.

EX GALENO.

Asphodeli radix vtilis est perinde atq; Ari, Asari & Dracontij. Extergentis siquidem & discutientis facultatis. Vtq; tamen cinis calidior & exciccantior, magis tenuiū partiū, & ad discutiendū potētior efficitur, propterea & alopecias sanat. Inest itaq; ei extenuādi facultas, atque obstruēda demoliendi, veluti etiam Dracontio. Ideoque ipsius cauliculus arquatis tanquam summum præsidium exhibetur.

EX PLINIO.

Defectis corporibus & phthisicis constat bulbos eius cū pitisana decoctos aptissimē mederi, panémq; ex his cum farina subactum saluberrimum esse. Nicauder & contra serpentes & scorpiones, vel caulem vel semen, vel bulbos dedit in vino tribus drachmis: subtrauitq; somno cōtra hos metus. Datur & contra venenata marina, & cōtra scolopēdras terrestres. Folia quoque illinūtur venenatorū vulneribus ex vino. Bulbi neruis articulisq; cū polēta tusi illinūtur. Prodest & concisis ex aceto lichenas fricare. Itē vlceri-

ba.

bus putrescētibus ex aqua imponere. Māmarum quoque & testiu inflātionibus. Decocti in fēce vini, oculorum epithoris supposito linteolo medentur. Folij in quocunque morbo decoctis magis medici vtuntur. Item ad tetra tibiarū vlcera, rimasque corporum quacunque in parte, farina a refectorū. Succus quoque ex tuis expressus, aut decoctus, vtilis fit corporis dolori cum melle. Idem odorem corporis iucundū affectātibus, cum iri arida & sale exiguo. Folia etiam supradictis medentur, & strumis, panis, vlceribus in facie, decocta cū vino. Cinis ē radice alopecias emendat, & rimas pedū. Decoctæ radice in oleo succus, perniones & ambusta. Et ad grauitatē auriū infunditur. A contraria aure in dolore dentium. Prodest & vrinx pota modicē radix, & menstruis, & lateris doloribus. Itē ruptis cōuulsis, tussibus dra chmæ pōdere in vino pota. Eadē & vomitiōes adiuuat cōmanducata. Semine sumpto turbatur vēter. Chrysermus & Parotidas in vino decocta radice curauit. Itē strumas admixta cachry ex vino. Quidā aiunt, si imposita radice pars eius in fumo suspendatur, & quarta die soluatur, vnā cum radice arescere strumā. Sophocles ad podagras vtroque modo, cocta crudāque vsus est. Ad perniones decoctam ex oleo dedit, & suffusus felle in vino, & hydropicis. Venerem quoque cōcitari cū vino & melle perunctis, aut bibentibus tradiderūt. Xenocrates & lichenas & psoras, radice in aceto cocta tolli dicit, Itē si cocta sit cū hyoscyamo & pice liquida, alarū quoque & feminum vitia. Et capillū crispiorē fieri, raso prius capite, si radice ea fricetur, Lapides renū in vino decocta atque pota eximit. Hippocrates semē eius ad impetus lienis dari cēset. Iumētōrū quoque vlcera ac scabiem, radix illita, aut decoctæ succus ad pilum reducit.

APPENDIX.

Animaduertendum facultates à Dioscoride & Galeno commemoratas, Albuco seu Asphodelo mari cōuenire, huius enim radix gustu acris est. Quæ verò à Plinio recensentur, hę partim mari, partim fœminę debentur. Fœminæ, cuius radix & folia glutinosa & amara sunt, vlcera glutinādi scabiē, rimasque corporū, & si quæ similes sunt facultates

conuq

cōueniunt, quas periti methodi simplicium medicamētōrū
facilè discernent. Experiētia etiā quotidiana testatur, hu-
ius vsum esse in vlcēribus malignis salutarem. Quæ autem
uari sint tribuēdæ, ex Dioscoride, Galeno, & gustu quiuis
deprehendere poterit. Nos in transcurso tantū parū at-
tentos monere volumus, ne indiscriminatim & promiscuè
vtrique generi has facultates inesse putarent.

ADNOTATIO.

Asphodelus mas Dioscoridi scriptus, nobis est frequens, folio por-
raceo, radicibus gladium magnarum effigie multis simul agnatis,
porcorum cibum.

De Atraphaxi.

Cap. XLI.

NOMINA.

Aτράφαξις, ἡ χρυσοδάκτυλος Græcis, Attriplex Latinis &
Officinis, Germanis [Molten, oder Milten.] Gallis
Arroche, ou *Bonne dame* nominatur. Atraphaxis Atticis d li-
teram in t mutare frequenter amantibus dicta est, quod
ἀδρως αὔξω, id est, statim in amplitudinem adolescat. Siqui-
dem octavo à satū die profilit, confestimque incremento
proficere videtur. Fidem celeris augmenti facit creptum in
confinio cæteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem
iuxta eam nasci quicquam tradunt, nisi languidum. Chry-
solachanon verò, id est, aureum olus dixerunt, à luteo quē
profert flore.

GENERA.

Duo Atriplicis sunt genera, satiuā seu hortēsis, & sylue-
stris. Satiuā simpliciter Germani [Molten.] Galli *Arroche*
ou *bōne dame*. Syluestrem verò cū adiectiōe aliqua, [V vild
molten, oder Ackermoltē, oder Klein scheifzmiltē] Galli
verò *Arroche sauvage* nominant.

For

FORMA.

*Atriplex Hortensis.**Atriplex Sylvestris.*

Hortensis caulem fundit quadratum, ramis brachiatum quibus primum flores lutei exigui, dein foliatum semen & obductum cortice promitur. Radicem vnam habet in altū descendente, non glabram, sed fibris quibusdam capillatam. Sylvestris tam luxuriosa proceritate prodit, vt quater nos sæpe cubitos excedat: caule vt hortensis anguloso, ramoso, & purpurascente: folio hortensū non admodum dissimili, potissimū quod ad colorem attinet: flore luteo exiguō, semine racematim congesto, radice simplici in altum descendente, ex qua se multæ promunt.

LOCVS.

Hortensis non nisi sata prouenit. Sylvestris sua sponte nascitur. Vtraque autem assiduo humore satiari amat.

TEM

• TEMPVS.

Vtraque Iunio & Iulio mensibus floret, deinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Atriplex humida in secundo ordine, frigida autem in primo. Hortensis tamen sylvestri humidior frigidiorque existit.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Esturolerum modo elixum. Aluum mollit. Crudum vel Coctū illitum panos discutit. Semen eius potum cū aqua malsa morbum regium sanat.

EX GALENO.

Atriplex celeriter, ob lubricitatem, ventrem permeat, Parum autem omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatem. Phlegmonis & phygethliis quidē incipientibus, crescentibus, & mollibus adhuc, ac veluti feruentibus, hortensis: vigentibus verò, declinantibus, & indurescentibus commodior est sylvestris. Semen eius abstergentis est facultatis, proinde ad morbum regium ex iccoris obstructione prognatum vile est.

EX PLINIO

Coquitur difficilimè. Addidere Dionisius & Dioeles, plurimos gigni ex eo morbos, nec nisi mutata sæpius aqua coquendum: stomacho contrarium esse, lentigines & papulas gignere. Hippocrates vulvarum vt ijs id infundi cum Beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendum dedit. Panos, furunculos incipientes, duritias omnes, vel cocto vel crudo illini vtiliter putant. Item ignē sacrum, cum melle, aceto, nitroque. Similiter podagris. Vngues scabros detrahare dicitur sine vlcere. Sunt qui morbo regio dent semen eius cum melle, arterias & tonsillas nitro addito perfricent, aluum moueant, cocto aut per se, aut cum malua, aut lenticula concitantes vomitiones. Sylvestri capillos tingunt. & ad supradicta vtuntur medicina.

EX SIMEONE SETHI.

Ventrem quidem cit, prodest ad caliditatem iccoris, ac icteri

i ſtericis, & calidam temperaturam habentibus ſuccurrit.
Commodiſſima autem bilioſis. Cum malua illita inflam-
mationes ſedat.

ADNOTATIO.

*Atriplex nomen retinet, aljſ Bonne dame & Prende femme
dicitur.*

De Atractilide.

Cap. XLII.


NOMINA.

Aτρακτυλῖς, λευκὸς ἄγριος Græcis: Atractylis, Cnicus
ſylueſter Latinis dicitur. Atractylis autem ideo dicta
quòd ea antiquæ mulieres pro fuſo utebantur: *Ατρακτος* e-
nim fuſus eſt Græcis. Sylueſtris verò Cnicus, quia Cnico vr
bano ſimilis eſt.

GENERA.

Sylueſtris Cnici ſeu Atractylidis, Plinio li. xxj. cap. xv.
& Theophraſto lib. vj. cap. iij. autoribus, duę ſunt ſpecies.
Vna mitior, & Cnico ſatiuo ſimilior. Hanc propriè Græ-
ci Atractylida, Latini verò fuſum agreſtem, aut colum ru-
ſticam, quòd eius caule rigido admodū & exili, veteres mu-
lieres pro colo, vt dictum eſt, utebantur, nominabant. Sūt
qui Cartamum ſylueſtrem appellāt. Germanicè itaque vo-
cetur, [*Vvilder feldſaffran*] Gallicè *Vne eſpece de Chardon*
ayant la ſueille ianne, ou Saffran baſtard, vt hac ratione diſ-
cernatur à Cnico, quem aliqui Cartamū, & Crocum hor-
tenſem nominant. Altera hirsutior, caules & folia Sonchio
non aſperæ ſimilia habens, quæ Officinis omnibus & vul-
go Carduus benediſtus nuncupatur. Germanicè [*Cardo-*
benediſt. Bornvrtz, oder Geſegneteter diſtel] vocatur Gal-
licè autem *Saffran ſaunage houſſu, ou chardon beniſt*.

For

*Atractylis vulgaris.**Atractylis hirsutior.*

Spina est Cnico similis, in summo autem virgularum folia multò lōgiora habens, caulem magna ex parte nudum, asperūque, quo etiam mulieres pro fuso vtuntur. Capitula in cacumine aculeata, florem pallidū, radicē tenuem, inutilem. Ex qua sanè descriptiōe omnibus perspicuum esse putamus spinam quam pictā exhibemus esse Atractylida, quod Cnico satiuo similis admodum sit, & in cacumine virgularum folia quā Cnicus longiora habeat, caulem denique magna ex parte nudum, autumnī potissimū tempore, quo folia sua sponte decidunt, & minimè læuem, sed asperum striatūque obtineat. Idē etiam rigidus & exilis est, vt fusi vsum præbere queat. Summitati quoque eius capitula incident spinosa, flos illi pallidus, radix tennis: & in sum

ma,

ma, nulla est nota quæ huic nō respondeat. Carduū autē benedictum vulgò nominatum esse alteram Atractylidis specie, ex Theophrasti & Plinij verbis ostendi potest: hirsutus enim est, caulibus Soncheis, humi serè reptantibus: propter suū enim mollitiem veluti sessilis caducūsq; solo procūbit, semine minuto, frequēti, amaro, & pilis barbato, quod molli lanugine operitur. Flos ei pallidus luteūve.

LOCVS.

Mitior Atractylis in aruis & montibus, hirsutior autem in hortis iam passim prouenit.

TEMPVS.

Prior Augusto mense apparet, eius tamē semen ante autumnum non maturefcit. Posterier citius nascitur, eius tamen semen serò etiam ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Gustu cum amaræ sint spinæ hæ, euidentissimum est calido & sicco temperamento esse præditas: id quod ex eandem etiam facultatibus colligi potest.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Atractylidis folia, coma & semen trita cum pipere vinò, que pota, contra scorpionum ictus prosunt, Sunt qui dicāt à scorpionibus percussos, quandiu teneāt eam herbam, nō sentire dolorem: depōita verò, dolore affici.

EXGALENO.

Atractylis aut Cnicus syluestris. Hæc planta ex spinarū est genere. Facultatem habet desiccandi, & modicè digerendi.

APPENDIX.

Prima spina in sanandis vlceribus & fistulis diuturnis efficacissima est. Altera, quā Carduū benedictū vocant, obstructiones internorum viscerum tollit, vrinā mouet, calculum frangit, vlcera, potissimū pulmonis, sanat. Percussis à feris venenatis medetur. Negant etiam pestis experiri contagia, qui aut cū cibo, vel potu præsumpserit: Iam quoque correptis magno fore remedio sibi vulgus persuasit. Ex quibus etiam omnibus fit perspicuum, easdem quas veteres Atractyli tribuerunt, vtranque spinam habere facul-

tates. Item herbam quam Carduum benedictum vocant, contra serpentum & scorpionum morsus valere omnibus in confesso est: quam sanè facultatem cum Atractyli etiam assignet Dioscorides, consequitur ab eadem diuersam nō esse. Recentiores carduum benedictum contra capitis vehementissimos dolores, vertiginem memoriam amissam, in cibo aut potu sumptum valere tradunt. Item ad putrescentia vlcera, mammarum potissimum, si in puluerem redactus inspergatur.

ADNOTATIO.

Atractylis mitior frequens in vjs, flore Cnici, sed pallidior. Atractylis hirsutior carduus benedictus, nobis hodie duplex.

De Angelica. Cap. XLIII.

NOMINA.

NVNQV ID veteribus cognita fuerit hæc herba, & quo nomine appellata sit, nōdum scire licuit, Neque enim Smyrniō est, quod scilicet vmbellam Anethi & semē rotundum, aliāq; multa quę descriptio requirit, nō habeat. Silphion etiam esse haud poterit: quod folia Apij habere minimè deprehendatur. Recentiores autem vno ore omnes Angelicam, & Sancti spiritus radicem, à suauissimo eius radice odore, quem spirat, aut ab immensa contra venena facultate, appellant. Germanis [Angelick, oder des Heiligen geysts vvurtz: oder Brustvvurtz] Gallicè *Angelique* vocatur.

GENERA.

Duo eius herbæ inueniuntur genera. Vna enim mitior est, cuius quidem radix valde odorata, à Germanis [Zam Angelick] nominatur, à Gallis aut *Angelique* dicitur. Altera sylvestris, eius radix suauis odore destituitur, & à Germanis [Vilde Angelick,] nominatur à Gallis aut *Angelique sauvage*, & vulgo Astrensia.

For

*Angelica sativa**Angelica sylvestris.*

Caulem profert duum cubitorum, concauum: folia oblōga, per ambitum serrata, subnigra: flores in purpura candidos, semen latum, foliaceum, radicem crassam & multam, foris nigricantem, intus candidam.

LOCVS.

Mitior in hortis plantata prouenit, & in montosis etiā nonnullis locis, perinde atque sylvestris.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefacientem & desiccatoriam vim in tertio ordine ei assignant herbarij recentiores.

VIREs.

Aperit, extenuat, discutit, vt recentiores perhibent. Vni

i ij cē

Et veneniis aduersatur. Pestilentiae popularim sequentis ar-
cet contagia. Corpora à lue pestifera vindicat, si tantum, vt
affirmant, in ore teneatur. Per hyemem ciccris magnitudi-
nem cum vino, per æstatem ex stillatitio rosarum liquore
sumpsisse satis est. Nec sensurum eo die contagionem polli-
centur, quo quis deuorarit: nam vrina & sudore venenum
abigit. Lentitiam pituitæ digerit, quapropter tussi quā fri-
gus attulerit, medetur. Crassa quæ in thorace coierint, dis-
cutit. Herba ipsa in vino et aqua cocta, vulnera interna glu-
tinat, concretum sanguinem resoluit, stomachum esu cor-
roborat, cor recreat, pituitam ventriculi deijcit, fastidia ci-
borum discutit, & elanguescentem innitat appetentiā. Ra-
biosi canis morfu, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum
ruta & melle folia indantur, dein cocta in vino bibantur.
Libidinem extinguit ore ieiuno sumpta. Lasitudines resi-
cit, thoracem expurgat. Supra febricitatis caput imposita,
fertur ad se feruorem elicere. Valere contra fascinationes
adfirmant, si quis eam secum gestarit.

ADNOTATIO.

Angelica sativa Parisijs frequens, syluestris desideratur.

De Aera. Cap. XLIIII.

NOMINA.

A *Ἰρα, ἢ θύα, ἢ ῥιζάνιον* Græcis: Lolium Latinis dicitur.
Officinæ nonnullæ, non sine magno errore, pro Mc-
lanthio seu Nigella vtuntur, vt non temerè etiam Pseudo
melanthion dici queat. Germanis [Katten, oder Korn-
egle.] *Yvr. ie, ou Nielle, Gasse,* appellatur.

FORMA.

Folio cõstat angusto, Theophrasto lib. viij. de Plantarũ
historia, cap. vij. teste, pingui & piloso, flore subpurpureo,
semine exili in siliqua hispida, vel vt Plinius ait, in cortice
aculeato. Ex qua siquidem descriptione satis perspicuũ fit
omnibus Pseudomelanthion hoc esse Lolium: Folia nãque
Porri habet, oblonga, hirsuta, florem purpureum, semen in
pilosa

*Lolium.*

pilosa, longa, angulata, ac per interualla striata siliqua. Et vt paucis singula complectar, hordeo, cuius vt reliquatum frugum pestis & vitium est, tota effigie non dissimile est.

LOCVS.

Non solum in triticea & hordeacea, sed in omni ferè alia segete p se prouenit. Frugum acerba pestis, ideoque à Vergilio infœlix appellatum.

TEMPVS.

Iunio mense floret, &

subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat & calfacit efficaciter, vt propinquū sit acribus magis quàm Iris: sed non est perinde vt illa tenuium partium, verum multum abest. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in principio tertij ordinis excalescencium, in fine verò secundi exiccantium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Lolium molitum nomas, putredines, & gangrenas cum raphanis & sale illitum compescit. Feras impetigines, & lepras cum sulphure viuo & aceto sanat. Strumas quoque cū fimo columbino, & lini semine in vino decoctum, discutit. Quæ ægrè maturantur rumpit. Decoctum ex aqua mulsa & illitum, ischiadicis prodest: cum polëta, aut myrrha, aut croco, aut thure suffitum, conceptiones adiuuat.

EX PLINIO.

Lolium molitum ex aceto coctum impositumq; sanat impetigines, celerius quo sæpius mutatum est. Medetur & podagris, aliisq; doloribus cum oximelite, Curatio hæc à cæteris differt. Aceti sextario vno dilui mellis vncias duas iustum est: ita tēperatis sextariis tribus, decocta farina Lolii sextariis duobus vsque ad crassitudinē, calidumq; ipsum imponi dolentibus mēbris. Eadem farina extrahit ossa fracta. Magis etiam cæteris purgat vlcera vetera, & gāgrænas. Cum raphano & sale & aceto lichenas. Lepras cū sulphure viuo. Et capitis dolores cum adipe anserino imposita fronti. Strumas & panos concoquit cum fimo columbino, & lini semi ne decocta in vino.

APPENDIX.

Iam commemoratas facultates huic etiam herbæ, quam Germani Ratten nominant, recentiores tribuūt. Mirificè enim hanc in sanandis impetiginibus, aliisq; scabiei generibus commendant. Item invulneribus glutinandis, ac fistulis curandis, compescendoq; sanguine, eius esse vsum tradunt, vt hinc etiam liqueat hanc ipsam à Lolio non esse diuersam.

EX SIMEONE SETHI.

Vim æqualem Iridi obrinet.

ADNOTATIO.

Lolium tuum est Githago & Nigella vulgaris alijs, lutea gallicis dicta.

De Asclepiade. Cap. XLV.

NOMINA.

Aσκληπιάς Græcis, Asclepias Latinis, herbariis Hirundinaria, Officinis Vincetoxicum, Germanis [Schußbenvertz] Gallis autem *Domte venin*. appellatur. Asclepias autem ab Aesculapio antiquo medicinæ autore nominata est. Hirundinaria verò à siliquis quas producit, quæ dehiscen

dehiscentes plumosum semen ostendunt, atque adeò hirū-
dinis effigiem referunt. Vincetoxicū, vel rectius *Vincetoxicū*,
haud dubiè dicta est, quòd illi insignis aduersus venena
vis sit, vt paulò post fusius docebimus.

FORMA.



Asclepias vel vince toxicum

Ramulos profert lon-
gos, in quibus folia lon-
ga Hederæ similia. Ra-
dices numerosas, tenues
odoratas. Flores graui-
ter olentes. Semen Secu-
ridæ seu Hedyari.

Ex qua delineatione ne-
mini nō perspicuum sit,
Vincetoxicū appellatā
herbam, esse Asclepiada.
Fruticosa siquidem her-
ba est, caulem obtinens
rotundum, leuem, te-
nuem, ac ferè iunceum,
ramulis longis, folio
hederaceo, sed oblongi-
ori in viridi nigrante,
floribus exiguis, caudi-
dis, aut verius in albo
palescentibus, graui-

ter odoratis, ex quibus siliquæ oblongæ fiunt, quæ dehi-
scentes semen plumosum Securigæ simili, hoc est rufum
& latum ostendunt: radicibus multis, exiguis, tenuibus,
& odoratis, adeò vt nulla sit prorsus nota quæ illi non
respondeat aptissimè. His accedunt locus natalis & facul-
tates, quæ singula cum Asclepiade illi communia sunt,
quemadmodum ex ijs quæ statim subiiciemus manifestis-
simum fiet.

LOCVS.

Prouenit in mōtibus asperis, altis, ac arenosis. Copiosissi-

i iiii mē au

mè autem nascitur in monte haud procul à Tubingua sito in quo olim arx posita fuisse fertur.

TEMPVS.

Angusto mense floribus abundat, ac subinde semina in folliculis oblongis, formam hirundinis cùm dehiscunt referentibus, profert.

TEMPERAMENTVM.

Aselepias, Paulo teste, calida, sicca, & tenuis substantiæ est. Quo sanè temperamento Hirundinaria etiam prædicta existit: amara siquidem & parū glutinosa eius est radix, folia verò aliquam præ se ferunt adstrictionem: vt iterum euidenter appareat Hirundinariam esse Aselepidas.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radices cum vino potæ, torminibus, & venenatorum moribus subueniunt. Folia verò illita, maleficis in māmīs, & vtero vitij, opitulantur.

EX PAVLO.

Torminibus in vino pota competit. Illita verò venenatorū mēsis, & malignis māmārū & vteri vitij succurrit.

EX PLINIO.

Radices torminibus medentur, & contra serpentium iectus non solum pota, sed etiam illita profunt.

APPENDIX.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mēsum pro uocationem vtuntur, & ad rabidi canis morsum, venenisque potenter resistere affirmant: vnde etiam haud temerè Victrix toxici ab iisdem appellata est. Hypodropicis etiam radicem in vino maceratam, & subinde coctam, mirificè auxilian tradunt. Flores præterea foliæque siccata, mox trita, vulneribus vtiliter inspergi aunt, Sordida etiam vlcera purgare, & ad cicatricem perducere, genitaliūque vitij & rupturis egregiè mederi docent. Quæ in vniuersum omnes facultates cū ijs, quas Aselepias obtinet, pulchrè quadrant: vt eandem esse Hirundinariam vocatam herbā nullus deinceps dubitare debeat.

ADNOTATIO.

Aselepias in Syluis frequens.

De Apio. Cap. XLVI.

NOMINA.

Aπιος ἡ ἰσχυρὴ χαμαὶ βλάπτει Græcis: Apios, Rhabanus sylvestris Latinis dicitur. Officinis incognita. Germanis [Erdnusz, Erckelen., Erdfeigen & Erdmandel,] Gallicè *Rane*, Rayfors, ou *Chube saunage*. appellatur. Apion verò dixerunt Græci, quòd radicis extremum in pyri formam turbinatur. Eadem etià ratione ischas & chamæbalanos ab iisdem nominata est, quod in ficus, vel glandis effigiem radicis extremum turbinetur. Quapropter non ineptè Latinis etià glans aut ficus, seu carica sylvestris nominabitur.

FORMA.

Ramulos duos aut tres unceos, tenues, rubentesque profert, qui supra terram parum se attollunt. Folia rutæ similia, longiora tamen & virentia. Semen exiguum. Radicem Asphodelo similem, & ad pyri figuram accedentem, rotundiorē tamen, & liquore plenam, intus calidam, foris nigro cortice tectam. Hæc Dioscorides. Alij adijciunt Apion habere tenues capeculos, florem Piso nō dissimilem, sed longè minorem. Quæ singula satis declarant herbam, cuius



Apios, Raphanus sylvestris.

ius picturam exhibemus, esse Apion: ramulos enim magna

gna ex parte duos, vel ternos, imò vt Theophrastus ait: quaternos, & interdum plures emittit, iunceos tenuésque & infima parte rubentes, qui supra terram parum se extollunt. Folia quoque Rutæ habet, at longiora & virentia: Semen etiam exiguum. Radicem denique Asphodelo mari si milem, & ad pyri effigiem accedentem: quod tamen, nõ de tota radice, quæ longissima est & tenuis, intelligendum venit, sed de extremis eiusdem, hoc est, nucibus seu glandibus ab ea dependentibus, pyri aut ficus formam habentibus, qualibus etiam Pœniæ radix formine assimilatur. Succosa quoque radix est, intusque candida. Quibus omnibus accedunt flores Piso similes, & mirificè odorati, minores tamen non capreoli tenues. Conueniunt etiam vires, vt ex sequentibus patebit, ita vt prorsus nulla sit nota quæ reclamare videatur.

LOCVS.

Prouenit in frumentaceis agris hordeaceis potissimum, tritici & zææ, quos interdum sues ductæ cupiditate eius radices, seu rectius nucum ex radice dependentium, prorsus euertunt. Atque hinc est quod panis porcinus à quibusdam nominetur.

TEMPVS.

Floribus abundat odoratis admodum Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Apios temperatura calida est, sicca mediocriter, id quod ex gustu faciliè deprehenditur.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Pars radices superior sumpta, vomitione bilem pituitamque extrahit. Inferior per aluum. Tota verò vtrinque purgationes mouet. Succus eius sesquioboli pondere haustus, vtraque parte, hoc est, supra & infra purgat. Cum verò liquorem colligere volueris, tundito radices: coniectisque in craterem aqua plenum misceto, tum penna collectum qui supernabit liquorem siccato.

EX PLINIO.

Succus purgat vtraque parte sesquiobolo in aqua mulsa. Sic & hydropicis datur acerabuli mensura.

APEN

APPENDIX.

Experientia testatur nuces has nauscam atque adeò vomitionem ciere, si quis illis vescatur.

Da Aslere Attico. Cap. XLVII.

NOMINA.

Aστὴρ ἄττικος, βουβώνιον Græcis: Aster Atticus, Inguinalis Latinis dicitur. Officinis ignota herba. Germanis [Sternkraut.] Gallicè *Petit Muguet ou Herbe de l'estoille*. commodè appellari potest, Asteris autem nomen, non à foliorum in caulibus, sed floribus potius figura & situ, accipit. Siquidem foliorum in huius herbæ flore numerus & forma, stellam præ se ferunt, vel, ut Plinius ait, capitula per ambitum diuisa folijs pusillis, stellæ modo radiata sunt. Errant itaque qui singula folia in caulibus stellæ formam representare putant. Bubonium & Inguinalis, quòd inguinum præsentaneum sit remedium, dicta est.

FORMA.

Cauliculus lignosus purpureū & luteum in summo florem habens, veluti Chamæmeli capitulum vndique per orbem incisuris diuisum, foliolis stellæ similibus. Quæ verò circa caulem sunt folia oblonga & densa hirsutave. Ex quibus

*Aster Atticus.*

quidem delineatione omnibus perspicuum sit, herbam cuius picturam exhibemus esse *Astera Atticum*. Nam caulibus eius lignosus est, folijs vestitus oblongis & densis, in cacumine flos illi purpureus & luteus, stellę modo radiatus, qui subinde in pappos abit: radix fibris multis capillata.

LOCVS.

Nascitur in collibus, montibus altis, & syluis.

TEMPVS.

Augusto mense vt plurimum floret, durantque in magnam Autumnii partem eius flores.

TEMPERAMENTVM.

Mixta est potentia, vti rosa: refrigerat enim, nō tamen vehementer, & digerit atque exciccatur, quod scilicet illi amara insit qualitas.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Aestuantī stomacho illita confert. Succurrit etiam oculorū inflammationibus, bubonibus, & procidēti sedi. Tradunt partem in flore purpuream, si bibatur ex aqua, angina correptis, & puerorū comitialibus opitulari. Recens, in guinum inflammationibus illita, prodest. Sicca, sinistra manu dolentis decerpta, inguini ad alligata doloribus liberat.

EXGALENO.

Non tantū illitum, sed etiam suspensum bubonas sanare creditur. Habet verò quiddam etiā digerens, vt mista sit facultatis, verū id non astringit.

EXPLINIO.

Bibitur aduersus serpentes. Sed ad inguinum medicinā sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cinctus alligari. Prodest & cōcudicis dolori adalligata.

ADNOTATIO.

Aster atticus tuus hic non cognitus.

De Agrosti. Cap. XLVIII.

NOMINA.

Agrostis Græcis, Gramen latinis, Germanis [Grafs.] Gallicè *Dens de chien* appellatur. Gramen verò dictū est, quod geniculatis internodijs mirificè serpat, à gradiendo,

do, vel à gignendi fœcunditate: siquidem crebrò ab ijs no-
uas spargit radices.

FORMA.

*Gramen.*

Geniculatis per ter-
ram serpit ramulis, & ab
ijs dulces geniculatasque
radices spargit. Folia
eius acuminata, dura, &
vt paruè arundinis lata-
quæ iumenta, bonesque
pascunt. Ex quibus ver-
bis planum fit omnibus,
plantam hanc cuius pi-
cturam damus, esse veri
graminis genus: genicu-
latis enim ramulis per
terrani serpit, & ab ijs
dulces, geniculatas, &
exiguas admodum ac te-
nues radices spargit. E-
dodrantalibus etiam ra-
mulis circa vnumquen-
que geniculum bina fo-
lia acuminata, dura, ac lata emittit. Floribus deniq; ad gra-
men Parnasi accedere videtur, candidi enim sunt, & quinis
distincti folijs, & his ipsis dissectis: quibus decidentibus fol-
liculi rotundi lini instar, semine pleni exiguo, vt Parnasi
gramen, prodeunt, Adco vt nemo sit qui non videat illi
per omnia graminis respondere notas. Quare reprehensio
ne digni sunt, qui Euphrasiam esse putant.

LOCVS.

Passim nascitur in vmbrosis locis, & dumetis.

TEMPVS.

In fine ferè Aprilis floribus suis candidis & elegantibus
ornatur.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Radix graminis mediocriter frigida & sicca est, mordacitatem quandam exiguam, & partium tenuitatem obri-nens. Herba verò ipsa in primo quidem excessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate moderata. Semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso verò desiccatorium, & tenuium partium & subacervum.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Graminis radix trita & illita vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, & vrinx difficultatibus. Calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit.

EX GALENO.

Radix cruenta vlcera glutinat. Cæterum mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen frangere lapides assolet si quis ipsam decoquens bibat. Semen autem alterius quidem imbecillum est, eius verò quod in Parnaso nascitur, vrinam ciet, & fluxus ventris & stomachi resiccat.

EX PAVLO.

Gramen Parnasi maximè vtile est, siccatur, modicè refrigerat, tenuium partium, & subacervum: eoque vulnera cruenta glutinat, & decoctum eius vesicæ calculos confringit.

EX PLINIO.


Decoctum gramen vulnera conglutinat, quod & ipsa herba tusa præstat, tueturque & ab inflammationibus, placat. Decocto adjicitur vinum ac mel, ab aliquibus & thuris, & piperis, & myrrhæ tertiæ portiones. Rursusque coquitur in æreo vase ad dentium dolores & epiphoras. Radix decocta in vino, torminibus medetur, & vrinx difficultatibus, vlceribusque vesicæ. Calculos frangit. Semen vehementius vrinā impellit. Aluum vomitionesque sistit. Priuatim autem draconum moribus auxiliatur. Sunt qui genicula nouem vel vnius, vel è duabus tribusve herbis, ad hunc articulorum numerum inuolui lana succida nigra iubeant, ad remedia strumæ panorūmve. Ieiunium debere esse qui colla

colligat. Ita ire in domum absentis cui medeatur, superuenientique ter dicere. Ieiuno ieiunum medicamentum dare, atque ita alligare, triduoque id facere. Quod è graminum genere septem internodia habet, efficacissimè capiti contra dolores adaligatur. Quidam propter vesicæ cruciatus decoctum ex vino gramen ad dimidias è balneis bibi iubent.

De Aloe. Cap. XLIX.

NOMINA.

Aloe Græcis, Aloe Latinis appellatur. Officinæ veterem appellationem retinuerunt, Germani destituti peculiari nomenclatura, pariter latinis Aloen vocant. Sunt qui hanc à crassis folijs, & similitudine quam cum Semperuiuo habet, Semperuiuum marinum nominent. Gallicè Perroquet.



Aloe.

FORMA.

Scyllæ folium habet Aloe, crassum, pingue, modicè latum rotundum, repandumque. Folia vtrinque gerunt ex obliquis aculeos ramos, & breues. Caulem profert Antherico similem, florem album, semen Asphodelo simile. Graui est tota herba odore, & gustu amarissima Radice vna, pali in terram adacti specie. Nostra pictura non nisi radicè & folia ob oculos ponit, reliqua hoc tempore habere non potui

tuimus. Dabimus autē operā, modò Deo sic visū fuerit, vs aliquādo integræ plantæ picturā studiosis exhibere liceat.

LOCVS.

Nascitur copiosissima in India præpinguisque, vnde succus quoque defertur. Prouenit etiam in Arabia, Asiaque, & in maritimis aliquot locis & insulis, vt in Andro. Nunc in aliquot hortis Germaniæ nostræ plantatur.

TEMPVS.

Neque florem neque semen in stirpe nobis videre contingit, quare de ijs quo nimirum proueniunt tempore, nihil certi monstrare possumus.

TEMPERAMENTVM.

Aloe calefacientium est primi ordinis intensi, aut secundi remissi, tertij autem exiccantium.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Duo sunt succi concreti genera. Vnum arenosum, quod sedimentum purissimæ Aloes videtur: hoc officinis Caballinum vocatur. Alterum iccinoris modo coactum, Succotrinum barbari appellant. Eligito purā quæ nihil doli sensit, sine calculis, splendentem, subruffam, friabilem, iccinoris modo concretam, faciliè liquefcentem, eximie amaritudinis. Reprobato autem nigram, & fractu cõtumacem. Est aloë vis adstringere, somnum conciliare, exiccare, corpora densare, aluum soluere, & stomachũ purgare. Poudere colearium duorũ in aqua frigida, aut tepida pota, sanguinis excreationes sistit. Regium morbum purgat tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pōdere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut cocto melle excepta, aluum soluit. Trium drachmarum pōdere perfecte purgat: Mixta alijs purgatorijs medicamentis, stomacho minus noxia ea reddit. Siccata & inspersa, vulnera glutinat, & vlcera ad cicatricem perducit, cōpescitque. Priuatim autem exulceratis genitalibus medetur, & rupta infantium præputia agglutinat. Condilomata, rimasque sedis cū passo mixta sanat. Sanguinis eruptiones ex hæmorrhoidibus factas compescit. Digitorum reduuias ad cicatricem perducit. Lioures & sugillata cum melle delet. Palpebrarum scabries, angulo

angulorūque pruriges lenit. Dolorem capitis sedat tēporibus & fronti ex aceto cū rosaceo inuncta. Capillos fluentes cum vino compescit. Tonfillis, gingiuis, & omuibz oris vlceribus, ex melle & vino prodest. Torretur oculorū medicamentis in testa pura & candente, rudiculāque subinde versatur donec æqualiter torreatur. Lauatur vt quod est arenosissimum subsidat, tanquam inutile, & leue & pinguisissimum assumatur.

EX GALENO.

Hæc herba non admodum apud nos prouenit: & quæ in magna nascitur Syria aquosior est. & facultatis imbecillioris: attamen vsque adeò desiccare potest, vt vulnera conglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cœlesyria et Arabia multò est melior. Optima verò Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentum cognominatum Aloe, ad plurimas res propter siccitatem mordicationis expertem vtile. Est autem non simplicis naturæ, sed vt iudicio est gustus, adstringit simul & amara est. Adstringit quidem mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit & ventrem, vtputa ex numero medicamentorum quæ Græci ab excernendo stercore vocant *ἰκνοσπρωτικά*. Verum & ipsius facultatis misturam attestantur particularia eius opera: nam & gratum stomacho est medicamen, vt si quid aliud, & sinus glutinat. Sanat & vlcera quæ egrè ad cicatricem duci possunt, & maximè quæ in ano sunt & pudendo. Iuuat etiā eorum inflammationes aqua liquata, & vulnera ad eundem modum glutinat. Congruit similiter vnti & ad inflammationes in ore, naribus, & oculis. In summa repellere & discutere simul potest, cum hoc vt paulūm extergeat, quantum videlicet vlcibus puris non sit molestum.

EX PLINIO.

Natura Aloes spissare, densare, & leuiter calfacere. Vsus in multis & principalis, aluū soluere, cum penè sit sola medicamentorum quæ per se id præstant. Confirmat etiā stomachum adeò vt non infestet vlla vis contraria. Bibitur drachma. Ad stomachi verò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ vel frigidæ, cochlearis mensura, bis tēre

in die ex interuallis, vt res exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea sumatur, eibus. Capillum fluentem continet cum vino austero, capite in sole contra capillum peruncto. Dolorem capitis sedat teporibus & fronti imposita, ex aceto & rosaceo. Dilutior que infusa, oculorum vitia omnia sanari ea conuenit Priuatim prurigines, & scabiem genarum, item insignita ac liuida illita cum melle, maxime Pōrico: tonsillas, gingiuas, & omnia oris vlcera. Sauguinis excreationes, si modicæ sint, drachmæ pondere ex aqua, si minus, ex aceto pota. Vulnerrum quoque sanguinem, & vndecunque fluentem sistit per se, vel ex aceto. Alias etiā est vulneribus vtilissima, ad cicatricem perducens. Eadem inspergitur exulceratis genitalibus, virorum condylomatis, rimisq; sedis, aliās ex vino, aliās ex passo, aliās sicca per se, vt exigit mitiganda curatio, aut coercenda. Hemorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit. Dysenterix infunditur. Et si difficilius concoquatur cibi, bibitur à cœna modico interuallo. Et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur pillulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina, ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatut vt quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa, pennaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torreri.

ADNOTATIO.

Aloe in domibus frequens. Perroquet vulgo dicitur, quod foliorum habitu & colore pistacum viridem referat.

De Bechio. Cap. L.

NOMINA.

B ^{ῥατορ} Græcis, Latinis Tussilago aut Farsaria dicitur. Sic vocata quod ῥατορ, hoc est, tusses iunare credita sit. Herbariis & officinis hodie Vngula caballina appellatur. Germanis. [Roszhub, oder Brandtlattich.] quod scilicet equinæ vngulæ persimilis sit, & ambustis medeatur. [Gal-

licè

licè *Pas d'asne, ou herba des pattes.*

FORMA.



Tuſſilago.

Folia hederæ habet, sed maiora, sex aut ſeptem à radice prodeuntia, ſupernè virentia, inferiore autem ſui parte albida, plures angulos habentia, Caulem palmum altum. Florem vere prodeuntem pallidū; quem vnà cum caule cōfeſtim abijcit. Inde nōnulli exiſtimauerūt ſine caule hanc herbam naſci. Radix illi tenuis eſt, quæ minimè inutilis eſſe poteſt, quandoquidem illius, vt ex ſequentibus patebit, in rūpendis thoracis abſceſſibus, & eijciendo ex vtero emortuo ſœtu vſus ſit. Subeſſe itaque errorē in Dioſ-

coride maniſeſtiſſimum eſt, vbi radicem Tuſſilaginis *Agropyron* eſſe inquit, quem tamen nemo interpretum, quod ſciam animaduertit. Hoc etiam adijciendum duxi pro confirmanda Dioſcoridis deſcriptione, & confutanda erronea quorūdam ſentētia, flores Tuſſilaginis eſſe fugaciſſimos, iſque enim enatis breui vigor vitæque durat, longiſſimæque mora triduum aut quatrimum, poſt quod illico tempus flacceſcentes in pappos euaneſcunt, & caduēi marcent, ita vt non niſi vere ſcēle ſorte fortuna terant obuiam, quo potiſſimū tempore flos & caulis ſine folijs videntur. Quapropter qui herbam ipſam hoc tempore non conſpexerūt, & tam ſubitam

floris & caulis iacturam haud animaduverterunt, sine vtrisque nasci crediderunt. Nos tamen & florem & caulem sæpius oculis contemplati sumus, ideóque vt vtriusque pictura accederet diligenter curauimus.

LOCVS.

Nascitur prope fontes, & in aquosis locis.

TEMPVS.

Flores vere, & in Aprili colliguntur: ab hoc enim tempore vt paulò ante diximus, nusquam apparent. Folia & radix tota æstate durant.

TEMPERAMENTVM.

Folia Tussilaginis virentia aqueæ substantiæ admistionem habent, vt hac ratione frigida & humida dici possint. Sicca vero acriora sunt, ideóque calida.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Tussilaginis folia trita, cum melle illita, ignibus sacris & inflammationibus cunctis medentur. Eadem sicca incensa eos qui sicca tussi & orthopnoea infestantur, quum fumum per infundibulū hianti suscipiunt ore, sanāt. Abscessus thoracis rumpunt. Eadē radix suffita potest, scærumque emortuum in aqua mulsa cocta & pota eijcit.

EX GALENO.

Bechium ideo nuncupatum est quòd βήχας id est, tussis & orthopnoeas iuuare creditum sit, si quis videlicet folia arida aut radicem in prunis accédens, ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, vt sine molestia noxæ omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia viridia partes cruda inflammatione obsessas illitu extrinsecus adiuuant, propter aqueæ humiditatis admistionem, qua omnia virentia tenera, alia plus, alia minùs participant. Nam sicca Bechij folia aciora sunt, quàm vt inflammatione laborantibus partibus cōtineant.

EX PLINIO.

Tussilaginis aridæ cū radice fumus per arundinem haustus aut deuoratus, veterem sanare dicitur tussim: sed & in singulos haustus passum gustandum est.

Adno

ADNOTATIO.

Tusilago vngula cabalina & passus asini vulgò dicitur.

De Buglosso. Cap. LI.

NOMINA.

Bοβλῶσος Græcis Buglossum, Bubula lingua, Bouis lingua Latinis, quòd scilicet eius folia bubulæ linguæ similia sint: Officinis & herbarijs Borrage, Germanis [Bur retsch] Gallicè *Bourrache*, ou *Bourroche* dicitur. Alia verò herba est quæ hodie Buglossa vulgò nominatur, *Buglosse* vò suo loco indicabimus.

FORMA.



Buglossum sine Borrage.

Buglossum Verbasco simile est, folium habens in terram depressum, asperum, nigrius, bubulæ linguæ nò dissimile. Florem cæruleum, speciosum. Quæ nimirum descriptio ita hodie vocatq; Borragini herbæ quadrat, vt nemo non (nisi talpa cecior sit) veterum esse Buglossum videat. Qui tamen eius rei plura argumenta desiderat, ea quæ libro primo, cap. xxxiij. nostrorum Paradoxorum produximus, egat, & nihil puto deinceps dubitabit.

LOCVS.

Nascitur in planis & sabulosis locis. Passim etiam hodie in hortis seritur, ob id olitoribus optimè cognitum.

TEMPVS.

Carpitur Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Buglossum calidi humidique temperamenti est.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Foliū Buglosi in vinū deiectum animi lætitiā efficere creditur. Aiunt quæ tres caules emittat si cum radicibus & semine tota teratur, & in potu detur, contra tertianos rigores prodesse: ad quartanos verò quæ quatuor. Horum autem decoctio in vino fiat. Herbam abscessibus etiam vtilem esse ferunt.

EXGALENO.

Buglossum vinis iniectū lætitiæ & hilaritatis causa esse creditum est. Sed & iis qui ob faucium asperitatem tussiu in melicrato coctum conuenit.

EXPLINIO.

Buglossio præcipuū quod in vinū deiecta animi voluptates augeat, & vocatur Euphrosynū. Buglossio inarescente, si quis medullam de caule eximat, dicatq; ad quem liberandū febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt à febre liberari.

EXSIMEONESETHI.

Buglossum vrinam cit, & si tim sedat. Caules eius cocti & crudi comesti iccinoris affectibus prosunt. A viatoribus ex eo conficitur zulapin, & est vtile.

ADNOTATIO.

Buglossum Borrage.

De Buphthalmo. Cap. LII.

NOMINA.

Bούφαλμος Græcè, Buphthalmū Latine, Hodie oculus bouis aut vaccae & cotula non foetida herbariis voca-

tur: Germanis [Rinsaug, oder Koucaug] Gallis *Oeil de Bœuf* pisse en l'œt, ou Camomille sauvage. Bupthalmum autem, non alia ratione dixerunt veteres, quam quod eius flores oculi imitentur formā, & Boum potissimum oculis similes sint. Germanicè etiā [Kouedill,] hoc est vaccinum anethū dicitur, quod scilicet verum Anethum eius folia referre videantur.

FORMA.

*Bupthalmum.*

Bupthalmū caulem tenerum emittit, folia fœniculo similia, flores luteos Anthemide maiores, oculorum figura, unde & nomen traxit. Hæ siquidem notæ adamus sim conueniunt herbæ quam vulgus herbariorum Cotulam non fœtidam vocant: caules siquidem eius teneri, folia fœniculo similia. Nec te moueat quod à Dioscoride Bupthalmo lutei flores tribuuntur, Cotulæ autem non fœtidæ albi sint: ad discū enim mediū ve Dioscorides respexit, quod luteum

est, non ad ambitū, in quo folia radiata cādida, vt in Chamælo, existunt. Quod dicimus, confirmāt quæ Galenus lib. vj. de simp. medic. facult. in hūc modū scribit. Bupthalmi, inquit, flores colore Anthemidis floribus similimi sūt, sed multo maiores. Serapion quoq; florem eius magis luteū flore Chamæmeli esse ait. Si itaque Anthemidis floribus si-

k iiii mil

De Bellide. Cap. LIII.

NOMINA.

Bellis neque à Dioscoride, neque à Galeno, nec alijs etiam Græcis, quod sciam, descripta est, ideóque Græco nomine destituitur. Lâtinam itaque duntaxat appellatione habet, & Bellis siue Bellius, autore Plinio, nominatur.

GENERA.

Duorum est generum, maioris & minoris discrimine insignis. Minor Bellis est ea quam officinæ Cōsolidam minorem appellant. Hæc iterum duum est generum. Quædam enim hortensis & domestica est Bellis, hanc Germani [Mossbleumle, oder rote bleumle] Gallicè *Marguerites de Jardin* ou *Cōsire petite* nominât. Altera sylvestris, quam vulgus

herbariorum Primulam veris, quod scilicet vere inchoante mox erūpat, Germani autem [Mossbleumle & Kleinzeitlosze] Gallicè *Consire petite sauvage*, ou *Pasquettes* nuncupant. Minorem officinæ nonnullæ Consolidam mediam quod credatur vulnera conglutinare Germani [Geusblonū] vocât, Nos aliam Consolidam mediam intra describemus.



Bellis minor hortensis.

FORMA.

Minor hortensis, sylvestri, præter florem qui rubicundus est, per omnia similis est. Constante verò flores ij interdum

k v lū

*Bellis minor sylvestris.**Bellis Maior.*

Amplici, interdum multiplici foliorum contextu, ut pictura affabrè ostendit. Sylvestris, Plinio lib. xxvj. cap. v. teste, flore constat albo, aliquatenus rubète, quinquagenis ternis interdum etiam quinquagenis quinis barbulis circinato, folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissimè serrato. Neque obstat quòd Plinius lib. xxj. cap. viij. Bellio luteum esse florem tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum mediùmve floris, quod sanè luteum est, respexit. Hinc est quòd à quibusdam Plinij locus ita legatur. Luteū & Bellio, ut subaudiatur semen. Maior Bellis procerior asurgit, folio non admodum diuerso, altioribus dūtate crenaturis laciniato, cauliculis tenuibus, surculosis, cubitum altis, flore priori non dissimili, maiore, paucioribus tātūm barbulis, & in vniuersum candidis, medium luteum in orbem concinnè cingentibus.

LOCVS.

Passim in pratis vterq; nascitur Bellius. Iam & in hortis feritur, sed flore multiplici, barbularum stipatu densiore.

TEMPVS.

Minor primo statim vere apparet, & tota ferè æstate durat. Maior autem in Maio mense floret, quo etiam tempore carpi debet.

TEMPERAMENTVM.

Bellius vterque calidus & siccus est, id quod ex Plinio colligi potest, qui illorū ad discutiendas strumas vsum esse scribit. Acetosus tamē sapor quē in gustu minor præ se fert, aliquam frigiditatis in ea portionem esse monstrat. Quicquid tamen sit, exiccare Bellios euidentissimum est.

VIRE S.

Quotquot hodie viuunt vulnerariam herbam Bellium esse nouerunt, valetque potissimum in capitis fractura ad-mota. Succus etiam herbæ vtiliter vulneratis bibitur. Laudatur etiam herba ad membrorū resolutionem, quā Græci paraly sin vocant: itemq; ad podagras, ischiada, & aduersus strumas.

ADNOTATIO.

Bellides nobis Marguerites & Pasquettes, quod ad Pascha sæpe flores hi incipiant. Bellis maior consolida media vulgò.

De Brathy. Cap. LIIII.


NOMINA.

B*ελεος* *ελεος* *ελεος* Græcis, Sarina vel Sanina Romanis, [Seuenbaum] Germanis, Gallicè *Saninier* dicitur. Officinæ nomen vetus retinuerunt.

GENERA.

Duum est generum Sabina. Vnum quod hic pictū exhibemus: alterum Tamaricis folia habens.

FOR



FORMA.

Primi generis Sabina folijs Cupresso similis est, spinosior tamen, graui odore, acris & feruēs. Arbor breuis & in latitudinem magis se fundens & explicās. Topiarius itaque frutex est, immortalī coma virens, patulo fastigio, Iuniperi similitudine.

LOCVS.

Passim in hortis nascitur.

Sauina vel Sabina.

TEMPVS.

Quoniam tempore colligi potest, potissimum autem Autumno, dum semine prægnaus est.

TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excoalsfacientium & desiccantiũ, & ex numero eorum quæ vel maximè tenuium sunt partium.

VIRESEX DIOSCORIDÈ.

Prioris folijs nōnulli pro suffitu vtũtur, vtriusque folia nomas sistunt. Inflammationes illita mitigāt. Cū melle illita nigrities repurgant, itẽmque sordes & carbūculos abstergunt. Cū vino pota sanguinem per vrinā ducũt, fœtũque exentiunt. Idem apposita & suffita præstant. Miscentur vnguentis excoalsfacientibus, priuatim Gleucino.

EX GALENO.

Sabina ex numero est fortiter exiccārium, idque secundu

dùm tres qualitates quas in gustu præ se fert similiter Cupresso, nisi quòd ea acrior est, & vt sic dicā, magis aromatica seu odorator. Igitur huius quā modò dixi qualitatē est particeps, nempe acrimonie consistētis in calido temperamento, præterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris quā in Cupresso. Siquidem quāto magis acrimonia superat, tāto etiā potentiùs digerit. Itaque glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam vtriusque illi tantū inest, vt etiam tendat, & inflātionem afferat. At putredinibus similiter Cupresso accommodari potest, maximē ijs quæ maligniores fuerint, & diuturniores. Nam hæc citra noxam medicamenti vehementiam perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodū sordida, ea cū melle expurgat. Carbunculos item soluit. Porro ob essentiaē partiū ve tenuitatem menses quoque prouocat, vt si quid aliud, & sanguinem per vrinas mouet. Fœtū etiam viuētem interficit, & mortuum eiecit. Vnguentis inditur, & potissimū Gleucino: & in multas antidotos iniicitur. Quidam verò etiam Cinnamomi vice duplum eius adijciūt: est enim extenuandi & digerendi facultatis, si pota fuerit.

EX PLINIO.

Sabina à multis in suffitus pro thure assumitur. In medicamentis vero duplicato pondere eosdem effectus habere quos cinamomū traditur. Collectiones minuit, & nomas compescit. Illita vlcera purgat. Partus emortuos apposta extrahit & suffitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle & vino pota, regio morbo medetur, Gallinacci generis pituitas fumo eius herbae sanari tradunt.

De Bato. Cap LV.

NOMINA.

Bάτος Græcis, Rubus aut Sentes Latinis vocatur. Aliquit bus Mora vaticana, corrupta voce, eius fructus dicuntur, cum dicendum esset mora vacinia. Nam in hodiernum vique diem Græci mora illa à βάτος, βάτινα καὶ βατίνα cognomināt. Testis Galenus libro sexto de cōpos. medica. secundum locos, ca. primo. Vergilius in Bucolicis vnus lite-

guntur. Folia nanque in verè, flores æstatis initio, Iunio ni-
mirum & Iulio mensibus: fructus autem vbi iam maturue-
rit per messes & extrema æstate decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Rubi folia, germina, flores, fructus & radix qualitate ad-
stringente participant, eaque non obscura. Sed hoc inter se
differunt, quòd folia potissimum & recens nata plurimum
in se habeant aqueæ substantiæ, parum verò adstringant:
eadem ratione & germina. Est itaque eorum temperies ex
terrea frigida essentia, & aquea tepida. Fructus autem, si q-
dem maturus fuerit, non parum habet succi temperati cali-
di, qui dulcis est. Proinde eam ob rem, & propter modicam
adstrictionem, cui non insuavis est. At immaturus à frigi-
da terrea substantia vincitur, ac proinde acerbus est, & exic-
catorius. Vterque autem siccatus recõditur, validius quàm
recens desiccans.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Rubus adstringit & desiccet, capillos tingit. Ramorum
eius decoctum potum aluum sistit, & fœminarum proflu-
uia cohibet. Presteris morsui vtile. Gingiuas firmat. Oris vl-
ceribus folia commanducata medentur. Cohibent herpe-
tas, & in capite achoras, oculósque procidentes, cõdyloma-
ta & hæmorrhoidas, illita folia sanant. Cardiacis & stoma-
chi doloribus trita & imposita subueniunt. Succus ex cau-
libus, folijsque eius expressus, & in sole coactus, efficacius
omnibus iam dictis medetur. Fructus eius optimè maturi
succus, ad oris medicamenta conuenit, sistit & aluum in
media maturitate comestus. Flos quoque eius in viuo po-
tus aluum sistit.

EXGALENO.

Folia & germina Rubi si mandantur, aphthas & alia
oris vlcera sanant. Quin & alia vulnera glutinare valent.
Flos eius eadẽ fructui immaturo facultatẽ possidet: vttaq;
ad dysenterias, & ventris profluuia, eiusque robur deperdi-
tum, & sanguinis expuiriones, idonea remedia. Radix præ-
ter adstrictionem non paucam, in se habet substantiam te-
nuem, propter quam etiã in renibus lapides comminuit.

EX

EX PLINIO.

Nec rubos ad maleficia tantū genuit natura, ideoque ex eis mora vel hominibus cibos dedit. Vim habet siccandi, adstringendique, gingiuis, tonsillis, genitalibus accommodatissimi. Aduersantur serpentium sceleratissimis, hæmorrhoidi & presteri, flos & mora. Scorpionum vulnera sine collectionum periculo iungunt, urinā ciunt. Caules eorum tunduntur teneri, exprimiturque succus, mox sole cogitur in crassitudinem mellis, singulari remedio contra mala oris, oculorumque, sanguinem excreantes, anginas, vulvas, sedes, cæliacos, potus aut illitus. Oris quidē vitij etiam folia commanducata profunt, & vlceribus manantibus, aut quibuscūque in capite illinuntur. Cardiacis vel sic per se imponuntur à māmā sinistra: Item stomachi doloribus, oculisq; procidentibus. Instillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosacco cerato. Calculorū ex vino decoctum presentaneum est remedium. Item per se in cibo sumpti cymæ modo, aut decocti in vino austero, labantes dentes firman. Aluum sistunt & profluuia sanguinis. Dysentericis profunt. Siccantur in umbra, ut cinis crematorum uā reprimat. Folia quoque arefacta & contusa, iumentorum vlceribus vtilia traduntur. Mora quæ in ijs nascuntur, vel efficaciorē stomatice præbuere, quā fatiua morus. Eademque cōpositione, vel cum hypocisthida tantum & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra arancos. Inter medicamenta quæ stiptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in vino ad tertias partes, ut colluantur eo oris vlcera, & sedis foueantur: tantæque vis, ut spongiæ lapidescant.

ADNOTATIO.

Rubus Ronce.


De Ballote. Cap. LVI.

NOMINA.

BΑΜΑΡΤΙ, ἡ μύληρον πρᾶσιον Græcis, Ballote Latinis, Officinis Marrubium nigrum, aut Marrubiastrum, aut Prassium fœtidum dicitur. Germanis [Schvvartz Andorn,

dorn: oder Andorn Vucible.] Gallicè *Marroquin puant ou Marrubin noir*. Marrubium à similitudine foliorum, nigrū à caulis colore, qui niger est Marrubii respectu, dicta Ballote est.

FORMA.



Ballote, siue Marrubium fruticosum.

Caules ex se mittit Ballote quadrangulos, nigricantes, subhirsutos ab vna radice complures. Folia Marrubio similia, maiora tamē, tubrotunda, pilosa, per intervalla in caule disposita, Apiastro similia, graueo lentia, vnde aliqui Apiastrum eam vocarūt. Flores in rotæ speciem caules circumiacent. Theophrastus etiā lib. vj. cap. ij. de historia plantarum Ballotem folio herbido, ferratori, incisurisq; profundioribus & conspectioribus discretis costare scribit. Vnde liquido constat hanc quam pictam damus esse veram Balotem, quod illa sit

herba fruticosa, quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis ferè, folio Marrubii, sed maiore, piloso, cigete per intercapedines caulem, odore graui, orbiculato florum purpureorum ambitu, qui scapos verticillatim obducunt.

LOCVS.

Nascitur propè vias, domos, sepes, cœmiteria, & aliis vmbrosis in locis.

TEMPVS.

Floret in fine Iunii mensis, & initio Iulii, quo sanè tempore carpi commodè potest.

TEMPERAMENTVM.

Amara & acris est, ideòque calefacit in secundo ordine iam completo, aut tertio remisso: desiccat autem in tertio.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius folia cum sale illita, canis moribus medètur. Feruenti cinere flaccescentia condylomata reprimūt, sordidaque vlcera cum melle purgant.

EX PAVLO.

Ballote, quod alii Marrubiū nigrum dicunt, acris est & absterforia facultatis. Illitum cum sale canis moribus medetur.

EX PLINIO.

Vis eius efficax aduersus canis morsus, ex sale foliis tritis imposita. Item ad condylomata, coctis cinere in folio oleis. Purgat & sordida vlcera cum melle.

ADNOTATIO.

Ballote Marrubium foetidum.

De Batrachio. Cap. LVII.

NOMINA.

B*atrachion* Græcis, Batrachium & Ranūculus Latinis dicitur. Apuleius Sceleratā nominat, Vulgus medicorū perperā Pedē corui vocat. Sunt etiā qui Flammulam abvrendi facultate, appellant. Germani [Hanenfusz]. Galli verò *Bassinet*. Batrachio aut siue Ranūculus dicta est haud dubiè quòd limitibus humidis opacisq; marginibus, ranarū more lætetur, aut quòd aquis ubi ranę degūt potissimūm gaudeat, aut quia inter eius frutices ranę frequenter inueniātur, Agreste verò Apium seu Apiastrum, quòd foliis Apiū æmuletur. Scelerata, eo quòd comesta noxia sit: vel (quod magis arridet) quia validi sceleratique mendicantes, sibi crura & lacertos hac ipsa dilaniant, quòd possint impudentiùs stipem extorquere, atque hac impostura pecuniolam aucupari.

GENE

G E N E R A.

Plura sunt Ranunculi genera, Dioscorides verò & Galenus quatuor potissimum esse tradūt. Primum duplex est. Huius enim generis Ranūculus quidā syluestris est: & hic iterū duabus discriminatur differentijs. Vnus enim luteos flores profert, & Germanis [V ueisser Hanenfuos] dicitur. Gallis autem *Bassinet sauvage iaune*. Alter verò purpureos, qui mihi, quod sciam, nondum visus est. Quidam autem hortenſis, qui nisi cultura accedat, prouenire haud solet. Hic itidem duplex est. Vnus qui simplici florum textura constat. Germanicè [Vngenſulter garten hanenfuos]. Gallicè *Bassinet de iardin simple*. Alter multiplicem foliorum in floribus compagem obtinet, ideoque Germanis [Gefulter gartè haenfuos] dictus est. Gallis verò, *Bassinet double*. Alterū quod à foliorum similitudine, quam cum Apij folijs obtinet, à nonnullis *ελαιον αγρον* est, Apium syluestre, vel Apium risus cognominatur, Germani [Vasser hafsz] vocant. Gallicè *Acheramin*. Tertium genus exiguum est, ob id etiam Germanis [Klèiner hanenfuos] nominatur. Gallis autem *Pied poul*. Quartum etiam minimum Germanicè [Vn aldt henle] appositissima voce appellatur, est enim inter reliquas herbas que germanicè Pedes galli vocantur & minima, & non nisi in syluis vt plurimum prouenit, adeoque composita voce rectissimè [Vualdthenle] nominatur, quasi dicas minima inter pedes Galli, & in syluis prognata. Est que duū generū: vnum quidē lacteo flore alterum luteo, vt pictura docet. Primū autem quod lacteo flore ornat, est id quod à Dioscoride pingitur, Germanicè [Vveisz Vualdthenle] vocatur. Gallicè *Coqueret blanc*. Alterum [das gelb Vualdthenle] Gallicè *Coqueret iaune*.



Ranunculus sylvestris. *Ranunculus hortensis simplex.*

Primum Ranunculi genus folia Coriandro similia habet, latiora, vel ut Plinius ait, ad maluæ latitudinem accedentia, subalbida & pinguis. Florem luteum, interdum purpureum. Cauleni non crassum, cubitali altitudine. Radicem parvam, albam, amaram, adnascantias Ellebori modo habentem, Cæterum effecit cultura, ut qui in limitibus simplici



Ranunculus hortenſis
multiplex.



Ranunculus aquaticus.
ſive Apium riſus.

ſimplici foliorum compage flores oriantur, gemino quodam denſoque ac multiplici foliorum ſtipatn nunc in hortis colluceſcant, quemadmodum pictura affabrè monſtrat.

Alterum genus lanuginofius, vel, vt Plinius inquit, folioſius, altiore caule, pluribus foliorum incifuris copioſiſſimum in Sardinia, accerrimumque, quod iam Apium ſylue ſtre ſive Apium riſus nominant.

I iij Ter

*Ranunculus minor**Ranunculi quarta species candida.*

Tertium genus valde paruum, grani odore, flore qui auri speciem refert.

Quartum hinc simile, flore autem lacteo aut luteo, radice longiore, & modo quodam nodosa, gustu acri.

Quarto itaq; generi duas picturas dedimus quæ tametsi floribus potissimum discriminantur, priore lacteum florem, posteriore verò luteum proferente, in reliquis tamen non per omnia conueniunt. Prior enim radice est oblongiore, caule paulò breuiore, folijs vero latioribus.

Post



Ranunculi quarta species
Lutea.

Posterior autem radice crassiore eadēque bifurcata & ramulis vn dequaque referta caule proceriore, folijs verò paulò strictioribus. Prior Gallis *Cocqueret blanc* dicitur, Posterior *Cocqueret iaune*.

LOCVS.

Primum genus *Ranunculi sylvestris lutei* sine cultura circa fluenta, & in limitibus pratis que humidis & vliginosis prouenit. Hortensis verò adhibita cultura in hortis nascitur. Alterū genus secus aquas & fontes gignitur, & apud Sardos copiosissimum. Ea si comedatur vscen-
tibus neruos contrahit,

rictuque ora diducit, vt qui mortem oppetunt, velut ridendum facie intereant. Ob id *Sardonius risus* in prouerbiū celsit, Et si autem nostra non perinde efficax sit atque ea quæ in Sardinia nascitur, tamen hanc vehementissimam erodendi facultate esse præditam, gustus ostendit. Tertium genus in pratis & campestribus passim prouenit. Quartum, vt Germanicum nomen palam demonstrat, syluis familiare est. Luteum vero in valle supra & infra *Bebenhusum monasterium* iuxta aquas copiosissimè nascitur.

TEMPVS.

Primum genus hortensis *Ranunculi lutei*, statim inter initia Aprilis floret: Maio autem mense disperit, & nusquam subinde conspicitur. Secundum & tertium ge-

nus itidem tota æstate inueniri possunt. Quartum in vere, Aprili nimirum mense, tantum apparet, quo sanè tempore hoc ipso sylux, luci, & nemora scatent, floribusque eius candicant.

TEMPERAMENTVM.

Omnium tum radix, tum vniuersa herba vehementer calida & sicca est. Primi tamen generis syluestris lutei, non perinde ac reliquorum acris admodum est facultas.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Omnium folia & caules teneri si illinantur, exulcerandi, & crustas cum dolore creandi vim habent. Proinde scabros vngues & scabiem tollunt, & stigmata delent, myrmecias, achrochordonas & alopecias modico tempore illita sanāt. Tepido eorundem decocto perniones fouentur. Radix sicca tritaque, sternutamenta naribus admota ciet. Dentium dolores adhibita lenit, eos tamen conterit.

EX GALENO.

Quatuor habet speciatim Ranūculus differentias. Omnes verò vehementer acrem facultatem possident, adeò ut cum dolore exulcerent, Hac itaque ratione si moderatè vtare, psoras & lepras excoriant, & vngues leprosos diuelunt, ac stigmata discutunt, & achrochordonas & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuant paucò tempore admota. Nam si diutius inhæreant, non excoriatus solū cutis, sed & in crustā vritur. Atque igitur hæc omnia caulibus & foliorum sunt opera, si illinantur viridia. Porro radix arefacta sternutatorium est medicamentum similiter aliis quæ valenter desiccant. Sed & dentiū dolores iuuat, vt & eos, vehementer scilicet exicando, frangat.

EX PLINIO.

Omnibus vis caustica, si cruda folia imponentur, pustulasque vt ignis faciunt. Ideo ad lepras & psoras vtuntur, & ad tollenda stigmata, causticisque omnibus miscēt. Alopecias imponunt, celeriter remouentes. Radix in dolore comminucata diutius, rumpit dentes. Eadem sicca

conciſa, ſternutamentum facit. Noſtri herbarij ſtrumeam vocant, quoniã madetur ſtrumis, & panis, parte in fumo ſuſpenſa.

ADNOTATIO.

Ranunculi omnia hæc genera Gallis ſunt frequentiffima in vinea, ſyluis, paludofis locis.

De Bryo. CAP. LVIII.


NOMINA.

Bryon Græcis recentioribus, Lupus ſaliſtarius Latinis, Lupulus officinis, vulgò Humulus vocatur. Aliquot Italiae rura, ad Græcã appellationẽ alludẽtes, Bruſcãdulam quaſi Bryon ſcanſile nominant. Germani [Hopffen] Galli Houblon, Græci autem Bryon à Bryoniz ſimilitudine

haud dubiè nominarunt. Lupus verò ſaliſtarius, quia ſubit ſcanditque ſalices, & arbuſta omnia circumuoluẽdo ſe circumplectitur, appellatus eſt. Hinc quoq; Lupus reptitius nonnullis nominatur.

FORMA.

Caules habet aculeatos, longiſſimosque. Folia vitis albæ, huiſpida, & nigriora. Flores cinereos ſeu candicantes, ac multis exilibus folliculis ſquamatis cõpaſciles. Radicem ſubnigram, longam.



*Lupus ſaliſtarius, ſive
Lupulus.*

LOCVS.

Passim & copiose in Germania nostra iuxta vepres & salicta prouenit, ex eaque ceruissiam (porum quo vini vice vtuntur Germani) conficiunt. Ideoque in hunc usum in hortis plantatur.

TEMPVS.

Augusto mense florēt & Septembri.

TEMPERAMENTVM.

Sunt qui refrigerare Lupulum dicant, alij temperamento medium esse putant. At vtrique (mea quidem sententia) falluntur: flores enim quorum potissimum vsus est calidos & siccos esse, odoris & grauitas, & inmodica amaritudo testantur. Antiquus etiam herbarius calidum & siccum in secundo ordine esse tradit. Denique constat radices quoque eius calidas esse.

VIRESEX RECENTIORIBVS.

Bilem vtranque detrahit. Abscessus discutit. Pituitam in aqua inter cutem per aluum ducit. Succus eius crudus hantus ventrem magis subducit, minus verò obstructiones aufert. Coctus verò magis ab obstructionibus liberat, minusque ventrem subducit. Auribus instillatus eas à putredine vindicat, & à foetore liberat. Radices obstructiones tollunt, lienis potissimum & iccoris.

De Veronica. Cap. LIX.

NOMINA.


Veteribus Græcis & Latinis cognita fuerit nec ne hæc herba, nondum constat. Vulgus autem herbariorum hodie Veronicam. Germani [Erenbreisz oder Grüdheyl] ob mirificam sanandi vlcera & vulnera facultatem, nominant. Galli verò *L'herbe aux Ladres*.

GENERA.

Duum est generum Veronica: vna mas, altera verò fœmina, Discrimina earum ex descriptionibus patebunt.

For

FORMA.

*Veronica mas.**Veronica scæmina.*

Veronica mas herba est per terram serpens, cauliculo dodrantali & nonnunquam etiam longiore. rubescente & lanuginoso: folijs oblongis, nigris, hirsutis & serratis, floribus in cacumine purpureis, semen vasculis loculi speciem habentibus, radice tenui.

Scæmina itidem per terram serpit caule lanuginoso, folijs rotundis instar herbæ quæ *Centummaria* & *Nummularia* hodie vocatur, minimè in ambitu incisæ, paulò quam maris viridioribus: floribus in luteo purpureis, semine in vasculis rotundis, radice, ut *mas* tenui.

LOCVS.

Nascitur incultis & sylvestribus locis.

TEM

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudinem quandam & vehementem adstrictionem in gustu præ se fert, vt hinc calidam & siccam esse conijcere liceat.

VIRE S.

Mirificè ad cruenta ac vetera vulnere & vlcera sananda confert. Scabiei denique & omnibus cutis vitijis medetur. Ferunt quondam huius herbæ adiuumento Regem Galliz elephantiz morbo correptum, à quodam venatore sanatum esse, cum is ceruum à lupo vulneratum eius herbæ comestione, & assidua in illa volutatione, curasse seipsum animaduertisset. Tumores etiam, inquacunque corporis parte fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recentiores huius vsum vnicè commendant in febribus pestilentialibus, iecoris & lienis obstructionibus, potissimum verò pulmonis exulcerationibus.

ADNOTATIO.

Veronica vtraque hic vsu rarissima.

De Bulbo syluestri.

Cap. LX.

NOMINA.

BOMBVS *Αγριος* Græcis, Bulbus syluestris Latini. Sunt quibus Ceba syluestris appellatur. Germanicè [Feld, Vvild, oder ackerz vvißel] Gallicè *Pourrieron*. Bulbos autem nominant radices suis membranis tunicatas siue pluribus capitulis coagmententur, vno folliculo omnes ambiente, siue quadamtenus distinctæ separantur.

For

FORMA.



Herba est caule dodrā
tali, cauo, folijs porra-
ceis, floribus lilij sinua-
tim emicantibus, specio-
sis, sex folijs è calathō
stellatim radiatis, ex vi-
ridi in luteum tenden-
tibus, capillo intus cro-
ceo, capitulo floribus
decidentibus triangula-
ri, seminibus pleno, ra-
dice bulbosa ceu Allium
citra odorem glutinosā
sa.

Bulbus sine Cepa sylvestris.

LOCVS.

In locis vmbrosis, circaque margines quorundam pra-
torum copiosè prouenit. Quare in vallibus non procul à
Tubingua iuxta monasterium Bebenhusense sitis, & radi-
ce montis Austriaci ad pratium tenue vocarum, Bulbus pla-
rimus nascitur.

TEMPVS.

Per initia veris, Martio & Aprili mensibus erumpit, ac
statim subinde euanesceit. Semen non tantum in caulibus,
v erumetiam iuxta radicem profert.

TEMPERAMENTVM.

Amara austeraque qualitate præditos inueniet, nō hūc,
sed & alios bulbos, qui gustū exactè consuluerit. Proinde
hos abstergere simul & glutinare, & nimirum etiam excise
care

care posse nemini non notum est.

VIRE EX DIOSCORIDE.

Omnes bulbi acres sunt & calefaciunt, veneremque stimulant. Lingua & tonsillas exasperat. Multum nutriunt. Carnes procreant, statusque faciunt. Ad luxata, collisa, sureulos, articulorumque dolores illiti conducunt. Gangraenis & podagris cum melle & per se hydropicorumque tumoribus & canum moribus prosunt. Cum melle pariter & pipere trito illiti, sudores cohibent, & stomachi dolores sedant. Furfures & achoras cum nitro tosto exterunt. Sugillata & varos per se, aut oui luteo purgant, & lentigines cum melle aut aceto. Fractis auribus cum polenta, & cotulis vnguibus prosunt. Ficos in calidis cineribus tosti, & cum mænarum capitibus crematis appositi, tollunt. Combusti verò & alyconio permisti vitia cutis in facie, & nigras cicatrices in sole illiti commendant. Cum aceto elixi & in cibo sumpti ad rupta faciunt. Cauere verò eorum in cibo copiam oportet, quoniam nervosas partes tentant.

EX GALENO.

Bulbi amarā austerāq; vim manifestā obrinent, quāobrem elanguescentis stomachi aliquatenus auiditatem excitant. At verò neq; ijs inutiles sunt, quibus è thorace & pulmone pus expuendū erit, quāquā crassiore ac glutinosiore sit corporis substantia, etenim amaritudo crassitudini aduersatur, lenta crassaque nata incidere. Quapropter bis elixi vberius quidē alūt, sed excreare volentibus reluctabuntur, ut pote omni amaritudine exuti. Tum verò ex aceto, oleo garoq; mistis, esitare satius fuerit: nā ita magis oblectabunt ac nutriēt, minusq; inflabūt, & facilius concoquentur. Quidam horū cibo abundē & immodicē vsi planē seminis autem copiam, inque venerē se esse propiores senserunt. Hos quoque homines variē apparāt. Nō enim solū aqua elixos, verūctiā patinas ex ipsis variē cōditas instrūit. Alij quidē in sartagine frigunt, multi in craticula assant. Verū hi multam coctionē haud sustinent, admodū pauca contenti. Sunt qui nihil prorsus præcoquāt: delectat nāque eos amaritudo ipsa ac austeritas integra, quippe qui amplius ab ea ad cibū alliciātur, quāquā ad huiusmodi illecebrā duo aut

tres plus satis facient. Si verò liberalius sic apparatus sumā-
tur, præsertim ubi, vt mos est, crudiores ingerūtur, āpius
cruditatem generabunt. Quidam etiam non probè cocti
inflationes & tormina pariunt. Qui ad hunc modū esitan-
tur, alimentum minimè boni succi procreant. At plurimū
decoctorum, aut bis etiam, succus crassior quidem ille erit
cætera verò melior ac alibilior reddetur.

EX PLINIO.

Bulbi ex aceto & sulphure vulneribus in facie medētur:
per se verò triti neruorū cōtractionē, & ex vino porrigi-
nes. Succū cū melle cauū morsibus. Erasistrato placet cum
pice. Sanguinē idē eos sistere tradit illitos cū melle. Alii si ē
naribus fluat, Coriandrum & farinā adiiciūt. Theodorus
& lichenas ex aceto bulbis curat, & erūpentia in capite cū
vino austero aut ouo. Et bulbos epiphoris idem illinit, &
sic lippitudini medetur. Aequē vitia que sunt in facie, corū
rubētes maximè in sole illitis, cū melle & nitro emēdat. Lē-
tiginē cum vino, aut cū Cumino coctis. Vulneribus quoq;
marē profunt per se, aut, vt Damion, ex mullo, si quinto die
soluātur. Iside & auriculas fractas curat, & testū pituitas.
In articulorū doloribus miscēt farinā. In vino cocti illiti vē-
tri, duritiem præcordiorū emolliunt. Dysentericis in vino
ex aqua cælesti temperato dātur. Ad conuulsa intus cum
Silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorē tussi illinun-
tur. Neruis vtilēs. Ideo & paralyticis dātur iuxta in pedi-
bus. Qui sunt ruffi ex his, citissimè sanant cū melle & sale.
Venere stimulat, Sylvestres interancorū plagas & vitia cū
Silphio pilulis deuoratis sedant. Et satiurorū semen contra
phalangia bibitur in vino. Ipsi ex aceto illinuntur conera
serpentū ictus. Semē antiqui bibendū insaniētibus dabāt.
Flosbulborum tritus crurum maculas varietatesque igne
factas emendat: Elixos asis minus vtilēs adijciunt esse, &
difficilē concoqui ex vi vniuscuiusque naturæ.

APPENDIX.

Hic. quē piētū damus, Bulbus, facultatem emolliēdi &
discutiēdi duos tumores habet. Humidis denique & de-
pascētibz vlcēribz tostus calido cinere, & cum melle
tri-

tritum atque admotum prodest.

ADNOTATIO.

Bulbus sylvestris hic videtur esse quod Leucoium Theophrasto pingitur, & nobis iam in hortis frequentius ad natalem christianam floret.

De Bicio. Cap. LXI.

NOMINA.

B ^{λεπτο} Græcè, Vicia Latinè nominatur. Officinæ nō sine maximo errore ea pro Orobo vtūtur. Germani alludentes ad Græcam appellationem, [Vvicken] simpliciter velcum adiectione [Zam vvicken] Gallicè Vesse. vocāt. Vicia autē, vt Varroni placet, dicta est à viciedo, quod itē vt vitis capreolos habeat, quibus sursum versus serpit.



Vicia.

FORMA.

Cubitali altitudine surgit, foliis Aphaces, angustioribus tamen, flore pisi, minutis nigricantibusque in siliquis seminibus, quorum quidem figura non rotunda est, sed similiter leniti latiuscula

LOCVS.

Sicca loca maximè amat, inter segetes autem copiosè provenit.

TEM

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Medium tenet caliditatis & siccitatis, validius tamen siccat, in secundo nimirum ordine.

VIRESEXGALENO.

Semina hæc non solum insuaui, sed cōcoctu etiam difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est quum huiusmodi naturā obtineāt, alimoniam quoque quæ ex ipsis in corpus permanat, improbi crassique succi esse, idoneam ad humoris melancolici generati onem.

De Blito. Cap. LXII.

NOMINA.

BΛιτρον Græcis, Blitum siue Blitus Latinis vocatur. Officinæ hanc herbam cum Beta confundunt nō sine magno errore. Germanis [Maier.] Gallicè, *Blete d'Espagne* dicitur. Blitum nomen inde traxit quod iners & fatuum olus esset, sine sapore aut acrimonia vllā. Nam Βαιτρον stolidos & ignauos Græci dixerūt. Sic hodie græca imitatione socordes, & nullius momenti homines, bliteos appellamus. Ita Plautus in Truculento bliteam meretricem nominavit.

FORMA.

Blitū non pingitur à Dioscoride, sed ab Hermolao Barbaro, homine non minus docto quam diligente, in suo Corollario ijs verbis describitur: Blitum erumpit ocysimè, folijs betaceis, sine acrimonia, fatuis & insipidis, semine vt Beta corticeo, copioso, racemoso, vt Attriplex, radice non vna non in rectum tendente, sed multiplici, obliqua, & proluxa. Ex quibus vtrique verbis, omnibus perspicuum fit, herbam quam depictam damus esse Blitum. Hæc siquidē ocysimè erumpit, atque in altum tollitur, foliaque Betacea prorsus habet. Insipida denique & sine acrimonia. Semen eius vt Beta corticeum, copiosum, racematim singulis ramis insidens. Radice non vna nititur, sed multiplici ac lōga: non in rectum, sed obliquum tendente. Rectiorem tamen & ma-

sa ve adest qualitas, quæ aliū ad excreationem irritare possit. Liqueat etiam quod minima ab ipso alimonia in corpus dimanet.

EX PLINIO.

Blitum iners videtur ac sine sapore aut acrimonia vlla. Vnde conuiuium fœminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile est. Ventrem adedò turbat, vt cholera faciat aliquibus. Dicitur tamen aduersus scorpiones potum è vino prodesse, & clauis pedum illini. Item lieni & temporũ dolori ex oleo, Hippocrates mēstrua sisti eo cibo putat.

ADNOTATIO.

Blitum iam in hortis frequens viride, album, frequentius rubrũ.

De Buniade.

Cap. LXIII.

NOMINA.

Bouviæ Græcè Romanis Napus, Germanis [Steckruob] Gallicè *Nauet ou Naneau* appellatur. Buniadis autem appellationem à tumente figura quam præ se fert, Græci deduxerunt. Namque radix Napi buniadis in amplitudinem excrefcit, & in rotundum exuberat. Cliuos siquidem colles, verrucosaque loca *Bouvdæ* nominant.

GENERA.

Napi buniadis, quem Galenus & alij veteres in Raporũ sensum reponunt, duo sunt genera. Vnum satium, quod forma, proximè ad Brassicam tertiæ speciei accedit, radicèque oblongiorem obtinet. Germani huius generis Napos [Truckensteckrueben] nominant. Alterum sylvestre, quod folijs suis Erucæ non dissimile est, radice ampliore, & rotundiore. Germanicè [Nassteckrueben] appellantur eius generis Napi.



Napus sativus.



Napus sylvestris.

Folia habet Rapi, laxiorem, Erucæ modo laciniata. caulé cubitalem, interdū altiorem, rotundum, flores luteos, Brassicæ proximos, semen in siliquis, radicem oblonguam.

LOCVS.

Bunias gaudet frigidis locis.

TEMPERAMENTVM.

Cū eadē quas Rapum vires habeat Bunias, necesse est idē etiā vt obtineat temperamentū. Est itaque Napus bunias in secundo ordine calidus, & in primo humidus.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix Buniadis clixa, flatu creat, minus tamen quā Rapum nutrit. Semen eius potum lætalia venena inefficacia reddit. Miscetur antidotis. Radix etiā eius sale conditur.

EX GALENO.

Easdem quas Rapa vires obtinent. Vide itaque caput de Rapis.

ADNOTATIO.

Napus bunias sativus, nobis Nauet, & eius semen Nauette.

De Botry. Cap. LXIIII.

NOMINA.

Botrys Græcis, Botrys Latinis appellatur. Officinis & vulgaribus herbarijs incognita. Germanis haud ineptè [Traubenkraut.] Gallicè Millegraine nominatur. Botrys verò dicta est à semine, quod racematim ramulis adnascitur.



Botry.

FORMA.

Herba tota est lutea, fruticosa, sparsa, multaque alarum caua habens. Semen totis ramulis adnascitur. Folia Cichorio similia obtinet, totaq; valde odorata est, ideoque vestibus apponitur. Ex qua quidem descriptione omnibus manifestū fit, herbam cuius picturam exhibemus esse legitimam Botrin: vniuersa enim herba ad luteum colorem vergit, fruticosa est, & multis stolonibus fusa, folijs Cichorij odoratis, semine circa ramulos totos in racem

m iij moꝝ

mos collecto nascente. Quid multa? nulla est prorsus nota quæ illi non appositissimè quadret.

LOCVS.

Nascitur circa profluentes aquas & torrentes. In Germania tamen, quod equidem sciam, non nisi sata prouenit.

TEMPVS.

Augusto & Septembri ad maturitatem maximè peruenit. quibus etiam mensibus, vt Ruellius annotauit, venalis herba per Parisientium urbem defertur. Odoris enim gratia Galli vestimentis, pannis & linteis curiosè interponūt. Apud Germanos tamen eius herbæ nulla est gratia, quod illis hætenus ignota fuerit.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse Botryn amaritudo eius quæ gustui occurrit, faciliè monstrat. Item vis eius incidendi, quæ illi propter calorem, tenuitatemque inest.

VIRES EX DIOSCORIDE.

In vino pota orthopnoeas lenit.

EX PAVLO.

Planta est admodum odorata, quæ cum vino pota non nisi recta ceruice spirantibus auxiliatur.

EX PLINIO.

Medetur orthopnoicis.

A D N O T A T I O.

Botrys herba hic frequens, diuersa à frutice quem Piment vocamus. Blattaria & rva crispæ nobis ignotæ.

De Barba Capri.

Cap. LXV.

NOMINA.

QUO nomine veteribus Græcis & Latinis hæc herba vocata sit nondum compertum est. Neque enim Pycnocomum est, quoddà descriptione illius prorsus abhorreat. Quare Barbam caprinam interea donec certius nomen nacti fuerimus, nuncupauimus, à florum nimirum figura, quæ caprinam barbam referre videtur. Germanicè [Vuald geiszbart,] vt eam segregaremus ab altera

altera eiusdem nominis, quæ non in syluis, vt hæc ipsa, nascitur, sed in pratis & senticetis, appellare nobis placuit. Gallicè *Barbe de Bouc*.

FORMA.



Barba capri.

Caulem habet tricubitalem, angulosum, folia Castaneæ aut Corylo similia in ambitu serrata, flores candidos, exiguos, racematim compactos, instar barbæ canæ dependentes, radicem nigram, linosam, intus candidam. Flores eius in iulos abeunt.

LOCVS.

Prouenit in obscuris syluis, & vallibus nonnunquam minus apricis.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, ac subiinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse hanc herbam faciliè ex gustu deprehenditur: miram enim amaritudinem, in radice potissimum, gustata exhibet.

VIRE S.

Abstergit haud dubiè expurgatque, & quæ in venis est crassitiem incidit. Quamobrem menses ducit, educendôq; ex thorace & pulmone, puri auxiliatur. Et in summa, siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam cõtinetur

m iii) eiusmo

eiufmodi, expurgat. Hac utique ratione & morbo comitia
li competit. Extrinsecus illita & impofita, tumores ex pi-
tuita ortos difcutit.

De Blattaria. Cap. LXVI.

NOMINA.

N Vm Græcis authoribus cognita hec herba fuerit
nōdum compertum habeo. Plinius certè libro xxij.
cap. ix. Blattariā nominat. Inuenit autem nomen hoc La-
tinū, à coligendis in fe blattis. Ideoque conuenientiffimo
nomine Germanis appellabitur [Schabenkraut] Gallicè
*Herbe venimeufe semblable à Bouillon blanc, ou Bouillon blanc
ferre.*



FORMA.

Plinius loco iam cita-
to Blattariā sic pingit.
Blattaria est fimilis Ver-
basco herba, quæ sæpe
fallit pro ea capta, folijs
minus cādidis, caulicu-
lis pluribus, flore luteo.
Ex qua pictura fatis con-
stat, herbam cuius pictu-
ram damus esse Blatta-
riam: sicenim Verbasceū
mentitur, vt pro eo sæ-
pius ab imperitis decer-
patur. Et sunt non pau-
ci herbarii, qui hac simi-
litudine decepti, eam in-
ter Verbascei genera con-
numerant. Folia tamen
quæ minimè sūt hirsuta
& cādida, sed potius vi-
ba

ridia, faciliè ab hoc errore paulò attētiore reuocare possūt.
Plures denique cauliculos habet, flores item luteos, ad Ver-

basce flores proximè accedentes . Foliculos quoque lini instar, in quibus semen continetur.

LOCVS.

Nascitur iuxta aquas, & fluminum ripas.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Vchemēs amaritudo eius satis docet esse calidā & sciccā.

VIRES EX PLINIO.

Hęc abiecta blattas in se cōtrahit, ideoq; Romæ Blat-
tariam vocant.

APPENDIX.

Non plura de huius herbæ facultatibus apud probatos
autores inuenio, sed haud dubiè si quis ea vti voluerit, ea-
dē quæ alia amara, in corpore nostro efficere potest. Quæ
qualia sint, ex capite præcedente faciliè intelliges.



De Bromo. Cap.
LXVII.

Bρῆμος Græcè. Aue-
na Latinis ac Offici-
nis Germanis [Habern]
Gallicè *Auoyné* dicitur.

FORMA.

Foliis & culmo Tritico
similis, geniculis interse-
cto. In summo verò fru-
ctum habet veluti locu-
stas duplici rure diuari-
m y catas

catas, in quo semen includitur. Radicem copiosam.

LOCVS.

Palsim in Germaniæ apris nascitur, ac iumentorum potiùs quàm hominũ pabulum existit.

TEMPVS.

Seritur Martio mense, metitur autem Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Auena vt medicamentum refrigerat, Galeno autore: vt alimentum verò, eodem teste, calefacit sufficienter. Vtrog; verò modo exiccat.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Semen eius hand secus quam hordeum ad cataplasmata vtile. Plus etiam ex ea sit cohibendæ alio accommodata. Succus eius in sorbitione acceptus, tussientibus prodest.

EX GALENO.

Auena vt medicamentum, similem hordeo vim obtinet. Nam illitũ desiccat, & digerit mediocriter, & sine morfu. Nonnihil etiam adstrictionis obtinet, vt ventris profluuia iunet.

EX PLINIO.

Semen vtile ad cataplasmata atque hordenũ & similia. Prodest tussientibus succus. Auenæ farina in aceto tollit nausos.


De Vua Crispa. Cap. LXVIII.

NOMINA.

VETERIBUS ne Græcis et Latinis frutex ille cognitus fuerit, me ignorare adhuc ingenuè fateor. Quare cū nomen aliud quo hunc appellaremus in promptu non esset, vulgarem & qua omnes hodie herbarij vtuntur nomenclaturam vsurpare voluimus. Vuam autem crispam fruticem hunc dixerunt ab intortis ferèque in circulum versis (crispa alij vocant) folijs, & acinis quos producit. Quo etiã respicientes Germani nostri, [Kruszbeer, oder Kruselbeer] vocant. Latinius fortè vua intorta nuncuparetur Gallicè *Grozelier*.

For

FORMA.

*Yua Crispa.*

ni, repugnare manifestè videntur. Posset tamen citra aliquod vitæ discrimen Rhāni generibus annumerari, quòd scilicet viribus illi similis admodum sit, quas etiam illi suo loco adscribemus.

LOCVS.

In frutetis & sepibus nascitur, nō tamen passim. Nusquā autem copiosius quàm Tubingę luxuriat, vbi circa omnes ferè sepes sese profundit.

TEMPVS.

Veris statim initio frutex ille pubet, primum hoc tempore folia, dein flores, ac non diu post acinos seu baccas acerbitate gratas profert.

TEMPERAMENTVM.

Haud dubiè idem quod Rhamnus temperamentum ob

tinet

tinet. Vt enim hic adstringit & refrigerat, sic etiā illa. Refrigerat autem in primo completo, aut secūdo incipiente, deficiat verò in secundo.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Folia ignibus sacris & herpetis illita auxiliantur. Fertur & ramos eius foribus & fenestris appositos veneficiorum arcere maleficia. E quibus Dioscoridis verbis satis liquet, Vnam intortam non hoc tantum nomine sepibus apponi vt easdem muniat, atque adeò alienorum ingressum prohibeat, verum etiam vt veneficia ab hortis propulset, Vt hinc quoque colligere liceat, eiusdem cum Rhamno esse facultates.

EX GALENO.

Herpetes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Porro ad hæc teneris vtendum est folijs.

De Balsamine. Cap. LXIX.

NOMINA.


QUO Nomine veteribustum Græcis tum Latinis appellatæ sint hæ plantæ, me ignorare ingenuè fateor. Puto autem illis planè fuisse incognitas, quod de ijs ne verbum quidem apud eosdem scriptum inueniatur. Hodie Balsamines nomine vocant. Causam indicabimus paulò post: Germani ad Latinam nomenclationem alludentes, [Belsamkraut,] haud (arbitror) ineptè appellabunt. Galli verò Meruelle.

GENERA.

Duo Balsamines genera damus. Primam, quam nos ceterioris discriminis gratia marem fecimus, Ligures Padani Balsaminā vocant, Hierosolimitanū pontū Hetruria, Mirabile Gallia, vulgus Italorum Charatiam, quoniam septi modo in hortis fenestrisque per cæcellos opere topiario facile digeratur. Alteram, quā fœminā nominauimus, Itali auctro genere Balsaminū appellant, priori quidem, quod ad fructum attinet, similis, nisi quod minor est, in alijs dissimilis: neque enim folijs, neque etiam floribus responder. Vtraque planta visu pulcherrima est, vt hoc saltē nomine ping

pingi meruerint. Et si præstet etiam harum habere picturas
vt de ijs plura inuestigandi posteris occasio aliqua sit.

FORMA.

*Balsamine mas**Balsamine fœmina*

Prima tenuibus prælongisque flagellis vltro citroque reptantibus enagatur, folijs Vitis albæ seu Bryoniæ, articulationioribus, exilibus pāpinis, ex alarum sinu prodeuntibus, quibus illigantes sese cancellatim vicinis implicant pergurijs: flore cucumeris ex albo in luteum languescente, turbinato vtrinque fructu, carnosa cute, & per versus verrucosa, ac rigidioribus bullis intumescente, cucumeris sylvestris pilli similitudine: puniceus maturo color, chartilago intus punicea vel lutea, sanguineisq; succus, Pomum maturitate dissilit inanitasq; cōfractio patet, semina intus pomi formam referentiā continens.

Alter

Altera caulem habet crassissimum. Portulacæ assimilem, in herbaceo colore rubescentem, folia Salicis, in ambitu incisifolia, flores magnos, purpureos, instar Consolidæ hodie regalis vocatæ herbæ caudatos, fructum priori non dissimilem, primò herbaceum dein pallidum luteūmve, pilosum, qui maturitate dissilit, inanitasque confractio apparet, semina intus aliquot lenticulæ fere figura continentem.

LOCVS.

Non nisi satè in Germania proueniunt. Sed iam in multorum hortis plantatæ nascuntur.

TEMPVS.

Floribus & fructibus prægnantes sunt Augusto & Septembri mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod Telephium temperamentum, potissimum alteram, obtinere arbitror. Quare in secundo ordine infuso, aut certe principio tertij exsiccare, nec insigniter, calefacere, primo nimirum ordine, est verisimile.

VIRES.

Ex primi generis Balsamines feminibus oleum exprimitur, ad vulnera: quod in Corollario suo annuauit doctissimus Hermolaus, præcipuum. Nonnulli pomum oleo prius imbutū aliquot dies insolant, deinde vel fimo, vel terra tantisper obruūt, dū protus intabuerit, sic Balsami vires glutinandis vulneribus adsciscere pollicentur: inde tractum Balsaminæ vocabulum. Quid multa? in vulneribus sanandis Telephio non inferiores esse conijcio, hincq; Balsaminas appellatas, Nos tamen de ijs peculiarem experientiam nullam habemus. Poterunt itaque alij si lubet: earūdem virum facere peticulum,

Adno

ADNOTATIO.


Balsamine est in hortis religiosorum sancti Germani Parisijs frequens. Gallis Merueille dicitur à mirandis eius effectus quæ in momordica scribit Pandeclarus in fine.

De Glycyrrhiza. Cap. LXX.

NOMINA.

Γλυκύριζα Græcis, Dulcis radix Latinis. Liquiritia Officinis, Germanis [Sueszholtz] Gallicè *Regalice* dicitur. Nomen tum apud Græcos, tum etiam Latinos à dulcedine, qua radix eius prædita est, inuenisse notius est, quàm vt dici debeat. Theophrastus nono de plantarum historia libro, Scythicam nominauit radicem, quòd in Scythia circa Mæotim paludem plurimum proueniat. Sunt etiam qui *Scythica radix*. ἄδισον vocitent, quòd sitim retenta in ore arceat.

FORMA.



Glycyrrhiza.

Breuis frutex est, ramos binū cubitorū altitudine spargens, in quibus folia densa, Létisco similia, pinguis, tactūq; glutinosa, Florem fert Hyacintho similē. Fructum pilularū Platani magnitudine, asperiorē tamen, siliquas Lentis modo rubescentes, breuesq; habentē. Radices illi sunt lōgæ, colore buxæ vt Gentianæ, subacerbæ, sed dulces, quæ Licij modo in succū coguntur & desantur. Hæc delineatio ita Liquiritiæ hodie vocatæ quadrat, vt nulla

vt nulla penitus sit nota quæ in illa non reperiatur. Frut-
cosa enim est, ramos bicubitales emittens, folijs lentiscinis,
densis, pinguibus, tactuque sequaci lentore glutinosi. Flo-
re Hyacinthi, fructu pilularum Platani crassamento, sed
asperiore, siliquas Lentis figura, & breues habente. Radici-
bus prælongis, buxco colore, & dulcibus.

LOCVS.

Plurima & optima in Cappadocia ac Ponto nascitur.
multa præterea nec ignaua aliquot Germaniæ nostræ lo-
cis, Pabenbergen si præsertim agro, IOACHIMI no-
stri Camerarij viri doctissimi, patria producitur. Et hodie
nusquā ferè nō feritur in hortis. His quæ semel cōprehēde-
rit, tam pertinaci fertilitate coheret, vt vix vnquā possit ra-
dicitus extirpari, tam restibili fecunditate regerminat.

TEMPVS.

Carpitur Septembre mense, quādo semine prægnās est
aut Vergiliarum occasu. Flores suos Iulio mense profert.

TEMPERAMENTVM.

Natura eius nostræ temperaturæ familiaris est: nā tale
monstratum est esse id quod dulce est. Sed quum adstrictio
quædam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentū quā-
tum ex caliditate & adstrictione est, tepidæ potissimum
caliditatis fuerit, quamproximè ad symmetrum tempera-
tūmve accedens. Porro quum etiam dulcis sit, humidaquo-
que sit oportet.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Succus radicis ad arteriæ exasperationes utilis est, opor-
tet autem vt linguæ subditus elique scat. Ardori stomachi,
& ad iccinoris thoracisq; vitia prodest. Vesicæ scabiem, &
renum vitia cum passio potus emendat. Idem eliquatus si-
tim restinguit. Vulneribus prodest circumlitus. Communis
ducatus stomacho succurrit. Radicum recentium decoctū
ad eadem conuenit. Radix vero sicca in puluerem trita,
pterygijs commodissimè inspargitur.

EXGALENO.

Huius fruticis radicum succus imprimis utilis est, simi-
liter vt eius radices dulcis, simulque modicè adstringens.
Proin

Proinde asperitates lenire potest, nō solū in arteria, verū etiam scabra vesica, idq; temperaturæ mediocritate. Quoniam autē temperie quoq; humidum est quod modicè dulce est, iure sanè sitim arcens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & natura humana frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad læuorem redactam pterygiorum illitu idoneum esse remedium.

EX THEOPHRASTO.

Dulcis & Scythica radix utilis ad suspiria, & tussim siccam, atq; in totum thoracis laborantis medicamento commoda redditur. Quin & ex melle vlceribus mederi potest. Sitim quoq; extinguit, si teneatur in ore. Quae de causa tū ea, tum Hippace, Scythas decem & duodecim dies degere, & vitam prorogare affirmant.

EX PLINIO.

Radicis vsus in subditis decocta ad tertias, cætero ad mellis crassitudinem, aliquando & tusa. E quo genere & vlcneribus imponitur, & faucium vitijs omnibus. Item voci utilissimo succo, sic vt spissatus est, linguæ subdito: itē thoraci & iccinori. In ore habentes sitim non sentiunt: ob id quidam Adipson appellauerūt eā, & hydropicis dedere ne sitirent. Non parū auxiliij cōfert ijs, qui perpetua siti excruciantur, ideo cōmāducata & stomatice est, & vlceribus oris inspergitur, sæpe & pterygijs. Sanat vesicæ scabiem, renū dolores, condylomata, vlcera genitalium. Dedere eam quidam potui in quartanis, drachmarum duarum pondere, & pipere, hemina aquæ. Commanducata sanguinem sistit ex vulnere. Sunt qui & calculos ea pelli tradiderunt.

Adipson.

ADNOTATIO.

Glycyrrhiza Gallis, partibus transpositu Rhiζ, *aglyceia*, *Riglice*.

De *Galeopsi*.

Cap. LXXI.

NOMINA.

Γαλεόψις, καλλιβόλον Græcè: *Galeopsis*, *Vrtica labeo* *La* *Scrophu-*
 tinè, vulgò & officinis *Scrophularia maior*, *Ficaria*, *laria ma-*
 n Mille *ior*.

Millemorbia & Castrangula dicitur. Germanicè [Kraunvvurtz, Sauvvurtz, groß feiguuartz en kraut.] Gallicè *Galeopsis l'Herbe aux Chats*. Appositè autem Galeopsis appellatur, nomine ex Græco & Latino composito, quòd eius flores prorsus galex aspectum referant. Aut si Græca cū Latinis componi haud possunt. γαλῶπις cum & non ι, vt habent multa exemplaria, scribendum erit, vt idem valeat ac Mustelæ aspectum referens: flores enim non dissimiles esse capiti illius animalis videntur. Et ita legendum esse Plinius etiam testatur, qui Galeopsin hanc nominat herbam. Scrophulariam autem à curandis strumis, quas scrophulas vocant, recentiores dixerunt.

FORMA.



Galeopsis siue Scrophularia maior.

Totus cum suo caule & folijs frutex Vrticæ similis est, læuiores tamē habet folia & cū teruntur grauiter odorata. Flores illi tenues, & purpurescentes. Huius delineationis notæ in vniuersum oēs, nulla prorsus reclamante, herbæ quam vulgus Scrophulariam maiorem nominat, conueniunt. Frutex enim est qui ad humani corporis ferè longitudinem interdum assurgit, foliaque Vrticæ habet, sed læuiores, & quæ trita grauem fundunt odorē. Flores tenues, atque purpurescentes. Respondet etiā locus natalis, vt ex sequētibus patebit. Esse autem veterum Galeopsin

psin vulgi Scrophulariam maiorem, præter ea que iam diximus, manuscriptus quoque codex euidenter ostendit: in quo pictura ita Scrophulariam refert, vt nemo sit qui eam non agnoscat. Hoc accedit quòd in descriptione, quam ex Dioscoride desumpsit, aperte testatur Scrophulariam maiorem alio nomine dictam esse Galeopsis & Galeobdolo. Neq; facultates discrepant, sed vtrarûque similes sunt, adeò vt haud dubiè veterum Galeopsis, recentiorum herbariorum sit Scrophularia maior.

LOCVS.

Nascitur circa sepes, semitasque, & in arcis ædificiorû passim.

TEMPVS.

Colligitur Iunio & Iulio mēibus, tum enim potissimū floret.

TEMPERAMENTVM.

Desiccatur, extenuatur, & discutitur, adeòque partium est tenuium, id quod amaritudo quàm in gustu præ se fert, satis indicat.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Folia, succus, caulis & semen, duritias, carcinomata, strumas parotidas & panos deiiciunt. Oportet autem bis die cum aceto tepidum cataplasma imponere. Fouentur & decocto eius vtiliter. Ad nomas, gangrænas, & putrescentia cum sale illita prosunt,

EXPAVLO.

Galeopsis, quam alij Galeobdolon appellant, vrticæ similis herba est, maiorem tamen læuorem habet, & odorem grauem, Scirrhusos tumores dissipat & emollit. Item ad nomas cataplasmatibus modo illita confert.

EXPLINIO.

Galeopsis folia caulesq; duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos & parotidas discutunt. Ex vsu est & decocto succo fouere. Putrescētia quoque & gangrænas sanat.

APPENDIX.

Recentiores etiam Scrophulariæ tribuunt facultatem sanandi vlcera putrescētia, & mariscas. Suceum eius mederi

deformati faciei iam ferè elephantice tradunt, vt inde satis constet à Galeopsi non diuersam esse. Semen in expellendis & enecandis lùbricis esse efficax adiiciūt, id quod ab eius eius amaritudine non abhorret.

ADNOTATIO.

Galeopsis tibi pingitur nostra Cataria.

De Gallio. Cap. LXXII

NOMINA.

Γάλλιον, ἡ γαλλίσιον, ἡ γαλάντιον Græcis, Gallium Latinis. Officinis, vt multæ alix optimæ herbæ, neglecta & incognita est. Germanis [Vnser lichen fravven Tuegler Vuol, oder betstro] dicitur. Nomen inuenit ex eo quòd vim coagulandi, ac spitandi lactis habeat. Gallicè *petit muguet iaulne.*



FORMA.

Ramos rectos. & folia Aparinæ similima habet. Florem in summo luteum, tenuem, frequentem, valde odoratum.

LOCVS.

Nascitur in aruis & humidis palustribusve locis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gallium siccum est & subacre.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Flos eius ambustis illinitur, & sanguinis profluvia cohibet. Idem cerato rosaceo miscetur, insolaturq; donec albescat, & sic lassitudines recreat. Radix venerem stimulat.

EXGALENO.

Gallium inde adeò nomen sortitum est suum, quòd lac coagulet, Facultatem obtinet exciccatoriam & subacrem. Flos eius sanguinis profluuijs competere videtur, & ambustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

ADNOTATIO.

Gallium à florum pallidorum & odororum copia, florastre dicitur Alijs Aspergula minor quòd Aspergilli formam habeat.

De Glechone. Cap. LXXIII.

NOMINA.

Γαλχων, βαλχων Græcè, Pulegium Latinè vocatur, Officinæ Latinum nomen retinent. Germanicè [Poley] Gallicè *pulege*. Blechona autem appellarunt, quòd gustatum à pecore cum floret, balatum concitet. Id quod Plinio libro vigesimo. ca. xiiij. autore de sylvestri verè dicitur. Pulegium verò, quòd eius flos recens incensus pulices interficiat.

GENERA.

Plinius & Apuleius duo Pulegij faciunt genera, alterum fœminam, alterum marem: nec alia ratione differre scribunt, nisi quòd mas candidum, fœmina verò purpureum florem habeat. Dioscorides Pulegium masculum, quòd sativum alio nomine in Dictamni descriptione vocat, dūta-

xat depingit. Syluestre autem secundam Calaminthæ speciem facit, quam Latini propriè Nepetam nominant, vñ suo loco dicemus.



FORMA.

Pulegium mas sue satium, cuius picturam damus, fruticosum asurgit & ad cubiti altitudinem increfcit, maxime si fit quo sustentetur folijs Sampſuchi, ſurculis hirsutis, rubricantibus, & per. internalla purpureo flore orbiculatim coronatis.

Pulegium mas ſive ſatium.

LOCVS.

Prouenit locis cultis & aquoſis: ſemelque ſatum diutina durat ætate.

TEMPVS.

Carpitur dum floribus prægnans eſt, id quod Iulio & Auguſto menſibus accidit.

TEMPERAMENTVM.

Pulegium quum acre & ſubamarum ſit, vel tum excalefacit, tum extenuat: ideoque in tertio ordine calidum & ſiccum eſſe ſtatuunt.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Extenuat, calefacit, & concoquit. Potũ, menſes, ſecũdas, & ſcæ

& fœtus trahit. Cum melle & aloe potum, ea quæ circa pulmonem sunt, educit, & cõuulsis auxiliatur. Nauseas stomachique morsus cum posca potum lenit. Atram bilem per aluum educit. Cum vino potum venenatorum moribus succurrit. Defectos animo, cum aceto naribus obiectum recreat. Siccatum & in puluerẽ tritum crematũmq; gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflamationes omnes mitigat. Podagris per se confert vsq; dum rubescat cutis. Cũ cera to varos tollit. Lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctum eius prurigines si eo lauatur sedat. Inflationes, duritias, & conuersiones vuluæ in decessionibus iuuat.

EX GALENO.

Pulegium calefacere abundẽ magnum est testimonium, quod illitum rubrificat, & quod, si quis diutius tolleret, exulceret. Extenuare verò satis indicat quum humida, crassa & lenta ex thorace & pulmone excreatu facilia faciat, mensq; moueat.

EX PLINIO.

Magna societas cum Mentha, ad recreandos defectos animo, Pulegio cum surculis suis in ampullas vitreas aceti vtriusq; deiectis. Qua de causa dignior è Pulegio corona vertigini quàm è rosis, cubiculis nostris pronũciata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur leuare. Quin & olfactu capita tueri contra frigorũ æstusq; iniuriã, & à siti traditur: neq; æstare eos qui duos è Pulegio surculos impositos auribus in sole habeant. Illinitur etiam in doloribus cũ polenta & aceto. Nauseas cũ sale & polenta in frigida aqua pota inhibet. Sic & pectoris ac ventris dolorem. Stomachi autem ex aqua, itẽm rosiones sistit, & vomitiones cum aceto & polenta. Intestinorum vitia melle decocta & nitro sanat. Vrinam pellit ex vino, & si Aminæum sit, & calculos, & interiores omnes dolores, ex melle & aceto sedat. Menstrua & secundas, vuluas cõuersas corrigit, defunctos partus eijcit. Comitibus in aceto cyathi mensura datur. Si aquæ insalubres bibendæ sunt, tritum inspergitur. Salsitudines corporis si cũ vino tradatur minuit. Neruorũ causa & in contractione, cum sale, aceto & melle confricatur

opisthotono. Bihitur ad serpentii ictus decoctum, ad scorpionum, in vino tritum, maximè quod in siccis nascitur. Ad oris exulcerationis, ad tussim efficax habetur. Flos recentis incensus, pulices necat odore. Xenocrates Pulegij ramum lana inuolutum, in tertianis ante accessionem olfactandum dari, aut stragulis subijci, & ita collocari ægrum inter remedia tradit.

EX SIMEONE SETHI.

Pulegium attenuat & calfacit vehementer, quapropter humida & crassa in thorace, & in pulmone humida & glutinosa innat, & vt excreantur efficit. Cum vino albo coctum & potum, calidumque syncerum menses prouocat. Extrinsecus illitum ischiadicis, & alijs partibus frigore affectis auxiliatur.

ADNOTATIO.

Pulegium in syluis & locis aditis luxuriat.

De Gentiana. Cap. LXXIIII.

NOMINA.

Gentiana
unde di-
cta. **T**ENTIANA Græcè, Gentiana Latine appellatur. Nomen apud omnes officinas retinet Germanicè [Entziā, oder Bittervurtz] Gallicè *Gentiane* nominatur, Sic à Gentio Illyriorum rege, qui in bello primus eius vires reperit, dicta est.

FORMA.

Folia Gentianæ iuxta radicem erumpunt iuglandi aut Plantagini similia, subrubètia: sed quæ à medio caule, præsertim autem cacumine prodeunt, breuioribus incisuris secta sunt. Caulis illi inanis, læuis, digiti crassitudine, binum cubitorum altitudine, geniculis interfectus, ex maioribus interuallis folia proferens. Flores eius lutei primùm calycibus conclusi, postea intumescètes explicantur, Semen in calycibus obtinet latius, leue, glumosum, ad Spodilij semē acce

*Gentiana.**Gentiana secunda species.*

accedens. Radicem mittit longam, similem Aristolochiz longæ, crassam, & amaram.

LOCVS.

Nascitur in altissimis montium cacuminibus, vmbrosis locis & aquosis. Plurima verò & copiosissima sub Alpinis montibus in Illyrio, & monte [Farrenberg] haud procul à Tubinga sito.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimum mēse, dein Iulio semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudo immensa satis monstrat radicem eius esse salidam & siccam.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Gentianæ radix calefactoriam & adstringentem vim habet. Venenatorum moribus succurrit duarum drachmarum pondere cum pipere, ruta & vino pota. Succus drachma, laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis & conuulsis opitulatur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita foetus eiecit. Vulneraria est imposita ut lycii, vulneribusque sinuatim depascentibus, potissimum succus, medetur. Oculi inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyriis acris miscetur succus. Radix alphas abstergit. Côtusa radix diebus quinque aqua maceratur, postea in eadem decoquitur, dum aquæ radices superstant emineant: deinde ubi refrixerit aqua in teolo percolatur, iterumque decoquitur. dum mellis crassitie contrahat: demum in vase testaceo reconditur.

EX GALENO.

Radix Gentianæ herbæ admodum efficax est quum opus est extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, quum impensè amara sit.

EX PLINIO.

Vsus in radice & succo. Radicis natura est excalectoriam, sed prægnantibus non bibenda: Præcipuè aduersus angues duabus drachmis cum pipere & ruta, vini cyathis sex siue viridis siue sicca pota prodest. Tanta huic vis est, ut iumentis etiam non tussientibus modo, sed ilia quoque trahentibus auxilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua pota. Farina eius ex aqua tepida fabæ magnitudine pota, intera neorū vitij occurrat. Radix trita vel decocta, à ruptis, conuulsis, & ex alto deiectis potatur.

ADNOTATIO.

Gentiana ex monte Iura huc conuehitur.

De Glycyda. Cap. LXXV.

NOMINA.

T *Λυκνισδὶ, ἡ πæνονία* Græcis, Pænonia & casta herba Latinis dicitur. Nomen Pænoniæ in officinis seruat. Germanis

nis[Peoniseubluom, Roenigszblum, Gichtvurtz. Beni, gnenrosz, Venedischrosz, Benediktenrosz, Pfingstrosz] Gallicè *rhoine, ou Rose nostre dame*, vocatur. Glycyfida porro dicta est quodd grana mali punici acinis similia habere videatur. Nam fida mali punici grana à Bœotis nominantur. Pœonia ab eius inuentore medicinæ peritissimo Pœone appellata est.

G E N E R A.

Duo eius genera sunt, mas & fœmina. Mas in vulgaribus herbarijs [Niniuenvurtz,] fœmina verò [Peonienblum,] alijsque nominibus Germanicis paulò antè cōmemoratis nuncupatur. Idem, magno errore, Pœoniam à Pionia defferre putant, atque adeò diuersis etiam capitibus,

imo & viribus disiūgūt. Ferendus tamen is error esset, nisi vtrique etiam herbæ, hoc est, Pœoniæ & Pionix, duplex genus assignarent, marem nimirum & fœminam, cum tamē sub vna Pœoniæ nomenclatura, vtrunque genus Dioscorides & alij veteres complexi sint.



Pœonia.

F O R M A

Caulis duorum fere dodrantum altitudine nascitur, multas

tas propagines habens, Mas Iuglandi nuci folia similia obtinet, foemina verò Smyrnij modo diuisa. Sūmo caule siliquas quasdā Amygdalis similes profert, in quibus quum aperiantur, grana rubra, multa, exigua, punici mali acinis similia inueniūtur, in medio nigra, purpurea, quinque aut sex. Radix maris, digiti crassitudine, dodrantali vero longitudine, gustu adstringens, alba. Foeminæ propagines sobolesve eeu glandes septē aut octo, vt Asphodelus habet. Ex qua siquidē descriptione abundē liquet. Pæoniā quæ passim in hortis nascitur, & cuius hic picturam damus, esse foeminā, quod eius folia Smyrnij modo sint laciniata, & quæ radix septem aut octo veluti glādis cōstet. Reliquæ notæ potissimū quod in siliquis grana alia rubentia, alia nigra sint v trique generi communes existunt.

LOCVS.

Nascitur in altissimis mōtibus, & passim hodie, foemina potissimū in hortis prouenit.

TEMPVS.

Maior floret mense.

TEMPERAMENTVM.

Pæonia radicem habet leuiter adstringentem cū quadā dulcedine. Si vero plusculum dentibus mādās, acrimoniam item quampiam subamarā subesse percipies: id quod in radice etiā nostratis Pæoniæ, quam foeminam esse diximus, deprehendes. Pæoniæ verò in vniuersum temperamentum tenuium est partium, exiccatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulò calidius.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Datur radix mulieribus à partu non purgatis. Cit menfes Amygdalæ magnitudine pota. Ventris doloribus cum vino pota auxiliatur. Regio morbo correptis prodest, renum ac vesicæ doloribus. Decocta in vino & pota, aluū sistit. Seminis grana rubra decē aut duodecim pota in vino austero, nigro, rubentem fluxionem sistit, stomachicis & erosionibus comesta profunt. A pueris pota & comesta, initia calculorum eximūt. Grana nigra nocturnis suppressio-
nibus

nibus,ephialtas nomināt: vulnæ strangulationibus, & vteri doloribus in aqua mulsa aut vino quindecim pota, opitulantur.

EX GALENO.

Radix Pæoniæ menses cit ex mulsa Amygdalæ quantitate pota. Sane tūdere eā oportet ac cribare, & sic inspergere, Expurgat etiam iccur obstrictum & renes, Sed hæc efficere, nata est quā acris & subamara est, quā verò quiddā etiam adstrictoriū obtinet, fluxiones ventris sistit. Oportet autem tunc in austerorū vinorum quopiam eam decoctam bibere. Est omnino resiccatoria vehementer, vt non dasperauerim eam ex collo pueris suspensam, merito comitialē morbum sanare. Equidem vidi puellum quandoq; octo totis mensibus morbo comitali liberū, ex eo quo gestabat radicem tempore. Vbi autem forte fortuna quod à colo suspensū erat decidisset. protinus morbo correptus est: rursusque suspenso in illius locum alio, inculpatè postea se habuit. Vjsum verò est mihi satius esse denuò id certioris experientie gratia detrahère: id quū fecissem, ac puer iterū esset cōuulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius suspendimus: ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus. Rationabile itaque erat aut partes quaspiam à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, ita affectos locos curare, aut aerem à radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenaiæ columellā phlegmone affectam iuuat, & Nigella fricta palam destillationes & grauedines desiccatur. si quis eam, in calidum linteam rarum liget, assidueque calorem ex ea per inspirationem, quæper nares sit, attrahat. Quin etiam cōpluribus linis, maximè marinæ purpuræ, collo viperæ ini ceris, illis viperam præfocaueris, eaque postea cuiuspiā collo obuinxeris, mirificè profuerit tum tonsillis, tum omnibus ijs q̄ in collo expullulant.

EX PLINIO.

Pæonia medetur Faunorū in quiete ludibrijs. Rubra grana rubentes menses sistunt quindecim sex pota in vino nigro. Nigra grana vuluis medetur, ex passo aut vino rotidem

tidem pota. Radix omnes ventris dolores sedat in vino, aluumque purgat. Sanat opisthotonum, morbum regium renes, vesicam. Matricem autem & stomachum decocta in vino, aluumque sistit. Estur etiam contra malum mentis, sed in medendo quatuor drachmæ satis sunt. Grana nigra auxiliatur & suppressionibus nocturnis in vino pota quo dictum est numero. Stomacho verò & erosionibus, & esse ea & illinire prodest. Suppurationes quoque discutuntur recentes nigro semine, veteres rubro. Vtrūque auxiliatur à serpente percussis, & pueris contra calculos incipiente stranguria.

ADNOTATIO.

Paonia mas & *sumina* nobis frequens, solam pingis seminam.

De Geranio.

Cap. LXXVI.

NOMINA.

Tεράνιον Græcè, Geranium Latinè, vulgò & herbarijs Rostrum ciconiæ appellatur. Geraniū autem à grui-
ni capitis imagine, quæ summo eius plantæ capitulo inest. Græcis aptissima similitudine dictum est. Sic recentioribus à ciconiæ rostri effigie. Rostrum ciconiæ nominatum est.

GENERA.

Duo Geranij Dioscorides tradit genera. Primum quod longioribus rostris, & in mucronem acuminatis constat. Hoc hodie officinis & herbarijs Acus pastoris & Muscata, Germanis verò [Storckenschnabel] Gallicè *Aguille de berger* dicitur. Alterum quod malux folia habet, Pcs columbinus vulgò nominatur. Gallicè *Pied de pigeon*. Sunt qui turpiter aberrantes. Amomum esse existimant. Germanicè [Taubenfusz, oder Schartenkraut] appellatur.

Præ

Præter hæc duo alia adiecimus genera, inter quæ id quod
 tertium ordine est, folijs Artemisiæ tenuifoliæ vel Chære- Tertium
 phyllo simile existit, herba Roberti & Robertiana à non- Robertia
 nullis, hand dubiè à superstitiõe aliqua Diui, qua superior na.
 ætas mirificè imbuta fuit, appellatur. Germanicè [Ruopre-
 chtskraut.] Gallicè *l'Herbe Robert.* Quartum folia obti- Quartum.
 nēs laciniata, Germanicè pro certiori discrimine [Kranich-
 halisz] vocari potest. Gallicè *pie de Colomb menu.* Quin- Quinè.
 tum quod folia Ranunculi habet, gratia Dei nominatur,
 Germanicè [Gottes gnad.] Gallicè *Grace Dieu.* Ab insigni
 in sanandis vulneribus effectu. Sextum, quod forma quar- Sextum.
 to generi simillimum est, nec ferè ab illo nisi sola magnitu-
 dine foliorum, florum & radicis distat, Germanicè [Bluet-
 vvurtz] à rubro colore aut mirifica insistendo sanguinis
 profluuii facultate vocatur. Gallicè *Espece de col de Grue.*

FORMA.

Geranium primum caules habet à radice rubentes, lanu-
 ginosos, folia Anemones, diuisuris incisa, flores purpureos,
 & in cacumine caulium fastigia capitulis ciconiæ aut gruû
 cum rostellis longitudine acus emicantia. Radicem oblon-
 gam & subrotundam, dulcèmq;.

Alterum

*Geranium primum.**Geranium secundum.*

- secundi.* Alterum ut præcedens caules tenues, rubentes à radice statim, languinososq: obtinet, folia malux similia, candidiora, flosculos subpurpureos, capitella gruini capitis modo rostrata, radicem tenuem & oblongam. Tertium, caules habet à radice rubescentes, lanuginosos, geniculatos, saporis & odoris iniucundi, folia Chærephylo aut Artemisiæ tenuifoliæ similia, flores purpureos, capitella gruini capitis modo rostrata, radicem intus viridem, & adstringentem. Quartum, cauliculos itidem ut reliqua rubentē, lanuginosum, folia laciniata admodum, flores purpureos, ex quibus capitella gruini capitis instar rostrata, & in ijs semina quinque nascuntur: radicem intus candidam, extrà subluteam. Quintum reliqua omnia magnitudine excedit, caules emittit oblongos, rotundos, modicè lanuginosos, à radice statim rubentes, folia Ranunculo similia, flores

*Geranium Tertium.**Geranium Quartum.*

res ferè cæruleos, capitella præcedenti Geranio similia, radicem crassam & longam, multis exiguis radiculis velut capillamentis quibusdam fibratam.

Sextum ramos habet tenues, lanuginosos, folia lacinia- Sexti.
ta, tenuia, flores in summo purpureos, ex quibus, vt in quarto, capitella gruini capitis formam referentia proueniunt. Radicem extra & intus rufam.

LOCVS.

Omnia Geranij genera in incultis proueniūt. Primum passim in campestribus & nonnunquam inter segetes nascitur. Alterum in colliculis. Tertium in vmbrosis locis & dumetis. Quartum in agrorum limitibus, & iuxta sepes. Quintum in pratis. Sextum in locis montosis & saxosis.

*Geranium quintum.**Geranium sextum.*

TEMPVS.

Primum statim inter initia veris Aprili mense flores suos ostendit, & subinde per integram æstatem. Alterum, Tertium & Quartum, Maio mense florent. Quintum Iunio et Iulio mensibus, quemadmodum etiam Sextum.

TEMPERAMENTVM.

Omniū folia & radices, primo excepto (cuius radix dulcis est quodammodo, atque adeò discutiendi vi prædita) adstringunt ac siccant.

VIRES EX DIOSCORIDÈ.

Radix Geranij primi in vino drachmæ pondere pota, vteri inflationes discutit. Secundum nullum habet in medicina vsum.

EX PAVLO.

Geranium quod folijs respondet Anemonæ, radicem habet siculentam, quæ cum vino drachmæ vnius pōdere supra, vteri inflationes dissolvit. Altera Geranij species in re medica inutilis est.

EX PLINIO.

Primæ Geranij speciei radix, reficientibus se ab imbecillitate vtilissima. Bibitur contra phthisin drachma in vini cyathis tribus bis die. Item contra inflationes, quæ & cruda idem præstat. Succus radices auribus medetur. Opisthoronicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum.

APPENDIX.

Et si secundum Geranij genus à Dioscoride alijsque nō nullis: tanquam nullius in medicina vsus damnatum sit, tamen posterior ætas quotidiana experientia in sanādis vulneribus & fistulis, eius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit: proinde eas herbas his ipsis in potu mirificè conferre tradunt. Et certè non mirum est: earundem vires olim fuisse ignoratas, cū & aliarum multarum plātarum facultates, quas cōstat esse hodie notissimas, veteribus fuisse incognitas, notius sit quā ut demonstrari debeat. Antiquus quoque herbarius, prædictorum Geraniorum folia magnam vim obtinere in glutinandis vulneribus, & articulorū doloribus leniendis tradit. Primi aut radicem mouendi urinam facultatem habere ait, ideoque calculosis, stranguariæ & difficultati urinæ prodesse. Tertiū genus ad oris, mamillarum, pudendorumque vlcera sananda vnicè conducit. Reliqua similiter ad glutinanda vlcera mirificè prosunt. Nullum verò ad sanguinem vndeunque emanātem compescendum præstantius sexto est, vnde etiam Germani, ut comprehensum est, [Blutvvurtz,] hoc est sanguinariam radicem appellare voluerunt.

De Gongyle. Cap. LXXVII.


NOMINA.

T *Ογγύλη* ἢ *γογγυλίς* Græcis, Rapum Latinis & Officinis, Germanis [Ruben] Gallis *Naueau rond* appellatur. Græci autem à figura eius, quæ plerunque rotunda esse solet, vocabulum detorserunt. Nanque quod in rotunditate coactum est, vel in orbem circumagitur, *γογγυλίς* dixerunt. Rapa verò, quod ex terræ rure, quasi ruapa, Varrone teste nominata est.

GENERA.

Rapi duo sunt genera. Vnum satium, quod simpliciter Germani [Ruben] vocāt. Galli verò *Rane ou naueau blanc de iardin*. Estque id iterum duum generum, Vnum candidum, quod Germani etiam [Vveif rueben] vocant: & alterum rubrum, [Rot rueben] iidem appellant. Galli *Rane ou Naueau rouge de iardin*. Alterum sylvestre, quod vulgus Rapunculum, quasi paruum rapum, Germani [Rapuntzel] nominant. Galli *Reponces ou Repouchon*.

FORMA.



Rapum satium album. *Rapum satium rubrum.*

Rapum satium caule & folijs Raphano simile est, floribus verò & siliquis, in quibus semen profert, Napis aut, Brassicis. Sylvestre, frutex est cubitali altitudine, ramosum, in summo læue, folia nimirū læuia habens digitali latitudine, aut maiora. Semē in calyculatis fert siliquis: dehiscentibus verò seminum inuolueris, alia intus capitū specie est siliqua, in qua semina parua nigra sunt, sed quæ fracta intus albicent. Flos eius in purpureū vergit colorem. Radix digitalis serè est. Quæ delineatio prorius alludit ad hanc herbam, quam vulgus Rapunculū nominat, siquidem cubitalis est, fruticosa, ramosa, folio digitali, nigro in siliquis semine, quod cum frangitur album intus apparet. Flos etiam

o ij pur



*Rapum sylvestre siue
Rapunculus.*

purpurei coloris est, radixque digitum magna ex parte magnitudine constat.

LOCVS.

Satiuum, solum putre & solutū desiderat. Sylvestre in aruis nascitur passim.

TEMPVS.

Satiuum rapū floret æstate, ac filiquatur sub inde. Sylvestre aut verno quidem tempore, priusquam in caulem attolitur, acetarijs frequenter inferi solet, erutum radicitus cum folijs iam recens enatis, quo sanè

tempore à pueris etiam agnoscitur. Deinceps verò exit in caulem & adolescit, ac Iunio mense flores, ac subinde semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Rapa calida sunt in secundo ordine, & humida in primo.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Satiui rapæ elixa radix nutrit, inflat, carnem flaccidā generat, Venerem stimulat. Decocto eius podagræ ac perniones fouentur. Iptā etiam radix trita illita prodest. Si verò quispiam in excauata radice rosacem ceratum feruenti cinere liquefecerit, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti eduntur ciendæ vrinæ accommodi. Semen in antidota & theriaca, præsertim quæ dolores mitigare possunt

possunt, aptè additur. Potum venenis aduersatur. Venerè concitat. Muria conditum, comestum minus nutrit, sed appetentiam excitat. Syluestre rapum miscetur medicamentis quæ ad detergendam faciem reliquumque corpus, ex lupinorum, aut tritici aut lolij, aut erui farina conficiuntur.

EX GALENO.

Rapi semen venerem excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic & radix concoctu difficilis est, inflatq; & semen generat. Succus ex ea in corpus digestus temperato crassior est: ideoque si quis ultra modum esitauerit, & maxime si perfectè conficere eam nequeat, crudum succum in venis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quando bene fuerit percocta, ut quæ longam elixationem requirat, optimaque sit bis decoctione perpeffa. Siu crudior ingeratur, concoctioni pertinacius resistet, pariet inflationes, & stomachum infestabit, nonnunquam etiam mordere illum non verebitur.

EX PLINIO.

Rapo vis medica inest. Perniones feruens impositum sanat. Item frigus pellit è pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum tussum cum sale cuiusque vitio pedum. Semen illitum & potum in vino contra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis verò antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ipsum abdicauit in cibis propter inflationes. Diocles magnis laudibus extulit, etiam venerem stimulari ab eo professus. Item Dionysius: magisque si cruca condiretur. Tosta quoque articulorum dolori cum adipe prodest. Syluestri ad læuigandam albicandamve cutem in facie totòque corpore vtuntur, mixta vrina pari mensura. Eius succus circa messem exceptus, oculos purgat, medetur caliginì admixto lacte mulierum.

EX SIMEONE SETHI.


Admodum nutriunt rapa, vrinam ciunt, inflant, genitalia semen gignunt, fauces leniunt atq; thoracem. Crebrior

illorum vsus crassum humorem generat, & obstructions iccoris parit. Ventrem nec sistunt, nec mouēt. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum & haustum magna copia, venerem suscitāt. Fertur quodd si quis hoc ipsum semē cum Calamintha & Lemnia terra commixtum sumat, eo die neque veneno, neq; morsu venenati animalis lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quapiam proprietate medetur.

ADNOTATIO.

Rapum satium Auberuillianum Parisijs commendant, radice tuberosa multum è terra extante. *Rapum syluestre* nobis cum Dioscoride *Rapuntium* dicitur.

De Gingidio. Cap. LXXVIII.



Chærefo-
lium.

Chæreso-
liū vnde
dictum.

Gingidium siue Chærefolium.

NOMINA.

Iγγιδιον Græcè, Gin-
gidium Latine, offi-
cinis Chærefolium, Ger-
manicè [Kerbelkraut]
Gallicè *Cerfueil* ou *Sal-
mille* dicitur. Chæreso-
lium autem, græca voce
& Latina coalescētibus
in vnum nomen, ob id
dictū est, quodd folijs lu-
xuriat. Ne tamē vocabu-
lorū vicinitas aliquā pa-
riat

riat confusionem, imperitòq; lectori nomenclationum similitudo imponat, sciendum est officinarum Chærefolium diuersum esse à Chærefolio Plinij.

FORMA.

Herba est syluestri Pastinacæ similis, tenuior tantùm & amarior. Radicula subcandida, amaricante. Vnde satis liquet herbam quam hodie Chærefolium nominant, esse Gingidium. Nam erraticæ Pastinacæ folium æmulatur, aliquantò tenuius: radicula subalba, amaricante, floribus candidis, semine in filiquis exiguis oblongo, angusto & acuminato.

LOCVS.

Pasim hodie in hortis colitur.

TEMPVS.

Maio mense floret, & subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Sicut gustu amaritudinem & adstrictionem præfert, sic temperamento quoque ipso caliditatem & frigiditatem. Secundum verò vtranque qualitatem desiccatorium in secundo ordine est: vnde iterum colligi potest, Chærefoliũ esse Gingidium, quòd ipsum gustui amarorem & adstrictionem euidentissimè repræsentet.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Crudum & coctum olerum modo esui idoneũ est. Editur etiam sale conditum seruatumve. Stomacho vtile. Vrinam ciēt. Decoctum eius cum vino potum, vesicæ accommodum est.

EXGALENO.

Estur Scandicis modo. Stomacho mirè vtile siue crudum, siue elixum libeat sumere. Longioris decoctionis impatiens est. Nonnulli ipsum ex garo oleoque esitant. Alij vinum aut acetum adiiciunt, ac multò sic magis stomacho conducit. Cum aceto assumptum, fastidiosos ad cibum inuitat. Perspicuum verò est hanc herbam medicamentum magis esse quàm cibum, quippe quæ adstrictionis & amaritudinis non obscuræ nec exiguæ particeps est.

EXPLINIO.

Coctum crudumque stomachi magna utilitate estur. Siccat enim ex alto omnes humores eius.

APPENDIX.

Facultates iam commemoratas etiam Chærefolio suo tribuunt recentiores: scribunt enim mirifice conferre ventriculo, ciendisque mentibus, vrinæ in vino decoctum, vt iterum hinc consistet à Gingidio non esse diuersum.

De Genista. Cap. LXXIX.

NOMINA.

Geneſta.
Geniſta
unde di-
ſta.

Geniſta
nō eſt ea-
dem cum
Sparto.

Geniſta Latinis rei rutiſticæ ſcriptoribus & Plinio nominatur. Officinis & barbaram ſectantibus medicinam. Geniſta & Geneſtra. Germanis [Giniſt vel Geniſt] Gallicè *Genet* appellatur. Geniſtram autem vocant haud dubiè quòd genu modo flexillis ad nexus ſit: vel, vt alijs placet, quia genibus medeatur dolentibus. Alia autem eſt

à Sparto, quòd hoc virgas habeat longas ſine folijs, vt ſuo dicemus loco, illa autem minutis folijs ſcatet.

*Geniſta.*

FORMA.

Geniſta fruticat ramis herbaceis, ſcabris, folijs minutis ſcatentibus, flore, luteo, apibusque gratiſſimo, ſemine lenticulis haud abſimili, quod ſiliquis innasceſcit, radice ſublutea.

LOCVS.

Per arida loca amat, idèòque in ſyluis, & iuxta ſyluas naſcitur.

TEM

TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mense, ac subinde in filiquis hirsutis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & ficeat in altero ordine, id quod amaritudo quam gustata refert, & eius facultates abunde docent.

VIRES EX PLINIO.

Semen Genistæ purgat Ellebori vice, drachma & dimidia pota in aquæ mulsæ cyathis quatuor ieiunis. Ramis similiter cum fronde in aceto maceratis pluribus diebus & tussis: succum dant ischiadicis vtilem, cyathi vnius potu. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere clystere. Perunguntur eodem succo ischiadici, addito oleo. Quidam ad stranguriam vtuntur semine. Genista tusa cū ax ungia, genua dolentia sanat.

APPENDIX.

Ex iam commemoratis verbis perspicuum omnibus fit, Sparto & Genistæ non obstante quod forma nonnihil distent, eandem inesse facultatem: vt enim Spartum pituitâ per superna & inferna purgare potest, sic etiam Genista. Hinc aded fit vt eius seminis hodierno tempore contra podagram magnus sit vsus. Vrinam etiam amaritudinis ratione mouet, & quia incidendi & extenuandi facultatem habet, lapidem tum in renibus, tum in vesica confringere, vt etiam recentiores tradunt, potest. Strumas denique atque alios tumores discutere posse ijdem scribunt.

De Genistella. Cap. LXXX.

NOMINA.

PRIORI non admodum dissimilem herbam nonnulli Genistellam vocant, quod scilicet Genista exilior & humilior sit. Germanicè appellari potest. [Die stechedne Ginst.] Alij vocant [Erdpfrymen, oder klein streichbluomen] Gallicè *Petit Genet*. Sūt qui nō sine magno errore pro Genista vtātur, quū facultatibus diuersis pedita sit. Sūt qui
Rosma

Rosmarinum aculeatū nominent, quòd eius folia Rosmarino ferè similia sint.

FORMA



Frutex est Libanotidis coronariæ, quam Rosmarinum vocant, penè folio, sed rigido ac pungente, flore luteo, piso non dissimili, semine in exiguis siliquis rufo, radice sublutea.

LOCVS.

Nascitur in arenosis locis, secus vias.

Genistella.

TEMPVS.

Maior mense flores luteos producit, quibus pastæ apes improbum mel conficiunt.

TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde valenter, simulq; citra mordacitatem exiccatem.

VIRE S.

Semen eius serpentibus aduersari tradunt. Decoctum foliorum, profluuium menstruorū sistit. Idem etiam potū ventris fluori succurrit. Et ut rem in pauca contraham, idem Genistella, quod Hippuris seu Cauda equina potest,

Adno

ADNOTATIO.

Genistella nobis frequens.

De Gnaphalio. Cap. LXXXI.

NOMINA.

T *Ναφάλιον* Græcis, Centunculum aut Centuncularis herba Latinis nominatur. Officinis ignota. Germanis [Rhuorkraut] appellatur, Gallis l'Herbe velue. Gnaphaliū verò vocata est hæc herba Galeno autore, à candidis molibusque eius folijs, quibus *ἀντὶ γναφάλοις* hoc est, pro tomentis vtuntur. Gnaphalion itaque dicitur, quasi tomentitia. Centūculum autem dixerunt, quod centonibus cum tomento maxima sit cognatio. Germanicam nomenclaturā ab eius facultate aduersus dysenteriam illi inditam esse nemini non notum est.

GENERA.



Dū esse videtur generum: vnum enim paulò latioribus ac cādidioribus folijs constat, alterū verò tenuioribus & minus candidis: quòdque flores in summitate ac cacumine tantū profert. Verū cū forma parum admodum, facultatibus verò nihil distent, nos vna pictura genus utrūque complexi sumus.

FOR

Gnaphalium sine Centūculum.

FORMA.

Candida & mollia Gnaphalium obtinet folia, atque adeò tomentitia, floresque luteos, radicem vero capillatam ac tenuem, vt pictura ipsa monstrat.

LOCVS.

Vulgaris herba vbique scatens Gnaphaliũ, in locis siccis potissimũ, interdum etiam pinguibus proueniens.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Adstringit atque adeò exiccat Gnaphalium.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Gnaphalij folijs aliqui pro tomento vtuntur. Tamen faciunt hæc ipsa in austero vino pota ad dysenteriam.

EXGALENO.

Folia Gnaphalij mediocriter adstringunt, ac proinde quidam id exhibent ex austerorum vinorum quopiam dysentericis.

EXPLINIO.

Dantur in vino austero ad dysenteriam, ventris solutiones, mensesq; mulierum sistit. Infunditur autem tenasmo, Illinitur & putrescentibus vlcera.

ADNOTATIO.

Gnaphalium Latinis Tomentum, officinis Cotonaria.

De Dipsaco.

Cap. LXXXII.

NOMINA.

Δ *Ixx* & Græcis, Labrum Veneris, Carduus veneris Latinis. Virga pastoris officinis, & Cardio fullonum dicitur. Germanis [Kartendistel, Buobenstrel, Vveberkerten] Gallicè *Chardon à carder*, alijs *Verge à Bergier*, ou *Chardon à Foullon*. Dipsaci autem nomen à contrariis inuenit, quoniam concauo alarum sinu rorem vel imbrem recipiat, quo velut ad abigendas sitis iniurias abutitur. Labri veneris nomenclatione à carinato foliorum habitu contraxit, quæ se anfractuosa sinuantia ambage, peluis vel lauacri speciem

ciem constituunt, & intra se humorem nunquam non retinent. Virga pastoris haud dubiè dicta est, ob longas virgas, quibus cardui ad poliendos pannos vtiles insident, quas pastores fortè sumunt, & ea parte qua possit manu capi aculeis nudant, reliqua autem aculeata parte gregem ducunt. Carduus verò fullonius cœpit appellari, quòd ea rudibus pannos velut echino quadam expoliunt, detrahisque floccis concinnant. Errat mirum in modum Serapionis interpretes, qui sub Virgæ pastoris nomine, Polygonon Dioscoridis delineat.

Virga pa-
storis

Carduus
fullonius.

Serapio-
nis inter-

pres per-
stringi-

tur.

GENERA.



Dipsacus albus.



Dipsacus purpureus.

Duum est generum. Vnum quod à fullonibus in hortis plantatur, alterum quod sua sponte passim prouenit. Differunt inter se hac quidem ratione, quòd primū folia latiora & profundius in ambitu incisa, flores candidos, echina-
taque

etque capitula magis aculeata habeat : alterum contra angustiora & minus laciniata folia, flores purpureos, capitulaque minus aculeata obtinet. Nos discriminis illius rationem habentes, primi generis appellauimus *Dipsacum album* Gallicè *Chardon à carder blanc*. alterius verò *Dipsacum purpureum*. Gallicè *Chardon à foulon rouge*, ad florum nimirum respicientes diuersitatem.

FORMA.

Aculeatarum generis est hæc herba. Caulem habet altum, spinis horrentem, folia caulem amplectentia, lactucæ similia, in singulis geniculis bina, oblonga, aculeis armata, quæ in dorsi medio veluti bullas intus & extrâ spinosas habent, concauo quo se in geniculis coniungunt sinu, quo aquæ, rores, & imbres asseruantur, Vnde *Dipsaci* quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singulis surculis capitulum vnum echino simile inest, oblongum, aculeatum, quod postquâ exaruerit candidum apparet. Dissectum per mediâ medullam caput, vermiculos habet. Quod si itaq; contempleris eam quam herbarij hodie *Virgam pastoris* & *Carduum fullonum* nominant herbam, offendes omnes huic notas respondere. Siquidem hæc pastoria virga profert caulem binum cubitorum, imò qui sæpiuscule supra hominis altitudinem increseat, spinis horridum, geniculatum, folia lactucæ, in singulis geniculis bina, prælonga, aculeata, quorum toruli bullantibus turgent spinis, dorsoque nocentibus aculeis rigent, carinato alarum sinu, qui peluis vel labri modo roris & imbris pluuij capax sit. Gnaræ laticis huius auiculæ, cū solis ardentissimus opprimit æstus, huc appellantur ad satianda sitis desideria, illis facta bibendi potestate anfractu liberalem potum ministrante. Scaporum fastigia echinato minuantur vertice, resupina hamulorum flexura, mucronibusq; leuiter vncinatis, quibus rude lanificium aspero ductu lenigatur. Singuli echini è rotundo in oblongum quodantenus turbinantur, inter quorum spicula candicans aut purpureus emicat flos. His dissectis in medio vermiculos idētidem nobis in autumno quum exicari incipit, licet inuenire. Vermiculus autem albus est, qui
per

per cavitatem echini dimouetur, & in caudicem transit. Hyeme etiam eundem videre licebit antequàm præfrigore moriatur. Imò etiam veris initio in quibusdam, vermiculi à nobis reperti sunt, partim viui, partim mortui.

LOCVS.

Nascitur humidis locis, iuxta riuos aquarum & fontes: quapropter nonnulli Dipsacon à Græcis nominatum esse arbitrantur.

TEMPVS.

Carpitur in æstate, Iunio & Iulio potissimū mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Dipsaci spinæ radix ex secundo ordine exsiccantium est, habetque nonnihil abstersorium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius radix cum vino decocta & tusa vsque dum cerati crassitudinem accipiat, imposita rimas fistulasque sedis sanat. Oportet autem medicamentum hoc ærea pyxide recodere. Ferunt præterea formicis & verrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi & collo aut brachio appensi, quartanas sanare produntur.

EX PLINIO.

Sanat rimas sedis, item fistulas decocta in vino radice vsque dum sit crassitudo ceræ, vt possit in fistulam mitti. Item verrucas omnium generum. Quidam & alarum, quas modo diximus, succum ijs illinunt.

APPENDIX.

Aliæ facultates quæ à Serapionis interprete & alijs recentioribus illi conceduntur, non sunt genuinæ, sed spurix, & Polygono adscribendæ.

ADNOTATIO.

Dipsacus satiuus & erraticus nobis est.

De Daphnoide. Cap. LXXXIII.

NOMINA.

△ *Aqvous* Græcè, *Daphnoides* Latine nominatur, Officinis & nostræ ætatis herbarijs, græcam imitantibus vocè, *Laureola*. Germanis. [Keilant, & keidelpast.]

Laureola

p Gallicè

Gallicè *Laureole* nuncupatur. *Daphnoides* autem & *Laureola*, à *Lauriforma* & specie, quam in folijs & fructu refert, dicta est.

FORMA.



Daphnoides siue Laureola.

Frutex est cubitalis, ramos complures habēs Lauri instar flexiles, à medio sursum versus foliosos. Cortex ramos vestiens admodum glutinosus lentusve est. Folia Lauro similia, molliora ramen, tenuiora, nec facile fragilia, os & fauces erodentia, incendiariaque. Flores candidi. Fructus ubi ematuruerit subniger. Radix inutilis. Quæ in vniuersum omnes notæ Laureolæ hodie dictæ conveniunt. Nec obstat quod Dioscorides suæ *Daphnoidi* candidos tribuat flores, cum Laureola purpurascētes potius

habeat: solet enim color secundum diuersas regiones in eadē sepe herba mutari, ut fusiùs in *Symphyto* maiore dicemus. Et certè nihil incōmodi erit si etiā Laureolæ flores quispiā candidos dixerit, cū albi coloris nō minor quā purpurei in ijs portio reluceat. Verisimile quoque est Dioscoridē ab extremo potius colore, quàm medio flores appellare voluisse.

LOCVS.

Nascitur in montanis & sylvestribus locis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere antequam folia erumpunt. Fructum autem autumnoprofert.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Calida est admodum & sicca.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Ducit per inferna pituitosa siccum aut recens Daphnoidis folium. Vomitus & menses cit. Commanducatum capitis pituitas elicit. Sternutamenta itidem mouet. Purgant etiam seminis eius pota grana quindecim.

EX PLINIO.

Daphnoides siue syluestris laurus aluum soluit, recenti folio vel arido drachmis tribus cum sale & hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus. Stomacho inutile. Sic & baccæ quinquæ denarve purgationis causa sumuntur.

APPENDIX.

Animaduertendum hoc loco mirum in modum errare officinas, propterea quod folijs Daphnoidis pro Mezereō (quæ tamen Græcorum est Chamelæa diuersa admodum à Daphnoide) vtantur: & eius fructu pro cocco cnidio, quod fructum Thymelææ esse notius est quam vt demonstrari debeat. Sic in manifestissimis cecutire solent officinæ, pulchrè interim ad eos errores conuiuentibus medicis, non minus quam illi, rei herbariæ imperitis. Thymelæam verò non esse laureolam hodie appellatam herbam, ex eo colligi potest, quod hæc ipsa, Dioscoride autore, linum nonnullis nominata sit, non alia quidem ratione, quam quod satiui lini similitudinem referat: cui quàm dissimilis laureola sit, nemo non nouit. Sūt etiam qui ad hanc similitudinem respicientes, in hodiernum vsque diem linum syluestre appellant.

ADNOTATIO.

Laureola herba faciens viduas.

De Dryi.

Cap. LXXXIIII.

NOMINA.

△ Pñe Græcis, Quercus Latinis & Officinis, Germanis [Eychenbaum] Gallicè *Chesne* Appellatur.

P ij FOR

*Quercus.*

FORMA.

Notissima est arbor Quercus, procera, crâssi ore & asperiore caudice, ramosa, folijs profundè laciniatis. Glandes producit optimas, & grandissimas gallas: item & viscum. Radix eius latissimè circûiacentem terram amplectitur.

LOCVS.

Passim in syluis alijsque locis nascitur.

TEMPVS.

Vere quidem germinat, sed tardiùs multis alijs arboribus.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat, adstringit & excalfacit paulò infra media, in genere scilicet eorum quæ tepida sunt.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Quercus omnis adstrictoriam facultatem habet, præsertim id quod inter corticem & caudicem membranæ simile clauditur: quinetiam membrana putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dyntericis & sanguinem excreant

creantibus, & in pefsis tritum contra fluxiones mulierum apponitur. Glâdes idem poffunt. Vrinam ciunt, capitis dolorem, & flatus comestæ pariunt. Refiftunt efitatæ venenatorum iſtibus. Decoſtum corticis cum lacte bubulo potû, contra toxica prodeſt. Crudæ autem tritæ & illitæ inflammationes leniunt. Ad malignas duritias, & malefica vlcera cum adipe ſuillo falſo conueniunt. Galla fructus eſt quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, præ ſe ſe ſens formam in digitis articulorum, ſolida, nullo foramine peruia. Altera leuis, plana, perforata. Eligi debet omphacitis quæ efficacior eſt. Vtraque vehementer adſtringit. Carnium excreſcentias tritæ, fluxiones gingiuarum & colu mellæ, atque in ore aphthas reprimunt. Nucleus earum cauernis dentium indigus, dolores ſedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent, & vino aut aceto, aut oxalme extin&æ, ſanguinem reprimût. Decoſtum earum ad inſeſus vtile, contravulux procidentias, fluxionéſque. Capillos denigrant aceto aut aqua maceratæ. Cœliacis, dyſentericis, cum vino aut aqua trita conuenienter illinuntur aut bibûtur. Vtiles & obſonijs mixtæ, aut integræ in aqua præcoſtæ in qua aliquid coquendum ſit quod ipsis conferat. In ſumma, galla vtendum quoties opus eſt adſtrictione & exiccatione.

EX GALENO.

Quercus omnes partes adſtrictoriæ facultatis participes ſunt: Sed plus tamen quæ in trunci cortice membrana ſub eſt, tum quæ ſub glandis putamine, ea videlicet quæ fructus carnem conueſtit. Quamobrem ad fluxum muliebrem ſanguinis expuitiones, ventriſq; diuturnos fluxus, commodâ eſſe credunt. Maximè verò ea vtuntur decoſta. Siquidem ego quâdôq; glutinaſſe me vulnus memini ſecuti inſiſtû, quum nullum ad manum eſſet medicamentû præter ipſius Quercus folia. Terebam verò in læui ſaxo. & vulnus cum circumiacentibus locis illinebâ. Eandem folijs vim habet & fructus Quercus: eoque medici nonnulli ad incipientes, & crescentes phlegmonas vtûtur. Nam quæ iam vehementes ſunt, adſtringentibus haud indigent. Galla quæ ompha

p iij citis

citis nuncupatur, admodum acerbum est medicamentum; plurimum terrenæ & frigide substantiæ particeps, per quâ desiccatur & reprimat fluxiones: adhiæc cōstringit cōtrahitque partes laxas ac languidas, omnibusque fluxionum affectibus strenuè resistit. Est verò tertij in desiccando, secundi autè in refrigerando ordinis. Altera aut galla, flaua, laxa, & magna, exiccat quidem etiam ipsa, sed tantò, quantò, acerbæ qualitatis minus est particeps. Cocta itaque ipsa per se ac deinde trita cataplasma non instrenuū esse sedis phlegmonarū, ac procidentiarū. Porro coquenda est in aqua, si modica opus sit adstrictione: sin vehementiore, in vino. Et si augere insuper adstrictionem sit opus, vino etiam vtare austeriore. Denique gallæ combustæ sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex vstione assumūt, suntque: ijs quæ ignem nō expertæ fuerint, tū subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Cæterum quū ad sanguinis suppressionem præparare eas voles, carbonibus impositas dum vndequaque candeant, aceto aut vino extinguere oportebit.

EX SIMEONE SETHI.

Glandes difficilis sunt coctionis, & valde nutriunt, tardius descendunt, crudosque humores generāt, proptereaque illarum vsum deuitari præcipimus.

De Dauco. Cap. LXXXV.

NOMINA.

Δ *Αὔκ* Græcè *Daucus* Latine nominatur. Officinæ alijs & adulterinis herbis sub hoc nomine vtūtur, germanicas appellationes in generum explicatione indicabimus.

GENERA.

Dioscorides tria Dauci cōmemorat genera. Primū *Creticum daucum* vocat. Germanis [*Bervurtz*] propter capillatam radicem, aut quia vteri dolorem, qui iisdem [*Bermuter*] appellatur, sanat. Galicè *Carotte sauuage*, ou *Panet sauuage*. Alterum nomine peculiari caret, folijs *La serpitio* simile

mile, Germanis [Vucisz Hirtzvurtz] dicitur.

Tertium genus idem nomine destituitur proprio, Germanis autē nonnullis [Schvvartz Hirtzvurtz] noiatur.

FORMA.



Daucus creticus.



Danci alterum genus.

Creticus Daucus folia Fœniculo similia habet, minora tamen & tenuiora. Caulem dodrantalem, umbellam Coriandro similem. Flores candidos, & post hos semen acre, candidum, hirsutum, & in commaducando odoratum. Radicem crassitudine digitali: & longitudine dodrātalī. Omnes huius descriptionis notæ, herbæ quā [Bervvurtz] Germani vocant, conuenire ad vnguē videntur, vna duntaxat excepta: siquidem semen non est hirsutū. Sed quum omnia alia, atque adeò facultates etiam ipsæ respondeant, non est cur vna hæc nota nos impediat, cur minus Creticum dau-

p iij cum



Dauci tertium genus.

umbella erraticæ Pastinacæ similis est, semine oblongo plenum, sapore vt Cuminum acri.

LOCVS.

Primum in petrosis & apricis locis nascitur, nusquam verò in Germania copiosius, quàm in Martianæ syluæ quibusdam pratis prouenit. Reliqua duo genera in altis montibus gignuntur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent.

TEMPERAMENTVM.

Semen Dauci admodum calefacit & exiccat. Idem etiâ, sed minori efficacia, facit herba.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Omnium Daucorum semen calefaciendi vim obtinet. Potum, menses, fœtus, & vrinas mouet. Torminibus liberat. Tussis diutinas lenit. Succurrit phalangiorum morfibuscum vino potum. Oedemata illitum discutit. Ex alijs, seminis tantum vsus est ex Cretico, radicis etiam, quæ cum vino præsertim ad venenata bibitur.

EX GALENO.

Dauci semen efficax admodum, tum mouendæ vrinæ medicamentum, tum prouocandis mensibus. Multum etiam discutere foris impositum valet. Ipsa etiam herba eandem vim obtinet, semine tamen inferiorem, nimirum ob aquæ humiditatis misturam.

EX PLINIO.

Vehementer vrinam impellit. Creticum magis contra serpêtes pollet. Bibitur è vino drachma vna, datur & quadrupedibus percussis, aduersatur phalangio, capitis dolori medetur, tussi subuenit, stranguriæ medetur drachma seminis. Eius radix in vino pota, dysenteriam sistit. Cõtusis & euersis potum duobus obolis, in mulsi cyathis tribus subuenit, aut si febris adsit in aqua mulsa. Menses & secundas potum facillimè pellit. Calculos eijcit. Folia, omnia tela infixacorpori extrahunt.

ADNOTATIO.

Dauci primum genus nobis tantum frequens.

De Dracontio Magno. C. LXXXVI.

NOMINA.

Δ *Ράκοντις μεγάλη, ἢ δρακόντιος μήτρα* Græcis, Dracunculus maior Latinis, nonnullis Serpentaria maior dicitur. Officinis ignota herba: Germani [Schlangekraut,] Galli *Serpentaire, ou Serpentine* vocant. Nomen autem à *Serpente* sumpsit: caulis enim glaber, purpureisque respersus luteis, versicolori facie, corpus anguinum repræsentat, & æquat longitudine. Vertex quoque sinuoso oris hiatu linguam exerens cruentam, caput exprimit. Atque hinc est quod veteribus etiam Romanis Colubrina, ac Serpentaria

Serpentaria maior
Dracunculus vnde dicta.
Colubrina.

nuncupata sit: vel sic dicta, Plinio autore, quòd è terra ad primas serpentium vernationes exeat, rursusque cum iisdem se in terram recondat, nec omnino occultata ea appareat serpens.

FORMA.



Dracunculus maior.

Caulem habet glabrum læuúmque, rectum, bicubitalem, baculi crassitudine, versicolorem, vt angui similis videatur purpureis etiam maculis abundat. Folia fert Rumicis inflexa, & plicata. Fructum in summo caule racemosum, coloris inter initia cineracei, postea quàm maturuit crocei & punicei. Radicem grandem, rotundam, candidam, tenui cortice vestitam. Ex qua delineatione omnibus perspicuúm fit, plantã eam cuius picturam exhibemus, esse Dracunculum maiore. Simplici enim caule attollitur, binum cubitũ alto, læui glabròve, recto, baculi crassitudine versicoloribus anguium

guinum maculis variegato, purpureis etiam intercurfantibus lituris, ita ut planè serpentis habitum coloremque mentiri videatur. In vertice comoso folia prodeunt sena septenave, crassiore pediculo digitorum modo propendentia, puniceis respersa notis, Rumicis primi generis figura. E foliato scapi fastigio, vagina quædam foris herbacea profilit, in mucronem sensim turbinata, velut erupturi partus inuolucrum, quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento differenta disilit in rimam, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensque perit relicto cornu. Cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis primo virètibz, dein croceo & puniceo colore rutilantibus. Radix denique magna, rotunda, alba tenuique cortice vestita, Et in summa, nulla est prorsus nota, quæ reclamare videatur.

LOCVS.

Nascitur in opacis sepibus.

TEMPVS.

Carpitur semen cum maturitate nigrescit, Radix per messem effoditur, hoc est, Iulio mense, aut initio Augusti.

TEMPERAMENTVM.

Dracunculus acris & amarus est, leuiculamque quandam adstrictionem habet, ut calidam & siccam esse nullus dubitare possit.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Radix calefaciendi vim obtinet. Tosta & elixa cum melle delincta orthopnoicis, ruptis, cõuulsis, tussibus, & destillationibus prodest. Pota cum vino Venerem stimulat. Concisa & ex melle illita, vlcera maligna atque phagedænica expurgat, præsertim cum vite alba. Ex ea & melle collyria ad fistulas, & foetus euocandos componuntur. Ad vitiligines cum melle efficaciter illiuitur. Polypus & carcinomata absumit. Succus eius ad oculorum medicamenta: item contra nubeculas, albugines, caliginemque utilis est. Odor herbæ radicisque, recens conceptos abortu vitiat. Idem præstant triginta grana eius in posca pota: sunt qui eius succum

cum cum oleo aurium doloribus infudere. Quin etiā folia eius, vt pote adstringentia, vulneribus recentibus imposuerunt, in vino autem cocta permionibus. Ferunt nō ferri à vipera eos q̃ folia manibus affricuerint, aut radice gestauerit.

EX GALENO.

Dracuntium quiddam Aro persimile habet, tum folijs, tum radice. Acre etiam est & amarum, tenuiumque partiū. Obtinet quoque leuem quādam adstrictionem, quæ quandoquidem cū prædictis duabus qualitatibus, acri scilicet & amara, coniuncta est: medicamentū factum est vtique maximè efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimum & lentos humores extenuans. Optimumque remedium est contumacium vlcerum. Expurgat extergetq; strenuè tum alia que extersionem desiderāt, tum alphas cū aceto. Folia quoque, vt pote similem facultatem habentia, vlceribus, vulneribusque recens inflctis accommodata sunt, & quantò minus fuerint sicca, tantò magis conglutinant: nam quæ sicciora sunt, viribus sunt acrioribus quàm vt vlcneribus conueniant. Creditum est cascum humidum, si illis folijs tectus reponatur, ob temperaturæ illorum siccitatem, à putredine conseruari. Fructus valentior est, nō folijs tantum, sed & radice: proinde & caneros, & polypodas eliquare creditus est. Succus quoque eius vitia oculorum expurgat. Dracuntij radicem bis tērvē elixam quo omnem exuat medicamentosam vim, in cibo interdum Ari modo exhibemus, quū crassi ac glutinosi thoraem pulmonemque infestantes humores fortiore vi expellendi veniunt.

EX PLINIO.

Omnino habentem Dracunculum serpentes fugiunt. Ideò percussis prodesse in potu maiorem aiunt, vt & menses, si ferro non attingatur, sistat. Succus eius & aurium dolori prodest. Reliquas facultates in Ari descriptione offendes. Videntur enim veteres Arum cum Dracunculo minori miscuisse.

APPENDIX.

Hæc est vera, Serpentaria, qua officinis vtendum erit, & minime ea, quam alio nomine Bistortam vocant. Nam viribus

ribus planè ab ea, quæ genuina est dissidet, vt suo etiã loco monuimus. Quare non est cur deinceps eandem medicamentis quæ thoraci expurgando adhibentur, admisceât medici: sed hanc potius, cuius picturam oculis subiecimus.

ADNOTATIO.

Dracunculus Serpentaria vulgò.

De Daphne alexandrina.

Cap. LXXXVII.

NOMINA.

Δ *ἡ δάφνη ἀλεξάνδρεια*, ἢ *ἰδαία* Græcis, *Laurus Alexandrina*, aut *Idæa* Latinis, officinis *Vuularia*, nonnullis *Bonifacia*, multis etiã *Pagana* lingua, Germanis [*Zapfenkraut* *hauckblatt*, & *auffenblatt*] dicitur. Theophrastus appellat *ἰπιφύλλιον* quod fructum super folijs ferat. *Alexan*

drinam autem *Laurum* dictam putamus, quòd *Alexander* victor ea v-sus fuerit. Hinc est quod *Apuleius* hanc *Victoria* leni nominet, quòd nimirum victores ea pro *Laurò* in triumphis & *Victoriae* signum vterentur: quanquam in eo ca-pite *Daphnoida* cū *Victoria* la confundat. *Idæa* verò ab *Ida* monte, quo in loco speciosior & copiosior nascatur.



Laurus Alexandrina.

FORMA,

Folia *Ruscus* seu *Myrto* sylvestris similia habet

bet maiora tamen, molliora & candidiora. Fructū in medijs folijs fert rubentem, Ciceris magnitudine. Ramos spargit à terra dodrantes, & aliquando ampliores. Radicem Rusco similem, maiorem tamen, odoratam, & molliorem. Ex qua sanè delineatione satis perspicuum fit, eam herbā cuius picturā damus, esse Laurū Alexandrinā. Folio siquidem Myrti sylvestris, sed ut Plinius li. xv. cap. xxx. ait, acutiore, molliore & candidiore. fructu inter folia rubro, magnitudine Ciceris, ramulis à terra sparsis dodrantalibus, radice sylvestri, Myrto proxima, odorata & molli.

LOCVS.

Nascitur in locis montanis, & in Ida mōte, ut comprehensum est, speciosissima. Nunc adfertur ex inferiore Panonia, atque in nonnullis hortis plantata prouenit.

TEMPVS.

Fructum in æstate in medio folij, in geniculo alterius folij quod maiori supernascitur, profert.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod gustus euidenter monstrat: siquidem gustantibus acris simul & subamara est.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix eius pota pōdere senum drachmarum cum dulci vino, difficulter patientibus, & stillicidio vrinæ laborantibus succurrit. Sanguinem quoque menstruum elicit.

EX GALENO.

Pota tum vrinas, tum mentes prolicit.

EX PLINIO.

Celeres partus facit, radice pota trium denariorū pondere, in vini dulcis cyathis tribus. Secundas etiā pellit mensesque eodem modo pota.

APPENDIX.

Recentiores in faucium vlceribus, & humecta supra modum columella vtuntur. Hinc est quod nonnulli appendant hanc herbam pueris, ut nimia illorum humiditas exicetur.

ADNOTATIO.

Laurus Alexandrina bilingua & Bonifacia, mihi ex Germania

mania delata visa est, qualis hic pingitur.

De Digitali. Cap. LXXXVIII.

NOMINA.

QVOD appellatione tum Græca, tum Latina, herba hæc hodie destituta sit, nulla alia de causa factum existimamus, quàm quòd veteribus incognita fuerit. Nos pulchritudine eius illecti, ἀνώνυμον esse diutius non sumus passi. Appellauimus autem Digitalem, alludentes ad Germanicam nomenclaturam [Fingerhuot,] sic enim Germani hanc stirpem nominant, à florum similitudine, quæ digitale pulchrè referunt ac exprimunt. Hæc appellatione utemur, donec nos vel alij meliorem inuenerint.

GENERA.



Digitalis purpurea.



Digitalis lutea.

GENE

G E N E R A,

Duum est generum. Vna enim purpureos obtinet flores ideoque Digitalem purpuream appellauimus. Germanis [Branner Fingerhuot] dicitur. Altera luteos habet flores, ob id Digitalis lutea dicta nobis est. Germanis [Geeler Fingerhuot] nominatur. In alijs per omnia similes sunt.

F O R M A.

Herba est cubitalis, folijs latis & oblongis, Plantagini non dissimilibus, in extremitatibus serratis, floribus à lateribus caulibus ordine dependentibus, digitalis formam referentibus, purpureis aut luteis. Quibus decidentibus, semen in calycibus latum & oblongum profert. Radix illi est exigua & capillata.

L O C V S.

Nascitur in montibus vmbrosis & saxosis locis.

T E M P V S.

Floret Iulio potissimum mense, atque subinde cadentibus floribus semen producit.

T E M P E R A M E N T V M.

Impensè amara est herba, perinde atq; Gentiana, vt hoc nomine calidam & siccam esse euidentissimum sit.

V I R E S.

Hæc herba hand dubiè quum opus est extenuatione, absterfione, purgatione, & obstructionis liberatione, efficax admodum esse solet. Nam, vt testatur Galenus libro quarto, de Simpli. med. faculta. cap. xvij. amari sapores abstergunt, & expurgant, & quæ in venis est, crassitiem incidunt. Quamobrem menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, & ex thorace & pulmone pus educere. Quid multa? potest hæc herba ferè omnia, quæ Gentiana, cuius vires suo in loco inueniunt studiosi,

De Ephemero nõ lethali. C. LXXXIX.

N O M I N A.

Eφῃμερον, ἢ ἱρίς ἄγρια Græcis, Ephemeron, Iris sylvestris Latinis dicitur. Cùm autem, Galeno, Paulo, & Dioscoride testibus, duo sint Ephemeris genera, alterum, quod Colchi

Colchicon à natali solo dicitur, interficiens, de quo suo locop plura: Alterum quod non lethale est, & præcipuo nomine Ephemerum dicitur. Hic de secundo, nempe non interficiente, nobis sermo duntaxat erit. Ephemerum autem nominatū est, nō quòd eadē die iugulet (nulla enim ei vis mortifera inest) sed quòd flos illius coeſtim marceſcat, nec longius vno & altero die commoretur. Vulgus & officinæ Liliū conuallium, quòd in opacis & lucis naſcatur, appellant. Germani [Mayenbluemle] Gallicè *Grand Muguet*.

FORMA.



Ephemerum non lethale.

ne, longam, adstringentem & odoratam. Nec obſtat quòd nunquā aut rariffimè apud nos reperiatur radix quæ unini digiti craſſitudinē æquet: Dioſcorides enim cum alicui

Caulem & folia Lilio ſimilia habet, tenuiora tamen. Flores candidos amarosq;. Fructum mollem. Radicem vnam digitali craſſitudine, longam, adſtringentē, odoratā. Quæ ſiquidē delineatio ita herbæ illi quæ vulgus Liliū cōualliū nominat, conuenit, vt nullā prorsus in ea ſit nota, quæ ei nō reſpondeat. Caulem enim & folia Lilij habet, ſed tenuiora. Flores cādidos & ſua uiter olentes, guſtu amaroſi, Fructū mollem, colore puniceum, aſparagi fructui non diſſimilem. Radicem ſingularem digiti minimi craſſitudi-

q herbæ

herbæ aut radici mensuram tribuit, id facit vt maiori parti indiuiduorum illius speciei quadret, nec adeò statam mensuram assignat, quin quandoque infra aut supra hanc esse possit. Cui hoc etiam accedit, quòd magnitudo secundum diuersas regiones in vna eadẽmq; herba sæpe variatur, ita vt nihil mirum sit radices nostri Ephemerì, paulò quàm illius quam Dioscorides vidit, minores esse.

LOCVS.

Nascitur in syluis & vmbrosis locis.

TEMPVS.

In Maio mense flores illius magna copia erumpunt, ac mox iterum euanescent atq; decidunt. Deinde Iulio mense fructus profertur Asparago haud dissimilis, vt dictũ est.

TEMPERAMENTVM.

Mistæ est temperaturæ, Galeno teste, nempe repellentis & discutientis, quia scilicet radix adstringit, florẽsque amari sunt.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius radix in dentium doloribus remedio est, si decocto eius colluuntur. Folia in vino decocta et illita, œdematata & tubercula, quæ nihil adhuc puris contraxerunt, discutiant: τὸν enim & οὐ τὸν legendum, vt ex Galeno liquet.

EX GALENO.

Ephemerum non illud lethale, quod etiam Colchicum nominant, sed alterum, quod & Irin agrestem vocat, folia & caulem Lilio similem obtinet, radicem oblongam, non rotundam ceu Colchicum: digiti autem potissimùm crassitudine est, adstringens & boni odoris. Ex quibus palàm fit quòd mistæ sit facultatis, nempe repellentis, & halitu digerentis. Testificantur verò id quæ particulatim addit opera. Siquidem nō inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Folia tuberculorum tum augmento, tum vigori congruunt. Oportet autem in vino decocta, priusquàm pus moueas, illinire.

EX PLINIO.

Radicem vnã digiti crassitudine obtinet, dentibus præcipuam

cipuam concisam in aceto, decoctamque vt tepido colluatur. Et ipsa etiam radix mobiles sistit, cauis & exesis imprimatur.

APPENDIX.

Recentiores roborare cor, iecur, cerebrumque tradunt. Hinc est quod eius succum aut decoctum syncopa, vertigine, morboque comitiali correptis, attonitis, & phreneticis exhibeant. Cæterum incipienti elephantia, ne latius serpat & alius radices agat, viam præcludere scribunt. Ocularij medici ad oculorum caligines discutiendas eo etiam vtuntur.

ADNOTATIO.

Ephemerum non lethale quod nonnulli hemorocalles, alij Lilium conuallium, alij grand Muguet dicunt.

De Elenio Cap. XC.

NOMINA.

Eλυσιον Græcis, Elenium & Inula Latinis, officinis Enula, rusticis Campana, vulgo, iunctis vtriusque vocabulis Enula campana dicitur. Germanis [Alant] Gallis, *Aulnee*. Elenium aut ab Helenæ lachrymis, è quibus natū fabulantur, quidam dictum esse volunt. Alij quoniam cōtra serpentes ex eo primum ab Helena remedium inuentum sit.

FORMA

Caulem ex se mittit Elenium crassum, hirsutum, cubitalem, & aliquando maiorem (interdum enim iustam hominis staturam altitudine æquat) angulosumque. Huic superne lutei flores insident, & in his semen Verbasco simile, tactu pruritus excitans. Folia angustifolia Verbasco similia obtinet, lanuginosa tantum & oblōga. Radicem subrusam, odoratam, magnam, subacrem, ex qua ad confisionem Liliorum aut Ari instar, pingues propagines appendicæ seu auferuntur, Hæ siquidem notæ Enulæ campanæ vulgo dictæ pulchrè quadrant, neque obstat, quod non in cunctis

q ij Græ



*Elenium siue Enula cam-
pana.*

Græcis exēplaribus oēs illæ habeantur, cū in nonnullis, ijsque probatissimis saltem legātur. Sic Marcellus Virgilius Florētinus in suis, quos ædidi in Dioscoridem commentarijs testatur, sibi visum esse antiquissimum ac probatissimū codicem, in quo adhuc omnes seruentur. Et certè nihil absurdum commitemus, si nonnullas Dioscoridē notas subticuisse dicamus, cū euidentissimum sit Inulam nō passim vna forma predictam nasci, quando, eodē Dioscoride teste, in quibusdā locis caulē haud emittat: in irriguis denique procerior & elegan-

tior, quā in siccioribus proueniat. Huc accedit quòd alias sæpe notas etiam admodum necessarias prætermittat.

LOCVS.

Nascitur mōtanis, vmbrosis, & siccis locis. In hortis etiā passim hodie plantatur.

TEMPVS.

Radix æstate effoditur, & concisa siccatur. Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Elenij radix nō primo statim occurso excalefacit, ac proinde nō dicenda est calida & sicca exactè, ceu mel & piper album, sed cū recrementitio humore.

VIREs

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radiciſ Elenij decoctum potum, vrinam & menſes ducit. Ipſa denique in eclegmate cū melle ſumpta, tuſſi: orthopnœæ, rupturis, conuulſionibus, inflationibus, venenatorum morſibus prædeſt, calefaciendi vi quam in vniuerſum habet. Folia eius in vino cocta, iſchiadicis vtiliter illinuntur. Radix etiam Elenij in paſſo condita, ſtomacho vtilis eſt. Si quidem ſalgamarij paululum ſiccata eam, mox decoctā frigida aqua demergunt, poſtremo in defrutum coniectā ad vſum recondunt. Ea trita & pota ſanguinem excreantibus auxiliatur.

EX GALENO.

Elenij radix maximè vtilis eſt. Eclegmatis quæ faciunt ad educendos lentos & craſſos qui ſunt in thorace & pulmone humores commodè miſcetur. Rubrificant quoque ea partes frigidis & diuturnis vexatas affectibus, cuiuſmodi ſunt nonnullæ coxarū paſſiones, iſchiadas vocant, et exigue aſſiduæque quorundam articulorum præ humiditate luxationes.

EX PLINIO.

Inula à ieiunis commanducata dentes confirmat, ſi veruta eſt, terrā non attingat. Cōdita tuſſim emendat. Radiciſ verò decoctæ ſuccus tineas pellit. Siccata autē in umbra farina tuſa, & conuulſis, & inflationibus, & arterijs medetur. Venenatorum morſus abigit. Folia ex vino lumborum dolori illinuntur.

ADNOTATIO.

Elenium vulgò cum latinis Enula campana.

De Eupatorio. Cap. XCI.

NOMINA.

EΥΧΑΙΩΡΤΟΝ ἢ ἡΠΑΤΩΡΤΟΝ, Græcè Eupatorium & Hepatorium Latine, officinis Agrimonia dicitur. Germanis] Odermenig, Bruchvurtz] Gallicè *Eupatoire, ou Aigremoine*. Eupatorium ab Eupatore rege, qui illam primus inuenit, nominatam eſſe volunt. Hepatorium verò, quoniā lecori præcipuè medeatur.

*Eupatorium.*

Fruticosa est herba, vnum interdum, alterū etiam scapum efferens, tenue, lignosum, rectū nigrum, hirsutum, cubitalem, aut etiā maiorē. Folia per interualla partibus potissimū incisa quinque, & aliquando pluribus, Quinquefolij vel cannabis potius folijs similia, nigricantia, & serræ modo in extremitatibus incisa. Semen à medio caule enascitur deorsum inclinatū, hirsutum, adeò vt siccātū vestibus hereat. Hæ delineationes adamussim nulla reclamante nota, herbæ quam vulgus & officinæ vocāt Agrimo-

niam conueniunt. Quapropter hanc verum & genuinum esse Eupatorium facile deprehendet, qui singulas descriptionis partes diligenter expendet. Siquidem Agrimonia fruticosa est herba, scapum vnum aut alterum obtinens, lignosum, tenue, rectum, nigricantem, hirsutum, cubitalem vel maiusculum, Folia ex interuallis Cannabina, aut Quinquefolio similia, quinquepartita vel plurifariam incisa per ambitum serrata, & medio caule semen erumpit, deorsum spectans, subhirsutum, vt resiccatum vestibus adhærescat. Proinde præfracta quadam ac immedicabili cæcitate captos esse eos iudico, qui hoc ipsum hodie non animaduertunt.

LOCVS.

Nascitur passim locis montosis, campestribus etiā, pratis nempe, & circa sepes.

TEMPVS.

Carpitur æstate, dum floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Eupatorium herba tenuium partium, incidendi extergendiq; facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Inest ei & adstrictio modica.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Contrita huius folia & cum veteri suillo adipe impoſita, vlceribus difficilè cicatricem contrahentibus medentur. Semen aut herba in vino pota, dysentericis, icciuiorosis, & serpentium morſibus auxiliatur.

EXGALENO.

Obstructiones iecoris expurgat, & robur huic visceri addit.

EXPLINIO.

Semen dysentericis in vino potum auxiliatur vnicè.

ADNOTATIO.

Eupatorium Agrimonia.

De Euphrasia.

Cap. XCII.

NOMINA.

HAud dubiè Euphrasie herbæ nomen à Græcæ linguae imperitis pharmacopolis deprauatum est, cum olim *εὐφροσύνη* dicta sit, quod nimirum oculos (quorum caliginem discutit) delectet. Ad quod nomen Germani nostri pulchrè alludentes [Augentrost,] hoc est, oculorū solariū appellant. Nonnulli hac quoq; ratione moti ophthalmicam & oculariā nomināt Galli *Lumillette* ou *Euphrase* Officinæ, vt ferè in omnibus alijs herbis, corruptam vocē retinentes, Euphrasiā vocāt. Etsi autē herba hæc Græco & elegantiori nomine donata sit: nihil tamē de ea, q̃ scia, apud veteres Græcos & Latinos, nēpe Dioscoridē, Plinium, Galenū, adde etiā recētores, Actiū, Paulū, & Actuariū scriptum

q̃ iij) reſpe

reperitur. Cùm verò appellatio ipsa Græcam testetur originem, videtur sanè à Buglossoveterum mutuata et desumpta esse: Vt enim hoc in vinum coniectum animi leticiam parit, atq; adeò *ὑψηλοῦρον* dictum est, ita etiam illa, quia oculos iuuat & delectat *ὑψηρόν* appellari cœpit. Quam subinde vocem imperiti linguæ, vt diximus, deprauantes, in Euphrasiam verterunt.

FORMA.



Euphrasia.

Herba est parua, palmæ vnus longitudine, Hyssopo similis, cauliculis purpureis, folijs exiguis, per ambitum serratis, flosculis albicantibus, ra- dice exigua & inutili. Nec obstat quòd Hermolaus, immensæ eruditionis vir, libro iij. capite decimo octauo sui Corollarij, luteolos esse dicit: is enim ad partem duntaxat florum respexit, quæ lutea esse euidenter apparet. Certè si flores Euphrasiæ exquirè cōsideres, neq; prorsus luteos, neque in vniuersum etiam candidos esse depræhendes: tri-

bus enim coloribus, nempe purpureo, candido & luteo, vt pictura ipsa ostendit, maculati sunt. Quum verò potior florum pars candido colore constet, factum est vt sermè omnes herbam hanc depingentes, albos illi assignarint flores: nobis autem hos candicantes dicere placuit.

LOCVS.

Nascitur in apricis collibus, & pratis ferè omnibus.

TEMPVS.

Inter autumnii initia magna copia erumpit.

TEMPERAMENTVM.

Quas particulatim facultates obtinet, abundè dotent calidam & siccam esse herbam.

VIRE S.

Vtuntur ea ad oculorum caligines & suffusiones, vel per se imposita, vel ex vino decocta. Memoriam etiam oculorùmque aciem redacta in puluerem, & in vino albo pota, mirificè roborat, amissamque reparat.

De Eleliphaco.

Cap. XCIII.

NOMINA.

EΛΙΣΦΑΚΟΝ Græcis, Salvia Romanis & officinis. Germanis [Salbey] appellatur. Porro cùm ipsa herba semper retorrida & exucca videatur, factum est vt Græcis Eleliphacon, quasi in labem redacta, vel in syderationē flaccescens dicta sit, ΕΛΙΣΦΑΚΟΝ & ΕΦΑΚΟΝ vocibus in vnam coalescentibus appellationem. Est autē ΕΦΑΚΟΝ seu potius ΕΦΑΚΟΝΙΟΝ malum in plantis, quum per æstatem & ardentissimum canis æstū vi solis altiùs penetrante, humorēque quo nutriuntur deficiente, languent & arescunt. Latini syderationem nomināt. Salvia autem dicta Latinis, quòd ad multa, præsertim ad fœcunditatem, salutaris. Gallicè, *Saulge*.

GENERA.

Duo sunt Salviæ genera, quemadmodum etiam plebei abundè nouerunt. Vnū quod priuatim Eleliphacon dicitur, squalidius folio & scabrius, lacunosa facie præasperū multò latius, quasi cultum senserit, adeò vt domestica aut hortensis Salvia dici possit. Nos euidentiori distinctione vsi, Saluiam maiorem nominauimus. Germani etiam [groß oder breyt Salbey] Galli *Saulge* vocant. Alterum folio leuius et contractius, quasi sylvestrem ob id referat figuram, sylvestris Salvia appellari potest: minùs etiam squalore oblitum est. Nos Saluiam minorem diximus. Germani

groß Salbey, oder klein Salbey, oder spitz Salbey] Galli *Saulge franche ou menue* nominant. Dioscorides vtrunq; genus sub vno Elelisphaci nomine complexus est, quòd scilicet facultate nihil dissent, sed idem prorsus efficiant.

FORMA.

*Salvia major.**Salvia minor.*

Frutex est oblongus, ramosus, quadrangulus & candidas virgas habes, Folia nali Coronei effigie, oblongiora tamẽ, asperiora, & crassiora, quæ sensim attritarũ vestium modo hirsuta, subalbida vehemẽter odorata, sed virosa sunt. Semẽ in summis caulibus sylvestri Ormino simile gerit. Hæc descriptio, nulla prorsus reclamãte nota cum herba, quam *Salviam* vulgò vocant, quadrat: nanque ea fruticosa est, rugo

rugosis folijs, extritarum latenter vestium asperitatem scabritiemve referentibus, incanis, vehementer odoratis, purpureo, in spica flore, in aquilini rostri speciem falcato, semine sylvestris ormini, vt pictura graphicè monstrat.

I. O C V S.

Nascitur in locis asperis, & vtrūque genus hodie passim in hortis inuenitur.

T E M P V S.

Carpitur in Iunio & Iulio mensibus quando nimirum floribus & semine prægnans est.

T E M P E R A M E N T V M.

Elleisphacos euidenter exalfacit, ac leuiter adstringit.

V I R E S E X D I O S C O R I D E.

Foliorum ramorumque decoctum potum vrinam cit, menses foetusque extrahit. Pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur, Capillos denigrat. Vulneribus herba utilis est, sanguinemque compescit. Feriua tetræve vlcera purgat. Pudædorū pruritus foliorum & ramorum decoctum cum vino, si eo abluantur, sedat.

E X A E T I O.

Tradunt quidam suffitam Saluiam menses immoderate fluentes, & omnino muliebri profluuium cōpescere: Agrippa sacram herbam vocauit, quam prægnantes mulieres: si fluidæ laxæque fuerint, vtilissimè comedunt: continet enim conceptum, vitalemque reddit: ac si succi huius heminam cum modico sale, quarto à secubitu die, mulier potauerit, deinde viro misceatur, proculdubio concipiet. Aiūt in quo dam Aegypti loco post sæuas pestilentias ab his qui super sunt, ad cum succum bibendū mulieres cogi, plurimosque inde produci foetus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem expuentibus succi Saluiæ cyathos duos, ieiunis cum melle bibendos, & sanguis illico cohibetur. Tabidis pilulæ in hunc modum parantur, Spicæ nardi, Zingiberis singu. drach. ij. seminis Saluiæ assati, triti & cribati drach. viij. Piperis longi drach. xij. cum succo Saluiæ pilulas conficito & mane ieiunis drachmā vnā exhibeto: eodemque modo in vespe re, ac postea aquæ puræ quippiam propinato.

EX PLINIO.

Menses Salvia cit & urinas. Pastinacæ marinæ ictus sanat. Torporem autem inducit percusso loco. Bibitur cum Absinthio ad disenteriam. Cum vino eadem commorantes menses trahit. Abundantes sistit decocto eius potio. Per se imposita vulnerum sanguinem cohibet. Sanat & Serpētium morsus. Et si in vino decoquatur, pruritus testium sedat. Partus emortuos apposita extrahit, itē vermes aurium. Ad tussim laterisque dolores bibitur, Cōtra scorpiones eadem & dracones marinos efficax. Cōtra serpentes quoque ex olco perungi ea prodest.

ADNOTATIO.

Salvia minor nobis, Franca diditur.

De Serpillo Cap. XCIIII.

NOMINA.

Eρυσσος Græcè, Serpyllum Latinæ Officinæ Latinū nomen retinuerūt, Germanicè [Quendel, Kinlin, Hünner Kœl] Gallicè *Serpolet ou Poliot* appellatur. Serpyllum aut, ut autor est Varro, ab eo q̄ serpat tam Græcis quam Latinis dictū est, quoniam si qua eius particula terram attingit, inibi radices demittit. Est enim ut Theophrastus libro sexto de plantarū historia capite septimo ait, propriū quoddam eius ramulorum incrementum, quippe cū possit in quantam voluerit quispiam longitudinem trahi, ad ictū illi pedamento aliquo, aut si prope sepes plātetur, aut ex altiore loco aliquo deorsum demittatur: sic enim in longum protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura quod in longum serpit, Græci & latini peculiariter Serpyllum nominarunt.

GENERA

Duo eius genera. Hortense, quod germanicè [heymischer Quendel] dicitur. Sylvestre, quod prutātum Zygis vocatur quod fortè eo iugarentur vites: Ζυγίς enim Græcis interdum idem quod Latinis ligare & vincere significat. Germanicè simpliciter [Quendel] dicitur. Nos sylvestris tantum serpylli pīcturam damus.

For

FORMA.

*Serpyllum.*

Hortense nō dissimi-
le est Origano, potissi-
mum quōd ad folia &
Ramulos ipsos attinet,
quos cādidiores tantū
habet: odore tamē pror-
sus Sāpiychum repræ-
sentat. Repit humi, &
in rectum non attolli-
tur. Sylvestre contrā hu-
mi nō serpit, sed rectū
exilibus ramulis & li-
gnosīs attollitur. Rutæ
folijs plenis, angustiori-
bus tamen. Flotculos ha-
bet subpurpureos, gu-
stu acres, odore iucūdo,
Radicem multifidā. Plī-
nius secus quā Diosco-
rides, hortense serpyllū:
nequaquā, sylvestre ve-
rō humi serpere asserit,

adēdō vt subesse in hoc mendam verisimile sit: res enim ipsa
& viuæ herbarum imagines satis testantur Dioscoridis sen-
tentiam esse veriorē. Dioscoridi subscribit Aetius. Neque
mirū est magis humi reptare cultū, quod infirmius humo-
ris copia est, atque adēdō ramis inualidioribus stare nequit,
quā sylvestre, quod illo rigidius ac lignosius existit.

LOCVS.

Hortense non nisi satū prouenit, & Columella teste, ne-
que pinguem, neque stercoratum, sed apriū locum desi-
derat, vt quod macerrimo solo nascatur. Sylvestre autem in
petris, collibus, & mōtibus plerisque copiosissimē nascitur,
ita vt eo quasi vestiri videantur.

TEM

TEMPVS.

Syluestre tota æstate floret, hortense autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Serpyllum gustu acre est, ob id calidū valde, ita vt menses & vrinam moueat.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Syluestre efficacius & maiori calefaciendi vi quā horten-
tense, atque ad vsum medicinæ aptius. Menses trahit, & vri-
nam cit potum: Torminibus, ruptis, cōuulsis, iecoris inflā-
mationibus auxiliatur. Aduersus reptilia, potum & illitū.
Capitis dolores sedat coctum, adiecto rosaceo, & aceto ma-
defactum: Maximè verò lethargo, & phrenitidi conuenit.
Sanguinis vomitum sedat succus eius quatuor drachmis cū
aceto potus.

EX AETIO.

Serpyllum ita calefacit vt menses & vrinam ducat. Hu-
ius genus duplex. Syluestre efficacius calidiūque hortensi
atque omnino vsus eius in medecina præfertur. Prodest.
torminibus, cōuulsionibus, rupturis, inflāmationibus ieci-
noris, reptilibusq; Potum ac illitum capitis dolores sedat.
Madefactum autem aceto ac decoctū admixto rosaceo le-
thargicis, & diutina phrenitim patientibus, summopere
congruit. Præterea drachmæ vnius pondere ex aceto bibi-
tum, sanguinis eiectiones compescit.

EX PLINIO.

Aduersus serpentes efficax, maximè Cenchrin & Scolo-
pendras terrestres ac marinas, & scorpiones, decoctis in vi-
no ramis folijsque, Fugat & odore cominus si vratur, &
contra marinorum venena præcipuè valet. Capitis dolo-
ribus, decoctum in aceto illinitur temporibus ac fronti cū
rosaceo. Item phreneticis, lethargicis, contra tormina & ie-
cinorum dolores. Folia obolis quatuor dantur ad lienem
ex aceto. Ad cruentas excreationes teritur in cyathis duo-
bus aceti & mellis.

EX PLINIO VALERIANO.

Serpyllum calidum, simul nobis vtile medicinæ vsus
osten

ostendit. Capitis dolores coctum ex aceto & rosaceo, tempori ac fronti illitum mitigat. Serpentes & omnia animalia venenata adustum nidore repellit, ideo et messoribus in cibo miscetur, vt si fatigatos fortè somnus oppresserit, tutè quiescant contra animalia, quæ hoc tēpore venenatis haufibus sæuire cōsueuerūt. Contusi puluis ex scrupulis duodecim in aqua datus, tormina emendat, vrinæ difficultates resoluit, lenis quoq; iniuriæ idem puluis ex aceto mixtus occurrit. Nec minus cruentis excreationibus subuenit, ex duobus cyathis mellis & aceto temperatum.

ADNOTATIO.

Serpillum nobis Serpolet.

De Elymo.


Cap. XCV.

NOMINA.

EΛΥΜΟ Græcis, Panicum Latinis, Germanis [Heydelpfenich, oder Fenich] Gallicè *Panic semblable au Millet* dicitur. Panicum autem à paniculis in quibus semen est, Latini appellarunt.

FORMA.

Milij similitudine profilit, dens vt plurimum folijs luxurians, culmo penè in furculum extenuato, nutante, rubido
panicu



Panicum.

panicularum fastigio, prædensis acervato granis, aliàs purpureis, aliàs rufis, nigris aliàs, item & candidis.

LOCVS.

Satum facilè quouis ferè loco provenit, leuem autem & solutam terrā potissimū desiderat. Nec in sabuloso duntaxat solo, sed in arena quoque nascitur, modo humidum cœlum, vel riguum sortiatur.

TEMPVS.

Quadragesimo die postquā satum est absolui, vt omnia æstiuā, inter omnes conuenit. Quocunque igitur tempore satū fuerit, vbi semine prægnās erit, tum carpandū venit.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat, præsertim si foris illinatur.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Milij similitudinem refert, eodēmq; modo in panes desingitur, & ad idē accommodatum est, minus tamen quā Milium nutrit & adstringit.

EXGALENO.

Panicum facultate pauci nutrimenti, & exiccatoria. Sistit quoque nonnihil ventris fluxus, eū ipsum etiam Milium. Panis itaque eius exigui est alimenti & refrigerans. Constat insuper præaridum & instar arenæ aut cineris friabilem esse: caret enim penitus pinguedine & lentore. Iure igitur alium humentem desiccatur. Agricola, farina huius cocta admisto adipe suillo & oleo vescuntur. Panicum in omnibus milio cedit insuauius esu, cōcoctu difficilior, ventremq; magis coereat, minusque nutrit. Huius farinam interdum cum lacte coctam, rustici veluti triticeam esitant: Clarūq; est id edulij tantò quā illud per se solum assumptum melius esse, quantò lac huius seminis natura ad boni succi procreationem, aliāque omnia, eminentius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoque ipsam in edendo suauitatem & voluptatem. Hoc namq; semen nulla gratia aut iucunditate commendatur.

EXPLINIO.

Panicum Dioçles medicus mel frugum appellauit. Effectus

Etus habet quos Milium. In vino potum prodest dysentericis. Similiter ijs quæ vaporanda sunt exalefactum imponitur. Sistit aluū in lacte caprino decoctum, & bis die haustum. Sic prodest & ad tormina.

ADNOTATIO.

Panicum nomen retinet.

De Erica.

Cap. XCVI.

NOMINA.

E *Picea* Græcis, *Erica* Latinis, [Heyd] Germanis Gallicè *Brusere* dicitur. Officinis inusitata.

FORMA.

*Erica.*

Erica fruticosa arbor est, *Tamarici* similis, multò tamē breuior. Eius flore vtentes apes, reprobū mel conficiūt. *Plinius* lib.xxiii.j.capit.xix. Fruticem esse scribit non multū à *Tamarice* differentem, colore rorisinarini, & penè folio. Id quod verè de ea *Erica*, cuius nos picturam damus, dicitur. *Theophrastus* etiā *Rosmarino* similem *Ericam* facit. Habet flores in cādidō purpureos.

LOCVS.

uis locisque arenosis nascitur.

In montibus & syl-

r. TEM

TEMPVS.

Autumno floret sola ferè in syluis.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est Erica, id quod in gustu amaritudo satis docet.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Ericæ coma & flores illita serpentiũ moribus medetur.

EXGALENO.

Discutiendi facultate prædita est Erica: flore eius potissimum & folijs vtendum.

EXPLINIO.

Ericen aduersari serpentibus tradunt,

APPENDIX.

Recentiores herbarij præter iam commemoratas, alias facultates addunt, nimirum florum decoctum lumborum ac ventris dolores lenire posse. Succum ex folijs floribusque elicatum, oculis imbecillibus guttatim instillatum, aut foris inunctum conferre.

De Erysimò.

Cap. XCVII.

NOMINA.

Eρύσιμον Græcè, Irion Latinè vocatur. Officinis nostris incognita. Vulgares herbarij non ineptè Sinapin sylvestrem, nonnulli etiam Rapistrum. Germani [Hederich & Vilden senff] Galli *Senene sauvage*, *Roquette jaune*, ou *Tortelle* appellant. Sunt qui perperam, eo quod gustu Erucam imitatur, sylvestrem Erucam nominant. Alia enim est Eruca sylvestris ab ea, quã Rapistrum nominant herba, vt suo loco dicemus. Erysimon quidam ἀπὸ τοῦ ἑρύκεν nomen mutuatum esse credunt, id est à multiplici foliorum sectione: nam Erucæ modo laciniata conspiciuntur. Alij ab oleris præstantia dictum volunt, quasi ἑρίτιμον, quod est preciosum & nobile. Mihi ἀπὸ ἑρύειν potius dictum esse videtur, quod ob suam caliditatem, maxima trahendi facultate prædita sit. Latini autem Irionem ab irruendo dixerunt, quod ignea vi, & feruido sapore irruat in gustum.

FOR

FORMA.

*Irion.*

Folia habet syluestri Erucae similia, caules lori modo flexiles, flores luteos. In cacumine siliquas corniculorum figura, vt Fœnugræci graciles in quibus semina continentur parua, Nasturtio similia, gustu feruido. Hæ utique notæ in vniuersum omnes, herbæ illi, quam pictam hic exhibemus, adamussim quadrant..

LOCVS.

Nascitur passim prope vrbes, domorū areas, rudera & hortos.

TEMPVS.

Per integram æstatē floret, autumnō autem semen in siliquis profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Erysimi hāud secus quā Nāsturtij calfacit & exiccat. Herba etiam ipsa arfacta similem semini vim obtinet. Humida tamen ac viridis, multō semine inferior est.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Erysimi semen thoracis fluxionibus purulentis, tussientibus, regio morbo, coxendicum doloribus, linctum cum melle confert. Bibitur etiam cōtra lethaliā venena. Ex aqua aut melle illitum, occultis carcinomatibus, duritijs, parotidibus, testium ac mammarū inflammationibus prodest. In vniuersum extenuat & calefacit. Mitius ad eclegina fiet

r ij si aqua

si aqua madefiat & torreatur, aut lintcolo illigatum cricum
lita pasta perassetur.

EX GALENO.

Irionis semen sicut gustu Nasturtio simile apparet, ita
facultate igneum est & excafactoriū. Porro vbi in ecleg-
mate vti ex vsu est, præstat aqua præmaceratum torrere,
aut lintcolo illigatum subindeque crustæ pistorię inuolu-
tum assare. Vtile est cū eclegmatis ad promouendas crasso-
rum lentorumq; in thorace & pulmone humorū expuitio-
nes. Quin & parotidas induratas atque duritias mamma-
rum & testiculorū veteres iuuat. Refert Dioscorides, quod
cum aqua & melle illitum, oculis profit cancris.

EX PLINIO.

Vtilissimum tussientibus cum melle, & in thoracis puru-
lentis excreationibus. Datur & regio morbo, & lumborum
vitijs, pleuriticis, torminibus, cœliaci. Illinitur verò paro-
tidum & carcinomatū malis. Testium ardoribus ex aqua,
aliàs ex melle. Infantibus quoque vtilissimum. Item sedis
vitijs & articularijs morbis cum melle & fico. Contra vene-
na etiam efficax potum. Medetur & suspiriosis. Item fistulis
cum axungia veteri, ne intus addatur.

ADNOTATIO.

Erisimum in fossis huius partis urbis luxuriat propè solum.

De Helxine cissampelo. Ca. XCVIII.

NOMINA.

EΑΣΙΝΚΙΟΣ & ΜΥΛΑ. Græcis, Helxine cissampelos & Con-
uoluulus Latinis nominatur, Vulgus herbariorum &
officinæ, Volubilem mediam & Vitealem appellant. Ger-
mani [Mittelvvinden, oder Vucingartenvvinden] Gallicè
Campanette, ou Vitreole, ou Lixet. Rectè autem cissampelos
dicitur: in vineis enim potissimum nascitur, & folio hedera-
ceo. Conuoluulus verò quod crebra reuolutione vicinos
frutices & herbas implicet.

For



FORMA.

Folia habet Hederę si-
milia, minora tamę. Ra-
mulos exiguos, circum-
plectentes quodcunque
contigerint. Folia deni-
que eius scansili ordine
alterna subeunt. Flores
primũ candidos Lilij
effigie, dein in puniceũ
vergentes, profert. Se-
men angulosũ in folli-
culis acinorum specie.

*Helxine Cissampelos sine
Convolvulus.*

LOCVS.

In vineis nascitur, vnde etiam ei appellatio Cissampeli.
vt diximus, indita est.

TEMPVS.

Aestate, potissimũ aut Iulio & Augusto mensibus, floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse ex viribus quas illi veteres tribuunt, facile
conijcere licebit.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius potus, aluum subducendi faculta-
tem ootinet.

EX GALENO.

Helxine, quę & Cissampelos nuncupatur, digerendi fa-
cultatem habet.

ADNOTATIO.


Helxine Cissampelos à ligando, Liçet & Liçeron.

De Heptaphyllo. Cap. XCIX.

NOMINA.

Eπτάφυλλον Græcè Septifolium Latinè, vulgò *Formen* tilla nominatur. Sunt ex recentioribus qui perperâ Bistortam vocent. Germanicè [Tormétill Rotheil Vvurtz] Gallicè *Tormentille* appellatur. Heptaphyllon autem à septenario foliorum numero dicta est.

FORMA.



Septifolium siue Tormentilla.

Quinquefolio similima est, nisi quòd septem nò quinque habet folia, vtrinque lanuginosa, exigua, parua, serrata, caulem certis ferè interstitijs ambientia, flores luteos, radicem puniceam ac modicè intortam. Ex hac descriptione omnibus constare puto, herbam nostris Tormentillam dictam, non esse Dioscoridis Quinquefoliū. Hoc enim (vt reliqua omitta) radicem non intortam sed rectam & oblongam habet. Plinius etiam lib. xxv. ca. ix. herbam Quinquefolium incipere & de sinere cum vite scribit. Tormentilla autem non

maturè prouenit, sed cum vites iam florent. Accedit quòd hæc in montosis & syluestribus incultisque: hoc verò pratis, cultis, & aquosis in locis potius prouenit. Apuleius

¶ Rius etiam vtrinq; herbam seorsum describit.

LOCVS.

Nascitur montosis, vt diximus, locis ac syluis.

TEMPVS.

Serò ac cum iam vites florent, herba hæc apparere incipit.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores iudicant hanc herbam in tertio ordine frigidam & siccam esse. Cæterum non esse frigidam, potissimum in tertio ordine, facultates eius abundè declarant. Gustus etiam adstrictionem illam tâta frigiditate prorsus carere palàm ostêdit. Quare cùm easdem quas Quinquefolium facultates habeat, idem etiam temperamentû obtineat necesse est. Erit itaque radix desiccatoria ex tertio ordine, nullatenus tamen manifesta caliditate participans.

VIRES EX APVLEIO.

Heptaphyllo herba trita & cum oleo mixta, pedes perunges, & tertio die dolorem tollit.

EX RECENTIORIBVS.

Facultatem obtinet glutinandi vulnera. Farina herbæ vel radices ex succo Plantaginis propinatur in difficultate urinæ. Eadem respersa vulnera ad cicatricem perducit. Cum albo oui subacta & figlino decocta, datur cholericis. Foliorum vis deploratis fistulis instillatur, neq; non oculis ad discutiendas nubeculas. Ad putrescentia oris vlcera herba & radix commanducata, & in ore retenta valent. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurismatâque sanat. Et vt antea diximus, facultates ferè easdem quas Quinquefolium obtinet. Quapropter venenis resistit, dysenterias, & omnes sanguinis eruptiones compescit.

ADNOTATIO.

Heptaphyllum Tormentilla, quamvis & vulgare pentaphyllum sæpe cū folijs septem inuenitur, vt Tormentilla cum quinq;.

De Eruca.

Cap. C.

NOMINA.

Eρωμον Græcis, Eruca Latinis. Officinæ Latinum nomen retinuerunt, Germanis [Vveisz seuß] Gallicè
r uij Roquet

Roquette appellatur. Euzomos autem Græcis, quoniam iura commendat, habeâtque in eisdem peculiarem gratiam, dicta est. *Erucam* verò idco nominatam volunt quòd erodant: hæc enim ubi degustaueris, os & linguam satis acriter vellicat.

GENERA.

Duplex est *Eruca*. Vna hortensis seu sativa, quæ Germanis [zam Vucisz senff] Gallis *Roquette de Jardin* dicitur. Altera sylvestris, iisdem [Vvilder Vveisz senff] appellatur: Gallis *Roquette sauvage*.

FORMA.



Eruca sativa.



Eruca sylvestris.

Sesquipedali thyrsu confurgit sativa, folio longo, angustoque, in profundas sed rariores crenas laciniato, gustu præter modum acri, floribus pallidioribus, semine in filiquis rapi, vel sinapi, fimo, radice candida. Sylvestris folio
satiuz

fatiuæ simili, strictiore tamen & minore, flore luteo.

LOCVS.

Satiua in hortis nascitur. Syluestris Hispaniæ familiaris, prope tamē aquas prouenit magna copia. Quæ autem apud nos creditur esse syluestris Eruca, ea non est, sed Erysimon, de qua quidem herba suo in loco abundè scripsimus.

TEMPVS.

Satiua tota æstate floret: syluestris autem circa Calendas Iunij potissimùm erumpit: alio enim tempore vix reperitur.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentū Erucæ idem cum temperamēto Erysimi.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Cruda Eruca satiua largiùs comesta venerem stimulat. Idem potest semen eius, quod vrinam cit, coctionem adiuvat, aluūmq; bonum efficit. Vtuntur semine ad condimenta: Quod vt plurimo tempore seruetur, aceto vel lacte maceratum, & in pastillos digestum recondunt. Syluestris semine, homines in Hispania sinapis vice vtūtur. Est autem ad ducendā vrinā efficacior, & multò quàm satiua acrior.

EXGALENO.

Olus hoc perquam manifestè calcfacit, adeò vt non facile solūm absq; iunctis Lactucæ folijs edatur. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in venerem stimulos addere. Caput magis dolore afficiet si solum edatur.

EXPAVLO.

Eruca temperamento Erysimi similis, flatulenta est, ob quod ad venerem instigat. Semen eius vrinam quoque mouet. Cæterum syluestris domestica valentior est.

EXPLINIO.

Eruca diuersa est quàm Lactuca naturæ, concitatrix venis, idcirco iungitur illi ferè in cibis, vt nimio frigori par feruor immixtus, temperamentum æquet. Eius semen scorpionum venenis & muris aranei medetur. Bestiolas omnes innascentes corpori arcet. Vitia cutis in facie cum melle illitum, Lentigines ex aceto, Cicatrices nigras traducit ad candorem cum felle bubulo. Aiunt verbera subituris potū

ex vino, duritiā quandam contra sensum induere. In con-
diendis opsonijs tanta est suauitas, vt Græci Euzomon ap-
pellauerint. Putant subtrita Eruca si foueantur oculi, clari-
tatē restitui. Tussim infantium sedari. Radix eius in aqua
decocta, fracta ossa extrahit. Tria folia syluestris Erucae,
sinistra manu decerpta, & trita in aqua mulsā si bibantur,
venerem stimulant.

ADNOTATIO.

Eruca nobis Roquette.

De Eupatorio adulterino. Cap. CI.

NOMINA.

NVM herba hæc veteribus Græcis & Latinis cognita
fuerit, & quō nomine ab ijsdem appellata sit, mihi
nondum constare ingenuē fateor. Officinæ tamen serē o-
mines pro Eupatorio vero (cū tamen non sit) haud sine



Eupatorium adulterinum.

magno errore vtuntur.
Hinc cū nomen aliud
nō esset quo illam appel-
larem, Eupatoriū a-
dulterinū nominare pla-
cuit. Germanicè [Ku-
nigundkraut], hoc est
herba S. Kunigundis vo-
catur, [& Vasserdost]
Gallicè *Eupatoire bastard*
ou aquatic ou Eupatoire
des Arabes, ab Origani
similitudine : & quōd
iuxta aquas proueniat.
Alijs [Hirtzenklee], ꝑ
vulnerati cerui sibi hac
medeantur herba.

FORMA.

Caulem ædit rotun-
dum

dum, purpureum, geniculatum, solidū & hirsutū, circa quē
 alæ panduntur, folia lōga, Canabinis ferē similia, amara-
 que. Flores in summo paruos coaceruatos, in cādido pur-
 purascentes, tādē in pappos tenues abeūtes. Radicē mul-
 tis fibris capillatā, & inutilem. Errāt haud dubiē qui herbā
 hāc Dioscoridis Hydropiper esse putāt. Nam & si ferē tota
 eius herbæ facies, floribus demptis, Hydropiperis delinea-
 tioni respondeat, tamen quia nulla prorsus piperis in folijs
 aut floribus acrimonia apparet, non est cur Hydropiper di-
 ci possit aut mereatur:

LOCVS.

In fluminū ripis, alijsque locis humidis nascitur, potissi-
 mū verò iuxta residues aquas, aut tardo fluxu prorrepentes.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu vehemēter amara est, vt calidā & siccā esse in se-
 cundo ordine, aut in medio tertij non sit dubium.

VIREs.

Haud dubiē herba hæc abstergit, expurgatque, & quæ
 in venis est crassitiem incidit: quamobrem menses & vrinas
 mouet, educendoque ex thorace pulmonēque puri auxi-
 liatur, aliasque facultates amari saporis, quas recenset Ga-
 lenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvij, obtinet. Potest
 itaque obstructions iecoris & lienis aliarumque partium
 corporis soluere. Ex recentioribus sunt qui hanc Vulnera-
 riam esse tradūt, neque temerē: id ipsum enim posse, siccitas
 eius testatur. Suffitū præterea eius herbæ venenatas fuga-
 re feras ijdem scribunt. Euidētissimum verò est hanc etiā
 contra venena esse admodum efficacem.

ADNOTATIO.

Eupatorium adulterinum quod haclenus officina celebrat.


De Erebintho. Cap. CII.

NOMINA.

EPIBIVΘ Græcè Cicer Latine. Officinæ Latinū nomē re-
 tinuerūt, Germanice [zysslern] Gallicè *Pois chiches*. no-
 minatur. GE

G E N E R A .

Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum, & nigrum. Nos ex ijs tribus nigri, tantum picturam damus. Differunt potissimum in floribus: hoc enim ut cernis purpureos, album verò candidos flores producit.



Cicer nigrum.

F O R M A .

Cicer sativum caule est lignoso, obliquo, foliis exiguis, multis, circinatis, flore albo vel purpureo, siliquis rotundis, radice tenui & non admodum longa.

L O C V S .

Pullo crassoque solo gaudet.

T E M P V S .

Floret Iunio & Iulio mensibus atque subinde in siliquis semen producit.

T E M P E R A M E N T V M .

Calidum & siccum est primo in ordine.

V I R E S E X D I O S C O R I D E .

Cicer sativum bonam facit aluum, urinā cit, inflationes parit, cutis colorem comendat, menses & foetus educit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium & myrmecias. Ad scabiem, acoras, impetigines, ulcera concrescentia & maligna, cum hordeo & melle. Alterum
genus

genus arietinum nominatur. Vtrūque cit vrinas, dato cū Rosmarino contra regium morbum & cutem subeuntes a quas eorum decocto. Lædunt autem vesicam exulceratam & renes. Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna singula earum capita eminentiâsve singulis Ciceribus tâgere, deligataque in lintheolo semina illa post se abijcere, vt acrochordones decidant.

EX GALENO.

Cicer legumen est flatuosum quod nutrire potest, alio mouendæ habile, ciendæ vrinæ idoneum, & semini generando aptum. Prolicit verò & menses. Porro quod vocatur arietinum, cæteris efficacius vrinam prouocat. Decoctum eius, calculos renum confringit. Reliquum autem Cicerum genus, quod Orobiæū vocant, eadem vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Lienem & iccur, & renes expurgant, scabiésque & impetigines extergunt. Parotidas & testes induratos discutiunt. Maligna etiam vlcera cum melle sanant.

EX SIMEONE ANTIOCHENO.

Cicera difficulter concoquuntur & excrementa gignunt. Vncrem stimulant, magisque quàm fabæ nutriunt, obstruções tollunt, & menses educunt. Habent salsam simul & dulcem qualitatem, & ob salsuginem ventrem mouent, propter dulcedinem autem vrinam. Inflationes quoque faciunt, & lac gignunt, extergendiq; facultatem obtinēt. Nigra, medicamentosam vim habent: vrinā euim vehementissimè mouent, & calculos renū & vesicæ frangunt. Nullū verò legumen sic vt Cicera, præcipuè aut nigra & parua, lapides frangere potest. Id verò magis eius ius: quod tamen vesicæ morbis supra cætera legumina officit. Cicera verò rubra calidiora & crassiorū sunt partiū quā alba. Omnia aut vrinā ducunt. Madefacta nocte vna in aqua & sumpta, lūbricos eiciunt, sed qui vititur, sex ieiunct horas oportet. Imposita vt cataplasma parotidibus, molliūt & discutiūt tumorem. Farina horū aceto subacta, & scabiosis inūcta prodest. Ius eorūdem ictericos iuuat, & vrinam albā reddit. Oportet verò ijs neque ante cibum, neque post vti, sed in medio.

De Echio. Cap. CIII.

NOMINA.

Eχιορ, ἡ ἀλκιβιάδιον Græcis, Echion & Alcibiadicum Latinis dicitur. Officinis ignotum. Vulgares herbarij syluestre Buglossum nominant, quos sequentes Germani [Vuld Ochsenzungen.] Galli Buglosse sauvage ou espece de langue de bouc appellant. Echion autem dictum volūt quod contra ferarū ictus sit vtile. Alij quod florescit capitulis viperæ similibus. Rectius Dioscorides, quod semina viperino capiti similia habeat.

FORMA.

*Echion.*

Folia obtinet oblonga, aspera, tenuia, Anchusæ proxima, minora tamen & pinguia. Habet & aculeos exiles folijs adiacētes. Cauliculos tenues multos, & vtrinque foliola tenuia, pennata, nigra, minora proportionē ad cacumē caulis. Iuxta folia flores purpureos, in quibus semen est viperino capiti simile. Radix digito exilior, subnigra. Ex qua sane delineatione sole clarius fit herbā cuius picturā hic exhibemus esse Echion. Folia enim habet prælonga, hirsuta, tenuia, ad Anchusam accedentia, minora tamen, pinguiā-

que, tenuibus spinis horridula, cauliculos tenues numerosos, minutāque folia utroque latere dependentia, nigra, in summo caule minuscule, inter quæ purpurei flores

res emicant, in quibus semina viperarum capitulis similia insident, à ceruice paulatim in rostellum extenuata, tumidiore superna parte, in qua quædam prominulæ quasi sedes oculorum apparent: id quod ego hisce oculis non semel, sed iterum atq; iterum conspexi. Radix digito tenuior nigricat.

LOCVS.

Vbique ferè ad itinera, & in asperis locis nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidum esse citra tamen insignem siccitatē inde conijcitur, q̃ lactis procreatricem facultatem obtinet. Medicamenta enim, Galeno libro quinto, capite vigesimo de Simpl. med. facul. teste, quia pituitosos humores calefacientia in sanguinem vertunt, lac procreare solent.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix non solum ijs qui à serpentibus morfi sunt succurrit pota cum vino, verum etiam præsumentes eam ne feriantur facit. Idem præstant folia & semen. Sedat etiam dolores lumborum, & cum vino aut sorbitione sumpta lac proritat.

EX PAVLO.

Echion spinosa herba est, quæ non modo à serpente cōmorsis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur.

ADNOTATIO.

Echion in vñs frequens agro Parrhisino.

De Eleoselino. Cap. CIIII.

NOMINA.

Eλεοσέλινον, ἡ δὲ ποσειλινον Græcis, Apium palustre & rusticum Latinis, Germanis [Vuaßer epff, oder Eppich, oder bauren eppich.] Gallicè *Hache de maretx* nominatur. Sic dictum Græcis, quod in paludibus & aquosis locis proveniat.

FOR

FORMA.

*Ellebormus candidus.*

Plantaginis similia folia obtinet, aut Betæ sylvestris, breuiora tamen, nigriora, et colore rubentia. Caulem palmi altitudine, cauum, quum sicca ri incœperit corticibus seu tunicis inuolutum. Radices illi subsunt numerosæ, tennes, ab exiguo & oblongo capite ceparû modo prodeuntes. Quod autem Dioscorides dicit colore rubere folia, id de costis corû intelligendum erit.

LOCVS.

Nascitur in montanis locis, frigidis & asperis.

TEMPVS.

Radices eius per messem legendæ sunt.

TEMPERAMENTVM.

In tertio ordine est excalefacientium & exiccantium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Optimus habetur qui mediocriter extensus est & albus, fragilis, carnosus, non acuminatus, iuncusque, aut quum frangitur puluerulentus, exilem interiorem medullam habens, gustu non admodum seruens, neq; saluam cōfestim ciens. Huiuscemodi autē strāgulat. Purgat vomitionibus, varia educens. Miscetur collyrijs, quæ claritati oculorum officiētia purgare possunt. Mēses educit, & fœtus in vtero appositus enecat. Sternutamenta cit, & mures interficit, cū melle & polenta subactum. Carnes simul coctum minuit.

s

Datur

Datur ieiunis per se cum Sefamo, aut Prisanæ succo, aut Alicæ, aut mulsâ, aut pulte, aut lenticula, aut alia sorbitione. Pani cōpīnsitur & torretur. Apparatus & victus ratio ab ijs tradita est, qui de ratione & modo dandi eius, dicato priuatim opere, scripserunt. Potissimum autem Philonidi Siculo ab Enna subscribimus. Longum enim esset ei qui de medica materia agit, curandi quoque rationem docere. Dant enim aliqui cum copiosa sorbitione, aut succo multo, aut modicū cibum, dari præcipiētes, statim Elleborum offerūt, præsertim ijs in quibus suspecta timendâve erit strangulatio, aut corporis imbecillitas imminet: tunc enim ea sic peragitur purgatio, quod non intempestiue medicamentum corporibus cibo munitis accedat. Sedi etiam balani ex Elleboro subdatæ cum aceto, vomitiones eliciunt.

EX GALENO.

Elleborus extergentis simul & excalescentis facultatis est. Quamobrem ad alphos, impetigines, scabies, lepræque accommodatus est. Quinetiam si in fistulam callo induratum infundatur, duobus tribusve diebus callum detrahit. Dentibus si cum aceto colluantur prodest.

EX PLINIO.

Candidum veratrum vomitione, causasque morborum extrahit, quondam terribile, postea tam promiscuū, ut plerique studiorum gratia ad promouenda acrius quæ cōmentabatur, sæpius sumptitauerint. Carneadem responsurum Zenonis libris, Drusum quoque apud nos tribunorum popularem clarissimū, cui antè omnis plēbs adstans planxit, optinates verò bellum Marsicum imputare, cōstat hoc medicamento liberatum comitali morbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam ut diximus, Sefamoides admiscet. Italia veratrum vocat. Farina eius per se & mixta radiculae qua lanas diximus lauari, sternutamentum facit, somnūque. Legitur autē tenuissimæ radices breuesque ac veluti decurtatæ etiam hæ. Nam summa quæ est crassissima, cepis similis, canibus tantū datur purgationis causa. Antiqui radicem corticemque carnosissimum eligebant, quo tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis spō-

gijs opertam turgescētēque, in longitudinem sūdebāt. Deinde fila in vmbra siccabant, ijs vtentes. Nunc ramulos ipsos à radice sua grauissimi corticis, ita dantes. Optimum quod acre gustu, seruēnsq; in frāgendo puluerem emittit. Optimū præterea quod celerrimē mouet sternutamenta, sed inulro terribilius nigro, p̄cipuē si quis apparatū poturo rum apud antiquos legat, contra horrores strāgulatus, in- tempestuas somni vires, singultus infinitos, aut sternuta- menta, stomachi dissolutiōes, tardiores vomitus aut lōgin- quiores, exiguos aut nimios. Sed antiquorum vitium erat, quod propter hos metus partiū dabant, cū celerius erū- pat, quod largiūsumitur. Themistion binas non amplius drachmas donauit. Sequentes & quaternas dedere, claro Herophili præconio, qui Elleborum fortissimi ducis simi- litudini æquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire. Præterea mirum inuentum est, quod inci- sum forficulis, cortex remanet. Hoc inanito, medulla ca- dit. Hæc in nimia purgatione data, vomitiones sistit. Ca- uendū est sc̄lici quoque cura, ne nubilo detur die, quip- pe impatibiles cruciatus existunt. Nam æstate potius quā hyeme dandum, non est in dubio, Corpus septem diebus præparandum cibis acribus, abstinentia vini, quarto & ter- tio die vomitionibus, pridie cœnæ abstinentia. Album ē dulci datur, aptissimē verò in lacte aut pulce. Nuper inue- nere dissectis raphanis inserere Elleborum, rursusq; cōpri- mere raphanos, vt transeat vis, atque eo lenimento dare. Reddi post quatuor ferē horas incipit: Totum opus septe- nis peragitur horis. Medetur in morbis comitialibus, verti- gini, melancholicis insanientibus, lymphaticis, elephantizæ albæ, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, inci- piētibusq; tympanicis, stomachicis, spasticis, clinicis, ischia- dicis, quartanis, quæ aliter non desinant, tussi veteri, in- flammationibus, torminibus redeūtib. Vetant dari seni- bus & pueris. Item mollibus & sc̄minei corporis animæve exilibus, aut teneris, & sc̄minis minus quā viris. Item ti- midis, aut si exulcerata sint præcordia, vel tumeāt, minime que sanguinem excreantibus, vel latere vel faucibus. Me-
s ij detur

detur extra corpus eruptionibus, pituitę cum axungia illitum. Item suppurationi veteri. Mures polenta admixtū necat. Muscę quoque necātur albo trito, & cum lacte sparso. Eodem & psoriasis emendatur.

ADNOTATIO.

Ellebori radice sola nobis cogniti.

De Elleboro nigro adulterino. Ca. CVI.

NOMINA.

HERBAM hanc cuius picturam damus non esse verum Elleborum facillè cōstabit, si eam ad descriptionem referas. Verum quum magna pars hodie medicorum pro Elleboro nigro, neque tamen citra summam efficacitatem vtatur, adulterinum nigrum Elleborum appellare placuit. Germanis [Christvurtz] dicitur, non alio sanè nomine quā quod circa seruatoris nostri CHRISTI natalem diem flores, modò calido in loco sita sit herba, producat. Cæterum etsi genuinus Elleborus non sit, tamen non admodum ab illo abluat descriptio, nec viribus multò inferior est, vt in alterius inopia, huius vsus citra errorem esse possit.

GENERA.

Duo eius esse genera deprehendimus. Vnum quod officinæ hodie Elleborum nigrū, germani vērò [Christvurtz] vt diximus, nominant. Nos certioris discriminis causa, Elleborum nigrum adulterinum hortensem appellauimus, quod scilicet sua sponte, & nisi plantatum sit, in hortis nō proueniat. Gallicè *Ellebre noir bastard de iardin*, officinis Patavina. Alterum quod sylvestre sit, & sponte sua nascitur, Elleborum nigrum adulterinum sylvestrem nuncupauimus. Germanis [Leuszkraut] dicitur. Gallicè *Ellebre noir bastard sauvage*.

FORMA

Hortensis caulem, vel potius pediculum habet oblongū & folijs nudum, nisi in summo, vbi folia oblonga, angusta pluribusque diuisuris incisa, atque ad eò in ambitu serrata producit. Florem habet herbacei coloris. Radices tenues, nigras,



*Eleborus niger adulteri-
nus hortensis.*



*Eleborus niger adulterinus
sylvestris.*

nigras, veluti à capitulo ceparū pendentes. Sylvestris prio-
ri admodum dissimilis est, nisi quia caulem obtinet crassio-
rem, foliaque minora. Florem etiā, etsi herbaceum habeat,
tamen è medio eius, folliculi, aut siliquæ duæ aut tres, in
quibus semen est, exeunt.

LOCVS.

Hortensis, vt dictū est, passim in hortis nunc prouenit:
Sylvestris in montibus asperis, lapidosis ac sublimibus.

TEMPVS.

Hortensis hyeme, circa CHRISTI nimirū natīlē, vt
comprehensum est, floret, Sylvestris autem vere & initio
æstatis.

TEMPERAMENTVM.

Quum experientia testetur Eleborū nigrum adulteri-
s. ii) num

nūm, potissimū hortensem, eandē quam genuinus habere facultatem, idem etiam obtineat temperamentum necesse est. Calidus itaque & siccus in tertio ordine erit.

VIRE S.

Purgat perinde atque genuinus inferiorem ventrem, pituitam & flauam bilem ducens. Prodest comitiali morbo laborantibus, in melancholicis, insanientibus, articulorū doloribus correptis, & resolutis. Menses in pello subditus trahit. Fœtus necat. Porro cū illis etiā insit extergendi vis, alphas, impetigines, scabiem, leprāsque curant. Erodētibus medicamentis commiscantur. Ideoq; sylvestris non temerē q̃ pediculos interficiat, [Leijfzkraut] Germanis meis dicitur. Non verò pediculos tantū, verū etiam oues & alia animantia comestus necat.



Helxine seu parietaria.

De Elxine.

Cap. CVII.

NOMINA.

Eλξιν, ἡ πυδίκιον Græcè, Helxine & Vrceolaris Latine nominatur. Officinę vocant Parietariā, & dempta vna littera Paritariam. Vulgus Muralium & Muralium. germani [Tag vnd nacht, S. Peterskraut oder Glaszkraut] Gallicè Parietaire ou L'apari-toire. Helxine autem ab aspero semine, quod tenaci nexu vestibis adhæret, dicta est. Perdicium verò q̃ ca perdices p̃cipuè vescantur. Vrceolaris aut̃ quòd detergēdis vitreis vrceolis, vasīsque efficac sit. Mu

Muralis & Parietaria, quòd muros ac parietes natales locos sibi fecerit.

FORMA.

Cauliculos habet tenues, subrubentes, folia mercuriali similia, hirsuta: circa caules veluti exigua semina, aspera, vestibus adhærentia. Hæc sanè pictura sic plantæ illi respondet, vt nulla prorsus sit nota, quæ illi nõ adamussim conueniat. Est enim fruticosa, cubitalis, cauliculis tenuibus, leniter rubescentibus, folijs Mercurialis herbæ, hirsutis, floribus purpureis minutissimis, exili per ambitum eius semine, aspero, vestibus adherente, radice subrubra, fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, muris, macerijs, parietibus & vineis. Nunc in hortis etiam plantata prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Facultas Perdicio inest abstergerendi & constringendi cū humiditate subfrigida.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Folia refrigerandi constringendique vim obtinet, Quare illita sacros ignes sanant, condylomata, adusta, incipientes panos, inflammationes omnes, et œdemata. Succus eius cerussæ mixtus, ignibus sacris & ijs quæ serpunt malis vtiliter illinitur. Inûgitur podagris cum cerato Cyprino, vel seuo hircino. Diurnas tussis adiuuat, cyathi mēfura absorptus. Contra inflammatas tōsillas gargarissatus & illitus prodest. Auriū quoq; dolores cū rosaceo infusus iuuat.

EXGALENO.

Vim habet abstergerendi & paulatim constringendi ac refrigerandi. Quare phlegmonas omnes inter initia, & in augmento vsque ad statum sanat, maximè calidas. Quinetiam incipientibus phygetlis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoq; eius ad dolores phlegmonosos mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhymia. Aliqui etiam medicorum ijs qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerunt. Certè euidentis extergendi experi-

mentum præbet & in vasis vitreis.

EX AETIO.

Exerit alopecias & impetigines priuatim assiduè illita, Sedis hæmorrhoidas aperit, fistulis medetur, & sinus cohibet trita, cum modico sale apposita.

EX PLINIO.

Hæc inficit lanas, sanat ignes sacros, tumores, collectionesque omnes & adusta. Panos succus eius cum psimythio, & guttura incipientia turgescere. Item veterem tussim cyatho hausto. Et omnia in humido. Sicut tōssillas & varices cum rosaceo. Imponitur & podagris cum capriño seuo cerâque Cypria.

APPENDIX.

Monēdi sunt hoc loco medici, vt rectum Helxines vsum discant. Nam hætenus non rectè eam in frigidis vitijs pro fomento vsurparunt, cum refrigerandi constringendâque vim habeat. Cæterum cum abstergendi quoque illi facultas insit, potest etiam calculosis, & ijs qui difficultate vrinæ laborant exhiberi, potissimum si aliquid consimilem facultatem obtinens ei admisceatur. Sic Actius sedis hæmorrhoidas aperire tradit, si trita cum sale, cui etiam abstergēdi vis inest, apponatur. Quare qui calculosis hanc herbam propinant, eurent vt aliquid quod abstergendi facultatem habeat, commisceant.

ADNOTATIO.

Helxine Parietaria nobis.

De Erythrodano. Cap. CVIII.

NOMINA.

E^{Putposd'vop} Græcè, Rubia Latinè vocatur. Officinis Rubeam tinctorum appellant. Germanicè [Roete] Gallicè *Garance* nominatur. A rubore radiceis, quo lanæ & coria tinguntur, factum illi vtrunque nomen est.

GENERA.

Dioscoridi & alijs, duo Rubiæ sunt genera. Altera enim fatiua est, quæ Gallis *Garance cultiuee* dicitur, altera verò sponte prouenit, & sylvestris existit: nec esse videtur alia, quam

quãquã à nostris Stellaria vocatur. Gallis Garâce sauuaze.

FORMA.



Rubia satina.



Rubia sylvestris.

Caules satiuæ quadranguli, longi, asperi, similes Aparinæ, multò tamen maiores robustiorésq; folia per interualla in singulis geniculis habentes, stellarum modo in orbem circumiacentia. Fructus rotundus, per initia viridis, mox ruber, postea cum maturuit niger. Radix tenuis, longa, rubra. Sylvestris itidem caules quadrangulos, vt diximus, emittit, folia per interualla in singulis geniculis stellarum instar in orbem circumiacentia, flores candidos, radicem tenuem, longam & rubram, adcò vt suo colore tingere etiam videatur.

LOCVS.

Nascitur in plerisque nunc Germaniæ locis, agro potius
s y finum

simum Argentoratensi & Spirensi. Scritur autem propter emolumentum quod ex ea quæstuosissimum sentitur.

TEMPVS.

Aestate colligitur fructus, & subinde etiam effoditur radix.

TEMPERAMENTVM.

Calida est in secundo ordine, & sicca in tertio.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix urinam ciet, qua de causa regio morbo laborantibus cum aqua mulsa auxiliatur: item ischiadicis & resolutis. Urinam multam & crassam ducit, nonnunquam etiam sanguinem. Bibentes quidem quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ redduntur differetiam spectare. Aduersus venenatorum morsus succum cum folijs bibere prodest. Semen ex oxymelite potum, lienem absuit. Apposita radix, foetus, menses, & secundas trahit. Alba vitilignes ex aceto illita sanat.

EX GALENO.

Rubia tinctorum radix acerbæ & gustu amara est. Itaque quæcunque agere diximus ubi eiusmodi conuerint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicias: quippe quum & lienem & iccur expurget, & urinam crassam copiosamque, ac nonnunquam etiam sanguinolentam moueat. Quin & menses ciet, ac mediocriter quæ extersionem postulant, extergit: proinde vitilignes albas cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis & resolutis in potu cum melicrato exhibeant.

EX PLINIO.

Erythrodanum, quam nos Rubiam vocamus, qua tinguntur lanæ, pellēsque perficiuntur, in medicina urinam ciet, morbum regium sanat ex aqua mulsa, & lichenas ex aceto illita: & ischiadicos & paralyticos, ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix semēque trahunt menses, aluum sistunt, & collectiones discutunt. Contra serpentes rami cum folijs imponuntur. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum.

ADNO


ADNOTATIO.

Rubia sativa nobis Garance, & sylvestris frequens.

De Zea. Cap. CIX.

NOMINA.

Zea Græcis, Zea & Semen Latinis Vulgo & Italis Spelta dicitur. Gallicè Peaulte Semen autè Latini præstantia frugis appellarunt. Hinc est quòd Homerus etià hanc celebraverit dicens, *σιδορ & ἄρορα*. Quibus sanè verbis innuit aruum Zeam largiens, non vt nonnulli arbitrantur quòd vitam donet, Plinio autore.



Zea primum genus.



Zea alterum genus.

GENERA.

Duo Zeæ Dioscorides facit genera. Vnum cuius gratia in singulis tunicis seu glumis gemina, quod Græcis ἐὰν
ὁβ καὶ

ob causam *ἑῖκον* & cognominatur. Germanis hoc genus [Speitz, oder Dinkelkorn] vocatur. Alterū simplicis est grani, & Germanicè nominatur [Einkorn, oder S. Peters korn.]

F O R M A.

Primū genus culmo, geniculis & spica tritico simile est duobusque vtriculis iunctis duo grana simul fert.

Alterū culmo & spica est breuioribus, grana singula in singulis tunicis duplici ordine seu versu dispositis proferens ac in summitate aristis suis planè hordeum refert.

L O C V S.

Latum pingueque solum desiderat.

T E M P V S.

Iunio mense floret, Iulio autem maturitatem cōsequitur.

T E M P E R A M E N T V M.

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeū, quatenus ad calefaciendi & refrigerandi facultatem attinet, placidè verò exciceat.

V I R E S E X D I O S C O R I D E.

Zea magis nutrit quàm hordeū, Ori suavis est. Digesta in pabificia, minus quàm triticum alit.

E X G A L E N O.

Zea, vniversa sua facultate quodammodo in medio est tritici & hordei: itaque ex illis cognoscatur.

E X P L I N I O.

Zea farina efficacior hordeacea videtur: trimestris mollior. Ex vino rubro ad scorpionum ictus tepida, & sanguinem excreantibus. Item arteria, Tussi cum caprino seuo aut butyro. Ex Fœnogræco mollissima omnium. Ulcera manantia sanat, & furfures corporis, stomachi dolores, pedes & mammas cum vino & nitro cocta.

E X S I M E O N E S E T H I.

Zea facultatem habet proximam tritico. Est verò facilis concoctionis, bonique succi: ad hæc etiam emplastica existit.

A D N O T A T I O.

Zea spelta nobis.

De Erigeronte.

Cap. CX.

NOMINA.

H *Ἐρίγωνα* Græcis, Senecio Latinis, officinis inusitata. Germanis [Grindtkraut] Gallicè *Senecion* dicitur. Græcis autem *Erigerō* quasi vernus senex nominatur, seu citò vel vere senescens, quod celeriter in pappum & lanuginem abeat, Itaque compositione nominis, tempus simul quo floret, & floris mox deflorescentis euentum indicare voluerūt Græci, vt quo tempore quærenda, & quibus notis inuenienda esset, omnes scirent. Non igitur senectutis ratio aliqua in ea est, sed canescentes, humani capilli modo post florem eius pappij, vt à senectute denominaretur, effecerunt. Eam etiam ob causam Romani Senecionem illam vocauerunt.

FORMA.



Senecio.

Herba est cauliculo cubitali, subrubro, folijs cōtinuis, in extremitatibus *Crucæ* modo incisuris diuisis, sed minoribus multò: floribus luteis, celeriter scissis dehiscētibŭsve, & in pappo deflorescētibus: vnde & *Erigeron* dicta est, q̃ vere scilicet capilli modo flores canescāt. Radice inuili. Omnes hę *Dioscoridis* notę herbę quā Germani [*Creutz vrtz* & *Grindt kraut*] nomināt respōdere deprehēduntur. Siquidem cauliculus est illi cubitalis, sub
rub

folia continua habens, per extremitates Erucae instar laciniosa, minora tamen. Fores lutei, qui scissi statim in lanuginem abeunt. Errant toto cœlo qui Senecionem Nasturtium esse garrunt.

LOCVS.

Nascitur passim in sepibus, & circum oppida.

TEMPVS.

Vere erumpit, quo etiã tempore, vt dictũ est, canescit, & durat ferè tota æstate herbę prouentus.

TEMPERAMENTVM.

Erigeron, Paulo Aegineta autore, mixtam temperaturam obtinet: refrigerat enim & modicè discutit.

VIREŠ EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus refrigerandi vim obtinent, quapropter cum exiguo vino, aut per se illita folia, testiũ sedisque inflammationes sanant. Cum manna, tum reliquis vulneribus, tũ nẽrĩorũ quoque medentur. Idem præstant pappi per se ex aceto illiti, verũm recentes epoti strangulant. Totus autem caulis in aqua decoctus, & cum passo potus, stomachi dolores à bili contractos per sanat.

EX PLINIO.

Lanugo eius cũ croco & exiguo aque frigide trita, illinitur epiphoris; Tosta cũ mica salis, strumis. Erigetõ quoque cũ farina thuris & vino dulci, testiũ inflammatiões sanat.

ADNOTATIO.

Senecio nobis Senecyon, officinus Cardopeli.

De Hedyosmo. Cap. CXI.

NOMINA.



H Δύοσμος ἡ μένθη, Græcè, Menta Latinè dicitur. Officinæ nomen Latinũ retinuerũt. Germanicè [Mütz] Gallicè Mente vocatur. Hedyosmon Græci, quod suauem spiret odorem nominarunt. Menta aut dicta est, quòd odore suo mentem excitet, aut quòd grato, vt ait Plinius, odore mentis percurrat.

GENERA.

Mentæ in vniuersum duo sunt genera. Vna enim satiuia &

ua & hortensis est : altera syluestris & fera. Satiuz iterum quatuor præcipua sunt genera, Vna est quam Germani [Deyment] simpliciter, vel [Krautz Deyment] vocant. Altera quam iisdem [Krautz Balsam.] Tertia quæ iisdem [Balsammuntz] appellatur, & [Vnser Frauuenmuntz, oder spitz muntz:] à nostræ ætatis herbarijs Romana vel Saracenica. Quartam Germani quidā [Hertzkraut,] nōnulli [Balsamkraut] vocant. Per me tamen licebit has species (quādoquidem facultatibus similes sint) vt cuius placuerit nominare. Nobis autē vt certius discerneretur, prædictis nominibus appellare placuit. Syluestris, quæ Latinis Mentastrum vocatur, & vulgò equina Menta, Germanicè [Roszmuntz: Vuilder Balsam: oder Vuildmuntz] dicitur. Non ignoramus plures esse Mentæ species, nos tamen eas duntaxat quas vidimus, pictas exhibemus.

FORMA.

*Menta sativa prima.**Menta sativa secunda.*

FOR



*Menta sativa tertia, siue
Romana.*



Menta sativa quarta.

Sativa prima caulem habet quadrangulum, à radice lente puniceantē, & lanugine pubescentē, foliū fere rotundum, serratū, molle & odoratū, flosculos purpureos internodia geniculatim coronantes, verticillato semper ambitu.

Altera priori per omnia similis est, nisi quod illi subpurpureus flos circa cauliculorum fastigia spicatur.

Tertia folio longiore & acutiore constat, flosculis purpureis coliculorum cacuminiibus spicatim insidentibus.

Quarta item longioribus folijs est, floribusque purpureis internodia geniculatim haud secus quā in prima caules coronantibus. Mentastrū verò folijs lanugine canescētibz, atq; hirsutioribus, Sisymbrio procerius, odore magis viroso, flosculis spicatim coliculorū fastigia coronantibus.

*Mentastrum.*

LOCVS.

Satiuz passim in hortis proueniunt. Amant aprium locum, nō pinguem, non stercoratum, humidis facilius adulescunt. Sylvestris autem, quæ Métastrum alio nomine appellatur, vliginosis gaudet locis, passimque irrigua hoc Metaastro pubent.

TEMPVS.

Florent omnes mense Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Vtraque, tam hortensis, scilicet quàm sylvestris, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine excalescentium. Infirmior tamen est hortensis, minúsque calescit. Exiccat autem in secundo ordine: illi enim ex cultura aliquid humiditatis accedit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Calescendi, adstringendi, atque exiccandi vim habet Menta hortensis. Proinde sanguinem sistit succus eius cum aceto potus. Lumbricos rotundos enecat. Venerem concitat. Singultus, vomitiones, choleramque sedat duo aut terni furculi cum acidi granati succo poti. Cum polenta illita abscessus discutit. Imposita fronti, capitis dolores mitigat. Mammas quæ tenduntur, aut lacte turgent, compescit. Cū sale canum moribus illinitur. Aurium doloribus eius succus cum aqua mulsa subuenit. Mulieribus ante coitum ad-

t

mora,

mota, conceptioni resistit. Linguae scabritiem confricata lenigat. Lac coire densarique in cascum non sinit, immersis in eo folijs. In summa, stomacho utilis est, & in condimenti peculiarem usum habet. Sylvestris in sanitate deterioris usus est quam sativa.

EX GALENO.

Menta sativa ad venerem mediocriter excitat, id quod omnibus inest, quae humiditate semicocta & flatuosa participant. Denique in abscessibus aliqui eam cum polenta imponunt. Habet etiam quiddam amarum in se & acerbum: illo quidem lumbricos interficit, acerbitate vero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis excreationes reprimit. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium. Actius addit, potum eius decoctum tribus seriatim diebus, colicos omnino sanare.

EX PLINIO.

Mentae hortenſis odor animum excitat, & sapor auiditatem in cibis: ideo in mammarum mixtura familiares ipsae accedere, ut coire densarique lac non patiantur. Quare lactis portionibus additur, ne huius coagulati potu strangulentur. Data in aqua & mulso, eadem vi resistere et generationi creditur, cohibendo genitalia densari. Aequè maribus et foeminis sanguinem sistit, & purgationes foeminarum inhibet. Cum amylo ex aqua pota, coeliacorum impetus. Syriation & vomicas vulvae curavit. Ille & iecinorum vitia ternis obolis ex mulso datis. Item sanguinem excreantibus in sorbitionem. Ulcera in capite infantiu mirè sanat. Arterias humidas secat, siccas adstringit, pituitas corruptas purgat in mulso & aqua. Voci succus sub certamine utilis duntaxat qui & gargarisatur vva tumente, adiecta ruta & coriandro ex lacte. Utilis & contra toſillas cum alumine, linguae asperae cum melle. Ad couulsa intus per se, vitijſque pulmonis. Singultus & vomitus sistit cum succo granati, ut Democritus monstrat. Recetis succus narium vitia spiritu subducto emendat. Ipsa trita choleras in aceto quidem pota, Sanguinis fluxiones intus, Ileum etiā imposita cum polenta, & si mammae tendantur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumi

tur

tur & contra scolopendras & scorpiones marinos, & ad serpentes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus, item sedis vitij. Impetigines quoque, vel si teneatur tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Asit & lieni mederi eam in horto gustatam, ita ne vellatur. Aridæ quoque farinam tribus digitis apprehensam, & stomachi dolorem sedare in aqua, & similiter aspersa in potionem, ventris animalia pellere.

APPENDIX.

Animaduertendum, ea quæ Plinius Mentastro tribuit, Calaminthæ deberi, vt satis liquet Dioscoridem legenti. Neque sanè mirum, quandoquidem autores societate quæ est inter Mentam, Mentastrum, & Nepetam decepti, tum species, tum nomina confundunt.

APPENDIX ALTERA.

Cæterum appendicis etiam vice hic annorandum erit, Aristotelem sectione xx. proble. secundo cū asserit Mentā refrigerare posse corpora, nō pugnare cū Galeno alijsque medicis q̄ illā esse calidā affirmāt. Per se nāque calidā est Mentā: at quia esā libidinem proritat, & hæc cū immodica fuerit corporis vires deiecit, atque adeo animū & corpus refrigerat, ideo eā ex accidente, q̄a videlicet vt in ventre immodicè ruamus efficit, refrigerare dixit Aristoteles.

EX SIMEONE SETHI.

Iuuat iecur frigidum, & ventrem corroborat ac stomachum, coctionem facit, vomitum sedat & singultum. Prodest etiam ad cordis morsus, & appetitionem suscitāt. Flatus discutit, & lumbricos interimit, potissimum syluestris. Mentē ius vicerem stimulat, & iecinoris obstructions tollit. Verū hoc vesci ad satietatem nō oportet, quoniā sanguinem extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauā bilem mutat: deia efficit vt sanguis qui maximè est tenuium partium discutiat, & crassius ac melancholicus relinquatur, atque ideo oportet biliosos ab ea abstinere. Contrita cū sale, & morsui rabiosi canis imposita, medicamentū fit salubre. Arida verò trita, & post cibum sumpta, ad concoctionem facit, & lienosos iuuat. Cum vino pota difficulter pa-

rienti succurrit. Ferunt etiam quòd mausa lippienti imposita, fiat remedium: quodque eius decoctum absorptum, còfestim sanguinem è faucibus eijcentes sauet. Huius semen ventrem purgat, & pulmonem lædit.

ADNOTATIO.

Menta nomen nobis retinet, & Balsamum quoque dicitur multiplex.

De Hemionitide. Cap. CXII.

NOMINA.

H *Μιωνίτις*, ή *σπλάνδιον* Græcis, Hemionitis Latinis, Plinio Teucion, officinis & herbarijs Scolopendria & Lingua ceruina, Germanis [Hirszung] Gállicè, *Langue de Cerf* nominatur. Alia tamen est à Dioscoridis Scolopendria, quæ Asplenon alio nomine dicitur.

FORMA.



Hemionitis, siue Scolopendria.

Folium Dracunculo simile profert, lanatū. Radices verò illi multæ subsunt, tenues. Neque caulem, neque semē, neque florem fert. Ex qua descriptione satis liquet eā herbam quam vulgus Scolopendriā vocat, esse Hemionitim, q̃ tota illi Dioscoridis pictura, nulla reclamāte nota, cōueniat. Sunt enim illi folia Dracunculi seu Ari, instar lunæ corniculantis falcata. Et si enim interdum in altum surgant, tamen inter initia potissimū incurua, & lunę crescentis modo falcata sūt.

Radici

Radibus etiā cohæret multis, exilibus, nunquā florescēs, nec caulem, nec semen proferens. Nō esse autem Phyllitīm imprimis folia docēt, quæ in ea sunt recta, & minimè sicut in Lingua ceruina lunata. Dein in tergo veluti vermiculi, qui in Phyllitide penilles, in Lingua ceruina aut sessiles nequaquam propendentes sed liratim digesti sunt. Tertio natales ipsi: Phyllitis enim in vmbrosis opacisve, & hortis nascitur. Scolopendria verò seu Hemionitis in petrosis. Quarto, quod me omnium maximè mouet, Phyllitidi nulla prorsus lienem liquandi facultas inest, quam tamen Scolopendriæ vulgari adesse præter communem consensum, quotidiana etiam experimenta demonstrant. His itaque de causis Phyllitis Scolopendria vulgaris esse aut dici non debet. Dato enim quòd descriptio per omnia conueniret, facultates tamen ipsæ, quæ diuersæ sunt, aliam à Scolopendria esse manifestè docerent.

LOCVS.

Nascitur locis vmbrosis, montosis ac petrosis: copiosissimè autem iuxta montem haud procul à Tubinga situm, quem Germanico vocabulo [Farnberg] nominant, propendere solet, Nunc passim in hortis habetur.

TEMPVS.

Aestate vsque ad autumnum abundè nascitur.

TEMPERAMENTVM.

Adstringens simul & parum amara est, vnde credibile est in primo ordine esse calidam, & in secundo siccam.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Herba gustu adstringit. Hæc autem cum acetò pota lienem liquat.

EX GALENO.

Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet: quamobrem cum acetò pota, lienosis auxilio est.

EX PLINIO.

Medetur lienibus, Cōstatque sic inuentum: cum extra super eā proiecta essent, fertur adhæsisse lienī, eūque exinasse. Ob id à quibusdā Spleniō vocatur. Narrant sucs qui radicem eius edunt, sine splene inueniri.

ADNOTATIO.

Hemionitis tua est Dioscoridi Phyllitis, vulgaris Scolopendria

De Eryngio. Cap. CXIII.

NOMINA.

H *Πύρινος* Græcis, Eryngium Latinis, Officinis corrupto vocabulo Iringus vocatur. Plærique etiã Centũ capita nominant, à numero nimirũ capitum q̃ in summo obtinet. Plinij tamen Centũcapita, ab Eryngio est diuersa vt etiam Serapionis. Si quis enim diligenter eius descriptio nem excutiat, eam planè esse deprehendet, quæ Dioscoridi Aster Atticus & Inguinalis appellatur. Vtriusque enim picture sic sibi respondent, vt planè vna esse herba videatur. Germanis Eryngium nominatur [Mansztrevv, Brachen distel & Raddistel] Gallicè *Chardon nommè Centteste*



Eryngium,

FORMA.

In genere aculeatarũ stirpium est Eryngium, cuius folia initio tale cõdita olerum modo comeduntur. Sunt autem lata, & in ambitu aspera, gustu odorata. Quum verò adoleſcunt, in multis caulium eminentijs spinis aculeatur: in quorum summitatibus globosa capita, durarum acutissimarumque spinarum ambitu, stellæ instar, circumnallantur, quorum color modò viridis aut candidus, interdũ

terdum cœruleus inuenitur. Radix illi oblonga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis crassitudine, & odorata. P qua nimirum delineatione omnibus perspicuū fit, spinam cuius picturam nunc exhibemus, esse Eryngium: aculeatis enim folijs & per extrema spinosis conspicitur, odoratis, canle cubitali, in cuius vertice coacta in globum capitula, duorū & acutissimorum spiculorum vallo, stellæ instar radiātur, quorum color in pubertate viridis, adultæ cœruleus, flaccescenti candidus conspicitur: radice pollicari, intus candida, foris nigra, sed odorata.

LOCVS.

Nascitur in campestribus & asperis locis. Prope Argentoratum eius magna est copia.

TEMPVS.

Colligi hanc quidam, vt Plinius tradit, cum sol Cancris hospitium tenet, hoc est, sub solstitio, iussere.

TEMPERAMENTVM.

Eryngium caliditate aut parum aut nihil, ea quæ moderate & temperata sunt, superat. Siccitatem verò in tenui essentia consistentem non exiguam obtinet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vim habet calefactoriam radix. Pota menses & vrinas pellit. Tormina & inflationes discutit. Cum vino iecinorosis, venenatorum morsibus, & ijs qui lætiferum hauserūt succurrit. Bibitur aduersus plurima cum Staphylini semine pondere drachmæ vnius. Appensa & illita tubercula discutere proditur. Radix cum hydromelite pota, opisthotonicis & comitialibus medetur.

EX AETIO.

Potum radicis decoctum colicis medetur. Mulso addito calculos, stillicidia, difficultates vrinæ, & renū vitia sanat: quod per quindecim iugiter dies, & ieiunos, & in lectum ituros bibere oportet. Quodd si cum eo Sium quoque decoxeris, magis proficies. Affirmabat quidam assiduo Eryngij vsu, nunquam postea minxisse calculos, cum prius eo morbo frequentissimè vexaretur.

EX PLINIO.

Clara in primis aculeatarum Eryngion est, contra serpentes & vcnenata omnia nascens. Aduersus ictus morsusque radix eius bibitur drachmæ pondere in vino: aut si plerunq; tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter efficax contra chersydros ac ranas. Omnibus verò contra toxica & aconita efficaciorcm Heraclides medicus, in iure anseris decoctam, arbitratur. Apollodorus aduersus toxica cum rana decoquit, cæteri in aqua.

De Thridace. Cap. CXIIII.

NOMINA.

⊙ *Pistia* Græcè, *Lactuca* Latinè: Officinæ Latinum nomen retinuerūt, Germanicè [Lattich, oder Lactuck] Gallicè *Laiçlue* nominatur. Dicta autè *Lactuca* est, quòd copia lactis, quod credebatur leniter mouere ventrem exuberet: vnde apud veteres in primis epulis veniebat, quod Martialis etiam ijs testatur verbis:

Prima tibi dabitur ventri *Lactuca* mouendo, Vtilis.

GENERA.

Lactuca primum in satiuam & syluestrem deducitur. Satiuæ tria sunt genera, crispa nimirum, rotunda, & capitata. Nos vna icone duo complexi sumus genera. Folium enim quòd statim à radice erumpit, eam *Lactucam* refert, quæ Latinis crispa, à folijs crispissimis. Germanis [krauser Lattich,) appellatur Gallicè *Laiçlue commune ou cresse*. Columella lib. xj. cap. iij. Cecilianam & Beticam à regionibus in quibus crescit, nominat. Reliqua folia eam quæ Rotunda à folijs rotundis vocatur, præ se ferūt. Germanicè [breiter Lattich] nominatur Gallicè *Laiçlue Ronde*. Tertij generis *Lactuca*, quæ capitata dicitur, à folijs suis, quæ vbi parum à terra attolluntur, mali cuiusdam speciem rotundam obtinent, & instar Brassicæ capitatæ, in capitis ferè formâ extuberant. Germanis [grosser Lattich Vveisser Lattich] à semine cædido nominatur, Gallicè *Laiçlue pommee ou Cabuce*. Syluestris *Lactuca* satiuæ opponitur, sponte enim sua in aruis nascitur. Germanis [Vvider Lattich] nuncupatur, Gallicè *Laiçlue sauvage ou Laiçlerot*.

FOR



*Lactuca sativa, crispa,
& rotunda.*



Lactuca Capitata.

Satiua prima, cuius imaginem hic damus, folia Intybo satiuo haud dissimilia habet, in rectumq; surgit, caulibus in summo brachiatum, in quorum cacumine flores sunt lutei. Altera folijs, quæ crispa admodum sunt, duntaxat à prioruariat, aliàs per omnia similis. Sic etiã capitata non nisi folijs suis, idq; dum paululum creuerunt, à prioribus differt. Ideoque duabus picturis, quæ omnes referunt, contenti fuimus. Sylvestris similis est sativæ Lactucæ, radice tamè brevior, proceriore caule, candidioribus folijs, gracilioribusq; asperioribus, & gustu amaris, quæ ut addidit Theophrastus, ubi consummata sunt, aculeantur. Ex qua delineatione abunde constat, Lactucam sylvestrem esse eam herbam quæ passim nunc ab officinis & herbarijs, non sine magno erro-

*Lactuca sylvestris.*

re, Endiuia dicitur. Ea enim in aruis & vinearum limitibus sponte nascitur, folio Lactucæ, & cum adoleuit per oras aculeato, & laciniatum serrato, caulibus bicubitali proceritate consurgentibus spinulis inhorrescentibus quibus succus inest lacteus amarûsque, flore vt Lactuca satiuâ luteo. Desinant itaque deinceps ea herba pro Endiuia vti medici, si modo rectè consultum ægris cupiunt.

LOCVS.

Satiua in hortis prouenit. Sylvestris in aruis & vinearum hortorumque maceris sua sponte nascitur.

TEMPVS.

Florent Iulio mense, atque subinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Lactuca satiuâ humidum est frigidumque olus, non tamen extremè, siquidem edendo non foret: verum maxime secundum aquæ, vt sic dicam, fontanæ frigiditatē. Simeon Sethi frigidam & humidam in tertio ordine statuit. Sylvestris autem minus refrigerat & humectat.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Satiua Lactuca stomacho accommodata est, refrigerat, somnū cōciliat, aluum molit, lactis abundantiam facit. Elixā magis alit. Illota autem comesta stomachicis prodest. Semē eius potum venerem assidue somniantibus opitulatur, & concubitum arcet, Ipsæ tamen frequentiores in cibo, clari-

tati

tati oculorum officiunt. Condiuntur muria. Quum in caulem prodierunt, vim quandā nanciscuntur succo aut lacti sylvestris Lactucæ similem. Sylvestris viribus in totū Papaueri similis est, vnde aliqui eius succum Meconio permiscuerunt. Aquosa per aluum purgat potus in posca liquor, obolorum duorum pondere. Exterit argema & caliginem. Cum lacte muliebri inūcta ad ambusta prodest. In vniuersum soporifera est & dolorem leuat. Menses trahit. Cōtra scorpionum ictus, & phalāgiorum morsus bibitur. Semen haud secus quā sativæ libidinū imaginationes in somno, ac venerem arcet. Succus ad eadē valet, sed viribus infirmior. Reponitur succus eius in fictili vase, antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolatus.

EX GALENO.

Lactuca ad calidas phlegmonas accōmoda est, & ad parua & leuia erysipelata, maioribus tamē satisfacere minimē idonea est, Est etiam eduliū sitim arcens. Semen potum geniturę profluuium cohibet, quamobrem etiam ijs qui libidinosis somnijs vexantur, datur. Sic & sylvestris Lactucæ semen. Cuius quoque succus colligitur, argema & caliginē expurgans. Ad adustiones cum lacte mulierum inungitur. Omnibus alijs oleribus paucissimū sanguinē & vitiosum generātibz, ex sola lactuca nō multus quidem, nec vitiosus, haud tamen omni ex parte laudabilis gignitur. Vt plurimum cruda ipsa vescuntur. Aestate autem cum in semen iam proruptura est, in aqua dulci præcoquentes, cum oleo, garo & aceto assumunt, aut cum aliquo ex cōdimentis, opsonijsve, præsertim ijs quæ caseo constant. Plærique etiam antequam excaulescat, in aqua elixa vtuntur, vti ego iā facio, ex quo dentes mihi deteriores esse cœperūt. Nam amicus quidam meus, quum olere hoc à longo tempore me vt familiari cibo vsum fuisse sciret, videretque pōst mādā à me citra magnam molestiā non posse, cocturæ rationem iudicauit. In iuuentute enim, quoniā assiduo os ventriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia Lactucis utebar. Quum autem ad prouectam etatem peruenissem, olus hoc cōtrā quā in iuuentute somnum iam studio & industria accet

accersenti mihi, auxilio fuit: quippe qui etiamnum iuuenis vigilijs dedita opera me assuefecerā declinante iam ætate, ipsa ex se infomni, grauius hoc incōmodo molestabar. Aduersus quod vnicum mihi præsentiſſimum remediū Lactuca vespere cōmanducata semper fuit. Frigidum ergo humidūque succum profert, haud quaquā tamen vitiosum. Itaque sicut alia olera, à iusta concoctione non excidit, neque aluum cohibet, vti neque impellit. Atque hæc illi non immeritò accidūt, quum nec austera, nec acerba sit, quibus facultatibus in vniuersum aluus sistitur, quemadmodum à salis, acris, & omnino abstergendi vim habētibz, ad excreationem concitatur, quorum nihil Lactucæ inest.

EX PLINIO.

Est quidem natura omnibus refrigeratrix, & ideo æstate gratæ à stomacho fastidium auferūt, cibique apētentiā faciunt. Diuus, certè Augustus Lactuca cōseruatus in ægritudine fertur, prudentia Musæ medici, cū priores eā, ob religionem, minimè commanducarent, in tantum recepta cōmendatione, vt seruari etiam in alienos menses eas oxymelite repertum sit. Venerem inhihent, æstum refrigerant somnumque faciunt. Cruditatem ipsæ nequaquam faciūt, nec vlla res maiorem in cibis auiditatem incitat inhihentq;. Ambustis profunt recentibus, priusquam pustulæ fiant, cū salē illitæ. Vlcera etiam quæ serpunt, coercent initio cum aphronitro, mox in vino tritæ. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt. Eruptiones papularum ex vino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt, ad quod vtilissimæ quam maximi caulis & amaræ. Quidam lacte infundunt. Deferuefacti ij caules & stomacho vtilissimi traduntur, sicut somno, & satiuæ maximè Lactuca, & amara lactēsque, quam Miconidem vocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte vtilissimum esse percipitur, dum tempestiuè capiti inunguntur, Semen satiuarum cōtra scorpiōnes dari. Semine trito ex vino potu & libidinum imaginationes in somno compesci. Tentantes aquas nō nocere Lactucam edentibus. Quidam tamē frequentiores in cibo osficere

ficere claritati oculorum tradiderunt.

De Thymbra

Cap. CXV.


NOMINA.

ῥυμβρα Græcis Thymbra, Cunilaque Latinis. [Kunc]
 Germanis Gallicè, *Sarriette* appellatur, vulgò *Satureia*.

GENERA

Thymbra seu Cunilæ duæ sunt species. Vna hortensis seu sativa, quæ quia minori est acrimonia, in condimentario genere edulijs concoquitur: hinc à saturando *Satureia* dici cœpit. Alij tamen à Satyris nomen traxisse putant, quod scilicet marcescentes coitus stimulet. Germanicè [Saturô. Huernerful, Ioseplen, z vuibel oder Gartenhyssop, oder sergen Kraut] nominatur. Altera agrestis siue rustica *Cunila* est, quæ peculiariter *Thymbra* nuncupatur.

FORMA.



Satureia Sativa.

Thymbra similis est Thymo, sed minor atque tenerior, ferens spicam floribus plenam, coloris viridis, *satureia* pedali altitudine surgit, fruticosa, surculosis vtrinque canaliculis, folio Hyssopi, flosculis per intervalla ex purpurea candicantibus, odore saporeque gratissimo.

LOCVS.

Thymbra in tenui solo, & asperis locis nascitur, *satureia* in hortis se nitur passum.

Tem

TEMPVS

Aestate vtraque Cunila floret.

TEMPERAMENTVM.

Thymbra calida & sicca in tertio ordine.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Thymbra eadem quæ Thymus præstat si cõsimiliter sumatur. Vtilis etiam in sanitate eius vsus. Est etiam satina Thymbra in cunctis syluestri minor: ad cibum verò vtilior, propterea quòd non adeò efficax illi sit acrimonia.

EX PAVLO.

Thymbra sylvestris eadem quæ Thymus præstat. Hortensis autem omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatior.

EX PLINIO.

Nusquam vtrûque Thymbre genus additur, quippe similis effectus.

EX HERBARIO ANTIQVO.

Farina eius ex vino pota, medetur pulmonis, thoracis, & vesicæ vitijs. Ciet vrinas, menses pellit. Herba ipsa cum floribus Lethargicos excitat calfactu, aut coronæ modo capiti imposita. Succus cum rosaceo auribus infunditur. Cũ triticea farina coxendicibus illinitur. Satureiæ vsus marcescentes coitus stimulat, quare à Satyris traxisse nomẽ putant. Stomachi concoctiones adiuuat, fastidia disecutit, hebetes oculos exacuit.

ADNOTATIO.

Satureia nomen retinet Sarriette.

De Thlassi. Cap. CXVI.

NOMINA.

O *Ἀδокси, ἢ θασκιδίον, ἢ σίνυξι ἀγρίον* Græcis dicitur Thlassi, Capsella, & Scandulaceum Latinis, Gallicè *Seneuè sauvage*. Sunt huius temporis herbarij qui Nasturtium tectorum, & Sinapi rusticum, quod digitis friatum sinapim suboleat, appellant. Alij Bursam pastoris vocant, non sanè quòd sit re vera eius herbæ species, sed quòd ad formam illius quamproximè accedat. Sic antiquo herba-

rio Bursam pastoris appellare Thlaspin placuit. Thlaspi autem Græcis à fructus forma dictum est, qui Nasturtio similis est, sed latior, & velut infractus & contusus. *ῥαῖδα* enim ijsdem contundi est & infringi, infringendóq; quod globosum timidúmve erat malleo, lapide, pedève cum dilatione exæquare.

GENERA.

Duo Thlaspi genera damus. Vnum latioribus folijs, quod ad Dioscoridis descriptionem proximè accedit. Hoc Germanicè [*Baurnsensff, oder Krefz*] nominatur. Gallicè *Senèue large saunage*.



Thlaspi latifolium.



Thlaspi angustifolium.

Alterum folijs angustioribus & strictioribus constat, & Germanicè [*Besemkraut*,] q̃ seoparū vices suppleat, vocatur. Gallicè *L'estroit Senèue saunage ou moultarde saunage*. Quare si quispiam hæc duo genera ab inuicem distinguere

certis

certis appellationibus voluerit, primum *Thlaspi maius* aut *latifolium*, alterū verò minus aut *angustifolium* appellet. Dioscorides etiam duo *Thlaspios* genera facit, vnum *latifolium*, alterum *angustifolium*.

FORMA.

Herbula est angustis folijs ad digiti longitudinem, in terram versis, in extremitatibus incis, subpinguibus. Caulē tenuem, duorum dodrantum emittit, adnascētes sibi paucos ramulos habentem, & per totum eius ambitum fructus est in summo modicè latus, in quo semen exigū. *Nasturtio* simile, disci figura, veluti cōquassatum, vnde & nomen inuenit. Florem obtinet album, semēnq; acre. Ex ea sanè descriptione satis cōstat, herbam hanc quam pictam damus esse *Thlaspi*, angusta enim folia habet, potissimum suprema eius parte, digitali longitudine, in terram se connectentia, per extrema leniter incisa, caulem duum dodrantum, agnatis in eo paucis calycibus, breui pediculo nitentibus, quadam ligularum vel cochleariorum effigie, in quibus semen continetur *Nasturtio* simile, sed latius & veluti conquassatum, quod acerrimi esse gustus deprehēditur, ita ut mansum *Sinapis* modo, os & linguam vellicet.

LOCVS.

In fossis, semitis, & sepibus prouenit.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus, floribus & semine pręgnans inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Semen calfacit & exiccat in quarto ordine.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Calefacit: bilem per superna & inferna purgat acetabuli mensura potum. Ischiadicis in clystere infunditur. Potum sanguinem ducit, & interiores abscessus rumpit, menses cit, & foetus necat.

EXPAVLO.

Semen *Thlaspi* facultatē habet acrem, ad eò ut internos abscessus potum dirumpat. Menses cit, & foetus enecat. Per eandem infusum sanguinolenta euacuans, ischiadibus prodest.

dest. Potest enim alioqui tum supernè, tum internè biliosos vacuare humores acetabuli mensura epotum. Infunditur & contra coxendicum dolores. Quinetiam potum sanguinem trahit, & internos abscessus rumpit.

EX GALENO.

Thlaspi semē facultate acre est, adeò vt internos abscessus potum rumpat. Menses mouet, & fœtus necat. Per sedē infusum sanguinolenta euacuans itchiadibus prodest. Est enim alioqui tum internè, tum supernè biliosorum humorum euacuatorium, acetabuli mensura potum.

EX PLINIO.

Semen asperi gustus, bilem & pituitam vtrinque extrahit. Modus sumendi acetabuli mensura. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem extrahat. Menses quoque cit, sed partus necat.



Lupinus.

ADNOTATIO.

Thlaspi nobis frequens.

De Thermiss.

Cap. CXVII.

NOMINA.

⊙ Ερμ-⊙ μιν-⊙ Græcis, Lupinus sativus Latinis, Officinæ Latinum nomē retinuerunt: Germanis [Feigbon] Gallis *Lupin* appellatur.

FORMA.

Vnicum caulem obtinet Lupinus, foliū quinque

quefariam aut septifariam dissectum, florem candidum, siliquas in quibus quina senave intus grana, dura, lata, rufaque continentur. Radicem luteam capillamentis fibratam.

LOCVS.

Exilem amat terram, arenosam & rubricam præcipue. Limoso agro non exit, culturamque reformidat.

TEMPVS.

Ter floret, primùm Maio, deinde Iunio, & tertio Iulio mensē. Post vnumquemque florem siliquas producit.

TEMPERAMENTVM.

Immensa amaritudo euidenter calidum & siccum esse monstrat.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Farina eius cum melle linctā, lumbricos pellit. Ipsi quoque macerati, & amari adhuc comesti idem efficiunt. Decoctum eorundem cum Ruta & Pipere potum idem facit: vnde & lienosis prodest. Eodem gangrænas, vlcera tetra, incipientē scabiem, alphas, maculas, exanthemata, & achoras perfundere vtile. Menses & fœtus idem decoctum cum myrrha & melle subditum trahit. Farina eorum cutem liuorēmq; expurgat. Inflammationes cum polenta & aqua mitigat. Ischiades & tubercula cum aceto lenit. In aceto cocta & illita strumas dissipat, & carbunculos rumpit. Decocti pluuiāli aqua donec in sucum liqueſcant, faciem abstergunt. Cum radice nigri Chamæleonis, omniū scabiei medentur, si tepido decocto abluantur. Radix cum aqua cocta & pota, cit vrinam. Vbi autem edulcati fuerint, triti cum aceto, et poti stomachi fastidium leniunt, & cibi auiditatem excitant.

EX GALENO.

Lupinus editur coctus, multis antè diebus maceratione in aqua amaritudinem deponens, sitque tunc nutritimētum crassi succi. Cæterum vt medicamen ita præparatus ex genere est emplasticorum. Qui verò natiuam amaritudinem habet, huic extergendi & digerendi vis inest. Lumbricos occidit illitus, & cum melle linctus, aut cum posca potus. Quin & decoctū eius lūbricos ejcere potest. Foris idētidē
perſu

perfusum, alphas, achoras, exanthemata, scabies, gāgrēnas
vlceraque maligna iuuat, partim extergendo, partim dige-
rendo citraque mordacitatem siccando. Expurgat iecur &
lienem cum Ruta & Pipere suauitatis gratia assumptum.
Elicit menses ac fœtum cum myrrha & melle adpositum.
Porro Lupinorum etiam farina sine mordacitate digerit:
nec enim liuida tantum, sed & strumas & tubercula curat:
atqui tunc in aceto, aut oxymelite, aut posca hanc decoque-
re oportet, pro laborantis nimirum temperamento, & affe-
ctus diuersitate, quod ex usu est inueniendo. Digerit item
quæ liuida sunt: & quæcunque modo dictum est præstare
decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam
qui Iſchiadiciis cataplasmatibus modo illinunt.

EX PLINIO.

Ex omnibus quæ eduntur sicco nulli minus ponderis est,
nec plus utilitatis. Mitescunt cinere aut aqua calidis. Colo-
rem hominis frequentiores in cibo exhilarant. Amari con-
tra aspidas valent. Vlcera atra, aridi decorticatiq; triti, sup-
posito linteolo, ad viuum corpus redigunt. Strumas, paro-
tidas in aceto cocti discutiunt. Succus decoctorum cum ruta &
pipere, vel in febris datur ad ventris animalia pellenda, mi-
noribus triginta annorum. Pueris verò impositi in ventrem
ieiunij profunt. Et alio genere tosti, & in defruto poti, vel
ex melle sumpti. Idem auaritate cibi faciunt, fastidium detrahunt.
Farina corum aceto subacta, papulas pruritibusq; in bal-
neis illita cohibet, & per se siccat vlcera. Linores emendat.
Inflammationes cum polenta sedat. Si ad mellis crassitudinem
decoquantur, vitilignes nigras & lepras emendant. Rum-
punt carbunculos impositi, panos & strumas minuant, aut
maturant. Cocti ex aceto cicatricibus candidum colorem red-
dunt. Si vero celesti aqua decoquantur, succus ille smegma
fit, quo solent fouere gāgrēnas, eruptiones pituitæ, vlcera ma-
niantia, vtilissimum. Expediit ad lienem bibere, & cum melle me-
struis hærentibus, Lienem crudi cum fico sicca triti ex aceto im-
ponantur, Radix quoq; in aqua decocta, urinas pellit. Me-

dentur, pecori cum Chamæleonte herba decocti, aqua in potum collata. Sanant & scabiem quadrupedum omnium in amurea decocti, utroque liquore postea mixto. Fumus crematorum culices necat.

De Io.

Cap. CXVIII.

NOMINA.

Iον πορφύρεον Græcis, Viola muraria vel purpurea Latini, [blavv Veiel oder Mertzen violen] Germanis Gallicis *Violette de Mars* dicitur. Officinæ simpliciter *Violam* nominant. Nicander Ion Græcis dictam credit, quod Nymphæ quædam Ionix, florem illum Ioui primum dedere muneri. Alij Græci Ion vocatum putant, quod cum

Io in vaccam à Ioue cōuerſa eſſet, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Latini quoq; de trita, t, litera. Violā qua ſi vitulam imitatiōe græca videri poſſunt appelleſſe.



Viola purpurea.

FORMA.

Folium habet minus tenuiusque quàm Hedera, nigrius tamē nec diſſimile. Cauliculus ſtatim à radice medius proſilit, in quo ſtoſculus ſuiterolens, purpureus, Humilis præterea eſt, ſtatimque à numeroſa radice orbiculata folia ſine ramis exeunt. Semēn quoque

que minutū in folliculis vasculisve rotundis, vt pictura indicat, extrema ferè ætate producit.

LOCVS.

Nascitur in opacis & asperis locis, ad radices maximè murorum, hortorum marginibus, & sepibus.

TEMPVS.

Viret hæc perpetuò, Theophrasto teste, si cultus adhibeatur: tamen vere, & Martio mense floret, quo potissimū tempore colligi flores eiusdem debent. Semina verò in ætate, vt dictum est.

TEMPERAMENTVM.

Violæ folia aqueam & subfrigidam substantiam superātem possident. Frigidæ autem sunt primo ordine, humidæ verò secundo.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Refrigerandi vim obrinet. Folia eius per se & cum polenta illita, stomacho æstuanti, oculorum inflammationibus, sedisq; procidentijs auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est cum aqua potum, angina correptis, & puerorum comitialibus mederi affirmant.

EXGALENO.

Folia per se, aut cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi æstuanti, & oculis.

EXPLINIO.

Purpureæ violæ refrigerant. Contra inflammationes illinuntur stomacho ardenti. Imponuntur & capiti in fronte. Oculorum priuatim epiphoris, & sede procidente, vuluæ. Et contra suppuratiões, Crapulam & grauedines capiti impositis coronis olfactiue discutiunt. Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureum est ex ijs comitialibus medetur maximè pueris, in aqua potum. Semen scorpionibus aduersatur.

EXSIMEONESETHI.

Profunt ad intestinorum dolores, cor verò offendunt. Dolores capitis qui fiunt à flaua bile, sopiunt, potæ & odoratæ. Ventriculum irritant, & flauam in eo inuentā bilem. Caput siccum humectant, calidūque refrigerāt suo odore.

ratu. Somnum inducunt. Humida capita destillationibus obnoxia reddunt.

ADNOTATIO.

Viola purpurea aut nigra nobis martia aut quadragesimalis, quod tunc serè floreat.


De Viola matronali. Cap. CXIX.

NOMINA.

Veteribus Græcis & Latinis cognitæ fuerint necne Violæ quæ hodie, quod eas matronæ colere soleant, matronales vocantur, nōdum compertum habemus. Quare vulgari & visitato nomine, donec rectius inuentum fuerit, utethur. Germanicè, quod rarè adhuc in Germania dū ista scriberemus fuerint. [V velsch veiel] appellare voluimus, vt nimirum hac nomenclatura à Leucoijs, de quibus suo dicemus loco, tēgregaremus. Possent etiam hand



Viola matronalis alba.



Viola matronalis punicea.

inceptū

ineptè [Fravvenveiel,] ad imitationem Latini nominis appellari Gallicè *Gyrosflees*.

G E N E R A.

Tria Violarum matronalium damus genera, Primi enim generis candida est, Alterius punicea, Tertij purpurea: nec differre admodùm nisi solis floribus videntur.

F O R M A.



Viola matronalis purpurea.

Fruticosa est herba, cubitali altitudine, ramosa, caule & folijs lanuginosis, oblongis, angustis mollibus ac canescentibus, floribus aut albis, aut puniceis, aut purpureis quadrifolijs, semine in oblongis siliquis lato ac tenui, radice longa, lignosa, subrufa & acri.

L O C V S.

In hortis & cultis locis proueniunt.

T E M P V S.

Iulio & augusto mensibus florent.

T E M P E R A M E N T V M.

Admodùm calidas esse sapor foliorum & radicis, qui acris est, abundè docet. Humiditatem autem multam, Galeno lib. iij. cap. xvij. de simpli. medi. facul. teste, eo quòd amara non sint, admistam habent.

v iij.

VI

VIRE S.

Incidendi & digerendi per halitum vim obtinent. Ideoque radix aut folia decocta in aqua, conuulsis, difficultate spirandi laborantibus, & veteri tussi auxiliantur. Vrinam & menses ducunt, sudoréique ciendi facultatem habent.

ADNOTATIO.

Viola matronalis tibi piſſio dicta, nobis Bachares videntur.

De Iride.

Cap. CXX.

NOMINA.

Iris Græcis, Iris Latinis appellatur: Officinis suam appellationem retinuit. Germanis [blauv Gilgen blauv Schvvertel, Veielvvurtz] Gallicè *Glaieul*, ou *flambe* dicitur.



Iris Germanica.

A cœlestis arcus similitudine, quam flores eius repræsentât, ut paulò post dicemus, nomen accepit Iris. Sunt qui nō sine pudendo errore aliam assignent herbam recto, aliam casui paterno, ita ut Iris ab Ireos, tanquam purpureus color à niueo, distingui putetur imperitis herbarijs. Promanasse autem hunc errorem ex Græca voce *Αἷριον*, qua Liliū quod candidos profert flores genti illi significatur, parum per vnus literæ abiectionem deprauata, verisimile est. Primam nāq; literam abijcientes, vltimam verò in

ver

vertentes, *λίριον* dixerūt pro *λίριον*. Sed hæc opinio indigna est quæ explodatur, cum Dioscoridem & alios veteres omnes seorsim de Iride & Lyrio siue Lilio agere constet.

FORMA.

Folia Gladiolo similia fert, maiora tamen, latiora & pinguiora. Flores in caule, æqualibus inuicem spatijs distantes, inflexi, varij. Aut enim candidi, aut virides, aut lutei, aut purpurei, aut cœrulei conspiciuntur. Vnde ob hanc varietatem arcui cœlesti assimilata est. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ, quæ simulatque fuerint dissectæ siccantur in umbra, & filo traicte receduntur. Hæc Dioscoridis pictura tota huic herbæ, quam Irim hodie herbarij & officinæ vocant, suffragatur. Siquidem ea radicibus nititur solidis, geniculatis & odoratis, adeo vt violarū purpurearum odorem prorsus referre videatur, & hoc nomine à Germanis nostris [Veielvvurtz], hoc est, Violacea radix sit appellata. Folia Gladioli faciem simulant, maiora duntaxat, latiora & pinguiora. Caule recto sesquipedali, è cuius fastigijs, pari interuacante spatio, flores erumpunt, inflexis mutuo foliorum labris, qui nitent varia colorum mixtura, instar cœlestis arcus. Quemadmodum enim aquarius ille arcus, qui est imago malè expressi solis, caua nube recepta, varios mentitur colores, sic vt cœruleas, virides, luteas, purpureasque lineas ducat, ita cauo calyculi sinu versicolores lituras flores ostendunt, qua diuersa specie cœlestem æmulantur arcum. Falluntur itaq; qui in toto floris ambitu huiusmodi varietatem perquirunt, cum inflexa foliorum labra vel purpureus, vel cœruleus semper color inficiat.

LOCVS.

Pasim in hortis & macerijs vinearum prouenit. Lantissima tamen est quæ in Illirio & Macedonia nascitur, & melior inter has quæ densa & breui radice constat, quæq; fragranti contumax est, colore subruffa, admodum odorata, gustuque feruida.

TEMPVS.

▼ ▼

Flo

Floret vere, Maio potissimum mense, quo sanè tempore flores colligi debent. Radices autem suo tempore, hoc est, autumnò.

TEMPERAMENTVM.

Iris in altero calefacit ordine, in tertio autem desiccatur, abstergit quoque & maturatur.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Irides omnes calefaciendi extenuandique vim obtinēt. Contra tussim efficaces, humorésque non facilè excreabiles extenuant. Biles ex hydromelite drachmarum septem pondere potæ purgant. Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Cum aceto potæ venenatorum moribus, lienosis, conuulsis, refrigeratis, rigentibus, & quibus genitura effluit, auxiliatur, Menses cum vino potæ ducunt. Decoctum earum ad muliebra fomenta utile molliens aperiensque locos. Ischiadicis infunditur. Fistulas & sinus carne explent. Quinetiam glandis modo cū melle appositæ, foetus extrahunt. Strumas veterésque durities coctæ & illitæ emolliunt. Aridæ vlcera explent, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo vtiliter illinuntur. Lentigines, cutis in facie vitia cum Elleboro albo, & duabus mellis partibus illitæ emendant. Pessis, malagmatis & acopis miscentur. In vniuersum magni vsus sunt.

EX PAVLO.

Iris tussi utilis. Humores in thorace non facilè excreabiles extenuat. Torminibus medetur, vlcerâq; sordida expurgat. Cum mulsâ pota aluum ducit.

EX PLINIO.

Infantibus eam circunligari salutare est. Dentientibus præcipua est & tussientibus, tinearumve vitio laborantibus instilari. Cæterum vlcera purgat capitis, præcipuè suppuraciones veteres. Aluum soluit duabus drachmis cū melle, tussim, tormenta, inflationes, pota. Lienes ex aceto. Contra serpentium & araneorum morsus, ex posca valet. Contra scorpiones, duarum drachmarum pondere in pane vel aqua sumitur. Cotta canum morsus ex oleo imponitur. Et

contra perfrictiones. Sic & neruorum doloribus. Lūbis verrō & coxendicibus eum resina illinitur. Vis ei concalfactoria. Naribus subdita, sternutamenta monet, caputque purgat. Dolori capitis cum Cotoneis malis aut Strutheis illinitur. Crapulas quoque & orthopneas discutit. Vomitiones cit, duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit, imposita cū melle. Ad paronychias farina eius vtuntur. Halitus oris commāducata abolet, alarumque vitia. Succo duritias omnes emollit. Somnum conciliat, sed genituras consumit. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrecentia sanat.

De Hieraceo. Cap. CXXI.

NOMINA.

IΕράκιον. ἡ σονχίλος, Græcis, Hieraceum Latinis dicitur, Officinis inusitatum. Germanicè, quum aliud nomen expiscari non potuerimus, [Habichkraut] Gallicè, *Cichoree ianne* appellauimus, ad Græcam alludentes appellationem: neque enim alia ratione Græci hanc herbam Hieraceum nominarunt, nisi quod accipitres, quos illi ἱερακαὶ dicunt, scalpendo eam, succoque oculos tingendo, obscuritatem cū sensere discutiant. Sonchites autem dicta est, quod Soncho non admodum dissimilis sit, maximè quod ad eius circumferentiam & extremam partem, in qua caules & flores sunt, attinet. Hæc enim & illa concano, & lacteum succum emittente caule, luteisque floribus est. Apuleius Lactucam syluaticam appellat. Plinius quoque libro vigesimo, cap. septimo, vt alij omnes ferè in Lactucarum sponte nascentium numero, propter similitudinem, Hieraceum hoc habet. Quàm autem inuicem similes sint Hieraceum & Lactuca syluestris, vtriusque icones & effigies collatz monstrabunt.

GENERA.

Hieracij duo sunt genera, maius nimirum & minus. Maius Germanicè [Grosz Habichkraut.] Gallicè, *Grande Cichoree ianne* Minus autem [klein Habichkraut] Gallicè. *Pijs'enlèl* nominatur.

For

*Hieraceum maius.**Hieraceum minus.*

Hieraceum maius caulem habet asperum modicè rubentem, spinosum, còcauum. Folia per interualla rariusculè diuisa, Soncho per circumferentiam similia. Flores in oblògis capitulis luteos. Quæ designatio prorsus hanc quam pictã damus herbam exprimit. Siquidem caulem emittit scabrũ, subrubrum, spinulis horrentem, cauum, folia ex interuallis & rarè laciniata, Sonchi folijs non dissimilia. Flores in longiusculis capitulis luteos. *Minus Hieraceum* folia ex interuallis per ambitum diuisuris scissa obtinet: Canles de se emittit cauos, teneros & virides, in quibus flores lutei circulum circumscribentes. Quæ itidem notæ omnes herbæ illi, cuius picturam exhibemus, conueniunt.

L O C V S .

Vtrunque in quibusdam pratis prouenit.

T E M

TEMPVS.

In fine Iulij mensis, & per vniuersum Augustum floret Hieraceum. Succus eius capitur per menses inciso caule.

TEMPERAMENTVM.

Maius Hieraceum planè Sonchi temperamento constare videtur, refrigerat itaque & mediocris adstrictionis est particeps. Minus in gustu paulò maiorem amaritudinem refert.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vim habet Hieraceum maius refrigerandi, & modicè adstringendi, ideòque æstuantì stomacho, & inflammationibus illitum prodest. Succus erosionè eiusdem in sorbitione mitigat. Herba ipsa cū radice illita scorpionum ictibus auxiliatur. Minus facultates habet superiori easdem.

EX PLINIO.

Succus sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierū. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionesque omnes præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis in lana cōtra epiphoras. Idem succus aluū purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpentium ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta, thyrsiq; triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maxime contra scorpionum ictus. Verū contra phalangia, cō mixto vino ex aceto,

APPENDIX.

Sunt qui tantam inesse huic herbæ vim cōtra oculorum vitia credant, vt radicem etiam à collo suspensam, caliginè oculorum sanare possè dicant,

ADNOTATIO.

Hieraceum vtrunque hic frequens.

De Hippuri. Cap. CXXII.

NOMINA.

Ἰπποური Græcis, Equisetū, herba aut salix equinalis Latinis, Recentioribus herbarijs verbū verbo reddentibus, Cauda equina, Germanis [Roszchvantz, Psedtschvantz. Roszadel. Ratzenvedel, Katzenzagel. Kantenkraut, Schaffthov] Gallicè *Queue de Cheval* nominatur

tur. Nomen tamen tam Græcum quam Latinum à caudæ equinæ imagine quam comæ illius præ se ferunt, accepit.


GENERA

Eius duo sunt genera. Vnū longius, quod nonnulli ætatis nostræ herbarij ab asperitate quam obtinet Asprellā vocant. Hinc est quod materiarij fabri ligneam pectinam & aliorum minorum operum ruditatem, huius herbæ scabritia in nitorem expoliunt. Germanicè [groß Roszschvantz] dicitur. Alterum breuius est, ad abstergenda vasa aptum. Germani [Klein Roszschvantz] appellant.

FORMA



Equisetum Longius.



Equisetum minus.

Primum Equiseti genus cauliculos habet inanes leniter rubentes, subasperos, solidos, geniculis qui inuicem inserti sunt dissectos, in quibus folia iunceæ, crebra, & tenuia. In latitudinem adsurgit, scandendo proximas stipites comis circumfusa

confusa dependet multis, nigris vt equorum canda. Radix illi est lignosa, dura. Alterum comas per interualla habet breuiores, candidiores & molliores.

LOCVS.

Longius Equisetum in aquosis locis & scrobibus prouenit, nec eo in fossis propè aquas & umbrosis locis alia planta frequentior est, vt hoc nomine *καρὰ θάλασσαν* Græcis dictū sit, Neq; enim *καρὰ θάλασσαν* aliud est illis nisi terræ rima & fissura. *ἰσχυρόν* etiam non alia ratione, quàm quòd in aquosis produceretur, nominauerūt. Alterum in pratis inuenitur, nec ferè frequentius occurrit, inuisa fœniseis.

TEMPVS.

Vtrumq; æstate suis in locis copiosè prouenit.

TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatem, ac proinde valenter simulque citra mordicationem exiccantem obtinet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adstringit, quapropter succus eius sanguinem ex naribus erumpentem sistit. Dysentericis cum vino potus confert. Vrinam cit. Folia, cruenta vulnera glutinant trita & inspersa, Herba & radix tussietibus, orthopnoicis. ruptisq; succurrit. Quinetiam intestinorum diuisiones, vesicæ dissectionem, & intestinorum ramicem coalescere cogit; folia in aqua pota feruntur.

EX GALENO.

Vulnere maxima conglutinat, etiā si præfectos esse nervos contingat: præterea intestinorum ramices cogit. Cæterum ad sanguinis reiectionem, ad fluxum muliebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & ad alia ventris profluvia generosum est medicamentum herba ipsa aut ex aqua, aut ex vino epota. Sunt qui de ea scriptū reliquerunt, quòd nonnunquam etiam vesicæ, & tenuium intestinorum vulnere succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluvio sanguinis ex naribus, tum fluxu obnoxij in ventre affectibus ex austerorum quopiam vinorum potus, ac si febre teneatur ex aqua.

EX PLINIO.

Vis eius spissare corpora. Succus sanguinem è naribus fluentem inclusus sistit, item aluum. Medetur dysentericis in vino dulci potus cyathis tribus, Urinam cit. Tussim orthopneam sanat: item rupta, & quæ serpunt. Intestinis & vesicæ folia bibuntur. Enterocælen cohibet.

ADNOTATIO.

Hippuris cauda equina vulgò, multiplex etiam nobis est.

De Hiberide. Cap. CXXIII.

NOMINA.

Iβηρίς, ἡ καρδαμυλὶς, ἀγριοκαρδαμύς Græcis. Galeno & Paulo alio nomine Lepidion: Hiberis, Nasturtium agreste Latinis appellatur, Officinis nostris incognita. Germanis [Gauchblom] Gallicè *Passeraige ou Nastor sauage*: non alia ratione quàm quòd plerosque qui in illius notitiam

nondum peruenerunt, infatuet. Potest etiam commodè dici [Vvilder Krefz] Gardamantice. & Agriocardamum Græcis appellata, quòd radici odor insit Nasturtij: vel quòd eius folia partim Nasturtio aquatico, quod à Dioscoride *Sisymbrium* cardamine dicitur, partim etiam hortensi, quod *Cardamon* Græcis nominatur, similia sint: vel quòd gustu Nasturtium referant.



Nasturtium agreste.

FORMA.

Folia Nasturtio similia



Nasturtium sylvestre aliud.

hoc est, in albo purpurascens: hunc enim Dioscoridem vocare lacteū florem, satis testatur quarta Ranunculi species, cuius etiam florem, qui colore huic similis est, lacteum esse scribit. Semen quoq; in siliquis tam exiguum producit, ut Plinio etiam teste, vix aspici possit: radicem autem exilem atque acrem, cui inest Nasturtij odor.

LOCVS.

Nascitur incultis locis, circa itinera & prata.

TEMPVS.

Verno tempore apparet, Aprili potissimum mense & Maio, duratq; ad æstatis initia, quo potissimum tempore lacteum florem fundit: initio enim purpureo colore maculatus videtur, efficaciorēque vsum obtinet, quod tum semen etiam in siliquis proferat.

lia habet, verno tempore, virentia, cubitali longitudine, aut minore, flore lacteo, radicibus duabus sed vna apud nos frequētius, nititur, odore Nasturtij quā acerrimo. Ex qua nimirum descriptioe omnibus perspicuum fit, herbam cuius pictura exhibemus esse Hiberida: caulem enim cubitalem obtinet, foliaque Nasturtio similia. Quæ enim à radice statim exeunt, aquatici: quæ verò in supremo caule emicant, hortensis Nasturtij folia referunt. Verno quoq; tempore virent, flos denique lacteus est,

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine calefacientium, vt Nasturtium, minus tamen eo desiccatur.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix calefacit & adurit. Vtilis est ad coxendicis dolores cum suillo adipe salso, emplastri modo quaternis horis illita. Deinde in balneum descendatur, & oleo cum lana locus perungatur.

EX GALENO.

Similis Nasturtio tum odore, tum gustu, tum viribus.

EX PLINIO.

Coxendicibus & articulis omnibus cum axungia modica utilissima, viris plurimum quaternis horis, foeminis minus dimidio adalligata, vt dein in balneum descendatur in calidam, & postea oleo & vino corpus perungatur, diebusque vicenis interpositis idem fiat, si qua admonitio doloris superfit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat ocultos. Imponitur in ipsa inflammatione, sed imminuta. Adalligata capiti cum Quinquefolio, epiphoras & si qua in oculis vitia sunt, emendat.

APPENDIX.

Recentiores herbarij eius herbae cuius picturam damus vsus probant contra pediculos, si lixiuo incoquatur. Vnde colligere licebit, eam exiccandi & ex alto euocandi trahendique facultatem haud secus atque Nasturtium aut Sinapi, habere. Nam, Galeno lib. j. de composi. med. secundum locos, cap. vij, teste, medicamenta quae phthiriasi medentur, necessario exiccant atque ex alto trahunt. Vt iterum euidentissimum sit hanc herbam, eo quod Nasturtij facultates obtineat, esse veram Hiberidam, non obstante quod raro aut nunquam duabus, sed vna potius & exili nitatur radice.

ADNOTATIO.

Hiberis in pratis frequens.

De Hipposelino. Cap. CXXIIII.

NOMINA.

IΠροσίλιον Græcis, Oulus atrum Latinis dicitur. Officinæ eius semine perperam pro Petroselino Macedonico utitur. Germanis [groß Episch, oder groß Eppich,] Gallicè *Ache, ou Hache large* appellatur. Hipposelinon autè à magnitudine dictum est: siquidem Græci magnis & amplis rebus hippo preponere solent, adeò ut Hipposelinum Latinis nihil aliud nisi grande Apium sit. Oulus autè atrum vel pullum à folijs, quæ atro colore nitent, appellatum esse videtur.

FORMA.



Hipposelinum seu Oulus atrum.

Maius est hortenſi Apio, caule cauo, alto, tenero, veluti lineas habente: folijs latioribus, ſubpunicis: Libanoridis coma, plena flore, in corymbos antequàm defloreat congeſta: ſemine nigro, oblongo, ſolido, acri, odorato: radice odorata, intus candida, ori grata, pro caulis magnitudine non admodum denſa. Porro ne mireris quòd picturæ non ex omni parte reſpòdeat deſcriptio: neque enim Hippoſelinum integrum, & quod ad perfectam peruenit ætatem, floresque

& ſemen produxit, damus, ſed id tantum quod primò erumpit. Radicem itaque tantum & folia depingi curavi-

mus, vt guæ Oleris attri(cuius sæpe fit apud Dioscoridem mentio)forma, saltē in folijs & radice, esset, cerneres. An nitemur tamen vt aliquando integram eius herbæ Picturam exhibeamus.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis, & iuxta paludes.

TEMPVS.

Satum tardè prouenit, idēque factum vt integrè depictum dare nobis hand licuerit. Floret, Plinio teste, ætatē.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, vt Apium, & siccum in medio tertij.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Estur olerum modo ceu Apium, Radix etiam cocta & cruda estur. Quinetiam folia & caules cocti manduntur, & per se aut cum piscibus præparatur. Crudaque ad salgama conduntur. Semen potum in mulso menses ducit. Rigore concussos calfacit potum & illitum. Vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eadem præstat.

EX GALENO.

Hippocelini similis Apio vis est, validior tamen. Mensiū autem & urinæ ciendæ potissimū facultatem habet, vt liquet ex capite eiusdem de Smyrnio.

EX PLINIO.

Olus atrum quod Hippocelinum vocant, aduersatur scorpionibus. Poto semine torminibus interancis medetur. Itemque difficultatibus urinæ semen eius decoctū ex mulso potum. Radix eius in vino decocta calculos pellit, & lūborum ac lateris dolores. Canis rabiosi moribus potum & illitum medetur.


De Ixo.

Cap. CXXV.

NOMINA.

Istæ Græcis, Viscum Latinis & officinis, Germanis [Mistel, oder Affolter] Gallicè Gwy nominatur.

FOR

*Viscum.*

Planta est fruticosa, lenta, semper virens, intus porracei coloris, extra subflaua, folijs buxi, acinis exiguis, sine flore.

LOCVS.

Nunquam in terra, sed semper in arbore, quercu præsertim, piro, malô que prouenit.

TEMPVS.

Autumni initio cum suis acinis decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit cum acrimonia: ex plurima enim ærea & aquea, paucissima terrena substantia con-

stat. Igitur acrimonia in eo amaritudinem excellit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Discutit, emollit, attrahit: tubercula, parotidas, cæterôque abcessus cum resina & pari cera mixtum, maturat. Epi nyctidas in splenio curat. Cû thure antiqua vlcera, & malignos abscessus mollit. Lienes cû calce, aut gagate lapide, aut asio coctum & impositum minuit. Cum auripigmento aut sandaracho illitum, vngues extrahit. Mixtum cum calce & fæce, vim suam intendit.

EX GALENO.

Valenter ex alto humores extrahit: nec tenues tantùm, sed & crassiores, eosque diffundit ac digerit. Est autem eorum genere quæ non protinus admota calfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut Thapsia.

De Isatide. " Cap. CXXVI.

NOMINA.

Iſatis Græcis, Iſatis Latinis vocatur. Gallis, vt in cōmentarijs ſuis teſtatur Cæſar, Glaſtum olim dicebatur, tunc Guadum. Germanis autem ad hoc nomen alludentibus, [Vveydt] Gallicè *Gueſde, ou Paſtel* nominatur. Arābibus Nil, Nilech. & Indicū, vt libro primo Paradoxorum cap. vigefimoſexto monſtrauimus. Barbari deprauata voce Oſatim appellant.

GENERA.

*Isatis ſatiua.**Isatis ſylueſtris.*

Duo Iſatidis ſunt genera. Vna enim ſatiua, qua tingen-
dis lanis infectores vtuntur. Altera verò ſylueſtris, qua la-
narū

harum infectores haud vtuntur. Priorem Germani simpliciter [Vveydt] Galli quoq; *Pastel ou Guesde*. Alteram verò cū adiectiōe [Vvild Vveydt] nosant Galli *Pastel saunage*.

FORMA.

Satina, folia habet Plantagini similia, sed pinguiora, nigrioraque, caulem duobus cubitis altiore. Hæc Dioscorides qui reliquas notas, q̄ sylvestri similes per omnia sunt, cōmemorare noluit. Ex sylvestris tamen effigie faciliè quales sint æstimare poteris: hæc enim, teste Dioscoride, satiuæ similis est, folia tamē maiora obtinet, ad Lactuæ folia accedentia: caules etiam tenuiores, multifidos, rubicantes, qui in cacumine folliculos linguarum figura multos dependentes habent, in quibus semen. Flos ei luteus & tenuis.

LOCVS.

Isatis satiuæ copiosè in Germania prouenit præsertim agro Erphordiano, cui magnum quæstum adfert. Viridem enim herbam trusatilibus molis premunt, vt herbaceam saniem excludant: dein abactō liquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis computrescere in æstate feruente sinunt. Hos cortinis infectoriæ coquunt officinæ, & laneos pannos, ac vellera demergunt, vt cœruleum imbibant colorem. Sylvestris sua sponte in quibusdam Germaniæ locis nascitur, vt Tubingæ, vbi omnes vinearum macerietes hæc herba septæ videntur,

TEMPVS.

Maior & Iunior mense florent, ac subinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Isatis satiuæ valenter admodum exiccantis, nondum tamen mordentis facultatis est: amara enim simul atque adstringens existit. Sylvestris verò acre quidam tum gustu, tum actione præfert: proinde valentiùs quàm satiuæ desiccatur.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Isatidis satiuæ folia, omnia cedemata & tubercula illita discutere possunt. Cruenta vulnera glutinant. Sanguinis profluvia sistunt. Vlcera phagedænica, herpetas, crysipellata, & putrescentia sanant. Sylvestris, eadem quæ satiuæ potest. Lienosis etiam pota & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Satiua magna vlcera durorum corporū glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint, & sanguinis profluvio laboratibus partibus vtiliter illinitur. Tumores œdematodes mirificè discutit, simul & reprimat, omnibūque vlceribus malignis mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si erodantur. Quòd si quādo laborantis natura validior appareat, folijs eius tritis aut panem, aut hordaceā farinam, aut triticeam, aut polentam, pro vincente in vnoquoque affectu, miscere oportebit. Sylvestris verò potentissimè humidis putredinibus obsistit, ad cætera verò iam cōprehensa deterior: immoderatiùs enim & cum mordacitate desiccatur, talia nanque irritantur hoc pacto, & phlegmone grauari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienosis quoque vtilis est, quum altera prodesse nondum possit.

EX PLINIO.

Ifatidis folia trita cum polenta, vulneribus profunt. Sanguinem sistit. Phagedænas & putrescentia vlcera, & quæ serpunt, sanant, Item tumores ante suppurationem. Cōtra ignem sacrum, radice vel folijs prodest, vel ad lienes pota.

ADNOTATIO.

Ifatis sylvestris nobis Guesde.

De Itea.

Cap. CXXVII.

NOMINA.

ITia Græcis, Salix Latinis, [Vveiden, oder Feiber] Germanis Gallicè *Saulx* appellatur. Salix verò à saliendo dicta est, quòd ea celeritate crescat, vt quasi salire videatur. Sic etiam Iteam quasi Salicem vocauerunt Græci.

GENERA.

Tria Salicis genera Theophrastus lib. iij. capi. xij. de historia plantarum recenset. Primam nigram nominari dicit, quòd nigro aut puniceo cortice obducta sit, Secundam candidam, quòd candido obducatur cortice. Terriam coactæ breuitatis ac pumilā, Helicen Arcadibus appellari scribit. Plinius etiam lib. xvij. cap. xxxvij. tria Salicis nomina cōmemorat: Viminalem, eandemque purpuream: Vitellinā à colo

à colore luteo, graciliorem priore: Gallicam, quæ sit tenuis-
sima. Lucius Columella lib. iij. cap. xxx. eiusdè quoq; tria
facit genera, Græcam, Gallicam, & Sabinam, quam etiam
Amerinam vocari à plurimis scribit. Græcam flauï coloris;
Gallicam obsoleti purpurei, tenuissimique viminis, Sabi-
nam gracilibus virgis atque rutilibus esse asserit.



Primum Salicis genus.



Secundum Salicis genus.

Quæ sanè singula pulchrè cum ijs quæ Theophrastus tra-
dit, conuenire videntur. Nam primam Salicis speciẽ, quam
Theophrastus nigram aut puniceam vocat, Plinius Vimi-
nalem, Columella verò Sabinam & Amerinam appellat:
Germani [rot Vveiden] nominant. Secundam speciem,
quã Theophrastus cãdidam, Plinius Vitellinã, Columella
autem Græcam vocant, Germani [geel Vveiden]. Tertiã,
quæ Theophrasto Helix dicitur, Plinius & Columella Gal-
licã appellant, Germani verò à tenuitate [klein Vveiden].

*Tertium Salicis genus.*

Salix breui caudice
conspurgit: ramis longis,
è trunco extremo veluti
à capite prodeuntibus,
lentis, flexilibus: folijs
longis, subtus incanis,
supernè virentibus: flo-
re seu nucamento squa-
matim compactili, la-
nuginoso: propenden-
te fructu, qui facilè an-
tè maturitatem euanes-
cat.

LOCVS.

Aquosis lætatur, ideò-
que auctu perquam fa-
cilis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere. Ocyssimè amittit fructum,
ante quàm omnino maturitatem sentiat, ob id dicta Ho-
mero ὀλισίκαρον, hoc est, frugiperda. Odiss. κ. vbi sic ca-
nit: μακρὰ τ' ἄνθος καὶ ἰταὶ ὀλισίκαροι. Fructum siqui-
dem fert, Plinio autore, abeuntem in araneam ante quàm
percoquatur.

TEMPERAMENTVM.

Salicis tum folia tum flores, citra mordacitatem exic-
cantis sunt facultatis, modicè adstringunt. Cortex tamen
eius siccior.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Adstringunt Salicis folia, fructus, cortex, & succus. Folia
tri

trita cum exiguo pipere & vino pota ileosis conueniunt. Per se etiam cum aqua sumpta, præstant mulieribus ne concipiât. Fructus potus sanguinem expuētibus prodest. Cortex eadem præstat. Vtusus & cum aceto subactus, clauos & callos illitus tollit. Ex folijs & cortice succus in putamine mâli punici cum rosaceo calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri optimû. Furfures exterit. Excipitur etiâ è Salice succus exciso cùm floret cortice: in interiore enim eius parte concretus inuenitur. Vim autem habet exterendi quęcunque pupillę claritati obstât.

EX GALENO.

Salicis folijs ad cruenti vulneris glutinationem quis vti posset. Verûm floribus eius maximè propè omnes vtuntur medici ad exiccantis emplastri præparationem: est enim vis eorum desiccatoria: habent etiam quandam adstrictionem. Sunt qui succum ex ea expressum, medicamen seruēt mordacitatis expers & exiceatorium, ad multas res vtile. Haud enim inuenias quid ad plures res vtilius medicamentum citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam adstringat. Porro arboris cortex similem facultatem obtinet, tum floribus, tum folijs, nisi quod temperaturæ sit siccioris velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusq; cinere vtuntur ad ea omnia quę valenter desiccare oportet. Nam clauos quos vocant, callos, myrmeciasque tollût, aceto ipsum macerantes acri. Nonnulli autem dum floret Salix, corticem eius incidunt, & succum quendam colligût vtunturque ad ea quę pupillas obfuscant, extergente videlicet simulque tenuium partium medicamine. Vti verò illo ad multa alia quis posset, si quidem talis sit.

EX PLINIO.

Salicis fructus ante maturitatem in araneam abit. Sed si prius colligatur, sanguinem reiicientibus prodest. Corticis è ramis primis cinis, clauum & callum aqua mixta sanat. Vitia cutis in facie emendat, magis admixto succo suo. Est autem hic trium generum. Vnû arbor ipsa exudat gûmi modo. Alterum manat in plaga cùm floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine. Hic ad purgandâ quę obstant

stant oculis, item ad spissanda quæ opus sunt, ciendamque vrinam, & ad omnes collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detruicatione ramorum à falce destillans. Ex ijs aliquis cum rosaceo in calyce mali punici calfactus, auribus infunditur, vel folia cocta, & cum cera trita imponuntur. Item podagricis. Cortice & folijs in vino decoctis fouere neruos vtilissimum. Flos tritus cum folijs, fursures purgat in facie. Folia trita & pota intemperantiâ libidinis coercent, atque in totum auferunt vsum sæpius sumpta.

De Capno. Cap. CXXVIII.

NOMINA.

KΑΥΘ Græcis, Fumaria Latinis: Officinis Fumus terre, Germanis [Erdrauch, Daubenkropff, Katzenkorbel] Gallicè *Fumeterre*,

ou pied de Geline appellatur. Fumaria verò hæc herba dicta est, propterea quod succus eius oculis inditus, veluti fumus lachrymas mouet, oculosque mordicat.



FORMA.

Fruticosa herbula est, Coriandro similis, tenera admodum, folijs candidioribus, cineracei coloris, vndique numerosis: flore purpureo.

Fumaria seu Fumus terra.

LOCVS.

Nascitur in segetibus hordeaceis, hortis, vineis, sepibus, & macerijs, alijsque locis incultis atque pinguibus.

TEMPVS.

Carpitur in fine Maij mensis & Septembris.

TEMPERAMENTVM.

Capnos calida & sicca in secūdo esse videtur ordine, id quod ex gustu patet: acris enim & amara est.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Huius succus acris est, visum acuit: lachrymas ducit, unde & nomen traxit. Illitus cum gummi duplices palpebrarum pilos renasci non finit. Commanducata herba biliosam vriuam trahit.

EXGALENO.

Capnos acris simul & amaræ qualitatis est particeps, nec tamen planè expers est acerbæ. Quamobrem biliosam vrinam multam prouocat, sanatque iecinoris obstructiōnes & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non parum lachrymarum trahens, veluti ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea vti solebat ad stomachum roborandum, vnaque ventrem lubricandum. Siquidem herbam priuūm desiccata condebat: dein cum vti volebat, subductionis quidem gratia, melicrato inspergebat: roborandi verò causa, vino nimirum diluto.

EXPLINIO.

Claritatem facit iūunctis oculis, de lachrymationemque ceu fumus unde nomen accepit. Eadem euulsas palpebras renasci prohibet. Bilem per vrinam trahit.

De Cici. Cap. CXXIX.

NOMINA.

KICI, ἡ ἐρίσσω Græcis, Ricinus Latinis, Mauritanis Kerua, Officinis nonnullis Cataputia maior, quibusdam etiam Pentadactylon & Palma Christi, quod scilicet eius folia in humanæ manus effigiem articulentur. Germanis [Vnderbaum, oder Creutzbau] Gallis autem *Paulme Dieu* dicitur. Croton autem & Ricinus à similitudine animalis; quod

quod semen eius referre videtur, nominata est. Sunt enim Græcis *κετρον*, & Latinis Ricini, insecta animantia, quæ canibus præsertim adhærent, quibus cibi nullus exitus est, colore limbo, nullis discreta membris, in globum continuè crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies sponte sua decidunt. Hinc est quod à Germanis nostris [Zecken-korner] nominantur.

FORMA.



Arbor est parvæ fici magnitudine, folia Platano similia habens, maiora tamen, leuiora & nigriora. Caudices verò & ramos arundinis modo concavos. Semen in vuis racemifve asperis, quod cortice nudatum, Ricino animali simile est. Quæ descriptio ita picturæ quadrat, ut nihil magis.

LOCVS.

Nascitur nusquam in Germania nostra, nisi satum fuerit. Satum autem semel copiosè provenit, Sine difficultate etiam passim iam in hortis provenit.

Ricinus, siue Palma Christi.

TEMPVS.

Carpitur Autumno dum semine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Ricinum in secundo vel summum tertio ordine calefacientium & siccantium esse apparet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Ex semine Ricini oleum nomine Ricinum exprimitur, ad edendum minimè aptum: alioquin tamen lucernis & emplastris vtile. Grana triginta numero putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, & aquam per aluum deijciunt, Vomitiones etiã mouent. Est verò iuuicũda admodũ & laboriosa huiusmodi purgatio: stomachum enim validè subuertit. Tusa & illita varos, maculãsq; sũle cõtractas purgãt. Folia trita cũ polenta, oculorũ œdemata & inflammationes sedant, mammãsq; turgentes cohibet. Per se aut cũ aceto illita, ignes sacros restringunt.

EX GALENO.

Semen Ricini, quod etiam purgat, extergendi & digerendi facultatem obtinet. Sic verò & folium, sed vndeque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius, tum tenuiorum partium, quàm est oleum commune, ac proinde quòque digerit.

De Cirſio.

Cap. CXXX.

NOMINA.

KΙρσιον Græcè, Spina mollis, Buglossum magnum Latine nominatur. Officinæ, necnō herbarij Buglossam vel linguam bouis vocant. Cirſion autem eò quòd varices (quos Græci κίρσιος nominant) sanet, dicta est. Germanis [Ochsenzung] appellatur.

GENERA.

Nos duo damus genera, quorum vnum Germanicum, Alterum verò Italicũ est, in quo omnia sunt maiora. Prius Gallis *Buglosse sauvage ou Lange de Beuf*, Alterum verò *Languette de Bouc*, Officinisq; Barba hircina nuncupatur.

FORMA.

Caulis est tener, duũ cubitorum, triangularis. Ab inferiore parte foliolis rosaceorum figura, angulos spinosos per interualla, sed molles habentibus. Folia Buglossi similia, modicè hirsuta, longiora, albicantia, extremitatibus aculeata obrinet. Cacumen in caule orbiculatum, hirsutum, in quo



Cirsium Germanicum.

Cirsium Italicum.

in quo capitula in summo purpurea, q̄ in lanugines ena-
rescunt. Hæc sanè descriptio satis monstrat, Cirsion esse
Buglossam hodie vocatam, cum ei delineationes omnes,
nulla ferè reclamante nota, conueniant. Siquidem canlis &
tener, bicubitalis, triagularis, spinosis per interualla angu-
lis, sed mollibus & innoxijs aculeis. Folia Buglossæ similia
longiora tamen, aut legè μικρότερα, hoc est, minora, cū Pli-
nio: subcandida, leniter hirsuta, in extremis partibus acu-
leata. Cacumē quoque caulis circinatum, hirsutum, in quo
capitula purpurea. Et si verò reliqua omnia conueniant,
tamen capitula purpurea non abeunt in pappos neque in
nostra, neque in Italica.

LOCVS.

Producitur locis cultis & incultis, arenosis potissimum
& pe

& petrosis. Italicum etiam hodie in multis hortis magna copia nascitur.

TEMPVS.

Carpitur Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

In primo calefacere & humectare ordine apparet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radice[m] Cirsij laboranti loco adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

EX PLINIO.

Hanc herbam radicemve eius adalligatam, dolores varicum sanare tradunt.

APPENDIX.

Non plures iam commemoratis facultates Cirsio, Dioscorides & veteres alij tribuunt. Videant igitur nostræ ætatis medici, ne temerè Buglossæ suæ quas non obtinet vires adscribant.

ADNOTATIO.

Cirsium Buglossum.

De Corianno. Cap. CXXXI.

NOMINA.

Kοριον, ἢ κοριάννον Græcis, Corion seu Coriannon Latinis, Vulgo & Officinis Coriandron. Germanis, qui Latinam seu officinarum appellationem imitantur, [Coriander] Gallicè *Coriandre* nominatur. Corio nomē fecisse cimices verisimile est, quos folia & caules eius olent: κηροδὲ enim Græcis insecti id genus est, quod Latinis cimex dicitur.

FORMA.

Caulis Corianno exilis, sesquicubitalis, ramosus. Folium dum primum erumpit Adianti, dein Fumariæ, odore gratum. Flores candidos. Semen rotundum ac nudum, firmum & diutinum. Radicem breuiusculam, ligneam, neque admodum fibratam.

LOCVS.

Amat terram pinguem, Palladio teste, sed & macro solo nascitur. Nunquam autem nisi satum provenit.

y TEM



Coriannon siue Coriandrum.
clariùs innotescet.

Autumno dum semine prægnans est, carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Coriandri temperamentum minimè frigidum ac simplex est, sed variè coalitum & compositum. Est enim copiosæ quidem amaritudinis particeps, quæ in tenui simul ac terrestri substantia fundatur sed & aquosæ humiditatis tepidæ ei nõ parū inest. Habet etiam adstrictionis uonnihil, sicut paulò pòst ex Galeni verbis

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vim refrigeratariam habet Coriandrum, vnde illitum cum pane aut polenta erysipelatis, & herpetibus medetur. Epinyctidas, testium inflammationes, carbunculósq; cum melle & vua passa sanat. Cum lomento strumas & tubercula discutit. Lumbricos semen cum passo potum pellit, genituramq; auget. Largiùs tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet, quapropter copiosorem & continuū eius vsum cauere oportet. Succus cum cerussa, aut argenti spuma, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes in summa cute inflammationes iuuat.

EX GALENO.

Coriannon siue Corion, aut vtcunq; vocare lubet, Vires
fiores

fliores Græci Coriannon nominabāt, ac recētioreſ omnes medici Coriō appellitāt, ſicut & Dioſcorides refrigeratoriā eſſe herbam dictitans, ſed perperant. Siquidem ex contrariis conſtat facultatibus, plurimum habens amaræ eſſentiaē, quam oſtendimus eſſe tenuium partium, & terrenam, nec modicum etiam aqueæ humiditatis obtinentem, quæ eſt facultatis tepidæ. Habet autem & adſtrictionis pauxillum. Ex quibus omnibus variè quidem agit ea quæ ſcribit Dioſcorides, & non tantum ex refrigeratione. Cæterum ego cuiuſque particulatim actionis cauſam enarrabo, tamenſi propoſitum fuerat mei vnius duntaxat hoc in libro ſententiam expromere. Sed fortè nihil obſtabit, imò ſi verum fatendum eſt, proderit nonnihil ſuperiores methodos quæ in paucis medicamenti ſunt dictæ, hunc in modum repetere. Primum ergo non Dioſcorides tantum, ſed & alij complures medicorum indeterminatè, & citra limitationem de morbis pronunciant, ſicut ſanè hac quoque tempeſtate nō paucos reperiās medicos inſignes, præter alia, hæc in re maximè hallucinantes. Interdum enim atra, liuida, frigidaque reddita parte quæ eryſipelas habuit, nec amplius refrigerantia poſcente medicamenta, ceu antea, ſed ea quæ inſixum parti præter naturam humorem euacuent, ij tamen refrigerare perſeuerant. Aliquando autem ad digerentia quidem tranſeunt, cæterum eryſipelas ſanare dicunt. Et ſanè ſcribunt incipientibus etiamnum & creſcentibus eryſipelatis alia connenire medicamenta, aliaq; declinantibus. Verū res ita non habet. Neque enim eryſipelas etiam vocari debet poſteaquam inflammatio eius & feruor, ac bilioſum illud abierint: neque quæ facultate ſunt frigida, neque quæ illa ſanant, remedio eſſe putandum eſt: ſed velut ſi vel initio protinus aut percuffis, aut alia de cauſa quauis tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, cum frigidum eſſe affectum exiſtimabis, & quæ digerant excaſciātq; poſcere: ad eundem modum ſi calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior eſt, ſed ſecunda alio nomine appellanda. Aut ſi diſplicet nominis mutatio, ſaltem ſicut aliqui alia ſcribunt principi, alia declinationis reme-

dia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendū sanè est, si cui ita placet, vt talis affectio etiā erysipelas vocetur: sed eam etiā calidā dicere vbi iam refrigerata est, id verò neutiquā concedendū. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratoriū esse credamus, sicut Dioscorides Coriannō, quod, vt ipse ait, cū pane aut polenta illitū, erysipelas sanat. Nam quod exquisitū est erysipelas, & iam vti que inflāmatum & flauum est, nequaquam cū pane sanabit Coriannō: sed illud quod iam refrigeratū est, Proinde nos superioribus voluminibus, quum determinata ac definita experientia cuiusq; medicamenti facultatem explorandam censuimus: quā maximè fieri posset simplicissimum eligi affectum cōsuluimus. At pleriq; medici, neq; quod vel pluri morborū protinus ab initio compositi inuadant, norunt: neq; quod alius affectus sit erysipelas exactum, alius verò is qui vocatur ab omnibus nobis vsitatè, vt à veteribus quoque, phlegmone. Alij aut inter hos medij plurimi, partim vt sic dicā erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelatodes. Ac inuenias nonnunquam vbi neutrum vincat, sed ad vnguem paria sint. Quinetiam nonnūquā œdematodes esse erysipelas cōspicitur, sicut aliud scirrhomodes, vt compositorum morborum haud paruus accretur numerus. De quibus copiosius cū alibi disseruimus, tū in libris de curandi ratione. Dicitur autem & nunc, quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum erysipelas haud vnquam ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, quum à biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quod longè à refrigeratione absit Coriandrum, vel ex ijs quæ ipse scripsit Dioscorides discere licet. Nā strumas, inquit, cū lomento discutit. Quod verò nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutiendis strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitare arbitror, vt qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quæ omnia temperie calida, & actionibus digerentia esse confessus est. Hactenus Galenus. Cuius quidem, etsi proluxa sint, verba ideo recensere placuit, vt vulgi & nonnullorum etiam medicorum errorem detegeremus, qui præ

ter veritatem Coriandri temperamentum esse frigidum asserunt. Deniq; vt ex hoc loco discerent studiosi, quàm periculosum sit Dioscoridis ac aliorum veterum scripta sine limitatiõe sequi. Admonitos quoque lectores esse volumus hoc caput ex eorum esse numero in quo Galenus à Dioscoride dissentit.

EX PLINIO VALERIANO MEDICO.

Non dubitanter Coriandro refrigeratrix potestas datur, nō tamen simplex, vt prudentissimè Galeno videtur, sed cui quēdā portio austeritatis immixta sit, inde quòd quēdā ex eo vitia curātur: quæ nunquam omnino curaret, si sola virtute frigida niteretur. Cum melle & vua passa tritum & impositum, omnes tumores collectionesq; compefeit. Præcipuè tamen isto genere medicaminis doloribus testium subuenitur. Sueco mali granati & oleo in potione permixtū, animalia interaneis innata persequitur. Semen ex aqua potum solutionem ventris stringit. Scriptum à multis legitur tria Coriandri grana, tertianas excludere ante accessionem si fuerint deuorata. Iisdem quoque repellendis efficax est ipsum Coriandrum ante solis ortum ignoranti cervicali viride subiectum. Mirum est quod Xenocrates tradit si vnum seminis granum fœmina biberit, vno die menstrua contineri, biduo si duo, & totidem diebus quot grana sumpserit.

Eadem ferè sunt quæ alter Plinius li. naturalis histo. xx. cap. xx. scribit: ideòque omittere placuit. Tātū addit, Marcum Varronem putare Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptam ætate seruari.

APPENDIX.

Non transeundum silentio erit quod Dioscorides hic diligenter monet, Coriandri copiosum & continuum vsum esse fugiendū. Ideòque errare vehementer recentiores medicos, qui eo tam frequenter, potissimū ad caput roborandum, cui insensissimum est, vtuntur manifestius est quàm vt probatione indigeat. Aquo sanè errore vel id saltem reuocare eos deberet, quòd idem Dioscorides, libro sexto, Coriandrum inter venena connumeret.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonum est, & eundem corroborat. Cibos in ventriculo donec probè concoquātur retinet. Tostū igne ventrem sistit. Prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. Sanguinis profluuium potum, & si imponatur, compefcit. Cum vino potum, lumbricos educit: immodicus tamen eius vsus delirium facit. Huius etiam succus potus venenum est & occidit. Qui enim hunc bibunt, muti fiunt, & desipiunt.

De Cassutha. Cap. CXXXII.

NOMINA.

K Aulax recentioribus Græcis, Cassutha, y, litera in, u, trā seunte, vt sæpe fieri solet, Latinis appellatur: officinis & herbarijs nostræ ætatis hinc deflexa quadam pristini nominis umbra, Cuscutha dicitur, cū primū Cassutha, deinceps conuersa Calscutha, postremo Cuscutha cœperit appellari. Sunt qui Podagram lini vocāt, quod quati compedibus id cui infederit illiget, nec vinctum eo facile possit extricari. Germanis [Filtz kraut: oder Flachszscheiden: oder Todtern] Gallicè *Goutte de lin, ou agoure de lin* dicitur. Errāt qui Dioscoridis Androsacen esse putant, cū veteres Græci, quod scīā, de Cuscutha hodie dicta, nihil memorię prodiderint. Plinius tamen lib. xv. capi. vltimo, eius videtur meminisse ijs verbis. Est & in Syria herba quæ vocatur Cassythas, nō tantū arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluens sese. Cassythas enim legendū non Cadytas: sic enim codices aliquot Pliniani (vt in suis annotationibus doctissimus Hermodolus admonet) ijsque emendatiores, habent. Iam igitur memoria Plinij Cassythas herba suo nomine Syriaco venerat in Latinum, quod multis postea seculis vsurpantes tam Pœni quā Arabes, suis scriptis protriuerūt. Quod autem Plinius sine spiritu protulit, id librariorum culpa factum esse suspicor, qui inuertentes mutarunt Cassythas in Calsythas.

FORMA.

*Cassutha seu Cuscuta.*

Herbosis fruticibus
adnascitur, earum admi-
niculo fulta: radice nul-
la, sed velut ab alarum
sinu prodeunte cirro ca-
pillamentove miræ lon-
gitudinis, statim ab eius
ortu sese ramulis cōvol-
uente. Quæ iam veluti
clauiculis nixa, sensim
proserpens herbarum fa-
stigia scandēs, & crebris
volutionibus opere to-
piario per vertices rota-
ta, comas herbarum cō-
plectitur: tam volubilis
illi natura est. Folijs vi-
dua cernitur. Florē fun-
dit album, semine quoq;
scatet tenui. Cirri dilu-
tiore rutilant purpura,
nonnunquam ex rubro

rufescunt, fidibus lyrarum crassitie pares.

LOCVS.

Non in terra, sed in herbis arboribúsq; passim nascitur
Cassutha, quas tam spisso sæpius irretit contextu, vt ten-
torij modo herbosum cespitem à sole vindicet. Nonnun-
quam cacuminibus impendens stirpes humi deturbat, pro-
priamque parentem suis laqueis strangulat, aut continuò
materni alimenti succu perducit ad tabem.

TEMPVS.

Aestate, Iulio potissimum & Augusto mensibus, maxi-
mus illius in Germania prouentus esset solet: hoc enim tem-
pore tâta eius est luxuria, vt mole sua stirpes oneratae, ferè
procumbere videantur.

y iiij

TEM

TEMPERAMENTVM.

In primo calefacientium abscessu seu ordine, & deficcantium secundo statuendum: quandam enim respicit amaritudinem.

VIRE S.

Abstergendi naturam obtinet, & cum quadam adstrictione roborandi facultate prædita est. Iecinoris impedimenta laxat, infracti et obstruæti lienis expedit vitia, venas pituitosis atq; biliosis exonerat humoribus, pellit vrinam. Regio morbo subuenit, qui iccinoris obstruætionibus contrahitur. Febris ijs auxiliatur, quæ pueros malè habent: sed vsu nimio stomachum sua astrictione grauat: verùm noxa tollitur, si Anisi momentum adijciatur. Natura eius flauam bilem per aluum exigere, sed efficacior cum Absinthio præbet effectum. Hæ quidem ex Pænorum ac Arabum tententia facultates Cassuthæ tribuuntur: qui utique vires illius longè magis gliscere pollicentur, si parentis ingenium ei patrocinetur. Hinc est quòd hanc forsitan veteres Græci, quamuis triuialem, eo nomine subticuerant, quod natiuas suæ meritò parentis dotes adsciuiſſet, è sinu cuius vernaculum ebibens humorem, aleretur. Nam testatum ijdem Arabicæ factionis medici reliquerunt, si calidæ insidet herbæ arborivæ, calidam sortietur facultatem: & si decubuerit frigidæ, vim sibi frigidam vendicabit.

ADNOTATIO.

Cassutha si thymo innascitur Arabum est Epithymum: nobis in satureia, hyssopo & maiorana est sepe visa omnino eadem, nec genere ab hac variare videtur quæ in lino, orobo, lente, vitia etiã luxuriari solet. Ea omni primum radiculis nititur, quæ tum arescunt & vaneſcunt quando primùm à planta, cui inuoluitur, cirris suis alienum depascit alimentum.

De Cestro. Cap. CXXXIII.

NOMINA.

Kεστρος Græcè, Betonica seu Vetonica Latine: in officinis antiquum nomen retinuit. [Braunbetonic] Germanicè, Gallicè Betoine appellatur. Varietate autem & copia remedio

remediorum Cestron à Græcis dicta : hac siquidem voce opus interpuñctum, ac uice pictum nominauere. Libri etiã à varietate subiecti, ab aliquot Græcis hoc titulo inscripti sunt. Plinius quoque aliquando Ebur cestrum, id est, pictum dixit. Betonica uerò ab inuentoribus Yetonibus, Hispaniæ populis, nominata est.

FORMA.

*Betonica.*

Herba est caulem tenuem obtinens, cubiti altitudine, aut maiorem quadrangulum. Folia longa, mollia, quernis similia, per ambitum incisuris diuisa, odorata, prope radicem maiora. In summo caulium semen veluti Thymbræ spicatum inest. Radices subsunt tenues ut Ellebori.

LOCVS.

Nascitur in pratis, syluis, montosis, frigidis & opacis locis, ideòq; Græcis *ψυχρόφρον* vocata est.

TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus, floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca in primo ordine completo, aut in medio secundi.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Folia Betonicæ carpuntur & siccantur plurimos ad vsus, Radices cum hydromelite potæ, pituitosam vomitionem cliciunt. Folia dantur ruptis, conuulsis, vuluæ affectionibus

y v & eius

& eiusdē strangulationibus, drachmæ vnus pondere cum hydromelite. Ternæ in vini sextarijs duobus cōtra serpentium morsus ebibuntur. Herba ipsa illita, venenatorū moribus prodest. Aduersus etiam venena drachma ex vino pota conuenit. Hanc si quis præsumperit, lethale haustum venenum nihil nocebit. Vrinam cit, Aluum subducit. Medetur comitialibus & furiosis cum aqua pota. Iecinoris & lienis vitijs drachmæ pondere cum aceto mulso pota succurrit. Cōcoctionem adiuuat: si quis à cœna eam fabæ magnitudine cum melle cocto deuorauerit. Eodem modo & acida tuāantibus propinatur. Stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vino sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus trium obolorum pondere cum diluti vini cyatho vno. Ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua. Hydropicis aurē binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, nō febricitantibus cum mulso. Regio morbo laborantes recreat. Mēses ducit drachmæ pondere cū vino pota. Aluum purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decē potæ. Cū melle tabidis, purulentis auxiliatur. Folia cū inaruerint trita ad hos effectus fictili vase reponuntur.

EX GALENO.

Vim habet incidendi, vt gustus indicat. Amariuscula enim est, & subacris ipsa herba, id quod & particularim edita ostendit actio. Nam consistentes in renibus lapides rūpit, et pulmonem & thoracē & iecur expurgat, abstergitq;. Menses mouet, & comitialibus prodest. Rupta, atq; cōuulsa curat & omnibus bestiarum moribus illita vlceri auxiliatur. Acidum ructantibus & ischiadicis bibita succurrit.

EX PLINIO.

Morsibus serpentum inponitur Betonica præcipuē, cui vis tanta perhibetur, vt inclusæ circulo eius serpentes, ipsæ sese interimant flagellando. Datur & ad ictus semen eius denarij pondere cū tribus cyathis vini, vel farina drachmis tribus sextario aquæ inponitur. Obolis tribus in aqua, cōtra purulentas, contrāque cruentas excreationes facit. Faciles præstat vomitiones radix eius Ellebori modo, quatuor
drach

drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spinae leuat eiusdem farina ex aqua mulsa. Aluū soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Folia siccantur in farinam plurimos ad vsus. Fit vinum ex ea & acetum, stomacho & claritati oculorum. Paraly sin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad lateris & pectoris dolores farina eius bibitur.

ADNOTATIO.

Betonica Betoine, Sylvestris autem duplex, nobis Armoire dicitur tunica & tunica ablata prima syllaba, & o in v corrupta of ficinis, Altilis autem nobis ocellus Oeillet dicitur.

De Betonica altera Cap. CXXXIII.

NOMINA.


DVAS esse Betonice species præter Paulum Aegine tam lib. 7. Plinius etiam lib. 2 5. cap. 8. abundè docet, & in aliquibus Dioscoridis codicibus huius quoque secunde Betonice mentio fit. Hanc itaque posteriorum, tam officinae quam herbarij medici Tunicam, detractis à Betonica duabus literis prioribus, nominant. Germanis [Grafzblumen & Negelblumen,] quod flores eius garyophyllorum odorem referant, appellare placuit.

GENERA.

Duū est generū. Vna siquidem sylvestris est, quam Germani [Vild Negelblumen,] hoc est, sylvestrem Gariophylleā, & [Dödernegele, Feldtnegele, & Bluotztropffle] Gallicè *Armoire*. Altera altilis est quæ alio nomine Betonica seu Vetonica coronaria, quod illius in coronis vsus sit, dicitur. Germani [heymisch Negelblumen] quasi dominatam Gariophylleam appellant, Gallicè *Oeillet*.

FORMA

Specie multum à priore Betonica differt. Radicem enim totam rubram, odoratamque habet. Folia porracea, oblonga, stamine, quo mediū diuiditur, puniceo ac rubete, cū recto calamo triangula, floribus in vertice purpureis. Hec Dioscoridis delineatio utriusque generi communis est: priuatim tamen sylvestris Betonica herba fruticosa est, folijs porri, oblon



Betonica sylvestris. *Betonica sylvestris altera.*

oblongis, angustis, per extremum mucronatis, cæsis, concoloribus calamis, teretibus, geniculatis, cubitalibus: floribus speciosis, simplicibus, qui quinis senisve folijs cōstant, lentè fimbriatis, magna ex parte purpureis, quamvis & interdum niuci conspiciantur. Atilis seu coronaria, folijs est porraceis, oblongis, per extremum mucronatis, concoloratu cæsis, teretibus cauliculis sesquicubitalibus, geniculatis cocuntibus pyxidatim internodijs, floribus omnium speciosissimis, Gariophyllorū odoratu, sed longè suauissimo, quandoquidem alius cocco rutilat, alius saturata nitet purpura, alius candido, alius emaculato blanditur colore, alius versicolore variatur cōmistu. Omnibus teres lōgiusculusq; calix spectatur, orbiculo superiorum denticulatus, à quo quina senave folia prodeunt, lentè quidem fimbriata. Nō
nulli



*Betonica Altilis seu
Coronaria.*

nulli tamen flores frequentiore coma stipantur, geminis vtrinque emicantibus flaminibus apicibus.

LOCVS.

Syluestris in pratis montibus, nitidisq; locis nascitur. Coronaria verò passim in fictilibus vasis alitur, neque facillè ædes inuenies, ante quas non expositam intuearis.

TEMPVS.

In æstate vtriusque magna est copia. Coronaria tamen longiori tempore durat, atque æstiuas, autumnales hyemalesque struit coronas.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse tum amaritudo, tum odor & alia multa declarant.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Animas hominum & corpora custodit. Contra nocturnas peregrinationes, loca insidiosa, & difficiles somnos commendatur. In totum, ad omnem medendi rationem celebrata. Recens trita vulneribus capitis indita dolorem finit. Vulnera glutinat. Fracta ossa extrahit, & hoc quotidie efficit, donec persanescat. Dolori capitis medetur, si decocta ea ex aqua caput perfundatur, aut temporibus cum bitumine ilinatur, aut radix eiusdem suffiatur.

EX INCERTO.

Farina eius tam aduersus toxica quam serpentum & scorpi-

pionum i&us ex albo vino bibitur. Quartauæ reliquarum que febriû horrores discutit. Comitialibus opitulatur sub ipsam accessiorem propinata. Eadem per se carcinomatis inspergitur, quæ tamen præstiterit herbæ succo prius abluis se. Estur contra ventris tēnias. Succus, pestis arcet cōtagia, atque etiam hanstus si iam morbus inuaserit, liberat. Fit ex flore oleum ad canis rabiosi morsus, ad fistulas & parotidas, quibus illitu medetur. Visus acie exacuit. Ieiuno sumpta dolorem dentium sedat, iure decocti colluto ore. Discutit grauedines. Partum, qui sine febre sit, accelerat. Neruorum vulneribus imponitur. Præsumpta ebrietatem arcet. Intertriginem in itinere faciundo non sentient, qui ex vino biberint. Fastidia cum aceto mulso discutit. Is qui ex morbis sese recolligunt, aluum ex aqua calida deiecit. Vomitiones cohibet. Dolores podagræ ac inflationes ventris sedat. Venena rabiosi canis morsu impressa elicit plagæ diutius illigata.

APPENDIX.

Recentiores sylvestris Beroñicæ succum mirificè commendant in atterendo & educendo calculo, & medendis comitialibus. Altis autem radicem contra pestis contagia vtilem esse tradunt. Hanc ob causam ex floribus etiam eiusdem, medicamentum conficiunt, quod Conseruam hodie vocant, quod ad eundem usum adhibent.

De Colchico. Cap. CXXXV.

NOMINA.

KΟλχικόν, ή τριήμερον Græcis, Bulbus agrestis Latinis Officinis & herbarijs Hermodactylus dicitur. Germanis [Zeitlosen] Gallicè *Mort au chien ou Chiennee*. Colchicum à Colchide veneni ferace, in qua nascitur, nomen desumpsit. Dicitur verò est Ephemereum, quoniam vno die sumptû interficiat, atque adeò ab altero Ephemero, quod minimè lethale est, & de quo suo loco diximus, non solum figura, verum etiam facultatibus differt. Et si verò Ephemeron Colchicum etiam significet, tamen præcipuè id Ephemeron quod veneno caret, hoc nomine intelligitur.

FORMA.

*Colchicum, cum floribus.**Colchici folia & semen.*

Autumni exitu florem subcandidum, crocino similem profert. Post florem folia Bulbo similia, pinguiora tamen. Caulem palmo altum, rufum, ferētem semen. Radicem habentem corticem in nigro rufescentem, quæ cortice suo nudata, alba, tenera, succo plena, & dulcis inuenitur. Habet Bulbus eius in medio rimā fissurā mve vnde flos erumpit. Huius descriptionis in vniuersum notæ omnes ita Hermodactylo nostro conueniunt, vt nemo, nisi Tiresia cæcior sit, Dioscoridis esse Colchicū ambigere possit. Exitu enim autumnii in pratis florem ædit albicantem, croci floribus similem. Posterius, februario nimirum mense & primo ita rim vere. Folia Bulbi, sed pinguiora. Caulem palmēū ferentem semen rufum. Radicem cortice in nigro colore rufescēte, quæ decorticata candicat, tenerāq; , succo plena, & dul-

cis ap

cis apparet. Bulbus etiam eiusdem diuisionem in medio obtinet, ex qua flos erumpit, vt pictura exquisitè tibi monstrat. His accedit, quòd Serapio Arabs sub nomine Hermodaëtyli, Dioscoridis Colchicon prorsus depingat. Alium tamen esse à nostro Hermodaëtylo illum putamus, quem Actius, Páulus Aegineta lib.vij, & Actuarius peculiariter & priuatim articulorum doloribus cōducere scribunt. Paulus enim separatim tanquam diuersorum mētionem fecit, & de Colchico & Ephemero diuersa ab Hermodaëtylo capita constituit.

LOCVS.

Magnus Colchici in Messenia, & apud Colchos prouentus. Nasceitur & passim in omnibus pratis Germaniæ nostræ.

TEMPVS.

Flores in Autumni exitu, vt diximus, apparent. Folia autem post flores generantur, & primo statim vere è terra erumpunt. Semen in æstate Iunio potissimùm mense producitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum nonnulli Colchicum in secundo ordine, seu à medio recessu statimnt.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix eius comesta fungorum modo strangulando enecat. Hanc autè depinximus, ne pro Bulbo deuorata aliquē lateat. Mirum est enim quantum ignaros propter suauitatem innitet. Hæc Dioscorides. Proinde satis liquet Hermodaëtyli huius nostri vsum minimè tutū esse: venenū enim est, & vsque ad sanguinis excretionem per inferna subducit. Eius tamen, radicis potissimùm & foliorum, ad enecandos ac abigendos pediculos vsus esse potest.

REMEDIA CONTRA COLCHICVM.

Remedio sunt edentibus quæcunq; cōtra fungos opem ferunt. Bubulum etiam lac potum, aded vt quoties hoc adfuerit, nullum præterea quærendum præsidium sit.

EX

EX PAVLO.

Ephemerum, quod nonnulli Colchicon, eò quòd in Colchide nascatur, vocāt aut Bulbum agrestem, epotum, protinus totum corpus prurire facit, vel ut vrtica & scilla tantum irritatūque interiora erodit, stomachum vrit cum ponderosa grauitate, Innascente autem malo, cruenta strigmentis mista per aluum egeruntur. Succurrendum, vt Salamandræ, vomitionibus & clysteribus, Sed ante quàm vires sibi adsciscat venenum, dari debet foliorum quercus, aut glandium, aut malicorij, aut serpylli decoctum cum lacte bibendum: aut Polygonij succus, aut surculorum vitis, aut rubi, aut tenerarū ferularum medullæ, aut myrti cum vino. Benefacit etiam castanearū interior tunícula, si cum aliquo è succis, quos prædiximus, assumatur. Origanum quoque cum lixiua potum, in idem efficax est. Adeò verò exactum præsidium est lac vaccinum calidum potum, & simul in ore contentum, vt hoc præsentē, nullum aliud consideretur.

ADNOTATIO.

Colchicon à necandis canibus nobis Tue chien, Ephemerum non lethale nobis lilium conuallium & grand muguet.

De Clematide Daphnoide.

Cap. CXXXVI.

NOMINA.

Κλεματίς δαφνοειδής Græcis, Clematis Daphnoides Latinis, Peruinca Officinis, Vinca peruinca vulgò nominatur. Germanis, eò quòd semper vireat, [Vngruen: vel Syngruen], Gallicè *Peruèche*. Clematida Græci, quoniam κλήματα, hoc est, sarmenta seu viticulas per terram spargat, dixerunt. Daphnoida verò à foliorum Lauri, quam eius folia habent, figura. Plinius lib. xxiii. cap. xv. Clematida Aegyptiam nominat: libro autē xxj. ca. xj. Vincamperuinca, aliòq; nomine Chamædaphnen dici tradit, quòd scilicet humilis videatur Laurus, vt nomē sonat. Non est autē eūcam Chamædaphnen putes, quæ Romanis Laureola

z

aut

aut Laurago dicta est, hæc enim à Vincaperuinca genere & facultatibus diuersa est, & seorsim illam Chamædaphnē depingit Plinius lib. xxiiij. cap. xv. vt hinc manifestissimū sit Plinio duplicem esse Chamædaphnen. Vnam quam sic appellant Dioscorides, Galenus, & alij Græci. Alteram quam priuatim Vincamperuincam alio nomine vocat Plinius. Sic autem, quod huius serpat, & se in modum funiculi porrigat vicina quæque vinciens, appellat.

FORMA.



Clematis Daphnoides.

ret, in modum lineæ folijs geniculatim circumdata. Hybernæ sua perpetua fronde texit coronas.

LOCVS.

Gignitur pingui, umbroso, lætæque solo, sed inculto, in agrorum vinearumque marginibus.

TEMPVS.

Hæc

Hæc cſi nunquã non viſceat, vere tamen duntaxat flo-
reſcere videtur, Martio potiſſimùm menſe & Aprili.

TEMPERAMENTVM.

Siccitas in Clematide, Paulo Aegineta teſte, cæteris qua-
litatibus præualet. Id quod guſtus etiam oſtendit: guſtanti
enim adſtrictionem quandã & amarorem habere videtur.
Adſtringit autem modicè, ſed fortiter amara eſt. Siccat ita-
que, at citra mordicationem.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius caules ac folia in vino pota, alui profluuia & dy-
ſenterias finiunt. Vteri dolores cū lacte & roſaceo, aut cy-
prino, in peſſo appoſita ſanāt. Cōmanducata, dentiũ dolo-
rem mitigant. Venenatorũ morſibus impoſita proſunt. Fe-
runtur & aſpidum morſibus cum aceto pota auxiliari.

EX GALENO.

Clematis daphnoides nequaquam eſt exulceratoria,
neque acris, imò alui profluuijs & dyſenterijs cū vino po-
ta prodeſt, dentiumque dolores manſa mitigat. Vteri do-
loribus in peſſo admodum vſui eſt, tantũ abeſt vt vrat aut
viceret.

EX PAVLO.

Clematis quibuſdam Daphnoides, alijs Myrſinoides, nõ
nullis Polygonoides, ſarmenta habet prælõga, craſſitudine
iunci, foliorũ verò Lauri. Siccãdi facultate pollet, qua alui
fluores, difficultates inteſtinorum, & dentiũ dolores finit.
Contra venenatorum morſus prodeſt.

APPENDIX.

Iam cōmemorata facultates ſatis oſtendunt Clematida
daphnoida eſſe Vincamperuincam. nã codex antiquus ma-
nu ſcriptus, quẽ in rebus dubijs lubens cito & ſequor, eaſdẽ
prorſus vires Peruincę tribuit. Sanguinis enim è naribus, p-
fluuiio mirum in modum prodeſſe tradit. Item ijs qui ſan-
guinem vomũt, aut ſpuunt. In ſumma omnem ſanguinis
fluxũ folia eius ſiſtere aſſerit, ita vt euidentiffimum ſit Pe-
ruincam officinarũ eandem eſſe cum Clematide hæc noſtra.
Quibus etiã accedit pictura & deſcriptio eiufdem, quẽ vtra-
que adamuſſim Peruincæ noſtræ reſpondent.

affurgit sesquipedalibus, statim à radice minorum foliorum pediculo, floribus candidis, semine per ramorum latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore.

LOCVS.

Pasim in hortis satum prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimū mense. Sequenti tempore semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Nasturtij semen calefacit & desiccatur ordine quarto. Herba quoque sicca similē semini facultatem possidet. Humida autē adhuc & viridis propter aqueę humiditatis admisti onem multò inferior est, adeoque sic mordacitas eius moderata est, ut cum pane ea uti liceat seu opsonio.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Omnium semen calefacit, acre est, & stomacho inimicū. Aluum turbat. Lumbricos pellit. Lienem imminuit. Fœtus in utero enecat. Menses cit. Venerē excitat. Sinapis & Erucæ semini simile est. Lepras & impetigines abstergit. Lienē illitum cum melle extenuat & reprimat, & fauos expurgat. Sorbitionibus incoctum ea quæ in thorace sunt educit. Potum serpentibus aduersatur. Suffitu easdem fugat. Capillos deciduos continet. Carbunculos rumpit ad suppurationem ducens. Ischiadicis cum polenta & aceto illitū cōfert. Oedemata & inflammationes discutit. Furunculos cū muria illitum ad suppurationē ducit. Herba omnia eadem, sed minore effectu, potest.

EXGALENO.

Nasturtij semen adurentis est facultatis particeps sicut Sinapi. Proinde coxendicis & capitis dolores, atque adeo quodcunque rubrificationem postulat, eo perinde atque Sinapi excalefaciunt: miscetur quoque remedijs quæ exhibentur asthmaticis, tanquam id quod crassos humores valenter incidere valet, velut & Sinapi. Nam per omnia ei simile est.

EXPLINIO.

z iij

Nastur

FORMA.

*Lilium Candidum.**Lilium Croceum*

Lilium caule simplici, raro duplici, tricubitali, comoso, folijs longis, Satyrij effigie, ex herbaceo nitentibus, flore eximij candoris, folijs foris striatis, & ab angustijs in latitudinem se paulatim laxantibus, forma calathi, resupinis per ambitum labris, luteis emicantibus ex fundo calycis apicibus, alterius quàm flos odoris, constat. Flos ille languido semper collo est, non sufficiente capitis oneri. Radix bulbosa. Hæc descriptio planè huic Lilio conuenit, quod hodie candidum vocamus. Nos alterius etiam generis picturam adiecimus, quod Croceum appellauimus, à flore eius, qui non, vt in priore, candidus, sed croceus est. Folia quoq; eius angustiora sunt quàm prioris, aliàs simile, vt pictura luculenter ostendit.

LOCVS.

Passim apud nos in hortis prouenit.

z iijj

TEM

TEMPVS.

Floret initio mensis Iunij.

TEMPERAMENTVM.

Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utique in gustu amaritudinem habet partim ex aquea, eaque temperata. Radix autem & folia primi ordinis sunt exiccantium & abstergentium. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in folijs.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Ex Lilij flore vnguentum fit, quod ab alijs Lirinum, ab alijs Sufinū appellatur, ad emolliendos nervos, priuatimque vulvarum durities aptum. Folia herbæ illita, serpentium moribus subueniunt. Feruescēta ambustis prosunt. Eadē, in aceto condita vulneribus opitulantur. Succus foliorum cum aceto & melle in æreo vase coctus, contra vetusta ulcera, & recentia vulnera medicamentum fit. Radix assa, aut cum rosaceo trita ambustis medetur, vuluam emollit, menstrua ducit, & ulceribus cicatricē inducit. Cum melle subacta neruorum præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphos, lepras, furfurēsq; emendat. Achores abstergit, faciēmq; emendat & erugat. Testiculorū inflammationes trita cum aceto, aut Hyoscyami folijs, & farina triticea, demulcet. Semen contra serpentium morsus potum valet. Illinuntur facris ignibus semen & folia cum vino trita.

EX GALENO.

Quod ex flore Lilij conficitur oleum & vnguentum, citra mordicationem digerendi simulque emolliendi facultatem obtinet. Vnde fit ut vteri duritiebus sit aptissimum. Porro radix foliaque per se trita desiccant, & abstergunt, & digerunt moderatē: proinde quoque ambustis competunt: siquidem hæc quoque moderatē desiccantem extergentēque facultatem postulant. Radicem ergo assam tostamve, ac deinde cum rosaceo contritam, ambustis quoad obducatur cicatrix imponunt: quippe cum alioqui & ad aliorum ulcerum omnium bonum sit inducendæ cicatrici remediū. Quinetiam vteros emollit, mensesque prouocat. Folia verò præcoquen

coquentes, & ipsa ad obductam vsque cicatricē imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed alijs quoque vulneribus. Sed sunt qui aceto ea cōdientes ad vulnera suo tempore vtantur. Quum alphos, aut pforam, aut leprā, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validiūs extergentium, cuiusmodi mel est. Cæterum si id moderatē illi ac cōuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa quæ valenter exiccare postulant absque morfu. Imposuimus verò etiam quandoq; & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus vtroque erat, atque insigne medicamen ad omnia ea quæ exiccare postulant absque morfu fuit, ceu vulnera omnia ingentia, & maximè quæ in capitibus musculorum eueniunt, & quæcunque humida flaccidave, diuturna & egrè ad cicatricem perducuntur.

EX PLINIO.

Lilij radices multis modis florem suum nobilitauerunt, contra serpentiū ictus ex vino potæ, & contra fungorum venena. Propter clauos pedum in vino decoquuntur, triuòque non soluuntur. Cum adipe aut oleo decoctæ pilos adustis reddunt. E mulso potæ inutilem sanguinem cum aluo trahunt. Lienī & ruptis & vulsis profunt, & mēstruis fœminarum, In vino decoctæ impositæque cum melle neruis præcisīs medentur. Lichenas, lepras & furfures in facie emendant. Erugant corpora. Folia in aceto cocta vulneribus imponuntur. Epiphoris testium in melle cum Hyoscya mo & farina tritici, Semen illinitur igni sacro. Flos & folia vlcerum vetustati imponuntur. Succus qui flore expressus est, ab alijs mel, ab alijs syrium vocatur, ad emolliendas vuluas utilis. Sudores mouet, suppuraciones concoquit.

EX SIMEONE SETHI.

Odoratum frigido capiti prodest. Oleum verò quod ex ipso paratur, vim habet discutiendi & emolliendi. Huius autem radice quidam vtuntur ad vulnerum sanationem.

ADNOTATIO.

Lilium nomen retinet. Est nobis & Lilium rubrum vulgò dictum
z v à florib

in colore in flauum inclinante, radice bulbosa, sed crocea, quod hinc croceum vocat.

De Cucurbita Satina. Ca. CXXXIX.

NOMINA.

KΟΛΟΚΥΝΘΑ ὡρίσιμῳ Græcis, Cucurbita Latinis vocatur: Officinæ latinū nomē retinuerūt. Germanis [Kurbisz] Gallicè Courge ou Courle. Græci ex aduerso vocabulum imposuere, ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ nominantes, quod scilicet pumili breuēsque sint partus, quos ipsa passim enititur, cū tamen corporis mole omnes herbarum arborūve fructus videatur superare. Cucurbitam verò Latini à concuruatu haud dubiè dixerunt, quòd facile si quid obstiterit aut fuerit impedimento quo minus extendatur, incuruescat.



Cucurbita maior.



Cucurbita minor.

GENERA.

P. inius lib. xix. cap. v. duo satiuæ Cucurbitæ genera facit. Vnam camerariam vocatam, quæ facili & admodū flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas & testudines opere rit. Alteram plebeiam, quæ scilicet suis flagellis humi repit. Nos ad formam respicientes tria eiusdem genera fecimus. Vnā maiorem, alterā verò minorem. Maiorem vocauimus sic à floribus & fructu, quos maiores habet. Minorem contra, quæ prædicta minora obtinet. Tertiā longiorem, à fructu oblongiore diximus. Ad hanc imitationem Galli priorem *Courge ou Courle grosse*. Alteram *Courle petite*, Tertiā verò *Courge longue* nominauerunt.

FORMA



Cucurbita oblonga.

Cucurbita amplexicaulis est, reptantibus flagellis in altum scandens, in ramosque vitis modo se diffundit, tamē ob caulis infirmitatem humi spargitur, ni propius adsit cui caducus innitatur: folio rotundo, Personatæ aut Asari folijs haud dissimili: flore candido, fructu coloris herbacei primū, flauī paulò post, pyri forma turbinato, qui aut in longum prorogatur, aut in orbem collectus intumescit, aut in breue crassamentum coigitur. Cortex recenti tener, inueterato durus, quo

quo carne prius exinanito peregrè proficiscentes vrceorum vice frequenter vtuntur, in eo vina condentes, quo per iter se à sitis iniuria vindicare possint.

LOCVS.

Amat rigua & aquosa loca Cucurbita, nec nisi sata prouenit.

TEMPVS.

Tardiùs in Germania ob soli frigiditatem fructus Cucurbitæ maturefcit, ideoque vix ante exactum autumnum maturum eius fructū inuenies. Cibus autem quotidianus, donec lignescat, esse potest.

TEMPERAMENTVM.

Cucurbita frigidaë humidæque temperaturæ est, vtraque qualitate secundi ordinis.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Cucurbita cruda trita & illita, œdemata, abscessusque mitigat. Ramenta eius infantibus cōtra capitis ardorem, quā siria sin vocant, in sinuipite vtiliter illinuntur. Oculorū inflammationes, podagrasque similiter iuuant, Succus è ramentis contusis per se, & cum rosaceo instillatus, aurium doloribus auxiliatur. Adustiões cutis inunctus adiuuat. Totius Cucurbitæ elixæ & expressæ succus cum exiguo melle & nitro potus, aluū leniter soluit. Si quis in Cucurbitā crudam excauatam vinum infundat, & sub dio habeat, temperatumque ieiunus bibat, aluum leniter molliet.

EX GALENO.

Succus ramentorum Cucurbitæ ad aurium dolores cum phlegmone iūctos, cum rosaceo vtentibus prodest. Sic tota quoque illita, calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. Comesta humida est, & sitim arcet. Cruda cibo insuaui est stomacho pnitiosa, & cōcoctu planè inexpugnabilis adeo vt si quis alterius cibi inopia ingerere eam compellatur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum algore ventriculo incūbere sit sensurus, stomachūque euertet, & ad vomitionem concitabit, quæ vna eum ab vrgentibus symptomatis liberare potest. Hanc igitur, aliāque ex fugacibus cōplura, aut mox quā elixata est, aut frictam in sartagine, aut assam om

nes homines esse consueuerunt. Ipsa quantum in se est, humidū frigidumque corpori aliuientū prębet, ac id ipsum ea de causa exiguum, sed leniter per aluū subit, cū ob suę substantię lubricitatem, tū ob communem omuium humidorum eiborū rationem, qui scilicet citra adstrictiones tales sunt. Nec sanē iufœliciter concoquitur, modò nō anteuertat corruptio. Plura lib. 2. de alimen. facul. Galenus.

EX PLINIO. VALERIANO.

Veteres medici de Cucurbita ita senserunt, vt eam aquā dicerent coagulata. Galenus humidę putat virtutis & frigide, idque ex eo probat, quod ipsa in cibo sumpta stomachum relaxat, bibendi desideria non excitat. Cætera etiam in Cucurbita talia, vt apertē frigide potestatis exempla demonstrat. Crudę & tritę leniūt omnem tumorem. In cibo sumptę molliunt ventrem. Succus earum, vt Galenus ait: ad compescendum velociter auriculę dolorem tepesfactus infunditur. Idem succus & dolorem dentium mitigat, si diutiùs in ore teneatur. Sed & rosacco inixtus, & vnctioni corporis admotus, febrium restringit ardores. Cinis aridę corticis efficaciter potest combusta sanare. Eundem cinerem didicimus ab expertis vulnera in veretro iam in putredinem versa purgare, & ad cicatricem vsque perducere. Semini sicco illa vis traditur, vt in puluerem tusum & in spersum impleat vulnera quę cauata sunt. Quidā illud in vino bibendum dedere, vt solutiones alui fluentis inhiberet. Viticulę quoque Cucurbitę iam senescentes cum passo & aceto dysentericis datę, miro modo saucia intestina componunt.

EX SIMEONE SETHI.

Concoctu facilis, bonique succi est, & admodū nutrit. Sitim sedat, vrinam cit, & ventrem mouet. Calidis & siccis temperaturis prodest, & inflammationes ventris & iccoris sedat. Pituitosos autem lædit, colicosque affectus, Si malos humores assequitur, ab ijs corrumpitur, & malum succum generat. Semen genitale minuit, & Veneris appetentiam extinguit. Sanguis ex ea procreatus, cōsistentiā tenuis est. Thoraci, pulmoni & veticę prodest. Succus ramentorum
eius

eius cum rosaceo impositus, ad aures inflammatione laborantes confert. Integra verò illita, calidas inflammationes refrigerat.

ADNOTATIO.

Cucurbita lata, Longa, & minor quæ nobis lagenosa dicitur, est frequens.

De Colocynthis. Cap. CXL.

NOMINA.

KΟΛΟΚΥΝΘΙΟ Græcis, Sylvestris Cucurbita Latinis, Colocynthida barbaris & officinis, Germanis [Vvilder] kurbisz, vel Coloquint] Gallis *Coloquinte ou Courle sauvage* appellatur. Sic autem nominata est, quasi parua Cucurbita. Nam si eius fructum satius contuleris, quantitate longè minor erit, ac pilæ forma in orbem coactus.

FORMA.



Viticulas foliâque per terram strata emittit, satiuo Cucumeri, ei nimirum quem Citrulum hodie officinæ vocant, similia: diuisuris scissa, fructum rotundum, mediocri pilæ similem, vehementer amarum, fungosa candidaque intus medulla: flores (quod Dioscorides omisit) palllescentes ac luteos, Cucumeri iam nominato similes.

Colocynthis.

LOCVS.

In Germania sua sponte non nascitur, sata tamen prouenit, sed rarissimè perfectionem attingit, quòd frigidior sit eius terra quàm quòd in ea fructū proferre possit. In orientibus enim & calidioribus locis nata ad nos defertur.

TEMPVS.

Eius flores in fine ferè æstatis, fructus autem extremo autumnò apparèt, qui primùm quidem herbacei, mox pallidi fiunt. Legendi verò sunt cùm cœperint in pallidiorem colorem demutari. Et durat integris natura & viribus ad quinque annos.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in tertio ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Medulla fructus purgandi vim habet, quatuor obolorum pondere cum mulsâ aqua sumpta, & cum nitro, myrrha, & melle coacta in catapotium. Arefactæ pilæ tritæ, vtiliter miscentur clysteribus ischiadicorum, resolutionis neruorum, & colico dolore affectorum, pituitam, bilem & strigmētâ, interdum etiam cruenta educentes. Appositæ scetus enecant. Dentium dolores, si quis repurget hanc, & luto oblinat, & in aceto nitroq; inferuescat, & ad colluendos dentes det, tollit. Si verò quis aquâ mulsam aut passum in ea decoxerit, & sub dio refrigeratum bibendum dederit, crassos humores & strigmenta purgat. Stomacho supra modum aduersatur. Sedi etiâ ex ea balani subiiciuntur, ad extremētâ eiicienda. Quinetiâ virentis succo, ischiadici vtiliter perfricantur.

EX GALENO.

Colocynthis gustu amara est. Sed quæ amarissimo dum potatur adsunt opera medicamento, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam validam in se continet, nimirum cum ijs quæ expurgat, per aluū & ipsa excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadicis prodest.

EX PLINIO.

Herbacea arefacta per se inanit aluum. Infusa quoq; clysteribus intestinorum omnium vitij medetur, & renū, &
lum

lumborum, & paralyſi eiectio ſemine. Aqua mulſa in ea decoquitur ad dimidias, ſic tuſſienti infunditur obolis quatuor. Prodeſt & ſtomacho, farinæ aridæ pilulis cū decocto melle ſumptis. In morbo verò regio vtiliter ſemina eius inſumuntur, & protinus aqua mulſa. Carnes eius cum Abſinthio & ſale, dentium dolorem tollūt. Succus verò cū aceto calefactus mobiles ſiſtit. Item ſpinæ & lumborum ac coxarum dolores, cum oleo ſi inſrictur. Præterea, mirum dictu, ſemina eius ſi fuerint pari numero adalligata febribus, ſana re dicuntur quas Græci periodicas vocant.

De Cotonea Malo. Cap. CXLI.

NOMINA.

KΥδωνία *malia*, Græcis, Malus Cotonea & Cydonia Latinis, Officinis Citonia, Germanis [Kuttenbaum] Gallicè *Coignacier* ou *Coingnier* nominatur. Cydoniam verò Græci à Cydone Cretæ oppido, vnde primum aduecta eſt dixerunt. Cotonea verò à Sidonte Corinthi vico nominata eſt. Sunt tamen, qui ſic vocatam velint, quòd *κωτα* eius lana quadam regi videantur, quæ cotton dicitur. Atqui in re non admodum magni momenti, parum refert vtram amplectaris ſententiam.

GENERA.

Cotoneæ arboris mala, Dioſcoride & Galeno auctoribus duum ſunt generum. Alia enim minora, rotunda, odoratioꝛaque ſunt, quæ vera Cotonea appellantur. Alia autem maiora, dulciora, ac minus acerba. Galeno in ſine libri ſexti de tuenda ſanitate teſte, Struthea nuncupantur.

FORMA.

Arbor notior eſt, quàm vt debeat repræſentari. Malo vulgari haud diſſimilis eſt, niſi q̃ infra magnitudinē illius ſubſidet, fructu ſcilicet incuruatos deprimente ramos, prohibentēque parentem creſcere. Folium quoque eius anguſtiùs à terra albicat. Poma tenui lanugine pubeſcunt, & incifuris criſpantur, vt piçtura affabrè oſtendit.

LOCVS.

*Cotonea Malus.*

In cultis & hortis pro-
uenit. Locum tamen pe-
culiariter & frigidum et
humidum desiderat. Si
in calido statuitur, assi-
dua irrigatione illi suc-
curri opus est: fert tamē
mediocris situs, inter
frigoris & caloris natu-
ram, statum. Planis &
declinis gaudet.

TEMPVS.

Autumno poma eius
maturescunt.

TEMPERA-
MENTVM.

Mala Cotonea frigido & terrestri temperamento dona-
ta sunt, proptèrque vincentem adstrictionem minus cæte-
ris malis humida existunt. Frigida itaque sunt primo ordi-
ne, & sicca secundo.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Cotonea stomacho accommodata sunt, vrinam mouēt.
Tosta mitiora fiunt. Cœliacis, dysentericis, purulenta ex-
creantibus, cholericis prosunt, præsertim cruda. Maceraro-
rum liquor potus, stomachi atque alui fluxionibus opitu-
latur. Succus crudorū assumptus orthopnoicis auxilio est.
Decocto eorum sedes & vuluæ procidentes proluuntur.
Quæ melle condiuntur, vrinam cient, mel autem naturam
eorū induit: quippe adstringēs & conspissans obstruēsvē
fit. Quæ autem cum melle coquuntur, stomacho vtilia sunt,

A

& gustu

& gustu iucunda, minus autem constringunt. Cruda cataplasmatibus miscentur ad cohibendam aluum, contrāq; stomachi subuersionem & ardorem, mammarum inflammationes, henes induratos & condylomata. Fit vinum ex ijs tuis & expressis, sed quò perduret, sedecim sextarijs succi, vnus mellis adijcitur, alioqui acefcit. Prodest autem ad omnia quæ dicta sunt. Vnguentū etiam ex ipsis cōficitur, quod Melinum appellatur, quo vtimur, quando adstringēti oleo opus est. Eligi oportet vera, quæ parua, rotunda & odorata sunt. Struthea autem vocata et magna, minū vtilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus vtilis, ijs potissimum quæ adstrictionem desiderant conueniens. Inflammationibus oculorum, sanguinis reiectionibus, alui fluxionibus, mensūmque impetui cum vino potus prodest.

EX GALENO.

Eximium quid Cotonea præ alijs malis possident: nam & plus adstringunt, & durabilem succum habent, si cocta cum melle asseruare quis cupiat. Aliorum succus repositus acefcit, vtpote frigida humiditate multa redundans. Strutheorum quoque succus perennare potest vbi rectè fuerit præparatus, quemadmodum & Cotoncorum: verū hic minus suauis & iucundius est, maximèque adstringit, ita vt huius quoque aliquando vsus sit idoneus ad ventris maiorem in modum dissoluti, robur restituendum.

EX PLINIO.

Cotonea cocta suauiora: Cruda tamen duntaxat matura, profunt sanguinem excreantibus, ac dysentericis, cholemicis, cœliacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt constringentem illam vim succi. Imponuntur & pectori in febris ardoribus, & tum decoquuntur in aqua, ad eadē quæ superscripta sunt. Ad stomachi autē dolores cruda decoctāve cerati modo imponūtur. Lanugo eorū carbūculos sanat, cocta in vino, et illita cū cera. Alopecij capillū reddūt. Quæ ex ijs cruda in melle cōdiuntur, urinā mouēt. Mellis autem suauitati multū adijciūt, stomachoq; id vtilius faciunt. Quæ verò in melle cōdiuntur cocta, quidā ad stomachi vitia trita cum rosaceo folijs decoctis dant pro ci
bo.

bo. Succus crudorū lienibus, orthopnoicis, hydropicis prodest. Item māmīs, cōdylomatis, varicibus. Flos & viridis & siccus, inflāmationibus oculorū, excreationibus sanguinis, mensibus mulierū. Fit & succus ex ijs mitis, cū vino dulcitusus, utilis & celiacis & iecinori. Decocto quoque eorū fouentur, si procidant vuluē & interanea. Fit & oleum ex ijs quod Melinum vocauimus, quoties nō fuerint in humidis nata. Minus vtilia Struthea, quamuis cognata.

EX SIMEONE SETHI.

Stomachū adstringunt & corroborāt, & ante cibū sumpta ventrem cohibent, vrinam prouocant. Si ad satietatem edantur, difficulter concoquuntur. Dulcia minus adstringunt, acida verò magis, vomitumque compescūt. Post cibū sumpta ventrem mouent: sed quibus est imbecilla facultas ventris retentrix, & excretrix valida, plus cibi accipiant.



Castanea.

• Mansa à potu vini vaporem in caput distribui prohibent. Si qua pręgnans, vt fertur, crebrius hæc comedat, puerum industrium & versutum pariet.

De Castanea.
Cap. CXLII.

NOMINA.

K *Asana* ἡ δίοβελαν, ἡ σαρδιανὰ βελαν, ἡ λίπιμον Gręcis: Castanea, Sardiana glans, Iouis glans, Nuxque castanea Latinis appellatur, Germanis nostris [Castani,] vel [Kesten.] Gallicè *Chastaigner* vocatur.

A ij Casta

Castaneas aut à Castano Magnesiæ oppido, vnde primū aduectæ sunt, nominatas esse constat. Sardianas verò glandes quoniam in Sardinia optimæ nascantur.

FORMA.

Arbor est vulgò cognita, Iuglandi haud quaquam dissimilis folio tantū venosiore & fimbriato. Nux quam producit intus solida, & plurimum plana, triplici tegminis ambitu septa, membrana primum amara, mox lento cortice, demum echinato calyce.

LOCVS.

Puram & resolutam terram desiderat, opacoq; & septentrionali cliuo lætatur. Montes & valles diligit. In plerisque Germaniæ locis copiosissima prouenit.

TEMPVS.

Incunte vere germinat, seriusq; Vergiliarum occasu fructificat.

TEMPERAMENTVM.

Adstringit & exiccat Castanea haud secus quam aliæ glandes. Calida verò & sicca est primo ordine.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Castaneæ adstringunt, eademq; quæ glâdes possunt. Potissimum autem quæ inter carnem & corticem membrana est. Caro his qui Ephemeron, hoc est, Colchicon, biberunt, accommodata est.

EXGALENO.

Castaneæ inter omnes glandes principatum tenent, solęque syluestrium fructuum alimentū memorabile corporibus præbent.

EXPLINIO.

Castaneæ vehementer sistunt stomachi & vëtris fluxiones, sanguinem excreantibus prosunt, carnes alunt.

EXPLINIOVALERIANO.

Castaneæ ex omnibus fortissimum quidem cibum corpori præstant, sed qui difficilè concoquatur. Coctæ autem in carbonibus, vel in fictili vase sicco assatę, & cum melle ieiunis datę, tussientibus prosunt. Aqua in qua cū suo cortice decoquuntur, cœliacis, dysentericis, sanguinemque ex
creant

treantibus bibenda haud inutiliter propinatur. Interior membrana quæ corticem fructumque discernit, ad tertiam partem decocta in aqua, & potui oblata, mirè aluum fluentem refrenat, adeò vt Dioscorides putet etiam cathartico dato, per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquam necesse sit, purget.

EX SIMEONE SETHI.

Copiosum corpori alimentum præbent, tardè transeunt, & difficulter coquuntur. Crassum humorem, capitis dolorem, & flatu efficiunt, ventremque sistunt. Si torreatur, aut siccentur, multum nocuenti deponunt.

APPENDIX.

Capitis dolores creant. Inflationes pariunt, concocti difficiles. Tostæ tamen crudis innocentiores sunt. Arefactæ multum noxæ remittunt. Tritæ cum melle & sale, rabiosorum canum moribus imponuntur. Mammatarum duritias discutiunt, cum hordeaceo polline & aceto impositæ, ijsque vino maceratis, & cum farina subactis, pessi vice vtuntur ad suppressendos menses.

De Caryo Basilico. Cap. CXLII.

NOMINA.

K *Ἀπυρον βασιλικὴν* Græcis, Regia nux & Persica, Iuglandisque Latinis: Officinis Nux simpliciter, Germanis [Velschnusz] Gallicè *Noyer* appellatur. *κάρυον* autem Græcis à capitis grauedine vocatam esse notissimum est. Nam folia arboris huius grauem expirant halitum, virésque eius in cerebrum penetrant, atque adeò eos sopore tentâs lædit qui sub arbore decubuerint. Basilicam verò, Regiamve & Persicam, eò quod è Perside primum in Græciam à regibus delata sit, dictam esse constat. Iuglandem à iuuâdo & glande nominatam existimant.

FORMA.

Arbor est prægrandis, multis prælongisque nixa radicibus, procerò caudice, multis summatim ramis ingentibus

*Juglans.*

brachiato, ad binum ternumve cubitorum complexus sæpius crassescente, cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente, folijs latis, oblongis, è iucundo grauiter subolētibus, patulâque iaculantibus umbrâ & insalubrem, p autumnū deciduis. Venni temporis initio veluti quodam gestiente foliorum conceptu, panicula prelōga, collo squamatis compactili protracta, ordine nucis pinex protuberat, dehiscitque. Flauescens statim quàm frondem facere cœpit, nutans caducaque prolabitur. Tum super ramenti huius pediculum flos

erumpit, totidemque calyculacea tegumenta quot flores petiolo contrahuntur, singulisque ijs singulę includuntur nuces, multis munitæ inuolucris, primùm herbaceo cortice, mox ligneo putamine, dein tenui tunica. Crispi intus nuclei quadripartito digeruntur, lignosa intercedente membrana.

LOCVS.

Montibus lætatur, aquasque odit. Passim in omnibus ferè Germaniæ hortis prouenit.

TEMPVS.

Germinat post afflatum Fauonij, non cacumine, vt maxima pars arborum, sed lateribus impulsio priore pullulo. Fructificat autumnno.

TEMPERAMENTVM.

Huius temperamentum ex virium enarratione patebit.
Viri

Virides verò nuces primo ordinæ siccæ, secundo verò calidæ censentur.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Nuces iuglandes difficiles concoctæ, stomacho inutiles, bilem augment, capitis dolorem faciunt, tussientibus iniiciæ. Ad vomitiones ieiunis in cibo vtilis. Præsumptæ & à cibo comestæ cum caricis & ruta, lethalibus venenis aduersantur. Largiùs esitæ latos lumbricos pellunt. Illinuntur mammarû inflammationi, abscessibus, luxatisq; cû exiguo melle & ruta. Cum cepa verò, sale & melle, canis hominîsq; morsui conferunt. Tormina cum putamine suo crematæ & vmbilico admotæ sedant. Cortex combustus, tritûsq; in vino & oleo, infantibus inunctus capillos elegâtes efficit, alopeciâsq; replet. Sistit menses crematum tritûmque, & cum vino admotum quod intra nuces clauditur. Vetus tarum autem nucum nuclei illiti, gangrænas, carbunculos, ægilopas & alopecias commanducati & impositi celeriter sanant. Fit etiam ex ijs contusis & expressis oleum. Recentes nuces stomacho minus nocent, dulciores enim sunt. Quam ob causam alijs miscentur, vt acrimoniam auferât. Illitu liuores quoque tollunt.

EX GALENO.

Arbor tum in germinibus, tum in folijs adstrictionem quandam possidet: cæterùm euidentem & plurimam in nucis putamine recenti & sicco: proinde eo fullones quoque vtuntur. At nos ea exprimentes, succo similiter vt mororum & ruborum decocto in melle, vt stomatico medicamento vtimur, & ad omnia reliqua ad quæ modò dicti succi conueniunt. Porro nucis ipsius quod edendo est, oleosum est & tenuium partium, ideòque etiam facilè exprimitur: & quò diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere licet: tunc sanè admodum discutiens fit, vt eo nonnulli gangræna, & carbunculos, & ægilopas sanent: nonnulli verò etiam ad neruos vulneratos vtuntur. Cæterùm si recens sit, adstringentis nonnihil qualitatis quoq; obtinet. At quod imperfectum est etiâdum, & nōdum siccū, veluti reliqui fructus

omnes qui virides sunt, plenum est senticoctæ humiditatis. Cortex tamen eius ubi inaruit, tenuium partium & exiccatorum est medicamentum, morsus expers.

EX PLINIO.

Arborum ipsarum foliorumque vires, in cerebrum penetrant, hocque minore momento, sed in cibis nuclei faciunt. Sunt autem recentes iucundiores, siccae vnguinosiores, & stomacho inutiles difficiles concoctu, dolorem capitis inferentes, tussientibus inimicæ, & vomituris ieiunis aptæ in tenasmo solo: trahunt enim pituitam. Eadem præsumptæ venena hebetant. Item anginam cum ruta & oleo. Item aduersantur cepis, leniuntque earum saporem. Auriû inflammationi imponitur cum mellis exiguo. Item cum ruta mammis & luxatis. Cum cepa autem & sale & melle, canis hominisque morsui. Putamine nucis iuglandis, dens cauus inurit. Putamen combustum tritumque in oleo aut vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, & ad alopecias sic vtuntur. Quod plures quis nuces ederit, hoc facilius tineas pellit. Et quæ perueteres sunt nuces, gangrenis & carbunculis medentur. Item sugillatis Cortex iuglandium lichenum vitio & dysentericis prodest. Folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuarijs Mithridatis maximi Regis deuicti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari commentario ipsius manu compositionem antidoti, duabus nucibus siccis, item ficis totidem, & rutæ folijs viginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoque canis morsus, nuclei à ieiuno homine commanducati illitique, præsentem remedio esse dicuntur.

EX PLINIO VALERIANO.

Nux viridis, vt pote adhuc aquatioris humoris, styptica & frigida virtute censetur. Potest denique & stomacho aliquid vigoris acquirere, & ventrem cum garo sumpta molli. Noces autem siccae, duræ, cum caricis duabus, & viginti rutæ folijs, addito salis grano simul conteruntur, nullisque venenis opprimi poterit ea die quisquis ieiunus accepit. Inter Calendas & Idus Iulij, centum numero noces statim

vt ar

vt arbori demptæ sunt, cortice adhærente quassantur: his admiscetur aluminis scissi libræ tres, & in nouo fictili vase ponuntur: super hæc infunduntur olei boni libræ tres & diligenter in loco neque humido, neq; nimium siccò obruuntur, post nonaginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorum damna restituit.

EX SIMEONE SETHI.

Virides ventrem mouent, quamobrem quidam ante cibum cum sapo comedunt. Facilius etiam quàm amygdalæ concoquuntur. Aridæ in ore inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores fiunt, si cum caricis edantur. Ferunt etiam eum qui nuces cum caricis & ruta ante reliquos cibos esitauerit, non magnopere à venenatis medicamentis lædi. Concoquuntur faciliè nuces in frigidis ventriculis, in calidis verò in bilem magis mutantur. Faucium & capitis dolorè afferunt, & tussis augent. Ante alios cibos sumptæ, vomitum adiuuant. Ad satietatem comestas, lumbricos educere scimus, Ad dentium pruritus utiles sunt.

De Caltha. Cap. CXLIIII.

NOMINA.

QVO nomine Græci plantam hanc appellauerint, fateor ingenuè mihi nouum constare. Latinis autè dicta videtur Caltha vel Calthula, quam vocem deinde corrumpentes officinæ, in Calendulam immutauerunt. Quamquam verisimile etiam sit, sic nominatam esse, quòd omnibus mensium Calendis fruticare comperiat. Atq; hinc sit quòd nonnulli florem omnium mensium appellent. Germani [Ringelblumen] vocant, ab intorto, & in circulum acto semine Galli *Soulsie ou Soulsi*.

FQRMA.

Herba est fruticosa, caule dodrantali, lignoso: folijs longiusculis, in angustum desinentibus, floribus speciosis croceis luteisve, non ingrati quamuis grauis odoris, qua dote in coronamenta venit: semine, cuius vagina scorpionis caudam imitatur: radice simplici, multo capillitio fibrata. Cur autem hanc herbam Caltham esse credam, facit in primis

A v Plini

*Caltha.*

Plinius, qui lib. xxj. capi.vj. Caltham odore grauem esse scribit. De- in Virgilius qui Aegloga secunda sic canit: Molliā luteolā pingit vacinia caltha. Luteolā à luteo florum haud du biè colore, nominans.

LOCVS.

Prouenit in cultis, atque vix hortum inuenies in quo copiose non nascatur.

TEMPVS.

Singulis ferè mensium Calendis, vt diximus, florere deprehenditur, Maio incipiens mense. Magis autem autumnō eiusdem emicant flores.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse statuunt, neque id immeritò, quandoquidem dulcedine modica cum amaritudine coniuncta participet.

VIRES EX RECENTIORIBVS.

Herba ipsa adhibetur condimentis & acetarijs. Flores vino potus ciet menses: item herbæ succus, quo in dentium dolore os præsentaneo remedio colluitur. Non parū etiam eius flos ad flauos reddendos capillos conducit. Idem, perinde atque ipsa herba, secundas educit mirificè, si aridus suffitibus admotus fuerit.

ADNO

ADNOTATIO.

Caltha seu Calendula nobis Soulsie à solsequio dicitur, quòd flos cum solis ortu aperitur, & occasu clauditur.

De Caryophyllata. Cap. CXLV.

NOMINA.

QVALITER Græcis & antiquis Latinis scriptoribus hæc herba nominata sit, nondum compertum habeo. Cur enim Dioscoridis Lagopum non esse credam, etsi paniculum pedi leporino prorsus similem habeat, facit quòd in manuscripto & peructusto herbario seorsim descriptam & depictam vtranque herbam viderim. Pictura autem Lagopi longè aliam herbam, quæ in segetibus nascitur, quàm sit Caryophyllata, exprimit: de qua suo loco dicemus. Neque defuit qui herbam hanc de qua agimus Geum Plinio dictam velint, quorum certè sententia periculo vacat, quod eadem facultas vtrisque radicibus sit. Sed ad institutum reuertamur. Herbam quam recentiores Latini Caryophyllatam, ab odoris suauitate quam radices de se præbent, nominant, vulgus herbam Benedictam, à diuina sua efficacia, & Sanam mundam appellant. Germani [Benedicten vurtz.] Galli *L'herbe benoiste, Resiçe, ou Galliot.*

GENERA.

Duo esse eius herbæ genera animaduerti, nō tamen multum à se dissidentia. Primum genus Caryophyllatam hortensem vocauimus, cui ex cultura aliqua teneritas accedit in folijs floribus & paniculis. Flos huic paulò minor & palidior quàm sylvestri. Germanicè [Galten, oder heymisch Benedicten vurtz] appellari potest. Alterū huius herbæ genus Caryophyllatam sylvestrem diximus, quòd scilicet citra culturam proueniat. Flores eius multò maiores, magisque ad croci colorem accedunt. Germanicè [Vild Benedicten vurtz] nominari commodè potest. Differentiam tamen nemo rectius quàm ipsa pictura demonstrabit.

For



Caryophyllata hortensis. *Caryophyllata sylvestris.*

Caulis illi sesquicubitalis, geniculatus, angustus, terna è pedicelo longo folia articulatum exennia, per ambitū serrata, bina etiā prioribus minora, singula genicula cingūt. E medio alarum ramuli funduntur tenues, quibus in summis flos luteus emicat, quo succusso caput extuberat circumnatis acinulis cumulatè stipatum, quasi rudimentum eluceat naturæ fragum inchoātis. Radix multis luteis capillamentis fibrata, Caryophyllum olet.

LOCVS.

Primum in hortis plantatum prouenit. Alterum in montanis, opacis, & iuxta sepes nascitur.

TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores, & peruetustus etiam herbarius, calidam & siccam

siccam esse in secundo ordine statuunt, Folia sanè in gustu non mediocrem adstrictionem ostendunt. Radix itidem haud paruum adstrictionem obtinet.

VIRES EX RECENTIORIBVS.

Radix eius luto & sordibus eluta siccatur, & imbre aceti respersa, arca & vestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosq; coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & cruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructiones tollendi scribit. Fomentum item ex vino decoctionis eius menses cire. Contra venena tritam cum vino sumptam valere. Concoctionem præterea roborare, dolorem ventriculi & intestinorum à frigiditate aut flatibus ortum decoctam in vino sanare ait. Mirificè etiam ad interna vulnera huius herbæ decoctum confert. Externa verò ex ea collui debent.

ADNOTATIO.

Caryophyllata quòd radix siccata Caryophyllū oleat, nobis Sana munda ab effectu vocatur: acetarij's etiā folio ex petita herba.

De Centaurio minore. Cap. CXLVI.

NOMINA.

K Ενταύριον μικρόν, ἢ λιμνήσιον, καὶ λιμνῶσιον Græcis, Febrifuga & Fel terræ, Latinis officinis Centauria minor, Germanis [klein Taufendguldenkraut, Fieberkraut Erdtgall, & Biberkraut.] Gallicè *Centauré, ou Fiel de terre* appellatur. Centaurium, quòd ea curatus dicitur Chiron Centaurus, cum Herculis excepti hospitio pertractanti arma, sagitta excidisset in pedem. Limnession & Limneum, quòd secundum aquarum scatebras ac paludes, quas Græci λιμνᾶς dicunt, nascatur. Febrifuga, eo quòd febres fuget, & procul è corpore pellat, Fel terræ, ob summam quam habet amaritudinem.

For

*Centaurium minus.*

Herba est Hyperico Origanóve similis, caulem habens altitudine supra dodrantem, angulosum, Flores in puniceo colore subpurpurascentes, ad Lychmidis flores accedentes, folijs parvis & oblongis veluti Rutæ. Semen tritico simile. Radicem exiguam, inutilem & leuem.

LOCVS.

Propter lacus & rigua loca, Dioscoride auctore, nascitur. Apuleio verò teste in solidis & fortibus quoque provenit, id quod non rarò in Germania nostra accidere compertum habeo.

TEMPVS.

Floret æstate & autumno, quo maxime tempore, qui sermine est prægnans, colligitur.

TEMPERAMENTVM.

In folijs & floribus vincit qualitas amara paululum obtinens adstrictionis, atque propter eiusmodi temperamentum admodum exiccatorium est medicamentum, expers mordacitatis.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Herba ipsa adhuc virens tusa & illita vulnera glutinat. Ulcera vetera purgat, & cicatrice obducit. Biliosa & crassa per aluum ducit. Decoctum eiusdem ischiadicis commodè infunditur, sanguinem educens, & à dolore leuans. Succus
ad oculum

ad oculorum medicamenta perutilis, cum melle quæ pupil-
las obtenebrant expurgans. In pello admotus menses ac
fœtus educit. Priuatim potus neruorū affectibus succurrit.

EX GALENO.

Centaurij minoris radix prorsus inefficax est, Rami ve-
rò & potissimùm folia quæ in ijs sunt atq; flores, vttiliora.
Vlcera magna, herba ipsa adhuc recens illita glutinat, Ve-
tera quoque & quæ ægrè ad cicatricem perducì possunt eo-
dem modo vtentibus cicatrice obducuntur. Arefacta, glu-
tinatorijs & desiccatorijs miscetur facultatibus, ijs videli-
cet quæ sinus & fistulas sanare sunt natæ, & veteres duri-
ties emollire, tum vlcerum maligna sanare. Miscetur etiam
ijs quæ rheumaticis affectibus medentur, in quibus ea
medicamenta optima sunt, quæ vehementer desiccantia
cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem.
Decoctum herbæ quidem Ischiadicis infundunt, ceu bilio-
sa ac crassa ducens: nam & talia purgat. Quanquam quum
adèò vehementer operabitur vt cruenta euacuet, tunc ma-
gis proderit. Succus porrò eius quum ad similes sit faculta-
tis, hoc est, exiccatoriæ & absterforiæ, & reliqua iam dicta
pulchrè efficere potest. Cum melle etià oculis illinitur, men-
sesque et fœtum appositus in pello euocat. Sunt qui ipsum
præbeant & his quibus nerui affecti sunt, vt qui euacuet &
desiccet innoxie quæ impleta sunt. Optimum etiam medi-
camentum est ad iecinoris obstructions soluendas. Bonū
quoque lieni indurato foris impositum, & nihilo secius si
quis bibere sustinuerit.

EX PLINIO.

Purgat aluum succus Centaurij minoris drachma in he-
mina aquæ cum exiguo salis & aceti, bilémque detrahit.

ADNOTATIO.

Centaurium paruum, nomen nobis retinet, Centaure.

De Cyamo.

Cap. CXLVII.

NOMINA.

K *Υαμ* Græcis, Faba Latinis dicitur. Officinæ Latinū
nomen

nomen retinent. Germanis [Bonen,] Gallis *Febue* appellatur.

FORMA.



Faba.

Sola Faba inter legumina sine adminiculo nititur, folio carnosio Portulacæ simili, flore cristato, versicolore, partim albo partim purpureo, atris quibusdam maculis notato, quas M. Varro lugubres vocat literas: siliqua plerumque semipedali, fructu intus lato humani vnguis effigie, colore non simplici, sed aut fuluo, aut nigro, iam verò etiā herbaceo & coccineo: ra dice singulari, lignosa, & capillata fibris. Quæ hic à quibusdam, quasi nostra non esset vera Faba, afferuntur argu-

menta, non tanti momenti sunt ut confutatione indigeant: constat enim nostram eas, quas veteres illi adscripterunt, habere notas & facultates. Non tamen negamus in diuersis terris maiorem aut minorem produci posse.

LOCVS.

Pasim in hortis sata prouenit. Latatur loco pinguis-
mo & stercoreato.

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Faba in refrigerando & exiccando ad mediam temperaturam propinquissimè accedit. Est itaque frigida & sicca in primo ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Spirituosa, inflans, concoctu pertinax, insomnia tumultuosa faciens. Tussi tamen confert, carnēsq; generat. Decocta in posca, & cum cortice comesta, dysenterias & cœliacas fluxiones sistit. Vtilis contra vomitiones in cibo sumpta. Minus inflat, priore aqua in decoctione effusa. Viridis magis stomacho nocet, plūsque inflat. Farina eius per se & cum polenta illita, ex plaga inflammationes mitigat, & cicatrices ad reliqui corporis colorē reducit. Mammis in quibus lac in grumos cogitur, & inflammatione laborantibus auxiliatur, lacq; extinguit. Cum melle & fœnigræci farina furunculos, parotidas, ac sugillata oculorum discutit. Cum rosa, thure, & oui albo, procidentes oculos, staphylomata & œdemata cōpescit. Macerata in vino suffusiones & ictus oculorum sanat. Ad sistendas fluxiones sine cortice comanducata fronti imponitur: testium inflammationes in vino decocta sanat. Puerorū pubi illita, diu impuberes seruat. Alphos exterit, Euulsos pilos vt nō nutriantur & graciles fiant, cortices illiti efficiunt. Cum polenta, alumine & oleo veteri illiti strumas discutunt. Decoctum illorum lanas tingit. Factas ab hirudinibus sanguinis eruptiones, cortice ablato, Faba qua parte cohæret diuisa, si dimidia apponatur, compefcit.

EX GALENO.

Caro Fabæ paulum quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex adstringentis: idcirco medicorum nōnulli totā Fabam cum polenta decoctam dysentericis, cœliacis & vomētibus exhibuerūt. Porro vt edulium flatulenta est, & coctu difficilis, vt si quid aliud. Excreationibus quidem ex thorace & pulmone idonea. Vt medicamentum verò foris imposita sine molestia exiccat. In podagricis ea sæpènumquid vti sumus ex aqua decocta, deinceps adipem suillum admiscentes. Ad neruorum tum contusiones, tum vulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos qui ex ictu iam phlegmone occupabantur, cū polentā. Sed & testium & mammarū bonū est cataplasma. Nā hæ partes, cū phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant,

maximè cum mammæ ex lacte in ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Manifestè fabacea farina cutis sordes detergere conspicitur, quod intelligentes mægones, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac vtuntur. Illinunt præterea & hac faciem quemadmodum præsana: nam quæ in summa cute emiunt lentes exterit, & maculas velut ex sole contractas.

EX PLINIO.

Faba hebetare sensus existimata, insomnia quoque facere. Solida fricta, feruensque in acri aceto coniecta, torminibus medetur. In cibo fressa, & cum Alio cocta, contra deploratas tusses suppurationesque pectorû, quotidiano cibo sumitur: & commâducata ieiunio ore, etiam ad furunculos maturandos discutiendosve imponitur, et vinò decocta ad testium tumores & genitalium. Lomento quoque ex aceto decocto, tumores maturat atque aperit. Item liuoribus, com bustis medetur. Voci etiam prodesse, autor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarum cinis, ad coxendices, & ad nervorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertias sistunt aluum.

De Consolida media. Cap. CXLVIII.

NOMINA.

INTER multas alias herbas quibus vulnera glutinandi facultas inest, & hæc cuius picturam damus connumeratur. Hinc est quod vulgus herbariorum illam Consolidam mediam nominet. Qua etiam appellatione nos uti volumus quod nobis, quo nomine veteribus Græcis aut Latinis appellata sit, nondum constaret. Rectius tamen Solidago diceretur. Germanis [Guldeguntzel] nuncupatur. Gallicè *Bugle ou Consire mayenne*.

FORMA.

Caulẽm habet quadrangulum, lanuginosum, ex quo per intervalla folia bina ex singulis geniculis in extremitatibus laciniata, Mentæ similia emicant. A medio caulis ad fastigium usque ex singulis foliorum alis, flores sex aut septem
in par

*Consolida media.*

in purpureo cœrulei exe-
unt. Radix illi subest li-
gnosa, quæ multas à se
exiguas radices capilla-
mentorum instar per ter-
ram latè serpentes pro-
pagat.

LOCVS.

Passim in pratis na-
scitur.

TEMPVS.

Floret copiosè Maio
mense.

TEMPERA-
MENTVM.

Gustu adstringit & a-
mara est, vt calidà & sic-
cam esse nemo dubitare
possit.

VIRES.

Vulnera glutinat.
Sanguinis grumos ex ca-
su, vel cōtusionibus coactos in corpore disijcit & dissoluit.
Præsens remedium est aphthis & vlceribus in ore serpenti-
bus, Decoctum eius tumoribus illitum eos dissipat. Vsus e-
tiam eius ad intertrigines, vlcera pudendorum, & intestino-
rum exulcerationes prodest.

ADNOTATIO.

Quam hic dat Consolidam medium vulneribus glutinandis,
aptissimam nouimus, à media nobis dicta diuersissimam.

De Cannabe.

Cap. CXLIX.

NOMINA.

K Avvaβis Græcis, Cannabis Latinis, Barbaris & vulgò
Canapus dicitur, Germanis autem [Hanff] Gallis
Chanvre.

GENERA.

Cannabis duo sunt genera. Vna enim satiuæ est, quam Græci *χοιμισσοφορ*, quod magni in vita vsus sit ad robustissimos funes texendos, Germanis [Zamer hanff] dicitur. Altera sylvestris, quam Latini Terminalem vocant, Germani [Vilden hanff.]



Cannabis sativa.

FORMA.

Satiuæ Cannabis folia fert fraxino similia, grauis odoris, caules longos, inanesque, semen rotundum. Sylvestris verò virgas fundit Althææ similes, nigriores, asperiores & minores, cubitali altitudine. Folia satiuæ similia, asperiora & nigriora. Flores subrubeos, Lychnidi similes. Semen & radicem Althææ similia. Eius effigiem videre nobis nõdum licuit.

LOCVS.

Satiuæ in locis cultis sata propenit. Sylvestris in syluis & asperis locis, Apulcioq; teste, iuxta semitas & sepes nascitur.

TEMPVS.

Herba ad vsus medicos carpitur dum maximè viret. Semen aut eius, Plinio autore, cum maturum est, id quod prope autumnæ æquinoctium accedit.

TEMPERAMENTVM.

Admodum calefacit & exiccat.

Vires

VIRESEX DIOSCORIDE.

Satiūq̃ maiori copia sumptum genituram extinguit. Ex viridi aut succus expressus, contra aurium dolores vtiliter instillatur. Sylvestris radix decocta illitaque, inflammatio- nes mitigat. Tumores discutit, & callos dissicit. Huius cor- tex texendis funibus utilis est.

EXGALENO.

Cannabis semen flatus extinguit, adeoque desiccatur, ut si plusculum edatur geniturā exiccet. Sunt qui ex viridi suc- cum exprimentes, ad aurium dolores ab obstructione, ut mi- hi videtur, natos vtuntur. Semen etiā Cannabinum diffi- culter concoquitur, stomacho & capiti aduersatur, prauos- que humores creat. Admodum excalfacit, ideoque caput æstuoso ac medicamentofo halitu sursum misso tentat.

EXPLINIO.

Semen Cannabis extinguere geniturā virorum dicitur. Succus ex eo vermiculos aurium & quodcunque animal in- trauerit cijcit, sed cū dolore capitis. Tantaque vis ei est, ut aquæ infusa, coagulare dicatur, & ideo iumentorum aluo succurrit pota in aqua. Radix contractos articulos emollit in aqua cocta. Item podagras & similes impetus. Ambustis eruda illinitur, sed sæpius mutatur priusquam arescat.

EXSIMEONESETHI.

Semen Cannabis comestum idem nocumentū quod Co- riandrum affert: immodicè enim si estur, ut illud, delirium facit. Folia verò arida pota, veluti farina, aut magis pro po- tione hæc farina exiccata, ebrietatem quandam hospitalem facit, & quæ ab hauriente nō sentiatur. Apud Arabas enim pinfitur, subigiturve pro vino, & inebriat. Desiccatur vero se- men genitale ut Caphura.

APPENDIX.

Quum ex iam dictis cōstet Cannabinum semen caput facile tentare, atque adeo lædere, imprudenter faciunt, qui vulgi errorem sequentes, in morbis ijsque maximis capitis, ex hoc semine confecta iuscula ægrotantibus magno corū malo exhibent.

De Cardiaca. Cap. CL.

NOMINA.

QUO nomine herba hæc veteribus sit appellata, nondum nobis constat. Nostri tamen temporis herbarij Cardiacam vocant, Germani [Hertzgspan: odes Hertzgspan.] Galli *Cordiale ou Gripaulme*. Cardiacæ verò haud dubiè à recentioribus nominata est, quòd cordis palpitatio ni, quam illi perperam *cardiacæ* appellât, mirificè conferre videatur. Alia est hæc à Ballote, de qua suo loco diximus. Officinis Agri palma.

FORMA.



Cardiaca.

Cardiaca caulem ex se mittit quadrāgulum, geniculatum, nigrum: folia laciniata, nigra, per interualla in caule ex singulis geniculis prodeuntia: flores in candido purpureos, orbiculato ambitu caules circūia centes, radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam.

LOCVS.

Passim in rudcribus & circa sepes nascitur.

TEMPVS.

Iulio mense floribus abundât.

TEMPERAMENTVM.

Amara admodum existit vt hoc nomine calidam esse in secundo ordine, & siccam in tertio constet.

Vires

VIRE S.

Recentiores rectè contra cordis palpitationem, cõuulsionem, & resolutionem conducere tradunt: potest enim quum amara sit herba, sua caliditate & siccitate crassos humores qui in venis & alijs partibus, neruosis potissimum, sunt, incidere, extenuare, & discutere. Hac etiam ratione morbo comitiali confert, vrinam mouet, & mēstrua educit, aliasque facultates quas Galenus lib. iiii. de Simp. med. fac. capi. xvij. amaris tribuit, obtinet.

ADNOTATIO.

Cardiaca nobis Agria palma hanc scio qua ratione dicitur, nisi fortè à rudi foliorum fissura tanquam in digitos, à qua sed perferliore Ricinus, vulgò etiam Palma Christi nuncupatur. Amara serba in hortis sponte sua passim luxurians.

De Caro.

Cap. CLI.

NOMINA.



Carum vel Carui.

K Ape Græcis, Caron vel Carcū Latinis, officinis Carui nominatur. Germanis [Mattkumich, oder Vvyfenkumel,] Gallis etiā Carui dicitur. A Caria fortè regione, in qua laudatissimū nascitur, appellationem accepit.

FORMA.

Caules emittit quadrangulos ab vna radice multos, folia Staphylini, flores candidos, & in cauliū summo semē angulosū ac copiosum, radicē oblongā & luteā.

B iij

LO

LOCVS.

Pasſim in pratis Germaniæ noſtræ prouenit. Optimum tamen eſt quòd in Caria, vt diximus, naſcitur.

TEMPVS.

Iunio menſe floribus & ſemine prægnans eſt.

TEMPERAMENTVM.

Cari ſemen calfacit & exiccat tertio quodammodo ordine moderatè acrem qualitatem poſſidens.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Semen Cari calfacit, vrinam cit, Stomacho & ori gratum accomodùmq;. Concoctiones adiuvat. Antidotis & oxyporis vtiliter miſcetur, Anifo proportionè reſpondens. Radix elixa Paſtinacæ ſylueſtris modo, edendo eſt.

EX GALENO.

Flatus extinguit & vrinas ciet, non ſemen tantùm, ſed & planta.

De Caryo pontico. Cap. CLII.

NOMINA.

K *Αρκαπονίχδα*, & *Ακατοκάρυα* Græcis: Auellanzæ nuces, & Præneſtinæ Latinis, [Haſelnuſz] Germanis, Gallis *Noſſette*, ou *Auellane* nominantur. Ponticæ autem vocantur, quòd in Aſiam Græciàmque è Ponto venerūt. Paruz, quòd Iuglandibus minores ſint.

GENERA.

Duo eius ſunt ſtigia. Vna enim eſt ſylueſtris, quā priuatim Germani noſtri [Haſelnuſz] Galli *Auellane ſauuages* nominant. Altera vero vrbaſea ſeu domeſtica, quam ijdem [Rotnuſz, oder Ruornuſz] appellant, Galli verò *Auellane franche*.

FORMA.

Corylus arbor in qua Auellana nux prouenit, caudice eſt multis infernè ſtolonibus fruticāte, ſupernè ramis brachiato, virgis breuibus, ſine alarū ſinu enodibus, craſſique non nullis, folijs ab vna parte nigris, altera verò ſubalbis, per ambitū ferratis, materia admodū lenta, cortice ſummo tenui, pingui, maculis albis vario, medulla tenui et ſua. Nō floret.

*Auellana nux sylvestris.**Auellana domestica.*

floret, sed floris vice quidam in eo peculiare cōpactili callo racematim cohærentes, & veluti prælongi vermes, singulari pediculo pensiles iuli erumpunt, qui incunte vere dehiscunt ac defluunt cū folia profiliūt, ac tum calyculacea tegumēta totidē summatim fimbriata, quot iuli supra pediculū exeūt, eorūque singulis nuces singulæ insunt. Domestica nō differt à sylvestri, nisi q̃ eius folium maius, & caudex procerior, melior fructus rubra membrana inclusus.

LOCVS,

Gaudet argillofis & viginosis locis: nascitur itaque in plano. Nemora etiam & montes Corylis vestiuntur.

TEMPVS.

Autumno leguntur Auellanæ nuces.

TEMPERAMENTVM.

Tum cortex, tum planta, tum fructus gustanti auste-

B V RIOR

rior quàm Iuglans apparet, plus itaque habet essentiae terrestres & frigidae. Simeon Sethi calidas & humidas esse Auellanas asserit.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Stomacho aduersantur Auellanae. Tritae in aqua mulsae, & potae veterem tussim sanant. Tostae verò & cum exiguo pipere comestae destillationem maturant. Totae crematae, tritae cum axungia aut seuo vrsino & inunctae, alopecias explent. Ferunt aliqui vsta earum putamina, & in puluerem redacta cum oleo caesiorum, oculorum pupillas infantibus nigrare, peruso syncipite.

EX GALENO.

Valentiores sunt Auellanae quàm Iuglandes: nam densior strictiorque his est substantia, ac minus oleosa. Caetera magnae nuci similia sunt.

EX AETIO.

Auellana, quae & Nux pontica nuncupatur, quòd in Euxino ponto frequens sit, praeter quòd frigidior, austerior, terrestriorque est, in reliquis Iuglandi assimilatur. Comesta dolorem capitis inuehit.

EX SIMEONE SETHI.

Magis nutriunt quàm Iuglandes nuces, difficiliusque concoquuntur. Inflationes faciunt, & vt quidam aiunt, ieiunum intestinum laedunt. Facilius autem concoquuntur, minusque ventrem sistunt, si interior earum cortex abijciatur. Dicitur quòd si quis ante reliquos cibos cum ruta sumpserit, huic neque morsus, neque venena officere illo die posse, & scorpiones ab ipso fugere. Sumptae cum caricis, iam à scorpione ictos iuuant. Ad aciditatem à nigro humore exiccatam omnino confert.

De Centum morbia. Cap. CLIII.

NOMINA.

HVIC herbae, vt alijs multis, nomen aliud imponere non licuit, quàm, quo vulgò hodie appellari solet, Centum morbie. Sic autem haud dubiè à chirurgis, qui illa quotidie vtuntur, à mirifica sua quā in plurimis vlceribus

me

medendis obtinet facultate, dicta est. Sunt qui à foliorum similitudine, quæ nummi speciem referunt, Nummulariam vocant. A nonnullis Hirudinaria, quòd passim terræ hirūdinis instar affixa sit dicitur. Nec desunt qui Serpentariā appellent, quòd compertum sit serpentes hac herba, si vulnerentur, sibi mederi. Germanicè [Egelkraut, oder Klein Naterzung, oder Pfennigkraut] nominatur. Gallicè l'Herbe qui tue les brebis.

FORMA.



*Centummarbia, siue
Nummularia.*

Serpit per terram, exiguusq; radiculis è coliculis latis prodeuntibus nititur. Folia habet ex utroque caulis latere rotunda pinguiq; flores luteos.

LOCVS.

Prouenit in locis humidis, potissimum verò circa fluentia.

TEMPVS.

Maio mense apparet, Iulio autem floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu admodum adstringit, vt hinc constet secundi aut tertij ordinis exiccantium esse herbam.

VIRES.

Huius flores & folia trita adedò desiccant adstringuntque, vt quæuis vlcera glutinare valeant. Ideoque pota cum vino dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanat. Cataplasmatibus ritu illita, vlcera putredine

dinosa iuuant. Profunt etiam ad sanguinis reiectiones, profluua muliebria, & ad omnia interanea vulnera & vlcera, potissimùm pulmonis. Externis etiam vlceribus summè confert, si vino in quo herba hæc decocta est, lauentur atque abstergantur.

ADNOTATIO.

An hæc Centummorbia sit vulgo dictum & putatum gramen Parnasi, explora.

De Coccimelea. Cap. CLIII.

NOMINA.

K Οκκίμνια Græcis, Prunus Latinis & officinis, Germanis eius arboris fructus [Pflaumen, oder Prumen.] dicuntur. Gallicè Prunier.

GENERA.



Prunus Sativa.



Prunus Sylvestris.

Duo sanè prunorum habentur genera. Vnum satiuorum

rum, in quo genere sunt nigra, candicantia, versicoloria, cerea, hoc est, ex candido in luteum pallescentia, purpurea, damascena, & si qua sunt alia. Alterum syluestrium, quæ Galeno lib. 2. de alimentorum facultatibus ἀγριοκοκκίμηλα, & in Asia πρῶμνα, Pruneola siue Prunula vulgò nominantur, Germanicè [Schlehen.] Caue eorum amplectaris sententiam, qui Poterium esse putant: neque enim facultates, neque noræ Prunulis respondent.

FORMA.

Prunus arbor est radicibus summo cespite vagantibus, paucis, caudice subrecto, scabro, multis brachiato ramis, folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim serrato: flore candido, foliato, pomo, carne, ciliisq; vestito, osse intus duro in quo nucleus includitur.

LOCVS.

Satiua Prunus in hortis nascitur, Damascena in Damasco Syriæ, à quo cognominata sunt. Syluestris autem passim in sepibus reperitur.

TEMPVS.

Satiua in æstate poma sua profert, syluestris autem autumnò.

TEMPERAMENTVM.

Satiuæ pruni fructus mediocriter humectant & refrigerant. Syluestris adstringunt, vt fusiùs ex eorundem facultatibus innotescet.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Eius pomum estur, stomacho tamen aduersatur. Aluum mollit. Syriaca autem pruna, & præsertim in Damasco genita exiccata stomacho vtilia sunt, & aluum cohibent. Folia in vino decocta & gargarissata columellam, gingiuas & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Præstant idem & syluestrium Prunorum fructus cum maturuerunt siccati. Cû sapa decocti stomacho vtiliores, & ad cohibendam aluum aptiores redduntur. Gummi Prunorum glutinat. Potum in vino calculos conterit. Ex aceto illitum, impetigines infantium sanat.

EX GALENO.

Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem plus, aridus verò minus. Cæterum Dioscorides, haud scio cur Prunam Damascenam siccatam ventrem sistere ait, quum tamen & ipsa palam etiam subducant, minus tamen ijs quæ importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringit: at quæ Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsæ arbores fructibus proportionem respondent: minus enim adstringunt quæ in Iberia nascuntur, magis verò quæ Damasci. Porro ut in summa dicam, quarum in folijs aut germinibus adstrictio quædam inesse apparet manifesta, ijs decoctis phlegmonæ in columella aut tonsillis existentes colluuntur. Sylvestrium fructus cuius inter adstrictioris est, ventremque sistit. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto verò puerorum sanare impetigines. Ac si id præstat, clarum est incidendi tenuandique illi facultatem inesse. Rarò fructum hunc austerum aut acidum, aut omnino iniucundum inuenias, ubi exactam maturitatem fuerit assecutus. Priusquam enim eò perueniat, nullus est ferme qui non acorem, aut acerbicatem præ se ferat: est qui & amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verum quum humectare & refrigerare mediocriter ventrem statuemus, utilis erit quæ subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porro æquè ac ficibus concessum est, ut vel exiccata utilia permancant. Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima ijs quæ in Iberia & Hispania proueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cum mediocri adstrictione magna laxaque sunt. At parua, dura, acerbæque, & in cibo permolesta: & ventri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maximè conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abundè ventrem molliunt etiam si sola comedantur, & multò magis si melicratum ipsum suborbeat,ur.

EX PLINIO.

Pruni folia decocta tonsillis, gingiuis, vix profunt in vi
no decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt,

liunt. Syluestrium quidem Prunorum baccæ, vel è radice cortex, in vino austero si decoquatur, ita vt triens ex hemina superfit, aluum & tormina sistūt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. Et in ijs & satiuis Prunis est limus arborum, quem Græci Lichena appellant, rhagadis & condylomatis mirè utilis.

De Conio.

Cap. CLV.

NOMINA.

K ^{δύσολος} Græcè, Cicuta Latinis & officinis, Germanis [Vrtzetling, vndtscherling, Schirling, oder vucterich,] quasi tyrānus dicitur, quòd scilicet hominem interficiat, si intra corpus sumatur. Hinc est quòd Athenienses eius succo in interimendo sapientissimo philosopho Socrate (quem falsò Anytus & Melytus quasi parum rectè de Dijs sentiret, accusarunt,) vsi sunt. Gallicè *Cigue ou Cocne*.

FORMA.



Cicuta.

Caulem profert geniculatum Fœniculi modo magnum. Folia ferula, vel, vt Plinius ait, Coriandro similia, angustiora tamen & graucolentia. In cacuminibus adnascentes ramulos & umbellâ. Florem subalbum, Semen Aniso simile, albidius tamen. Radicem coneauâ nec profundam.

LOCVS.

Passim in pratis, locis incultis, & vmbrosis nascitur.

TEM

TEMPVS.

Iulio mense flores & semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Summam habet refrigerandi vim Cicuta, atque adeo venenum est.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Inter lethalia connumeratur Cicuta, sua frigiditate encans. Remedio est meraci vini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus contusis, priusquam semen & coma are-scat, expressusque in sole densatur. Multus aridi ad medēdi rationem vsus est. Miscetur utiliter collyrijs, quæ leuandi doloris gratia adhibentur. Herpetas & erysipelata illitus restinguit. Herba cū coma trita & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, languidæque reddit. Lac extinguit, mammas in virginitate increfcere prohibet. Puerorum testiculos tãbescere facit.

EX PLINIO.

Cicuta venenum est, publica Atheniensium pœna inuisa, ad multa tamen vsus non omittendi. Semini & folijs refrigeratoria vis, quæ si enecat, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquam perueniat ad vitalia, vini natura excafactoria. Sed in vino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs floribusque: tunc enim maximè tempestiuus est & melior. Semine trito expressus, & sole densatus in pastillos, necat, sanguinem spissando. Hæc altera vis. Et ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad dissoluenda inedicamenta vtuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandum malagma. Præcipuus tamen est ad cohibendas epiphoras æstiuas, oculorumque dolores sedandos circumlitis. Miscetur collyrijs, & alios omnes rheumatismos cohibet. Folia quoque tumorem omnem dolorémque & epiphoras sedant. Anaxilaus autor est, mammas à virginitate illitas, semper staturas. Quod certum est, lac puerperarum mam-mis imposita extinguit, venerémque testibus circa pubertatem illita.

AD

ADNOTATIO.

Cicuta nobis est maior, cuius caule cavo quòd bibant rustici, bibere dicitur: Gal. Cigue. Alia est minor, odore non ingrato, tenera multum, cetera priori similis quæ arbore sit terra pingui.

De Cynoglossò officinarum.

Cap. CLVI.

NOMINA.

K *Υνύγλωσσος* Græcè, Latine *Lingua canina*: Officinæ Græcam appellationem retinuerunt, Germanicè [*Hundszung*] Gallicè *Langue de Chien*, ou *espece d'Orcaïette* appellatur. Animaduertendum tamen nos non temerè adieciſſe officinarum: neque enim Dioscoridis damus *Cani nam linguam*, quæ vidua caule est, & viribus etiam ab hac nostra diuerſa.

FORMA.

Caulem obtinet cubitalem, & interdum longiorem, hispidum, furculosum, folia angusta, prælonga & lanuginosa, non venosa, molliaque: florem primum purpureum, dein cœruleum, stamina habentem purpurea: radicem oblongam, & profundè terram penetrantem.

LOCVS.

Pæssim circa itinera prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret.

C TEM

*Cynoglossum.*

PLANTARVM HISTORIAE TEMPERAMENTVM.

Recentiores herbarij frigidam & siccam esse statuunt in ordine secundo.

VIREs.

Oris & alijs maleficis vlceribus medetur. Dysenteriz etiam prodest. Debet itaq; illius herbæ vsus esse in omnibus vlceribus, vulueribus, scabie Hispanica, & similibus morbis. Auxiliatur etiam gonorrhœæ & destillationibus: atque hinc est quod catapotiorum compositioni, quorum nomenclatura est ad omnes morbos catarrhi, aut de Cynoglossio, admisceatur.

De Cnico.

Cap. CLVII.

NOMINA.



Cartamin.

K Nicot. Græcè, Cnicus & Cneus Latine nominatur. Officinæ Cartanum & Crocum hortensem appellant. Germani [Vilden garten-saffran, Jad differetiam Atractylidis, de qua supra dictum est. Gallicè *Saffran sauvage.*

FORMA.

Folia habet oblonga, incisuris diuisa, aspera, aculeata. Caules cubitales, in quibus capita olivæ magnitudine. Floræ similem Croco, semen candidum & rufum, oblongum, angulosum.

LOCVS.

Nascitur in hortis & agris satus.

TEM

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, ac subinde semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excalefacientium eius semen, si quis foris eo vti volet.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Huius flore vtuntur in opsonijs. Semen tunditur & ex eo exprimitur succus qui cum hydromelite aut gallinaceo iure datus aluū purgat. Stomacho tamen aduersatur. Fiūt etiam placenta quæ aluum emolliunt, si succus eius amygdalis, nitro, aniso: & melli cocto miscetur. Oportet autem ante cœnā in partes quatuor diuisas, Iuglandis nucis quantitate, duas aut tres sumere. Eas hoc modo cōficere oportet Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostatarum & decorticatarum cyathi tres, anisi sextarius vnus aphroni tii drachma vna, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendam aluum efficacius efficit.

EXGALENO.

Cnici semine duntaxat ad purgationes vtimur.

De Cenchro. Cap. CLVIII.

NOMINA.


K ~~Ερυθ~~ Græcis, Milium Latinis & Officinis. Germani [Hirz] Gallicè *Mil ou Millet* appellatur. Nomen, Festo autore, à miliaria summa deriuatum.

FORMA.

Frumenti genus stipula cubito altiore, geniculata, folio arundinaceo, semine in iuba tereti & penulo, folliculo cōchiso, radice numerosa, capillata, ac multiplici fruticante culmo.

LOCVS.

Satum in aruis prouenit. In frigido & aquoso solo prius ferendum, postea in calido præcipiūt. Gaudet solo limoso vlginiosoque.

*Milium.*

TEMPVS.

Augusto mense de-
metendum.

TEMPERA-
MENTVM.

Milium primo ordine
refrigerat, exiccat autē
tertio exoluto, aut certē
secundo intenso. Paulu-
lū etiam tenuium est
partium.

VIRES EX DIO-
SCORIDE.

Minus cæteris frugi-
bus alit. In panes autem
coactum, aut tanquam

puls confectum aluum sistit, vrinam autem mouet. Tostū
verò saccis inditū & fomenti loco appositum, torminibus
& alijs doloribus auxilio est.

EX GALENO.

Milium, vt ferculū, comestum inter omnia frumentacea
edulia minimum nutrimenti confert. Sed & ventrem desic-
cat. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomen-
tū hī quæ citra morsum exiccari postulāt. Cataplasmatibus
etiam modo illitum exiccare potest, attamen admodū friabi-
le est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus vsus. Pa-
nus ex milio exigui est alimenti & refrigerātis. Constat in-
super præaridum, & instar arenulæ aut cineris friabilem ef-
fectū caret enim penitus glutinoso pingui iure itaque aluū
humentem desiccatur. Milium tamen ad omnia panico præ-
stantius, nam & suauius editur, facilius cōcoquitur, ventrē-
que

que minùs cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti in coctam esitant, veluti triticam agricolæ: clarumq; est id edulij tantò quàm illa quæ per se sola sumuntur melius esse quànò lac milij natura ad boni succi procreationem, aliaq; omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoque ipsam in edêdo suauitatem ac voluptatē.

EX PLINIO.

Miliò sistitur alius, discutiūtur tormina, in quem vsus torretur antè. Neruorū doloribus & alijs, feruens in sacco ponitur, neq; aliud vtilius, quoniā leuissimum mollissimūque est, & caloris capacissimū. Itaq; talis vsus eius est ad omnia quibus calor profuturus est. Farina eius cū pice liquida serpentium & multipedæ plagis imponitur.

EX SIMEONE SETHI.

Difficulter concoquitur, ventrem sistit parūque nutrit. Iuuat eos qui refrigeratione & exiccatione ventriculi indigent. Sumptum cum lacte, vel amygdala thasia faciliùs coquitur, & humidius fit.

De Crambe satina. Cap. CLIX.

NOMINA.

K ραμβη ἡ σίμπε. Græcè, Brassica satina Latine, Officinis & vulgò Caulis, Germanicè [Kohl] Gallicè *Choux* appellatur. Crambe Græcis dicta cēsetur quasi *κραμβη* quodd pupillas oculorum, quas Græci *κράες* vocant, obtundat, hebetetque. In qua certè sententia fuisse Columellā hoc eius de cultu hortorum carmen testatur. Nunc veniat quamuis oculis inimica Coramble. Attici integro nomine *κραμβη* protulerunt, alio sed potiore etymi sensu, quasi *κρατὶ μβη* vel rectius *ἀνίμβη* id est, crapulæ satietatiq; cōtraueniat. Nā vino aduersatur, vt inimica vitibus, Antecedens in cibis ebrietatem arceat, & postea sumpta crapulam discutit.

GENERA.

Et si plurima sint Brassicæ genera, vt ex veteribus rei rusticæ scriptoribus liquet, quatuor tamen duntaxat, quæ hodie vsitatae sunt, producemus: quarū vna Græcis *λίνα* hoc est,

lzeus nominatur, grâdibus & latis folijs, caule magno: Germanis [Breiter oder grossel Koel] vocatur. Gallis simpliciter *Choux*. Altera crûpa, quæ à similitudine apij *οιαιvouskie* id est, Apiana nuncupatur. Vulgò crispus caulis, Germanicè [Krauser Koel.] Gallicè *Choux crespes*. Tertia propriè vocatur Crambe, minutioribus caulibus, & tenuioribus folijs, flore luteo, Germanicè [kleiner koel,] vt ab alijs discernatur, nominari potest, aut simpliciter & sine adiectione [Koel] Gallicè *Choux rouges*. Quarta sessilis est, folio & capite patula. Vulgus caputos caules, quasi capitulatos appellat, quoniam in capitis formam extuberant. Folia enim horum in oibem glomerantur, exterius callosa & per ambitum rugata, multis intus carinarum voluminibus, externis semper interiora complectenti-



Brassica primum genus



Brassica secundum genus.

bus

bus. Huc alludētes Germani [Cappiszkraut] Galli *Choux
sabux* vocant. Nonnulli à candore foliorum Brassicam
albam, & caules albos appellare maluerunt. Hoc genere
Brassicæ in plerisque Germaniæ partibus, Baioria potissi-
mum, per integrum anni curriculum quotidie videntur,
quod illic eius prouentus sit vberimus.

FORMA.

*Brassica tertium genus.**Brassica quartum genus.*

Caule est Brassica leuiter rubente, crasso: folio prægran-
di, carnoso, ex cæsis candicante, in latus vtrinque diffuso,
prominulis venarum toris fruticante, cyma patula, flore
luteo, tum albō, semine in siliquis.

LOCVS.

In hortis hodie passim proueniunt Brassicæ. Frigidis
verò & pluuijs regionibus positio earundem optima.

TEMPVS.

Augusto mense potissimum florent, ac subinde semen

C iij etiam

etiam proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Brassica tum manducata, tum foris imposita exiccat. Sicca verò & calida primo ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Brassica satiuā aluo est idonea, si leuiter seruesacta edatur. Percocta verò aluum sistit, & multò magis bis cocta, & in lixiuio decocta. Aestiuā stomacho nocet & acrior est. In Aegypto propter amaritudinem nō estur. Obscuritate visus laborantibus & tremulis comesta auxiliatur. A cibo sumpta ex crapula et vino noxas restinguit. Cyma eius stomacho utilior, sed acrior, & ad ciendam vrinam validior. Condita sale stomacho inimica est, aluūque conturbat. Crudus eius succus cum iride & nitro deuoratus aluū molit. Cum vino potus viperarum moribus succurrit. Cum Fœnigræci farina, podagricis & articularum doloribus correptis, vlcerebūsq; sordidis & vetustis illitus prodest. Caput purgat per se naribus infusus. Menses ducit cum Ioliacea farina inditus. Folia per se aut cū polenta trita, omnibus inflammationibus & œdematis conferunt. Erysipelatis, epinyctidis & lepris medentur. Cum sale carbunculos rumunt. Capillorum in capite defluxum retinent. Cocta autem & melli mixta, gangrænarum pascens malis opitulantur. Cruda ex aceto comesta lienosis profunt. Mansa verò deuorato succo vocem amissam restituunt. Decoctum eius potum, aluū & menses mouet. Flos post conceptionem in pello subditus sterilitatem facit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum, lumbricos pellit. In antidota cœliacorum additur, faciē lentiginēsque expurgat. Cauliculi virides cum radice cremati, & adipe porci vetusto excepti diuturnos laterum dolores impositi mitigant.

EX GALENO.

Brassica esculenta desiccandi vim habet tū esca, tum foris imposita, nō tamen etiā admodum acrem. Alioqui & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanat. Præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctida & herpes sanat. Habet
quid

quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maximè Brassicæ Aegyptiæ, quantò ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatæ particeps semen est: sicut videlicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundùm eandem facultatem ephelidas, lentigines, & quæcunque alia modicam absterfionem postulât, adiuuat. Caules Brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet iam & adurentem vim participant. Hac ratione enim veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam valenter digerens medicamentum efficitur. Brassicæ quoque succus purgandi quâdam vim obtinet: contrà solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis quàm incitare deiectionem potest. Proinde quâ expellere alui excrementa propositum erit, aheni in quo elixa vnâ cum aqua fuit, propius admoto, ipsam eximere confestim, vasculoque in quo paratur, oleum cû garo iniicere oportebit. At humentem aluum siccare volentes, quum mediocriter bullisse videbitur, priore aqua effusa repentinè aliam calentem iniicimus, ac ita rursus in ea discoquimus vsq; dum tenera flaccidâque euaserit.

EX PLINIO.

Cato crispam maximè probat, dein lænem grâdibus folijs caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorum caligini, scintillationi oîusque, vel stomachi doloribus, crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laseris radícula, sumptam acetabulis duobus matutino. Tantâq; esse vim, vt qui terât hæc validiores fieri se sentiant: Ergo vel cum vino tritam, sorbendam, vel ex olei intinctu sumendam. Podagræ autem, morbisq; articularijs illini cû rutæ, coriandri & salis mica, hordei farina. Aqua quoq; eius decocta, nernos articulósq; mirè iuuari. Si foueantur vulnera & recentia & vetera, etiam carcinomata, quæ nullis alijs medicamentis sanari possunt: Foueri prius aqua calida iubet, & bis die tritam, imponi. Sic etiâ fistulas eluxatas, & tumores reuocari, quæq; discuti opus sit. Insomnia etiam vigiliâsq;

C v tolle

tollere decoctam, si ieiuni edant quamplurimam ex oleo & sale. Tormina, si decocta iterum decoquantur, addito oleo & sale, cumino, polenta. Si ita sumatur sine pane, magis profuturam. Inter reliqua bilem detrahit per vinum nigrum pora. Quin & urinam eius qui Brassicam esitauerit, asseruari iubet, calefactamque nervis remedio esse. Auribus quoque ex vino succum Brassicae tepidum instillari suadet. Idque etiam tarditati audientium prodesse asseuerat. Et impetigines eadem sanari sine vlcere. Graeci biles detrahere non percoctam putant. Item aluum soluere, eandemque bis coctam sistere. Vino aduersari, vt inimicam viribus. Antecedente in cibis cauere ebrietatem. Postea sumpta erapulam discuti. Hunc cibum & oculorum claritati conferre multum, succo vero crudae angulis vel tantum tactis cum Attico melle, plurimum. Hippocrates coeliacis, dysentericis bis coctam cum sale dari iubet. Item ad tenasmon, & renu causas. Laetis quoque vbertatem puerperis hoc cibo fieri iudicans, & purgationem foeminis. Crudus quidem caulis si edatur, partus quoque emortuos pellit. Inuenio & a podagra liberatos edendo eam, decoctaque ius bibendo. Hoc & cardiacis datum & comitialibus morbis addito sale. Item spleneticis in vino albo per dies quadraginta. Contra vero singultus coriandro, & anetho, & melle ac pipere, & aceto. Illitam quoque prodesse inflationibus stomachi. Item serpentium ictibus, & sordidis vlceribus & vetustis, vel ipsam aquam cum hordeacea farina. Succum ex aceto, vel cum Foenogreco. Sic aliqui & articulis, podagrisque imponunt. Epinyctidas ac quicquid aliud serpit in corpore, imposita leuat. Item repentinis caligines has & si maditur ex aceto. Sugillata vero & alios liuores pura illita. Lepras & psoras cum alumine rotundo ex aceto, Sic & fluentes capillos retinet. Epi charmus testium & genitalium malis hanc vtilissimè imponi asserit. Efficacius eadem cum faba trita. Item coeulsis cum ruta. Et muris aranei morsus, foliorum aridorum farina alterutra parte exinanit. Stirpium Brassicae aridorum cinis, inter caustica intelligitur. Ad coxedicum dolores cum adipe peruetusto. Plura de Brassica viribus vide apud Catonem de re rustica, ca. clvij.

EX SIMEONE SETHI.

Malum & melancholicum succum procreat. Visum hebetat, & somnum per cōtraria insōmnia interturbat. Succus eius aliquatenus purgat: corpus verò eius ventrem sistit. Quapropter in quibus humectā alium exiccare volumus, ipsam modicè decoquentes, aquamque primā abiicientes, confestim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim neque æris, neque frigida aquæ quod bis coquitur, tāgere debet. Aestiuā Brassica peioris succi est quā hyberna. Cit verò vrinam, lumbricos interficit, & ijs qui ex vino crapula laborant, auxiliatur. Fertur autem quòd ab humiditate ortā hebetudinem sanat. Cocta cum pingui carne, plurimū noxæ atque vitij amittit. Flos eius proprietate quadam semen genitalē corrumpit, vtero impositus, & mulieres cōcipere prohibet. Pulmonem lædit. Tradūt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere: Et quòd eius succus cū melle sumptus, magnificè defectiones vocis iuuat. Vulneribus imposita, ea conglutinat, & malefica vlcera, & induratas inflammationes sanat.

ADNOTATIO.

Brassica nobis à caule insigni & arboreo, Caulis dicitur, Ea nobis multiplex magis est quā hic scribitur & pingitur.

De Cruciatā.

Cap. CLX.

NOMINA.

QUO nomine veteres hanc herbā appellauerint, nondum compertum habeo. Neque enim Isatis est, quā vulgus Saponariā vocat, vt suo loco docebimus, ideoque nomen quo illam nominaremus fingendum fuit. Ad imitationem autem Germanicæ nomenclaturę Cruciatam diximus, quòd eius radix in modum crucis, transfossa sit. Vt hoc etiam nomine Græcè *σταφυλιος* dici posset. Germanicè [Creutz vurtz, Sperenstich, & Madelgeer] Gallicè *Cruciatte* nuncupatur.



Cruciatella.

FORMA.

Caulem rotundū obtinet dodrantalē, in summo rubentem, alas multas habentem, è quibus singulis bina folia crassa, angusta & oblonga, florēque orbiculatim purpurei è siliquis coloris herbacei prodeunt. Radicem albam, longā, crucis instar ab utroque latere perforatam, à qua illi nomen inditum est.

LOCVS.

Nascitur locis incultis.

TEMPVS.

Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Admodum amara est, vnde facilè colligere licet, calidā & siccam esse.

VIREs.

Recentiores eius esse magnum contra pestilentiae venena vsum tradunt. Item quodd ea quæ in thorace sunt educe re valeat. Quæ sanè singula præstare posse, amarus sapor qui illi inest, abundè docet. Abstergunt enim expurgantq; amara, & quæ in venis est, crassitiem incidunt, Galeno lib. quarto de simpl. medicamentorum facultatibus capitulo decimo septimo autore. Quamobrem menses etiam mouet, comitiali morbo cõpetit, & alia quæ amaris ab eodem tribuuntur, præstare potest. Vulneribus etiam glutinandis mirificè conducit.

ADNOTATIO.

Cruciatam habemus aliam à foliorum quatuor situ, in crucis formam flore pallido, diuerso, Enterocelis efficacem.

De Ci

De Cisso. Cap. CLXI.

NOMINA.


K ^{Isis} Græcè, Hedera Latinè, [Ephevu] Germanicè, Gallicè *Lierre* dicitur. Athenienses Bacchum appellarunt Citton, quo nomine rigens Hedera quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata est Cissos: è diuerso nunquam nisi repens humi Chamæcissos. Sic Dyonisia hoc est Bacchica nominata est à Baccho, qui primus ex Indis in Græciam Hederā asportauit: vel quòd in tutela eius fuerit: Nam vt ille iuuenis semper, ita hæc viret. Nec secus omnia, sicut ille mentes hominum, illigat. Hedera verò dicta est, quòd vetustis parietibus hæreat: vel potius quia ædificata petat, & altè diuagetur: vel quia id cui adhæserit, edat acque corrumpat.

GENERA.

Plurimas, Dioscoride auctore, sigillatim habet species: sed maxime generales tantum tres. Candida enim quædam dicitur, eo quòd candidū fert fructum: hæc fœmina à Plinio vocatur. Germanis [vveisser Ephevu] nominari commodè potest. Altera nigra, quæ nigrum producit fructum: hæc Plinio mas nominatur. Germanis [Schuuartzzer Ephevu.] Hæc etiā parietibus obrepit, murisque pertinacius hæret quàm vt possit abire, hinc [Maurephevu] Germanis vocatur, & [Baumephevu.] quòd scilicet arbores suo complexu strangulet. Tertia priuatim Helix, id est, clauicula, & hederula nuncupatur. Germanis [Klein Ephevu, oder Erdephevu.]

FORMA.

Nigra, quæ in Germania nostra prouenit, arbores & parietes radicosis amplectitur brachijs, in totum fruticosa, folia primum cūmpubescit angulosa, cū plurimum in triangulam faciem exeuntia habens. Vetustiori rotundantur, pingua, dura, immortali viore: flore exili, vitigineo, non inodore: baccis primum herbaceis, mox atris, & nonnunquam croceis, longiori pediculò in vix modum dependentibus sparsioribus racemis non in globum, candidæ modo, coeuu
tibus

*Hedera nigra.**Hedera Helix.*

tibus, sed in acinos discretis. Radice numerosa, densa, flexuosa, contorta, ac sicculosa, nec admodum profunda. Candida inter media folia emittit brachia, quibus arbores complectitur, maxime ramosa & robusta, corymbis, hoc est, racemis in orbem circumactis, aut folio albicat. Helix quantumvis diu vivat, Theophrasto autore, nunquam fere fructum adeoque sterilitate à ceteris distat. Parva tenuiave huic folia, angulosa & rubra, viticulaeque tenues sine corymbis.

LOCVS.

Hedera aquis gaudet. Nigra passim circa muros crescit. Helix verò in sylvis humi serpit.

TEMPVS.

Nusquam non viret Hedera.

TEMPERAMENTVM.

Hedera ex contrarijs composita est facultatibus, habet enim quid

quiddam adstringētis substantiæ, quæ terrena & frigida est. Habet etiam nonnihil acris, quæ calida est. Nec deest tertia, aqueam nāque substantiam quandam tepidam obtinet certē si viridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manētque quæ terrea est & frigida adstringēnsque & ea quæ calida & acris.

VIRE^s EX DIOSCORIDE.

Hedera omnis acris & adstringens est, Nervos tentat. Flores trium digitorum carptu, in vino bis die poti, ad dysentericos faciūt. Ambustis cū cerato illiti profunt. Tenera folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū & corymborum succū cum irino vnguento, melle, aut nitro uaribus infunditur. Et cōtra veteres capitis dolores valet, atque eō perfunditur caput cū aceto & rosacō. Dolentibus & purulētis auribus cum oleo medetur. Nigrtæ hederæ succus, aut e poti corymbi imbecillitatē pariunt, mentēmque turbant largiūs sumpti. Pillulę quinque corymborum tritæ calefactęque in malicorio cum rosacō si instillantur in contrariam aurem, dolorem dentium mitigant. Denigrāt capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta, omniū vlcera generi, etiam si cacoethe sint, illinūtur. Vitia cutis in facie & ambusta, vti iā diximus decocta sanant. Mouent mēses triti & subditi corymbi. Idem poti post purgationes scēminarum, drachmæ pondere sterilitatem faciunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vuluæ inditus, menstrua & fœtus extrahit. Succus instillatus in naribus, graueolentiā & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculósque illita necat. Radicum succus cū aceto potus, phalangiorum morsibus succurrit.

EX GALENO.

Viridis, folijs eius in vino decoctis, vlcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt, ad sanitatē reducit. Igne etiam factas exulcerationes cicatrice includit. Cum aceto decocto folia lienosis profunt. Flores autē quodāmodo validiores sunt, vt ad læuorem redacta cum cerato ambustis conueniant. Præterea succus medicamentum est, quod naribus infusum capiti purgando idoneum existit. Vetus
aurium

aurium fluxiones sanat: ad hæc vlcera vetera tum in auribus tū in naribus. Porro si acrior appareat aut rosaceo, aut dulci oleo misceatur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, vsq; adeo calidæ potestatis vt obscure adurat.

EX PLINIO.

Natura omnium Hederarum in medicina anceps. Mentem turbat & caput purgat largius **pota**. Nervis intus nocet. Iisdem nervis adhibita foris **prodest**. Eadem natura quæ & aceto, ei est. Omnia genera eius refrigerat. Vrinam ciunt potu, capitis dolorem sedant, præcipue cerebro continentiq; cerebrum membranæ vtiliter mollibus folijs impositis, cum aceto & rosaceo tritis & decoctis, addito postea rosaceo oleo: Illinuntur autem fronti, & decocto eorum sonetur os, caputque perungitur. Lieni & **pota** & illita profunt. Decoquantur & contra horrores febrium, eruptionesque pituitæ, aut in viho teruntur. Corymbi quoque poti vel illiti lienem sanant: iecinora autem illiti. Trahunt & menses apppositi. Succus Hederæ tædia narium graucolentiâque emendat, præcipue albæ satiat. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur etiam purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior albæ est, ferro calefactus: satisque est acinos sex in vini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem alba terni, in aceto mulso poti, tineas pellunt: in qua curatione ventri quoque imposuisse eos vtile est. Hederæ quæ chrysocarpon appellauimus, baccis aurei coloris viginti, in vini sextario tritis, ita vt terni cyathi potentur, aquam quæ cutem subierit, per urinam educit Erasistratus. Eiusdem acinos quinque tritos in rosaceo oleo, calefactosque in cortice punici, instillauit dentiū dolori à contraria aure. Acini, qui croci succū habent, præsumpti potu, à crapula tutos præstant. Itē sanguinem excreantes, aut torminibus laborantes. Hederæ nigra candidiores corymbi poti steriles etiam viros faciunt. Illiuitur decocta in vino omnium vlcerum generi, etiam si cacoethe sint. Lachryma Hederæ psilothrum est, phthiriâsinque tollit. Flos cuiuscunque generis trium digitorum carptu,

carptu, dysentericos & aluum citam emendat, in vino austero bis die potus. Et ambustis illinitur vtiliter cum cera. Denigrant capillum corymbi. Radicis succus in aceto potus, contra phalangia prodest. Huius quoque ligni vase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt, mōxque combiunt, & ita illiunt ambusta, prius perfusa aqua calida. Sunt qui & incidant succi gratia, eoque vtantur ad dentes erosos, frāgique tradunt, proximis cera munitis ne lādantur. Gummi etiam in Hedera quærunt, quod ex aceto vtilissimum dentibus promittunt.

De Ceraso.

Cap. CLXII.

NOMINA.

Kερασο Græcis, Cerasus Latinis, Germanis [Kirschenbaum] Gallis *Cerisier* dicitur. Cerasum autem arborē, vt Athenæus refert lib. ij. Dipnosop. à Cerasunte Pontica ciuitate, primus in Italiam Lucullus intulit, debellato Mithridate. Ille idem est qui etiam fructum cognomine ciuitatis appellauit Cerasium.

GENERA.

Multa Cerasiorum sunt genera: in Germania tamen tria, quod sciam, duntaxat proueniunt. Primi enim generis sunt rotunda, ac maximè rubent, suāque voce illis dicuntur [Amarellen.] Alterius generis, quod ad figurā attinet, prioribus similia sunt: differunt autem colore, qui illis ad nigredinem accedit. Vocatur autem horum lingua [Vviechel.] Tertij generis prædictis minora sunt ac longiora, partimque rubent, partim nigricant: à nonnullis priuatim [Kirschen vel Krieschen] appellatur. Nos vna icone omnia tria complexi sumus. Quæ in utroque genere nigra sunt, ea velle tium manus & labra succo suo, qui sanguineus est, mororum instar inficiunt.

FORMA.

Cerasus folio ferè Mespili, duro, latiore, & in ambitu serrato constat, cortice læuo, in candido nigricante, flore albo racemiatim congesto, fructu rubro aut nigro, magnitudine fabæ.

*Cerasus.*

Frequens est in omnibus hortis *Cerasus*. Quæ tamen posterioris generis *Cerasia* profert, in sylvis nonnunquam & nemoribus etiam reperitur. Gaudet autem aquosis montibus.

TEMPVS.

Iunio ac Iulio potissimum mēsisbus fructus maturitatem consequitur. Flores primo statim vere apparent.

TEMPERAMENTVM.

Cerasorum non vnum idēque est temperamentum, quod ex eorundem facultatibus perspicuum sit. Simeon tamen Sethi frigida & humida esse tradit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Cerasa quidem ipsa si viridia sumantur, ventri vtilia sunt. Eadem siccata aluū sistunt. Gummi *Cerasorū* cum vino diluto sumptum, vetustæ tussi medetur. Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex vino potum calculosis auxilio est.

EX GALENO.

Cerasus arbor fructum fert non paræ adstrictionis in omnibus particularim plantis participē. Nam & in horū, sicut etiam malorū granatorum, & malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam verò dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum

nondum concocta sunt ac matura, quædam admodum acerbæ sunt, quædam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in Cerasijs non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt, subducunt, sed minus apta stomacho sunt. Cõtrà austera. Quæcunque verò acida sunt ea pituitosis excrementosisque stomachis conueniunt. Siquidem austeris magis exiccant. & nonnihil etiam incidunt. Porrò ipsius arboris gummi communem omnibus viscosis, & mordacitatem expertis medicamentis, facultatem obtinet, quæ ad arterias exasperatas accommodata est. Propriè autem (si quidem verum est quod quidam scribunt) calculis vexatos cum vino potum adiuuat: Nam sic illi tenuium partium quædam facultas inest.

EX PLINIO.

Cerasa & aluum molliunt, stomacho utilia. Eadem siccata aluum sistunt, vrinam ciunt. Inuenio apud autores, si quis matutino rosida deuoret cum suis nucleis, in tantum leuari aluum, ut pedes morbo liberentur.

EX SIMEONE SETHI.

Cerasa mali succi sunt, ventrem subducant, humidum ventriculum lædunt, præsertim cum non sunt matura. Profunt autem calidis & siccis ventriculis ac temperaturis. Gumi verò arboris cum vino sumptum calculosis auxiliatur.

APPENDIX.

Sunt qui tradunt gummi quod ex arbore destillat veteri tussi mederi, exque vino sumptum, guttaris lenire asperitates, fastidia discutere, & ciborum appetentiam moliri. Colorem cutis facere gratiorem, & oculis asferre claritatem. Lichenes infantium ex aceto sanare.

De Cyano. Cap. CLXIII.

NOMINA.

KYANOS Græcis, Plinio & Latinis alijs Cyanus appellatur. Nonnullis Bapti secula, quod secatibus & metentibus officiat, retusa in eius occursum falce. Nam & seculam veteres falcem dixerunt. Rectius tamen Blaptisecula vocatur.

D ij retur

retur, quòd βαλάνη Græcis nocere significet. Nostri florē frumentorum, Germani autem [Blavvkornbluemen.] nominant, quòd scilicet in frumentario nascatur agro. Cyanos verò dicta est hæc planta, ob floreni quem profert cœruleum, aut quòd honorem nomenque dederit cœruleo colori. Hinc est quòd pueri in hodiernum vsque diem barbulas calycibus erutas, ex candido oui liquore terant, quo in pingendis grandioribus literis cœrulei nitorem mentiantur. Gallicè *blaneole*, *Bluet*, ou *Aubifoin* dicitur,



Cyanus.

FORMA.

Caulis illi est angulosus, folia angusta & oblonga, calyces rosarum sed squarosi atque tristes, quos plurimæ cœruleæ stipāt barbulæ. Radix oblonga, lignosa, fibris quibusdam capillata.

LOCVS.

Triuiialis flos est, passim in frumentis nascēs.

TEMPVS.

Iunio potissimū mens se floret, nec parum gratiæ suo cœruleo colore frumentis adfert. Hinc est quòd rusticorum etiam coronis inserantur, quanquā inodorus prorsus sit.

TEMPERAMENTVM.

Frigidæ est temperaturæ atque adeò repellentis, id quod gustus etiam facillè indicat, viscositatem manifestā, & nullum

lum prorsus caloris indicium præ se ferens.

VIRE S.


Recentiores rectè tradunt huic herbæ facultatem inesse qua oculis alijsque partibus inflammatione laborantibus proſit.

A DNOTATIO.

Cyanus vt Græci dicitur, colore floris sic nobis Bluet & percele, cur verò Gallis Aubifoin, velut ab albo saxo dicatur, non video: nisi sortè quod in eo genere quadam flore sunt etiam albo, & qui purpurei sunt inserta ligati, & aqua inferna parte immisſi, tandem albeſcunt.

De Crommyo. Cap. CLXIIII.

NOMINA.



Cepa.

K *Πικρυον* Græcis, Cepa, & in neutro Cepe, Latiniſ dicitur. Officinæ genuinum nomen, retinuerunt. Germanis, [zvibel] appellatur: quod sanè vocabulū à Gallico detortum eſſe videtur: quādoquidem Galli ſua lingua Cepam vocent Siboulam. Crommyon aut, Ariſtotele in problematis autore, dictum eſt, quod oculi pupillam cōprimi cogat. Nam oculos veſicādo expreſſis ſubinde lachrimis cōtrahi pupillas certum eſt. Idem libro ix. *Dipnoioph*, teſtatur Athenæus. Cepa verò à capitis magnitudine, Gallicè *Oignon*.

D iij FOR

FORMA.

Folia habet serè porracea, intus cōcaua: caulem teretem rotundūmq; per cuius fastigium flores primū candidi, ac subinde semen, in orbem spargūtur: radicem capitatam pluribus compactam tunicis, quæ summam prætenuibus rufisque vestitur membranis, vertice nigricantem, à quo fibræ, capillitij modo, fruticant.

LOCVS.

Terram Cephæ amant pinguem, vehementer subactam & irriguā: passimque hodie in omnibus plantantur hortis.

TEMPVS.

Floret Iulio potissimū mense, & deinceps semen profert, quod nō antè legendum, quā cū nigrum colorem præ se fert. Si quidem eo colore perfectionem fatetur, nigritiaque maturitatis index est.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine excalescentium, essentiāque eius crassarum est partium: Si succum eius exprimas, quod reliquum est admodum terreæ substantiæ est eiusque calidæ: ac succus aquæ aeræque caliditatis.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Cepa longa acrior est quā rotunda, item flava quā candida, sicca quā viridis, & cruda quā cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordicant, flatu gignūt, appetentiam inuitant, extenuant, sitim excitant, fastidium pariunt & expurgāt. Aluo vtilis sunt. Detractis tunicis inque oleū cōiectæ, ac pro glandibus subditæ hæmorrhoidas, reliquasque excretiones aperiunt. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, angināque laborantibus. Suppressos menses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cum sale, ruta & melle illinitur. Cum aceto autem in sole inūctus alphas sanat. Cum pari spodio, scabra, lippitudines sanat. Varos cū sale reprimat. Contra calcamentorum attritus, cum gallinaceo adipe vtilis est. Alui fluoribus prodest. Aurium grauitati, ac sonitui cōfert. Ad purulentas aures, & eliciendam aquam in ijs interceptam valet. Alopecie earum succo vtiliter perfricantur: celerius enim quā Al-

tyonium pilos euocat. Largior Ceparū cibis capitis dolores ciet. Cocta vehementius vrinam pellit. In morbis, cocta etiam, copiosius comesta, lethargum efficit. Cum passis uis, & fico illita, tubercula concoquit & rumpit.

EX GALENO.

Hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole albos abstergit, alopecij attrita pilos Alcyonio citius restituit. Porro succus eius ijs qui suffusione oculorum laborant, aut aciem oculorum obtusam præcrassitudine humorum obtinent, inunctus prodest. Tota Cepa manducata flatuosa est. Itaq; quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant. Crassos corporis humores extenuat, glutinososque incidit. Bis tamen aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliatur, quanquam ne sic quidē vim perdit extenuandi: verū facultatem quandam obscurissimā alendi corporis exinde acquirit, cuius antea quā decoqueretur nihil prorsus obtinebat.

EX PLINIO.

Cepæ olfactu ipso & delachrimationi, & caliginī medetur, magis verò succi inunctione. Somnum etiā facere traduntur, & vlcerā oris sanare, commanducata cum pane. Et canis morsus virides ex aceto illitæ, aut siccæ cum melle & vino, ita vt post diem tertium soluantur. Sic & trita sanant. Tostam in cinere epiphoris multi imposuere cum farina hordacea, & genitalium vlceribus. Succo & cicatrice oculorum, & albugines, & argemas inunxere, & serpentium morsus, & omnia vlcerā cum melle. Item auricularum cū lacte mulierum, & in ijsdem sonitum aut grauitatem emendantes, cum adipe anserino, aut cum melle stillauere. Et ex aqua bibendum dederunt repenti obmutescētibz. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum omnium, priuatim scorpionū. Alopecias fricere & pforas tufis cepis. Coctas dysentericis vscendas dedere, & contra lumborum dolores. Purgamenta quoque earum cremata in cinerem, illinētes ex aceto serpentium morsibus, inter ipsas quoque multipedes ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas proximi inutilia esse p̄cordijs et cōcoctiōi, inflationēq; & situm facere dixerūt. Asclepiadis scho

la ad validum quoque colorem profici hoc cibo. Et si succum ieiuni quotidie edat, firmitatem valetudinis custodiri, stomacho utilia esse, ac spiritus agitationi, ventrem mollire, hæmorrhoidas pellere subditas pro balanis, succum cum succo sceniculi contra incipientes hydropises mirè proficere. Item contra anginas, rura & melle. Excitari eisdem lethargicos.

EX SIMEONE SETHI.

Cepa lotium cit, & semen genitale gignit. Cibi appetentiam excitat. Capitis dolores facit, & stomacho officit. Rationem, etiam ut aliqui ferunt, lædit. Si verò coquatur, plurimum malignitatis deponit, & utilis fit ad thoracis asperitates, & tusses. Hæmorrhoidas imposita aperit, & cum aceto inunctum alphas extergit. Et si autem crassarum partium substantiam habeat, humores tamen crassos & lentos extenuat. Ventriculū verò inflat. Si crebrius quis ea utatur, in henis vitia incidit.

De Campanula. Cap. CLXV.

NOMINA.

QUVM nobis non constet quo nomine veteribus appellata sit hæc herba, placuit illam Campanulam, à florum similitudine, qui campanam planè referunt, nominare. Germanis [Halszkraut,] hoc est Ceruicaria dicitur, quòd scilicet ad oris, & crucis fauciumque mala mirificè conferat. Gallicè, *Gans nostre Dame, ou Gantelee.*

FORMA.

Caulem profert quadrangularem, hirsutum, rubescentē, folia oblonga, hirsuta, in extremitatibus incisa & serrata, ad Vrticam proximè accedentia, flores purpureos campanæ aut calathæ similes, in medio luteum quid prominens obtinentes, quibus emarcescentibus in rotundis capitulis semē provenit. Radicem multifariam intortam, & candidam.

LOCVS.

Gignitur in pratis siccis, in quibus dumeta plurima existunt, Propemodum enim nunquam nisi in dumetis reperiri potest.

TEM



Campanula.

fert. Vtilis etiam haud dubiè ad alia quæuis vlcera, ob insignem quem obtinet in exiccando facultatem.

ADNOTATIO.

Campanula huius videtur nobis Gantelee, & Gans nostræ Dame à dactylothea in floribus forma.

De Calaminthe. Cap. CLXVI.

NOMINA.

KΑλαμίνθη Græcis, Calamintha Latinis, officinis Calamentum nominatur. Germanicas appellationes paulò post indicabimus, Calaminthaverò dicitur quasi vel bona, vel vtilis mentha: nāque nidore suo serpentes fugat. Quod testatur etiam Aristophanes ijs verbis: σφίς δέξῃ καλαμίνθη, σφίως λασικῶ. Nisi quis existimet à κάλσ hoc est, ligno, quasi lignosam appellari mentham.

GENERA.

D v Cala

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit, vt hinc exiccandi illi vim esse qsq; conijcere queat.

VIRES.

Adstringendi habet facultatem, ideòq; decoctum illius vnicè ad oris exulcerationes, aliāque eiusdem mala quæ adstrictione indigent, con-

Calaminthæ Dioscorides tria facit genera. Primū amæ montes, ideo huius generis Calamintha montana vocatur. Germanis [Steinoder Katzenmuntz] Gallis *Calament* dicitur. Alterum Latini propriè Nepetam. Vulgus eò quòd Pulegio simile sit, sylvestre Pulegium nominant. Germani etiam vulgi opinionè sequētes, [Vilden Poley & korn muntz] Galli quoq; *Pulege sauvage* vocant. Officinæ pro Calamento hoc solo genere vtuntur. Tertium Mentastro simile est, Germanicè [Geelmuntz] commodè appellatur Gallicè *Calament aquatic.*

FORMA.



Calamintha primū genus.



Calamintha secundum genus.

Primū Calaminthæ genus folia Ocymo similia habet, subalba, ramulos angulosos, florem pupureū. Alterum Pulegio simile est, maius tamē: propter quod quidam, vt dictū est sylvestre Pulegium nomināt, quoniam & odorem illius æmule



Calamintha tertium genus.

TEMPVS.

Florent Iunio, potissimum verò Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calamintha essentia est tenui & Calida, siccaque in tertio quodammodò ordine, Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu quidem acris & palàm calida est, ac paulù omnino amaritudinis obrinet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Omniù folia gustu feruentia admodùm & acria. Radix inutilis. Pota aut illita demorsus à serpente opitulatur. Decoctum eius potù vrinas & menses expellit. Ruptis, còuulsis orthopnœ, torminibus, cholerae, rigoribusque auxiliatur. Præsumpta in vino venenis resistit. Regium morbù expurgat. Lumbricos & ascaridas cum sale & melle pota cneat. Nec secus cocta crudaque si teratur. Elephanticos esitata

æmuletur. Tertium Mètastrî similitudine est, longioribus folijs, caule & ramis prædictis maius, sed minus efficax: flore luteo.

LOCVS.

Primi generis Calamintha in montibus & asperis gignitur, vnde & montana dicta est. Aliterius in campestribus & agris. Tertij in aquosis locis.

tata adiunat, si postea serū lactis bibatur. Folia trita & adposita, menses ducunt, & foetus interimūt. Accensa aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta & illita. Sugillata tollunt. Ischiadicis imponitur, vt humorem ex alto euocet, meatusque trāsmittet, summam cutem exurens. Vernies necat succus auribus instillatus.

EX GALENO.

Periclitantibus & corpori admoventibus extrinsecus imposita, primum quidem valde excafcit, & mordicat, cutēque laniat, postremò etiā vlcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum ipsa per se sicca, tum etiam cū melicrato, perspicuo calfacit: & sudorem ciet, omneque corpus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam cōtra rigores per circuitum repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cū frictione nō segni, intrò verò assumentes, sicuti est dictū. Quinetiam & coxendicibus eam quidam in ægitudinibus ischiadicis tanquam strenuum remedium illinūt: trahit enim quæ in profundo hærent, totūque adeò articulum excafcit, cutēque non obscure adurit, mensesque tū pota, tum apposita admodum efficaciter prouocat. Potum etiam elephantiorum remedium, non eò tantū quod strenuē tenues humores digerat, verumetiam quia extēnuet & incidat valenter crassos, quales sunt qui hunc morbum procreant. Sic & cicatricibus atris candorem reddit, & sugillata digerit. Sed ad talia recentem magis quā arentem adhibere præstat. Quippe arefacta vehementior redditur, & ad vrendum promptior. Porro talis cum sit, ad venenatarum bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria, & quæcunque medicamenta calida sunt & acra, tenuiumque partium, quæque faciliè ex alto ad sese circumiacentem omnem humiditatem possunt attrahere. Cæterum quæ illi inest amaritudo, planè exigua est, verū ad quædam ita efficaciter agit, vt quæ valentissima est, nimirum quū coniuncta sit vehementi calori cum tenui essentia. Quare & ascaridas & lumbricos succus eius infusus aut potus enecat. Eadem ratione

aurium

aurium vermes, aut si alicubi in parte corporis sinuosa, aut implicata quæ putredine têtetur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptum seu pota, seu admota interimit & eiecit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem eius, tenuitatem & amaritudinem: abstergendi verò ppter vnicam amaritudinem. Itaque asthmaticis ob omnia antedicta prodest. Ictericis verò potissimum ob amaritudinem, si cut alia ferè omnia amara, utpote abstergentia & expurgantia in iccinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

EX PLINIO.

Decocta in aqua ad tertias discentit frigora. Mulicrû menstruis prodest. Aestate sedat calores. Vires quoque contra serpentes habet. Fumû ex ea nidoremque fugiunt, quam & substernere in metu obdormituris vtile est. Tusa ægilopis imponitur, & capitis doloribus recens, cum tertia parte panis temperata aceto illinitur. Succus eius instillatus naribus supinis, profluuium sanguinis sistit. Item radix cû myrti semine in passo tepido gargarizata, anginis medetur.

ADNOTATIO.

Quanam herba Calaminthis genera apud Dioscoridem & Galenum explient, hodie parum constat, ut Musa Ruellius repugnet ob historiam Dioscoridi & Galeni obscuram breuitatem.

De Crithe.

Cap. CLXVII.

NOMINA.

K P^{idm} Græcis, Hordeum Latinis & officinis dicitur. Germanis [Gersten] Gallis Orge. Ex eo polenta, quam Græci ἀλφιτον nominât, & Ptisana, medicamenta veteribus vñtatissima, conficiuntur.


GENERA.

Rustici duo esse Hordei genera tradunt. Vnum Polystrichum, quod sic dictum est, quia in multos versus spicatur. Sunt enim ex hoc genere quæ spicam tribus, interdû quatuor, nunc ex, nunc octo versibus distinctâ proferût. Germanis [Grosz Gerst,] hoc est, Hordeum magnum vocatur.

Gallus

Gallis Orge à plusieurs râcs. Alterum Distichum nominatur quodd scilicet in duos duntaxat versus spicatur. Germanis [Klein Gersten, id est, Hordeū exiguum appellant. Gallicè Orge à plusieurs rancs.

FORMA.

*Hordeum polystichum.**Hordeum distichum.*

Culmum habet tritici, fragiliorem tamen minoremque quinque, sex, & interdum pluribus geniculatum articulis simplici in stipula folio, & eo quidem scabro ac lato. Grana ferè nuda, longiore capillamento, mordacique arista. In versus spicatur, radice frequenti, capillus fibrata.

LOCVS.

Hordeum pinguisimum amat agrum.

TEMPVS.

Erumpit à primo satù die septimo, & caput alterum graui in radicem exit, alterum in herbam. Metitur Augusto mense.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Hordea primi sunt ordinis in exiccando & refrigerādo.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Hordeum optimum est candidum, purumque. Minus quam triticum nutrit. Ptisana tamē ob cremorem in elixatione redditum, plus alimēti præbet quam polenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atq; faucium scabritias, exulcerationesq; pollet, quibus etiam triticea ptisana præsidio est, sed plus alit, magisque vrinam mouet. Lac abundē suppeditat, si cum Fœniculi semine decocta sorbeatur. Abstergit, vrinam ciet, inflat, stomacho aduersatur, & œdemata cōcoquit. Farina hordeacea cū fico in malsa aqua decocta, œdemata & inflammationes discutit. Duritias cum pice, resina & fimo columbino concoquit. Cum meliloto autem & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes, cum lini semine, fœnogregæ & ruta illinitur. Strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad cōcoctionem perducit. Cum Myrto autem, aut vino, aut syluestribus pyris, aut rubo, aut malicorio, alui profluuia sistit. Podagricis inflammationibus cum cotoneis, aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liguata eadem cum aqua, atque cum pice & oleo decocta, pus excitat. Cum aceto autem liguata, & cum pice decocta, contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex ijs aluum cohibet, inflammationesque mitigat.

EX GALENO.

Hordea pauxillum etiam abstersionis habent. Paulò etiam plus desiccant quam farina fabacea, cui non insunt cortices. Cætera verò similia sunt foris vtentibus. In cibo autem hoc præstant fabis, q; flatuosam naturam exuant: fabis quātūcūq; coxeris, flatuosa natura remanet, sunt enim crassioris essentia quam hordea, quamobrem ijs plus etiam nutriunt. Quoniā verò ambo paulum à medio recesserūt, multo sunt vsui. Nā talia medicamenta multis alijs miscentur cen materiæ quædam: itaq; etiā cera & oleū paucis medicamentis cōiunguntur. Polenta verò multò plus hordeo desic

deficcet. Plura de hordeo, ptisana & polenta apud Galenum lib. j. de alimentorum facultatibus offendes.

EX PLINIO.

Farina ex hordeo & cruda & decocta, collectiones impetūsque discutit, lenit, & cōcoquit. Decoquitur aliàs in multa aqua, aut fico sicca. Ad iecinoris dolores eam in posca positam concoqui opus est, aut cum vino. Cūm verò inter coquendum discutiendūque cura est, tunc in aceto melius, aut in sœce aceti, aut cotoneis pyrisve decoctis. Ad multipedum morsus cum melle, ad serpentium in aceto & cōtra suppurantia, ad extrahendas suppurationes ex posca, addita resina & galla. Ad concoctiones verò & vlcera vetera cū resina. Ad duritias cum fimo columbino, aut fico sicca, aut cinere. Ad neruorum inflammationes, aut intestinorū, vel laterum, vel virilium dolores, cum papauere, aut meliloto, & quoties ab ossibus caro recedit. Ad strumas cum pice & impubis pueri vrina. Cum oleo & sœnogræco cōtra tumores præcordiorum, vel in febribus cum melle, vel adipe vetusto. Suppuratis triticea farina multò lenior. Neruis cum Hyoscyami succo illinitur. Ex aceto & melle lentigini.

ADNOTATIO.

Hordeum polytichon seu hexastichon à disticho Picardis distinguitur, Parisiensibus confunditur.

De Croco. Cap. CLXVIII.

NOMINA.

K PIX ☉ Græcis, Crocus Latinis appellatur. Officinæ antiquū nomen retinuerunt. Germani [Saffran] vocant simpliciter, aut cū adiectione, [zamer saffran.] Galli *Saffran*. Sic verò vocatus à Croco iuvene, qui propter amorē Smilacis virginis in florem sui nominis versus est: quod Ouidius testatur, qui sic scriptum reliquit:

Et Crocum in paruos versus cum Smilace flores.

FORMA.

Crocus folio est angusto adusque capillamenti penè exilitatem: flore purpureo Colchici floribus nō admodū dissimili,



simili, in quo flamma
Crocī stamina radice
bulbosa, copiosaque ac
viuaci.

LOCVS.

Nascitur in Coryco
monte Cilicię optimus.
Proxima nobilitas ei q
in Olympo Lyciæ mon
te prouenit. Dein ei qui
ex Aegis Aetoliæ vrbe
affertur. Nunc in pleris-
que Germaniæ locis plā
tari cępit haud infeli-
citer, qui viribus è locis
iam commemoratis al-
latis haud cedat.

Crocī flores & folia.

TEMPVS.

Florem ante folium ædit, per autumnum nanque Ver-
giliarum occasu floret, neque vltra mensis spatium flores
durant. Postquam autem hi decidunt, statim folia angusta
& oblonga prodeunt, viréntque tota hyeme.

TEMPERAMENTVM.

Crocus paulum quid adstringens obtinet, quod terreum
frigidumque est, sed superat in eo calefaciens & qualitas &
facultas, vt tota essentia secundi sit ordinis excalefacien-
tium & primi exiccantium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Crocus emollit, concoquit, leniter adstringit, vrinam cit
& coloris bonitatem efficit. Arcet crapulam cum passo po-
tus. Fluxiones oculorū cum lacte muliebri inunctus sistit.
Potionibus quæ pro interaneis parantur, vtiliter miscetur
E item

item ijs quæ vuluæ sedique subijciuntur & illinuntur. Venerem stimulat. Inflammationes erisypelatosas inunctus lenit. Aurium remedijs vtilissimus est. Lethalem sanè dicunt hunc si trium drachmarum pondere cum aqua bibatur. Ra dix eius cum passo pota, vrinam cit.

EX GALENO.

Crocus concoquendi vim quandam habet, adiutante scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodum excalefaciant, paucula adest adstrictio, ea parem facultatem habent essentijis emplasticis nominatis, quas cum iunctas caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse constat.

EX PLINIO.

Discutit inflammationes omnes quidem, sed oculorum maximè ex ovo illitum. Vulvarum quoque strangulatus, Stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iccinorū, pulmonum, vesicarumque, peculiariter inflammationi earum vehementer vtile. Item tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus. Vrinam cit. Qui crocum prius biberint, crapulam non sentient. Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoque ex eo mulcent ebrietatem, Somnum facit. Caput leniter mouet, Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cum cetera Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonus est, ciborumque concoctionem efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethargica vitia iuuat. Discutiendi quoque vim obtinet & visceribus vtilis est, ad spiritusque difficultatem conducit. Si quis illo mediocriter vtatur, bonum colorem habebit: sin verò citra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibique inappetentiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus ubi dolèt, summo opere prodest, superpositis Betæ folijs.

De Cynocrambe. Cap. CLXIX.

NOMINA.

KΥΝΟΚΡΑΜΒΗ, ἢ ΚΥΝΙΑ, ἢ ΛΙΝΘΙΩΣΙΣ ἄγρια ἄρρητη Græcis, Canina Bratisca, Cynia, & sylvestris Mercurialis mas Latinis,
[Vvil]

Vilde Bingelkraut das mennle, Hundsz koel] Germanis
appellatur: Gallicè *Mercuriale sauvage*.



Cynocrambe

culorum connexum, & in summa nihil est quod non in ea
descriptioni admodum respondeat.

LOCVS.

In syluis copiosè prouenit.

TEMPVS.

Semen veris initio, nempe Aprilis mense, profert, mature
scit autem Maio.

TEMPERAMENTVM.

Quum gustu nihil à satiuua Mercuriali distet Cynocram-
be, colligitur hinc idem quod illa obtinere temperamentū.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Caulis & folia pota, & olerum modo comesta ahiuum ci-
ent. Ius verò decoctorum bilem & aquosa detrahit.

E ij AP

FORMA.

Caulem ex se mittit
dodrantalem, tenerum
& subalbidū. Folia Mer-
curiali similia, albescētia
ex certis interuallis. Se-
men propè folia parū,
rotundum. Ex qua qui-
dem delineatiōe sole me-
ridiano clarius est, her-
bam cuius picturam da-
mus esse Cynocrābem.
Siquidem ea caulem bi-
num palmarum altitudi-
ne habet, mollem & sub
candidum. Folia Mercu-
riali similia admodum,
certis interstitijs, subalbi-
da. Semen item iuxta fo-
lia exiguum, rotundum,
geminorum instar testu-

APPENDIX.

Alia est Cinocrambe ab hac nostra, ea cuius mentionem facit Galenus, Paulus & alij, adde etiam Dioscorides, verū sub nomine Apocyni: quod lectorem, ne diuersas herbas vnā esse putaret, monere volui.

ADNOTATIO.

Hæc Brassica canina licet Mercurialis mas dicatur ob eius similitudinem, tamen Dioscoridi diuersa sunt planta.

De Colutea Cap. CLXX.

NOMINA.

K *Κολυτῖα* Græcis, *Colytea* & *Colutea* Latinis, Gallicè *Bagnenaudier* dicitur: à nullo tamen, quod sciam, veterum quā à Theophrasto libro tertio de plant. histo. cap. xviiij. celebrata.

*Colytea siue Colutea.**Sena.*

G E N E R A .

Duo eius sunt genera. Vnum quod priuatim Colutea vocatur, officinis incognitū. Germani [vuelsch Linsen] appellant. Galli *Bazuenaudier*. Alterum officinis cognitum & frequenti vsu à medicis vsurpatum, Mauritano sermone Sena nominatur. Germani ad eam alludētes appellationem, [Senec] Galli etiam *Sené* nunciant. Differūt autem inter se magnitudine: siquidem primū genus maius est altero vt pote quod quadriennio, Theophrasto loco paulò antè citato teste, se in arborem efferat. Siliquæ etiam illius magis turgido spiritu distendūtur. Sena verò siliquas profert lunatas, nec ita prætumidas. Semē denique Coluteæ rotūdum, lentis obtinens similitudinem: Senæ autem oblongū, cordisq̃ue humani instar acuminatum.

F O R M A .

Frutex est ramis exilibus, folio sænigræci: flore genistæ aut pisi, luteo, membraneo folliculo, pellucēte, prætumido & veluti quodam spiritu distendente turgido, ita vt digitis si prematur, crepitans disiliat, in quo semen atrū, durum, latum, lentis magnitudine, pisi gustu, in ordinemque digestum clauditur.

L O C V S .

Satum vtrunque in hortis prouenit.

T E M P V S .

Floret Colutea Maio & Iunio mensibus, ac subinde in siliquis oblongis semen profert.

T E M P E R A M E N T V M .

Arabes calidam in principio secundi & siccam in primo ordine statuunt.

V I R E S E X A C T V A R I O .

Sena siliquosus quidam fructus à barbaris appellatur, qui citra noxam drachmæ pondusculo potus, pituitam & bilem deijcit, post hos reliquos humores modestissimè purgat, retorridam atramque bilem, cuiusque suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetusito capitis dolori, scabiei, comitialibus, imperigini succurrit. Sed feruēfacti ius potius quam tritici farina propinatur. Interaneorum obstructions tollit.

APPENDIX.

Quum non forma tantum imò etiam sapore duo hæc Coluteæ genera sibi similia sint, faciliè etiam hinc colligitur facultate inter se minimè differre. Quare verumque citra molestiam atram bilem retorridamq; educit, caputque ac ecerbrum, & instrumèta sensuum à noxijs purgat humoribus. Quid multa? Aduersus omnia vitia ab atra bile nata valet.

APPENDIX ALTERA.

Dum hosce commentarios conscriberemus, non erat ad manum græcus Theophrastus: quare cū Latino tantum v. tendum esset exemplari Theophrasti, nō satis conijcere potuimus, an per *υ* aut per *σ* vox ipsa scriberetur, cum non raro Latini eas voces in quibus Græcè *υ* est per, vt, efferant, Quare Latinè dici hanc herbam Coluteam & Colyteam putauimus. Sed nacti tandè Græco Theophrasti codice statim deprehēdimus *κολυτῖα* a *κολυτῖα* diuersam esse: id ipsum enim Theophrastus manifestè innuit. In Latina verò Theodoro versione perperam pro Colytea scribitur Colycea: id quod nobis etiam tenebras offudit.

ADNOTATIO.

Colutea nobis Bazuenaudier, cuius folia & folliculos sena loca non sine viribus substituunt pauperes.

De Coronopo. Cap. CLXXI.

NOMINA.

K *Ορονις* & *Ασπιον* Græcis, Pes Cornicis & Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis incognita herba Germanis commodè [Kraen oder Rappensulz] Gallicè *Capriole ou Sanguinaire, ou Fient au Chien.* appellari potest. Coronopus enim non alia ratione dici cœpit, quàm quòd Cornicis pedem effigie repræsentet. Sanguinaria autem, Sanguinalis ve vocata est, quòd sanguini sistendo apta sit herba. Sunt qui herbam stellæ nominant, alludentes haud dubiè ad Græcam appellationem astrion. Nonnulli quod foliū eius multipartito confectum; in ceruini cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu vocarunt.

FORMA.

*Coronopus.*

Herbula est oblonga per terram strata, folijs fissis, radice gracili et adstringente. Ex qua quidem descriptione, etsi conceisa admodum, satis liquet, herbam hanc cuius picturam damus esse Coronopum. Herbula enim est folijs oblongis & scissis, ac in multas partes laciniatis atque aded cornicis pedem effigie referentibus humi quoque semper sparsa proserpit: radice denique tenui admodum & adstringente prædita: Quibus omnibus id quoque accedit, quodd Dioscorides Psyllium fo-

lia Coronopo similia habere scribit. Quod si verum esse ex vtriusq; herbæ collatione experiri volueris, senties Coronopi huius nostri folia planè Psyllij folijs simillima esse, potissimū vbi primū è terra erūpūt: imò quod ad folia, flores & semina attinet, omnia in vtriusq; sibi similia deprehēdes, in eòq; solo distare comperies, quodd Psyllium folia nō fissa habeat, & in altum surgat, singulāq; iam dicta maiora producat: contrā Coronopus humi repat, minoraque omnia proferat. Vtraq; igitur herba luteos obtinet flores & semina in capitulis pulcibus similia. Capitula verò in Coronopo sunt multò quā in Psyllio tenuiora ac lōgiora, id quod pictura graphicè monstrabit. Ex ijs quoq; manifestum sit errare illos toto cælo, qui gramen aculeatū & Coronopum

vnam & eandem herbam esse contendunt, cum tamen forma non parum distare videatur. Atq; hinc est quod omnes veteres tam Græci quam Latini vtrunque herbam seorsim, & in diuersis locis descripserint. Plinius siquidem li. xxiij. capi. xix. aculeatum gramē in cacumine aculeos plurimum quinos habere, atque adeo Dactylon vocatum esse hoc nomine, quod scilicet digitorum speciem referat, scribit. Coronopus verò neque quinos, neque in cacumine aculeos obtinet, sed tantum folia fissa, vel si aculeos placet appellare has fissuras, non in cacumine, sed in ambitu passim foliorum eas reperies: vt certum sit Coronopum non esse aculeatum gramen.

L O C V S.

Dioscorides in incultis, semitis, & iuxta domicilia nasci tradit. In Germania tamen, quod sciam, nusquam nisi sata prouenit.

T E M P V S.

Floret Iunio mense, ac subinde in oblongis capitulis semen profert.

T E M P E R A M E N T V M.

Ex adstrictione ipsa satis constat radicem ipsam siccan- di vi præditam esse.

V I R E S E X D I O S C O R I D E.

Herba cocta estur olerum modo. Radicem habet in cibo adstringentem, quæ cœliacis conducit.

E X G A L E N O.

Coronopodis radix comesta cœliacis prodesse creditur.

E X P L I N I O.

Seritur interim Coronopus, quoniam radix cœliacis præclarè facit in cinere tosta.

A D N O T A T I O.

Coronopum, id est pedem cornicis pingit quam nos meritò cornu cerui vocamus, quod adulta eius folia cornu ceruini effigie ramosa sint. Coronopus nobis alius est in syluis frequens folio infernè ror- lam nigram aut geranium referente, supernè exiguo in pedis cornicis formā planè diuiso, cui flos supereminet luteus parvus.

De Cyclamino. Cap. CLXXII.

NOMINA.

KΥλάμινον, ἰχθυόθυρον Græcis, Rapum & tuber, vmbilicúsque terræ Latinis, Cyclamen officinis mutata voce, Panis porcinus & terræ, atque Arthanita à nostræ ætatis herbarijs. Germanis [Erdvurtz oder Apffel Schy vein oder Sevvbrot] Gallicè Pain de Pourceau dicitur. Cyclamino Græci nomen fecerunt, circumactam in orbē eius circinationem contemplati ἀπο τοῦ κύκλου quasi ab orbe Cyclaminon, hoc est orbicularem dixerunt. Fuitque hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Ichthyotheron verò idem, quòd pisces ea necantur, nominauerūt. Romani Rapum terræ, quoniam eius radix in terra velut Rapum extuberat. Qua sanè ratione Terræ tuber, quòd in molem quandam intumeat: aut Vmbilicum terræ, quoniam vt vmbilicus circinata forma emergit, sic & Cyclaminus sub

terra conspicitur, etiam appellarūt. Panem porcinum haud dubiè primum vocarūt subulci, qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, quod sepius radicem in orbē circumactam intuerentur, quæ non in globum intumescens, sed veluti pressa sese in latitudinem explicaret, qua forma quotidiano vsu panes visuntur, Terræ panem cœperunt appellare.

FORMA.

Folia Hederæ habet,
E v pur



Cyclaminus.

purpurea, varia, supra infrâque albicantibus maculis. Catul-
lem longitudine quatuor digitorum, nudum, folijsque ca-
rentem, in quo flores rosarum effigie purpurei. Radicem
nigram, Rapo similem, in latitudinem se pandentem.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis & vepribus, maximè sub arboribus.

TEMPVS.

Cyclaminus ad finem Augusti folia sua quæ per inte-
grum retinuit annum, amittit: & subinde noua emittit, at-
que statim inter ea flores ostendit, qui integro durant au-
tumno.

TEMPERAMENTVM.

Clarum est ex particularibus operationibus, quas statim
subijciemus, Cyclaminum esse calidam & siccam in tertio
ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix Cyclamini cum hydromelite pota pituitâ, aquâq;
per inferna trahit. Menses pota & apposita cit. Tradunt
si prægnans mulier radicem transgrediatur, abortum fieri.
Partum appensa accelerat. Bibitur & in vino contra lethar-
lia, præsertim leporem marinum. Illita contra serpentium
ictus remedio est. Immista viuo ebrietatem facit. Regium
morbum sistit tribus drachmis pota cum passo, aut diluta
mulsa. Sed oportet eum qui bibit cubiculo calido reclina-
re, multis vestibus contactum, quò sudet. Eiectus verò su-
dor felleus colore inuenitur. Succus eius ad purgandum
caput, naribus instillatur. Sedi etiam ad deiicienda excre-
menta in lana subijcitur. Vmbilico, imo ventri & coxæ il-
litus succus aluum mollit, verum abortum efficit. Suffusus
& hebetibus oculis inunctus cum melle succus prodest.
Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Sedem
procidentem cum aceto inunctus succus compescit. Expri-
mitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem deco-
quitur. Radix cutem extergit. Exanthemata exprimit.
Vulneribus per se ex aceto aut melle medetur. Illita lie-
nem minuit. Vitia cutis in facie à sole & alopecias emêdat.
Decocto eius luxata, podagra, & capitis vlcuscula, pernio-

nesque vtiliter fouentur. Ipsaque in vetere oleo sernefacta ad cicatricem perducit quæ oleo illo inuncta fuerint. Caua ta radix oleo expletur, & cineri seruenti imponitur, adiecto interdum thyrrhenicæ ceræ modico, vt strigmenticrafsitudinem contrahat, vnguentum tum primis vtilè pernionibus. Radix Scillæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoriam assumi contusam, & in pastillos conformatam.

EX GALENO.

Cyclaminus varias vires obtinet, nam & extergit, & incidit, & ora venarum aperit, & attrahit, & discentit. Clarum verò id est ex particularibus operibus. Nam succus eius hæmorrhoidas referat, violenterque ad secessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, strumas, aliasque durities discutientibus commiscetur, ac suffusis cum melle illitus competit: ad hæc quoque per nares expurgat. Adeò est vehemens eius facultas, vt abdomine illito ventrem subducit, & fœtum interimat. Nam & alioqui validum interimendo conceptui medicamen est, in pessa addito. Tota verò radix succo imbecilior est, quamquam & ipsa vehemens sit. Nam & menses siue epota, siue apposita euocat, & regio morbo prodest, non modò ipsum viscus expurgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem excernēs. Proinde à potione omnibus modis sudoris adiuvanda prouocatio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum pafso. Cutem extergit cum in alijs, tum quòd alopecias, ephe-lidas, omniaque exanthemata curet. Lienem quoque induratum iuuat illita, tum recens, tam arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis exhibeant.

EX PLINIO.

Cyclamini radix contra serpentes omnes bibitur. In omnibus ferenda domibus, si verum est, vbi sata sit, nihil nocere mala medicamenta, amuletum vocant: narrâtque ea ebrietatem repræsentari, addita in vinum radice. Et siccata Scillæ modo concisa reponitur, decoquiturque eadem ad crafsitudinem mellis. Suum tamen venenum inest ei: tra-
dunt

duntque si prægnans radicem eam transgrediatur, abortu fieri. Radix denique tribus drachmis bibitur in loco calido, & perfrictionibus tuto: sudores enim felleos mouet.

ADNOTATIO.

Ciclamini frequens in loco Aurelianensi, in hortis etiam nostris provenit.

De Cypero. Cap. CLXXIII.

NOMINA.

Kυπερ & κυπερ Græcis, Cyperus & Cypirus Latinis dicitur. Quæ enim Græci quandoque diphthongo, ut Theophrastus, quandoque vocali breui, quemadmodum Dioscorides, Galenus & alij quidam, penultimam scribunt, sit ut aliqui, e, alij verò, i, retineant. Poetæ qui, e, ex diphthongo retinuerunt, meritò penultimam in Cypero produciunt. Officinæ latinum nomen retinuerunt. Germanis [Vuilder

Galgan] Gallis *Sonches* vocatur.

FORMA.

Cyperus porri folia habet, longiora tamen, graciliora & solidiora. Caulem cubitalem, & nonnūquam altiore, angulosum, scæno simile, in cuius cacumine minorum foliorum ac seminis productio est. Radices illi subsunt, quarum usus est, oblongæ, oliuarum modo sibi inuicem commissæ, aut rotundæ, nigræ, suauiter olentes, & amaræ: vel, ut Theophrastus delineat,

*Cyperus.*

uit,

uit, inæquales, partim crassæ, carnosæque partim graciles atque furculosæ. Ex qua descriptione omnibus esse perspicuum arbitramur, stirpem cuius nunc picturam damus esse Cyperum. Siquidem folia fert porracea, longiora, exilioraque: caulem altitudine cubiti, aut altiorē, angulosum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt, inter quæ semen residet. Radices huic sunt oblongæ, oliuarum modo inter se connexæ ac inuicem implexæ, aut rotundæ, nigræ, iucundè spirantes, gustu amaræ. Præterea magna inæqualitate notantur, quod pars quædam crassa carnosaque, quædam gracilis atque lignosa sit. Nemo enim non videt radice tenuitatem furculosam protinus in oliuaria tubercula verticillari. Nasitur quoque è latere huius radícula (quod Theophrastus etiam notauit) vnde cauliculus erumpit alius, vt pictura affabrè monstrat.

LOCVS.

Nascitur in locis cultis & palustribus. In Germania cer-
tè non nisi cultus in hortis prouenit.

TEMPVS.

Minuta folia in cacumine cum semine Iunio & Iulio
mense producit.

TEMPERAMENTVM.

Cyperì radices maximè vsui sunt, exalfacientes pariter
& exiccantes citra mordacitatem.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Radici Cyperi calefaciendi vis inest, vrinamque mouen-
di. Calculosis & aqua inter cutem correptis pota succurrit.
Aduersus scorpionum ictus remedio est, Refrigerationibus
vulnæ & præclusionibus fotu auxiliatur. Pellit menses. A-
rida trita oris vlceribus, etiam si depascent, prodest. Malag-
matis calefacientibus miscetur, & vnguentorum spissamen-
tis accommodatur.

EXGALENO.

Cyperì radices maximè vsui sunt, exalfacientes pariter
& exiccantes citra mordacitatem. Itaque vlceribus quæ præ-
nimia humiditate cicatricem difficulter admittūt, muricè
pro

profunt: habent enim quiddam etiam adstringens, quapropter vlceribus item conueniunt. Quin & incidendi vim quam illis inesse testificandum, qua & calculo vexatis congruunt, & urinam mensesque mouent.

EX PLINIO.

Cypero vis in medicina psilothri. Illinitur pterygijs, vlceribusque genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris vlceribus. Radix aduersus serpentium ictus & scorpionum præsertim remedio est. Vuluas aperit pota. Largiori tanta vis, expellit eas. Urinam ciet & calculos: ob id utilissima hydropicis. Illinitur & vlceribus quæ serpunt, sed his præcipuè quæ in stomacho sunt, ex vino vel aceto illita. Iūci radix in tribus heminis aquæ decocta ad tertias tussi medetur. Semen tostum & in aqua potum, sistit aluum & feminarum menses, capitisque dolores facit.

ADNOTATIO.

Cyperus nobis Souhet, sortè à radice quam Galli Souche vocant cuius vi & vsus est præcipuus.


De Lathyri. Cap. CLXXIIII.

NOMINA.

L Aethiops Græcis, Lathyris Latinis. Officinis Cataputia minor, quod in pilulis quibusdam, seu potius catapotijs, semen ferat: aut quod verisimilius est, quia granis eius ad aluum subducendū pro catapotijs vtatur. Germani [Springkraut Sprigkoerner oder Treibkoerner] appellant, quod semē scilicet nisi in tempore auferatur, sua sponte ex loculamentis saliendo excidat. Gallicè *Esपुरge*.

FORMA.

Caulem profert cubitalem, vacuū, digiti crassitudine: in eius cacumine sunt alæ. Folia in caule oblonga, amygdalinis similia, latiora tamen & læuiora. Quæ verò in summis sunt ramulis: minora, Aristolochiæ aut oblongæ Hedere figura. Fructum fert in summis ramis tribus loculamentis distinctum

*Lathyrus.*

stinctum, rotundum ceu Capparin, in quo terna sunt semina putaminibus inuicem discreta, rotunda, maiora cruvis, quæ quum corticibus exuuntur, candida sunt & gustu dulcia. Radix illi tenuis & inutilis. Totus autem frutex lacteo liquore, Tithymali modo, plenus est. Hanc ceterè descriptionem, si singula comparare velis, ita Cataputix minori quadrare inuenies, ut nulla prorsus sit nota, quam non pictura referat. Nam hæc caulem cubitali emittit longitudine, & digitali crassitu-

dine. Gignuntur in fastigio alæ, & folia in caule oblonga, amygdalæ proxima, latiora & leuiora. Quæ autem in summis emicant ramulis, minora ijs quæ caulem ambiunt conspiciuntur, Aristolochiæ aut longioris Hederæ figura. In cacuminibus fructum gerit triplici cellula conceptaculoque distinctum, ceu Capparin rotundum, in cuius ventriculis grana tria intercurfantibus membranis diuisa continentur, cruvis maiora, rotunda, quæ corticibus exuta alba spectantur, gustatu dulcia.

LOCVS.

Nascitur locis cultis & sabulosis.

TEMPVS.

Carpitur autumnodum fructu prægnans est, semênque eximitur dum tuniculæ quibus includitur, inaruerunt.

TEMPERAMENTVM.

Calidam

Calidam in tertio, & in primo ordine humidam statuūt.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Purgant aluum grana eius sex vel septem sumpta in catapotio, aut comesta, aut cū caricis aut palmulis deuorata frigida, superpota aqua. Ducunt autem pituitam & bilem, & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectū præstat. Folia cū gallinaceo aut oleribus decoquuntur.

EX GALENO.

Sunt qui Lathyrin dicant Tithymali esse speciem, tum quòd similiter illis succum habeat, tum quòd eodē modo purget, vniuersaque illis facultate similis sit, nisi quòd semen gustantibus videatur dulce: quod sanè etiam maximè purgatoriam vim obtinet.

EX PLINIO.

Grana vicena in aqua purā aut mulsa pota, hydropicos sanant. Trahunt & bilem. Qui vehementiùs purgari volunt, cum folliculis ipsis sumunt ea, nam stomachum laxant: itaque inuentum est, vt cum pisce, aut iure gallinacci sumerentur.

ADNOTATIO.

Lathyrus nobis à purgandi violentia Espurge dicitur.

De Leucoio Dioscoridis. Ca. CLXXV.

NOMINA.


A *Euktopi* Græcis, Viola alba, vel Viola simpliciter Latinis: officinis Mauritana voce Cheiri vel [Keirim] appellatur. Germanis [Veiel] Gallicè *Violier*. Non autem temerè adiectum est Dioscoridis: hac enim voce à leucoio Teophrasti, de quo suo loco dicemus, segregare volumus.

GENERA.

Et si Leucoij nomine Viola significetur candida, tamen & pro lutea, & cœrulea, & purpurea solet vsurpari. Quatuor itaq; Violæ huius sunt genera, quæ sola florū diuersitate inter se differūt. Alia enim cādida alia lutea, alia purpurea

rea. Non est tamen quòd per purpuream hic intelligas eam quæ Græcis ἰορ, & Latinis propriè Viola dicitur: nam eius alia ab ea de qua hic agimus familia est, huicque tum qualitate tum facultate, adde etiam forma, contraria. Ea enim quæ ἰορ Græcis vocatur, humilis est, ob id à nōnullis Sessilis dicta, & latiore folio. Contrà nostra illa vt mox dicemus, cubitali est altitudine, & minimè sessilis. Idem de candida dictum putes, nam ea quoque duplex est: vna de qua hic fit sermo, alia sessilis, de qua in præsentia nihil dicemus: cœruleas enim videre nō licuit. Quare supposititium hoc verbum in Dioscoride puto, maximè cum Plinius lib. xxj. vbi de satinis Violis loquitur, purpurea scilicet lutea & alba, nullam de cœrulea mentionem fecerit.

FORMA.

*Leucoion Dioscoridis.**Viola lutea.*

Cubitali altitudine profiliunt, ramosæ, caule Brassicæ.

F exiliore;

*Viola purpurea.*

ton. Hoc itaq; tempore flores carpendi. Semen inter æstatis iniitia profert.

TEMPERAMENTVM,

Leucoion abstergetem facultatem possidet, & tenuium est partium, Galeno autore: proinde vt calidum sit necessè est.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Lutea in medicina præcipui vsus est. Huius flores aridi & sernefacti in deflusionibus, contra vuluæ inflammationes valent, & menstrua educunt. Cerato excepti rimas sedis sanant: cum melle oris vlcera. Semen eius dnum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle appositum, menses, secundas & fœtus educit. Radices cum aceto illitæ, reprimunt lienem, & podagricos inuant.

EX

exiliore, folio longo, molli, canescente, flore quadrifolio, Violæ syluestris odorem referente: non vnus coloris, nam alij candidi, alij lutei, alij purpurei. Semē foliaceū tenuibus quidem, sed quincuncialibus siliquis continetur.

LOCVS.

Vbique ferè in hortis & cultis reperiūtur. Non enim nascuntur magna ex parte nisi satæ fuerint.

TEMPVS.

Primo vere, & maiopotissimum mense, inter flores emicat Leuco

EX GALENO.

Leucoij frutex vniuersus extergentem facultatem obtinet, ac tenuium partium est, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciore magis etiam quàm virides, adeò vt & oculorum crassas cicatrices extenuent. Tuii menses quoque decoctum eorum mouet, & secundas, foetumque emortuum elicit, & si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum, vt si quod aliud, amarum. Quòd si quis virium eius vehementiam multa aqua admixta mitiget, ant certe id genus aliquo, habebit & ad phlegmonas bonum medicamentum. Sic decoctum eius si non merum fuerit, vteri phlegmonas identidem persusum sanat, potissimùm quæ diutino tempore ad scirri modum induruerunt. Sic cum cera vlcera ægrè ad cicatricem peruenientia curat. Sunt verò etiam qui cum melle ad oris vlcera adhibeant. Semen quum eiusdem sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarum mensura potum, tum mensibus eiendis cum melle appositum conuenire creditur, foetumque viuente interficere ac mortuum eiicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrenæ, cū aceto lienes induratos sanant. Nonnulli verò & phlegmonas induratos ijs curant.

EX PLINIO.

Extenuant, menstrua & vrinam ciunt. Minor vis est recentibus, ideoque aridis post annum vtendum. Lutea dimidio cyatho in aquæ tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illitæ sedant lienem. Item podagram, oculorum inflammationes, cum myrrha & croco. Folia cum melle purgant capitis vlcera, cum cera rimas sedis, & quæ in humidis sunt. Ex aceto verò collectiones sanant.

ADNOTATIO.

Leucoia nobis à caryophylli in flore figura & acrimonia Gyrosee dicuntur, & vnū genus luteum officinis cum Mauris Kerri.

De Lapatho Cap. CLXXVI.

NOMINA.

Λ *Απιάριον* Græci, Rumicè Latini, Barbari Laparium vocant. Lapathum autem ab effectu nomen accepit, quod

scilicet exinaniat : etenim *καταλείπει* vacuari vel exinanire Græcis est : omnium siquidem generum folijs decoctis alijs mollitur.

GENERA.

Huius quatuor genera facit Dioscorides. Primum oxylapathon Græcis & Latinis dicitur. Officinæ Lapatium acutum, Germani [Mengelvurtz, Grindtvurtz, Streyffvurtz, zittervurtz, vvidampffer] Galli *Pareille, ou La patience* nominant. Oxylapathum, quamuis anceps in acidum saporem vel acutam figuram videatur significatio, tamen nomen à folijs, quæ in mucronem desinunt, accepisse videtur. Secundum genus hortense priori dissimile, non quidem in vniuersum, sed dūtaxat in folijs, quæ, Serapione teste, multò sunt latiora. Galli hodie *la Rheubarbe des moynes* vocāt. Hoc genus haud dubiè est Rhabarbarum monachorum, quod passim hodie in hortis plantatur : Oxilapathum enim per omnia ferè simile est, folia tamen latiora obtinet, & ob cultum paulò tenerius est. Cùm autem primum erumpunt folia, purpurea ferè sunt, dein quotidie viridiora fiunt, ut pictura ipsa monstrat. Tertium sylvestre, paruum, plantagini simile, molle & humile est, quod vulgato nomine bonus Henrichus, germanicè [gouter Heinrich] Gallicè etiam *Bon Henri* dicitur: id quod ex forma primùm colligitur: folia enim eius oxalidi, nisi quòd ampliora sunt, atque adeò ad plantaginis nonnihil accedunt folia, similia sunt. Flores autem eius & semen sic Oxilapathum referunt, ut vix ab invicem discerni queant. Dein vires etiam conveniunt: vulneraria enim herba est Bonus Henricus, ac mirificè ad sordida purganda, ac glutinanda ulcera confert, sic ut appensa etiam, ac trita vulneribus imposita, vermes qui in ijs nascuntur excidere faciat. Quartum genus Græci *ὄξαλις*, Latini Oxaliden. Officinæ Acetosam, Germani [Saur Ampffer] Galli verò *Oseille, Vinette, Sallette* nominant. Oxalis autem ideo dicta est, quòd in gustu acorem planè respiciat, unde etiam vulgus Acetosam vocavit. Hanc propriè Romani appellarunt Rumicem, forsitan quòd ab ea succus non aliter atque mamma (quam Rumen veteres dixerūt) sitientibus

crug

exugi soleat. Galenus tria tantum genera Lapathi facit. Oxaliden Oxilapathon & Hippolapathon, quod sic Græci quasi grande Lapathum dicunt, magnis amplisque rebus hippo præponere soliti, ab equo excellentis amplitudinis animali magnitudinem mutuantes.

FORM A.



Oxilapathum.



Rumicis secundum genus.

Oxilapathum folijs duris & in cacumine acutis, semine herbaceo acuminato ex minutissimis pediculis pendente radice longa & lutea vel potius crocea. Secundum genus Oxylapatho perquam simile est, folijs tamen latioribus ac tenerioribus constat, caule bicubitali interdum, striato, floribus exiguis, luteis, semine ut Oxylapathum triangulari, radice longa & lutea seu crocea. Tertium genus, quod vulgus hodie Bonum Henrichum vocat, folium Oxalidis, latius tamen, aut Aro, vel ut Dioscorides inquit, plantaginæ simile

F iij

obtinet.

*Rumex tertium genus.**Oxalis.*

obtinet. Aliqua enim Ari, aliqua autem plātaginis folia referunt. Caulem prioribus duobus humiliorem, in quo flores & semina racematim multa dependent. Radicem vero longam & subflavam. Oxalis autem folio sylvestri & paruo humilive Rumici similia habet. Caulis eius non adeo grandis est, sesquicubitum altus. Semen acuminatum, rubrum, quod foliaceo vestitur inuolucro, sapore acri, quod in caule & aduascensibus coliculis nascitur.

LOCVS.

Oxilapathon in palustribus & circa fossas potissimum nascitur. Secundum genus hodie in multorum hortis confitum prouenit. Tertium passim in areis, sepibus & circa itinera crescit. Oxalis in omnibus pratis copiosissime prouenit.

Tcm

TEMPVS.

Aestate antequam prata demctantur omnium copia haberi potest.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores Acetosam statuunt esse frigidam & siccam in secundo. Atqui quale huius & reliquarum Rumicum sit temperamentum, ex facultatibus earundem, quas mox dicemus, facillè deprehendent studiosi. Secundi generis Rumex in folijs manifestissimam aciditatem ostendit, vt hinc etiam conijcere liceat esse Rumicem, vtcunque monachi, & cū ijs multi quoque medici, Rhabarbarum esse contendant.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Omnium Rumicum olus decoctum aluum mollit. Crudum illitum cum rosaceo aut croco melicerides discutit. Semen sylvestris & Oxylapathi & Oxalidis cum aqua aut vino vtiliter contra dysenterias, cœliacos affectus, stomachi fastidia scorpionumq; ictus bibitur. Si quis etiam in potu præsumat, nihil ictus patietur. Radices ipsarum ex aceto & crudæ illitæ, lepras, impetigines, scabrososq; vngues sanant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus decoctum earum sedat, si eo foveantur. Coctæ in vino si cum iure colluantur, aurium dentiūq; dolorem mulcent. Strumas parotidasq; discutiunt si cum vino decoctæ illinantur. Lienes autem cum aceto. Aliqui vtuntur radicibus contra strumas, vinculo collo eas appendentes. Tritæ & appositæ scæminarum fluxiones sistunt. Decoctæ cum vino & potæ regio morbo correptos emendant. Calculos vesicæ comminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon easdem antedictis Rumicum generibus vires obtinet.

EX GALENO.

Lapathum moderatè digerentem facultatem habet, oxylapathum verò mistam: nam simul cum eo quod digerit, nonnihil quoque reprimendi facultate participat. Semen eorum manifestam quandam adstrictionem obtinet, adeo vt & dysenterias, & alui profluua sanet, potissimū autem oxylapathi. Hippolapathon easdem dictis facultates ob-

tinet, sed imbecilliores.

EX PLINIO.

Syluestria Lapatha scorpionum ictibus medentur, & ferre prohibent habentes. Radix aceto decocta si coletur, succus dentibus auxiliatur: si verò bibatur, morbo regio. Semen, stomachi inextricabilia vitia sanat. Hippolapathi radices priuatim vngues scabrosos detrahunt. Dysentericos, semen duabus drachmis in vino potum, liberat. Oxylapathi semen lotum in aqua cœlesti, sanguinem reiicientibus, adiecta acacia lentis magnitudine, prodest. Præstantissimos pastillos faciunt ex folijs & radice, addito nitro & iure exiguo. In vsu aceto diluunt. Sed satium in epiphoris oculorum illinunt frontibus. Radice melicerias & lepras curant. In vino verò decocta, strumas & parotidas & calculos. Poto vino & lienes, cœliacos equè & dysentericos & tenasmos. Ad eadèmq; omnia efficacius ius Lapathi, & ructus facit, & vrinam ciet, & oculorum caliginem discutit. Item pruritus corporis, in folia balnearum additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat & cõmanducata dentes. Eadem decocta cum vino, sistit aluum. Folia soluunt adiecto sale.

APPENDIX.

Alterius generis Rumicis, qui Rhabarbarum monachorum vocatur, radix purgandi etiam vim obtinet, si in puluerem redacta drachmæ pondere sumatur. Neq; id mirum admodum, cum etiam Dioscorides ipse omnium Rumicum olus decoctum aluum mollire, atque decoctas eorundem radices cum vino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimirum per inferna eductionem, testetur.

ADNOTATIO.


Oxilapatum à Lapato, vulgus la Patience & Parelle. Secundum genus Lapatum rotundum vulgò dictum videtur, aut ei affine Rhabarbarum Cartusianorum. Tertium genus est Oxalis vulgaris, nomen Parisijs Oseille retinens.

DE

De Limonio. Cap. CLXXVII.

NOMINA.

Λ Ειμυδιον Græcis, Limonium, Beta syluestris, & Tinabinulum terræ Latinis, Vulgò Pyrola, Germanis [Vvintergruen, Holtzmägolt, Vvaldmangolt, oder Vvaldtkel] Gallis Limoine, ou Bette de pré, ou Bette sauuage, appellatur. Beta autem syluestris hæc herba dicta est, quòd in syluis & locis muscosis, hortensi Betæ primum erumpenti haud dissimilis proueniat. Tintinabulum, à floribus eius tintinabulo similibus, Pyrola, quòd eius folia arboris pyri folio similia sint.



Limonium.

FORMA.

Folia Betæ similia habet, tenuiora tamen & minora, decem, aut plura. Caulem tenuē, rectum, lilio æqualem, semine rubro, gustuq; adstringente plenum. Ex qua siquidem descriptione abundè liquet, herbam, quam vulgus Pyrolam vocat, esse Limonium. Folijs enim Betæ similis est, verùm tenuioribus & minoribus (legendum enim in Dioscoride μικρότερα & non μακρότερα, Plinio libro vigesimo capite octauo teste) decem, interim pluribus. Caule

tenui, recto, lilio simili, pleno seminis rubri, quod gustu adstringit. Quibus accedit quòd Germanicè [Vvaldtman golt.] id est, Beta syluestris nōiatur. Neq; vires discrepant: adstringit enim vulnerariaq; herba est Pyrola, haud tecu

F y atque

atque Limonium. Flores denique tintinabulo fimiles sunt
vt citra vllum discrimen Pyrolam Dioscoridis esse Limonium
asseuerare liceat.

LOCVS.

In vmbrosis & syluestribus prouenit locis.

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & semen gustu vehementer adstringunt, ita vt in
tertio ordine siccitatis illud rectè recentiores collocent.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Semen tritum in vino potum acetabuli mensura, dysentericis
ac cœliacis auxiliatur. Rubrum, sceminarum profluuium sistit.

EXGALENO.

Limonij semen vtpotè austerum, cœliacis, dysentericis
& sanguinem spuētibus cum vino exhibent. Iuuat & profluuium
muliebre. Satis autem est acetabuli mensura.

EXPLINIO.

Huius folia ambustis vtilia, guttantia adstringunt. Semen
acetabuli mensura dysentericis prodest. Aquæ è radice coctæ
maculas vestium eluere dicuntur, itémque membranarum.

EXRECENTIORIBVS.

Pyrolæ decoctum interna & externa vulnera potum sanat.
Item fistulis ac alijs malignis vlceribus medetur.

ADNOTATIO.

Limonium nobis frequens, officinis nomen non habet.

De Lamio. Cap. CLXXVIII.

NOMINA.

LAMIVM Plinio lib.xxj.cap.xv.& lib.xxij.cap.xiiij.
Vocatur. Vulgò vrtica iners & mortua. Sunt qui albā
Vrticam nominent, & Archangelicam. Officinis inusitatum,
Germanicè [Todtnessel oder Taubnessel] Gallicè
Ortie morte, ou Ortie Blanche dicitur. Iners & mortua cognominata,
quòd folijs non mordentibus sit mitissima.

GENE

G E N E R A.

Vrticæ mortuæ tria inueniuntur genera. Vnum albis, (quod propriè Lamiū dicitur) Alterum luteis, & Tertium purpureis floribus constat. Nos, quia solis floribus differunt, nec in eorum folijs aliquod discrimen apparet, vna icoue omnia tria complexi sumus genera.

F O R M A.

*Lamium,*

Folijis constat Vrticæ pungentis, minoribus, frimbriatis, candidioribus: lanugine nequaquam mordaci: caule quadrangulo: flore albo, luteo, aut purpureo: radice ex interuallis cinnis capillata. Graui odore tota fragrat. Innoxia est & morsæ caret. Semen in caulibus per interualla copiosum & nigrum profert.

L O C V S.

Passim circa semitas & sepe nascuntur.

T E M P V S.

Vere primo, Maio potissimum mense, floribus abundant, & tota ferè æstate.

T E M P E R A M E N T V M.

Calidum & siccum est Lamium veluti etiam alia Vrticæ genera, id quod ex gustu, eiusque facultatibus deprehenditur.

VIRES EX PLINIO.

Medetur cum mica salis contusis incussisque inustis & strumis, tumoribus, podagris, vulneribus. Album habet in medio folio, quod ignibus sacris medetur. Quidā ē nostris tempore disereuere genera. Autumnalis Vrticæ radice alligata in tertianis, ita ut egri nuncupentur cum eruitur ea radix, & dicatur quæ, & cui, & quorū filio eximatur, liberari morbo tradiderunt. Hoc idem contra quartanas pollere. Eidem radice vrticæ addito sale, infixæ corpori extrahi. Folijs cum axūgia strumas discuti, vel si suppurauerint, erodi complerique.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores hac inerti Vrtica vtuntur sistendo ruentis ē naribus sanguinis impetu, imæ ceruici vel scapulis alligando, inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum. Vlceribus denique, putredinibus & fistulis mirificè cōferre, ac mederi tradunt.

ADNOTATIO.

Lamium vrtica alba à flore vulgò dicitur.

De Lino.

Cap. CLXXIX.

NOMINA.

Λ *ivov* Græcis, Linū Latinis & officinis, germanis [Lein oder Fläschsz] Gallis *Lin* appellatur:

FORMA.

Herba est tenui caule, folijs angustis, oblongis, & in summo acuminatis, floribus cœruleis, speciosis, quibus decidentibus folliculus enascitur in qua semina continentur sulua.

LOCVS.

Gaudet pingui solo & modicè humido. Agris autem noxium est, deteriores enim eos facit, id quod ijs carminibus in Georgicis significauit Virgilius.

Vrit enim lini campum seges, vrit auenæ.

Vrunt letheo perfusa papauera somno.

TEMPVS.

Vellitur æstate vbi maturitatem cōsecutum fuerit, quæ
fanè

*Linum.*

sanè duobus argumen-
tis intelligitur, intumef-
cente semine, vel flauef-
cente colore.

TEMPER A- MENTVM.

Est in primo ordine
calidum, ac humiditatis
& siccitatis quodammo-
do in medio situm.

VIRE EX DIO SCORIDE

Semen Lini eandem
Fœnogræco faculta-
tem obtinet. Omnem
intus forisque inflam-
mationem discutit & e-
mollit, cum melle, oleo,

exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum.
Vitia cutis in facie crudum, varosque cum nitro & sicu-
litum. Cum lixiuia autem parotidas, duritiesque discu-
tit. Herpetas in vino decoctum, & fauos purgat. Vngues
scabros cum pari modo Nasturtij & mellis eximit. Cum
melle vice eclegmatis sumptum, ea quæ in thorace sunt e-
ducit. Tussim lenit. Ventrem stimulat si cum melle & pipe-
re mixtum pro placenta largius sumatur. Huius decoctum
intestinatorum utriusque erosionibus iniectum medetur, adq;
excrementorum educationem prodest. Ad vuluæ inflam-
mationes in defectionibus haud aliter quam Fœnigræci
perquam vtile est.

EX GALENO.

Lini semen esum flatuosum est, etiam si frigatur, adeò
sanè excrementitia humiditate plenum est. Visceribus ta-
men

men quæ circa hypochondria sunt, vt si quid aliud, gratiâ existit. Quidam hoc tosto instar opsonij non secus ac factitio sale cum garo vtuntur. In vsu est & melle conspersum. Inserunt nonnulli panibus quoque. Stomacho & concoctioni repugnat. Tenuiter corpus alit. Quod spectat ad deiectionem, nec laudandum, nec vituperandum, per exiguam tamen vim mouendæ vrinæ tenet, quæ in tosto efficacior est. Idem quoque aluum magis sistit. Rustici sæpenuerò torrefacto adiecta portione mellis vtuntur.

EX PLINIO.

Lini semen cum alijs quidem in vsu est. Et per se mulierum cutis vitia emendat in facie. Oculorum aciem succo adiuuat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum myrrha. Cum vino sedat parotidas. Cum melle, aut adipe, aut cera, stomachi solutiones inspersum polentæ modo. Anginas in aqua & oleo decoctum, & cum aniso illitum. Torretur vt aluum sistat. Cœliacis & dysentericis imponitur ex aceto. Ad iecinoris dolores estur cum vua passa & ad phthisim vtilissimè. Semine sunt & eclegmata. Musculorum, nervorum, articulorum, ceruicium duritias, cerebri membranas mitigat farina seminis, nitro aut sale, aut cinere additis. Eadem cum fico item concoquit ac maturat. Cum radice verò cucumeris sylvestris extrahit quæcunque corpori inhaerent. Sic & fracta ossa. Serpere vlcus in vino decocta prohibet. Eruptiones pituitæ cum melle emendat. Ungues scabros cum pari modo Nasturtij, & testium vitia, & ramices cum resina & myrrha, & gangrenas ex aqua. Stomachi dolores cum Fœnogræco sextarijs vtrisque decoctis in aqua mulsa. Intestinorum & thoracis perniciosâ vitia, clystere in oleo & melle.

De Lichene. Cap. CLXXX.

NOMINA.

LICHEN Græcis, Lichê Latinis, Officinis & herbarijs Hepatica, Germanis [Stein oder Brunnenleberkraut] Gallis *Hepatique* dicitur. Lichen autê Græci & Latini nominarunt, quod contra Lichenas omnibus remedijs antepona

ponatur: aut à re ipsa nomen dederunt, quoniam saxa quibus hæret linguæ modo lambat. Hepaticam verò recentiores vocarunt, quòd iecinorum fibris similis conspiciatur.

FORMA.



Folio succi pleno, crasso & oblongo constat, rorulentis petris adhærente, sub quo cauliculi, pediculorum forma, capitula stellata habentes, exeunt.

LOCVS.

Nascitur in roscidis & grauiter olentibus saxis.

TEMPVS.

Iulio mense ea, quæ dicta est, forma decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Lichen, siue Hepatica.

Abstergentem ac modicè refrigerantem facultatem, vtrunque verò resiccantem habet. Abstergentem quidem atque exiccantem à petra, refrigerantem autem ab aqueo humore.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Lichen illius sanguinis eruptiones sistit, & inflammationes compescit. Impetigines sanat. Inunctus cum melle, regio morbo affectis prodest. Oris & linguæ defluxiones arceat.

EX GALENO.

Lichen qui in petris nascitur, est veluti muscus quidam, sed rectè ex plantarum genere censerì potest. Sic nominatus videtur, quòd lichenas seu impetigines curet. Extergentem

tem & mediocriter frigidam facultatē obtinet. Porro quòd ex talibus substantijs componitur, aduersum esse inflammationi nihil mirum est. An verò sanguinis eruptiones sistat, vt Dioscorides ait, id neutiquam dicere queo.

EX PLINIO.

Sanguinem sistit vulneribus instillatus, & collectiones illitus. Morbum quoque regium cum melle sanat ore illito & lingua. Stigmata etiam delet.

De Linozoste. Cap. CLXXXI.

NOMINA.

Λ *Ivisusis*, ἰβίσκος *Bostrakion*, ἰβρία Græcis, Mercurialis Latinis & Officinis dicitur. Germanis [Bingelkrant, Mercurius kraut, oder Kuovvrtz,] Gallis *Mercuriale*. Mercurialis dicta est, quòd à Mercurio inuenta sit.



Mercurialis mar.



Mercurialis perennis.

G E N E R A.

Duo eius genera, mas & fœmina, quæ facillè ex eorundem descriptionibus discerni poterūt. Folia verò maribus nigriora, fœminis candidiora.

F O R M A.

Mercurialis folia Ocimo similia habet: ad Helxines foliorum figuram accedentia, minora tamen. Ramulos geniculatos, alarum cava multa & densa habentes. Fœmina semen fert racemosum & multum. Mas verò iuxta folia exiguum, rotundum, geminorum testiculorum modo connexum. Totus frutex dodrantalis, & nonnunquam maior.

L O C V S.

Nascitur in campestribus cultis, vinerisque, aliquibus locis tam copiosa & efficax, vt sapore suo vina etiam inficiat, & bibentibus ingrata reddat.

T E M P V S.

Augusto mense semine prægnaus est.

T E M P E R A M E N T V M.

Calidam & siccam in primo ordine esse asserunt.

V I R E S E X D I O S C O R I D E.

Vtraque alium mouet olerum modo comesta. Cocta in aqua, & epota aqua, bilem & aquosa ducit. Credūtur præterea fœminæ folia trita & pota, aut post purgationem pu dendis apposita, vt fœminæ concipiantur efficere. Masculæ verò similiter adhibita, mares progenerare.

E X G A L E N O.

Mercuriali omnes duntaxat ad ventris purgationes vtūtur. Verumenimverò si quis eius facere periculum volet, in cataplasmate sane digerentis admodum facultatis esse experietur.

E X P L I N I O.

Mirum est quod de vtroque eorum genere proditur: vt mares gignantur hunc facere: vt fœminæ illam. Hoc contingere si à cōceptu succus protinus bibatur in passio, edanturve folia decocta ex oleo & sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eam in nouo fistili cum heliotropio, & duabus aut tribus spicis, donec decoquatur. Decoctum

G dari

dari iubent & herbam ipsam in cibo, altero die purgationis, mulieribus per triduum, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum vsu prædicauit illas. Fāsque ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille eas vulnæ cum melle, vel rosaceo, vel irino, vel lirino admouit. Item ad ciendos menses, secūdāsq;. Hoc idem præstare potu totūque dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitque cum vino vetere. Alio folia imposuit, epiphoris, stranguriæ & vesicæ. Decoctum eius dedit cum myrrha & thure. Alio quidem soluendæ, vel in feбри, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextarijs aquæ ad dimidias, bibitur sale & melle admixto, necnon cum vngula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui vtranque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt.

De Libanotide coronaria.

Cap. CLXXXII.

NOMINA.

Λ *Βαυλῆς* Græcis, Rosmarinus Latinis & Officinis, Germanis [*Rosmarin*,] Gallis *Rosmarin* appellatur. Libanotis verò dicta est, quòd odorem thuris reddat. Libanotida autem non eam quæ simpliciter sic nominatur à Græcis intellige, sed eam quæ cum adiectione, coronaria Libanotis appellatur.


FORMA.

Rosmarinus qua nectentes coronas vtuntur, virgas habet tennes, circa quas sunt folia tenuia, crebra, oblonga & gracilia, intus candicantia, exteriore autem parte viridia, grauiter odorata. Florem, quod Dioscorides omisit, in candido cœruleum, radicem nigram, multis fibris capillatam.

LOCVS.

Hodie passim in hortis & fœtilibus vasis plantatur. In Narbonensi autem Gallia sua sponte prouenit tam copiose, vt eius incolæ aliud lignum non vrant.

TEM

*Rosmarinus.*

TEMPVS.

Carpitur Maio mense & deinde vsque ad Septembris mediũ. Floretque bis annuatim, vere & autumno.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod ex gustu & viribus conijcere quisque poterit.

VIRESEXDIO SCORIDE.

Calfacit. Regium morbum sanat, si quis eam in aqua decoxerit, & ante exercitia bibendam dederit, dein post exercitia lauerit, & vino potauerit. Miscetur etiã acopis, & musto oleo:

EX GALENO.

Libanotidis (quæ ad coronas est utilis, quam Romani Rosmarinum nuncupant) decoctum, regio morbo laborãtes potum adiuuat. Omnes enim Libanotides abstergentis & incidentis facultatis sunt participes.

APPENDIX.

Recentiores Rosmarinum suffitu tussim & destillationem sedare tradunt. Et quod imprimis nobile, tutam præstare in pestilentia domum crematam, nidore improbam aeris diluentem pernitiem. Adijciunt & alias facultates, eas nempe: Rosmarinus corroborat cerebrum, sensus interiores memoriã & cor. Succurrit tremori, resolutionique partium. Loquelam amissam reparat, & alia multa potest, quæ memorare superuacaneum est.

Rosmarinum coronariam tantum pingit, quod passim Luxuriet.

De Ligustro. Cap. CLXXXIII.

NOMINA.

LIGVSTRVM Plinio alijsque Latinis nominatur Officinis inusitatū. Germanis] Beinholtzlin, Mundtholtz, Rein oder Schulvucidem.] Gallis *Troesne* dicitur. Quo autem nomine Græcis appellatum sit nondum certò nobis constat: neque enim ut ferè omnes hodie putant Cypro est, quæ Plinio lib. xij. teste, semen habet Coriandri, peregrinaque existit arbor. At Ligustrum semen non Coriandro simile, quod rotundum ac subflauum est, sed potius atrum, & altera parte latum modiceque concavum in racemis profert. Nec arbor est peregrina, sed sponte in sepibus

& senticetis ubiq; prouenit. Mea tamen sentetia Phyllirea potius apud Dioscoridem erit, q̃ hæc Cypro cõgener ac similis sit, easdẽque quas Ligustrũ facultates habeat Iudicium tamen penes prudentem lectorẽ esse volumus.

FORMA.

Ligustrum arbor est parua, folijs Oleæ similibus: floribus paruulis, cãdidis et odoratis, racematis florentibus: fructibus initio virẽtibus, processu tẽporis nigris, vuarum more congestis.

LOCVS.

Nihil frequentius Ligustro



Ligustrum.

gustro in vepribus occurrit, nihilque crebrius in dumetis inuenitur, ita vt hoc nomine cōtemptui habeatur. Quapropter huc respiciens Virgilius in Bucolico carmine, eius flores negligi à pastoribus, ac inutiliter perire canit, dicens:

Alba ligustra cadunt, vacinia nigra leguntur.

TEMPVS.

Maior mense floret, autumnō autem cum maturis baccis nigrescit.

TEMPERAMENTVM.

Et si forma non nihil à Cypro distet Ligustrum, temperamento tamen eodem est præditū. Eius enim folia & surculi mixta qualitate constant: discutiens enim quiddam cū aquea substantia, modicè calida, & quiddam etiam adstrictorium ex terrena substantia frigida, & sine morsu siccanre, obtinent.

VIRESEX PLINIO.

Succus eius nervis, articulis, alioribus: folia vbique veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationibus prosunt. Acini contra phthiriasin, item cōtra intertrigines, folia ve, sanant & gallinaceorum pituitas acini.

APPENDIX.

Recentiores Ligustri succum vlcera oris, veretrique sanare tradūt. Idē etiā posse folia in vino decocta adijciūt: vt hinc euidentissimum sit, folijs Ligustri, haud secus atque Cypri aut Phyllyree adstrictoriam inesse vim, propter quā cōmāducata & decocta, oris potissimū vlceribus opitulantur.

ADNOTATIO.

Ligustrum Tronia officini dicitur.

De Lunaria minore. CLXXXIIII.

NOMINA.

DIV multumque de huius herbæ nomenclatura fuimus solliciti, at vtcunque multos interrogauerimus, tamen aliud nomen quàm idipsum quo nunc appellamus expiscari haud potuimus. Vocetur itaque Lunaria minor donec certiore appellacionem habere contigerit. Germa-

G iij nicē

nicè [Klein Monkraut,] vt sit ad Latinam nomenclaturā
allusio quædam, nuncupetur. Gallicè *Tanre*.

FORMA.



Lunaria minor.

Rotundo est caule,
cui folia vtrinque septē
annexa, cordis ferè hu-
mani formā habentia:
in summitate caulis se-
men Betæ simile pro-
fert.

LOCVS.

Nascitur in monti-
bus: Copiosissimè autē
Tubingæ in pede mon-
tis Austriaci prouenit.
Propè hanc nunquam
non Ophris, de qua suo
dicemus loco, inuenitur.

TEMPVS.

In fine Maij & Iunio
mense inuenitur, dein
statim euanesceit.

TEMPER A-
MENTVM.

Terrestre quid præ se fert gustata, atque parum adstrin-
git, vt hinc mediocriter frigidam & siccam esse verisimi-
le sit.

VIRES.

Vis foliorum eius haud dubiè vulneribus efficax, gluti-
nandi nanque facultate prædita est. Chymicorum nugas,
quibus eius herbæ vsus frequentissimus est, lubens præ-
tereo. Constat autem experientia, ad suppressendos men-
ses & album muliebri profluuium: mirificè conferre hanc
herbam.

DE

ADNOTATIO.

Lunaria minor inuentu hic rara, quanquam nomen herbaris propè omnibus in ore est frequens, tum eius, tum etiam maioris.

De Lepidio. Cap. CLXXXV.

NOMINA.

A Existit Græcis, Lepidium Latinis appellatur. Vulgus herbariorum Piperitum nominât, Quam denominationem sequentes Germani nostri [Pfefferkraut,] Gallorum vulgus *Passerage* vocant. Nomen verò hoc à pipere traxit, cuius acrimoniam herba hæc gustata refert. Diuersa est verò (vt obiter parùm attentos moneam) ab ea planta quam Plinius Piperitum nuncupat: de qua suo loco dicemus copiosè. Sunt qui Lepidium alio nomine Raphanum

nominent, quod non alia sit ratione, quàm quòd herba hæc, quòd ad folia attinet, Raphano syluestri, quem Amorraciam alio nomine dicunt, admodum similis sit. Lepidium verò appellatum quòd *λεπίδας*, hoc est, squamas & maculas in facie deleat & repurget.

FORMA.

Fruticosum est, in cubitalem altitudinem surgens folijs laurinis, sed mollibus, & maioribus. Sic quidè Lepidion depingit Plinius et Paulus.

G iij

Vnde

*Lepidium.*


De Leucoio Theophrasti.

Cap. CLXXXVI.

NOMINA.

A Eundem Theophrasti hoc loco describimus quod planè diuersum est à Leucoio Dioscoridis, quod suprà depinximus, id quod tamē pleriq; etiā docti viri nō animaduertunt. Latinis Viola alba dicitur. Germanicè [Vveisz Horuung (zbluomenoder Mertzenbluomē)] Gallicè *Violette*, ou *Giroflee Blāche*. Nō autē ab re Viola alba dici cœpit: flos enim huius herbæ colorem album, & Violarum odorem refert.

FORMA.

*Viola alba.**Viola alba foliacum semine.*

Folia habet Porrò similia, tenuiora tamē & molliora, ex radice bulbosa prodeuntia. Pediculum etiā profert dodrantalem, tenuem ac ferè iunceum, in quo candidus flos est, in

medio croceus, Violarum purpurearum odorem referens, quo decedente, capitula Nucis auellanae quantitate erumpunt, in quibus semen Sinapi haud dissimile continetur. Quod si ad hanc descriptionem adhibeas ea quæ de Viola alba Theophrastus libro sexto & septimo de stirpiū historia tradit, certè sole manifestius erit herbam hanc cuius picturam damus esse eam, quā *λιχίον* Theophrastus vocat. Nam hæc prima florum se ostendit. Emicat vbi cælum clementius statim, etiā non hyeme exacta: vbi verò immitius, postea: celeriter quoque euanescit. Radicem denique bulbosam & florem odoratum obtinet. Quæ singula etiam de hac nostra herba verè dici possunt. Prima siquidem floru, hyeme etiam nondum exacta, Februario nimirum mense & die diuo Valentino sacro, vbi cælum clementius fuerit, apparet. In Aprili, vbi appropinquare iam cœperit Maius, euanescit. Flos item eius Violarum purpurearum prorsus odorem refert. Radix etiam ad Bulbi similitudinem orbiculata existit, vt hoc nomine nemini dubium esse debeat, quin sit Viola alba Theophrasti.

L O C V S.

Prouenit in vmbrosis syluis & locis, qualis est nō procul à Tubinga paulò supra & infra monasterium Bebenhusum vocatum, vbi copiosissimè nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis.

T E M P V S.

In Februario statim hæc erumpit, vt diximus, herba, & inter initia Martij ad perfectionem venit. Semen in Aprili ostendit in capitulis, vt in altera pictura vides.

T E M P E R A M E N T V M.

Folia ferè qualitatis omnis expertia, radix autem dulcis & glutinosa est, vt hoc nomine adstringat & exiccet, vt re liqui bulbi.

V I R E S.

Digerentem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut reliquos blubos, habere ex ijs quæ commemorauimus satis constat. Tamen nunc nullus, quod sciam, eius stirpis vsus est.

A D N O

ADNOTATIO.

Leucoion Theophrasti à Massario in libro nono Plinij depressum est, quod nobis circa Natalem Christianum etiam summum frigoris floret, passim in syluis, & nunc quoque in hortis quibusdam.

De Lithospermo. CapCLXXXVII.


NOMINA.

Lιθόσπερον Græcis, Lithospermū Latinis, Officinis & medicis hodie omnibus Miliū solis appellatur. Germanis [Meerhirs oder Steinsomen] Gallicè *Gremet ou herbe aux perles*. Nomen à lapidea seminis duritia accepit: neque enim Lithospermū aliud sonat Græcis, quàm lapideū semen. Quū itaque semina tanquam calculos ferat, candore & rotunditate margaritarum, duritia verò lapidea, commodissima voce Lithospermon dictum est. Miliū verò so-

lis recentioribus nominatū puto, quòd semen eius candore solis & lucis splendore fulgeat.

FORMA.

Folia habet Oleæ similia, longiora tamē & latiora, & quæ in ima parte sunt, humi iacent. Ramulos verò rectos, tenues, crassitudine iūci acuti, solidos, lignososq; In quorū cacumine bifidi diuarcatique exortus cauliculorum speciem exhibent, longa habentes folia, inter quæ semen lapideum rotundum, paruum, eruo æquale. Plinius graphicè cādore & ro



Lithospermum sativum.

& rotunditate margaritas referre dixit. Nostrum autē Lithospermon multò minus quàm Dioscorides & Plinius tradiderunt semen profert, quod soli diuersitati acceptum referendum erit. Radix etiam Lithospermi (quod adijciendū esse arbitror) exteriore sui parte rubore perfunditur.

LOCVS.

Lithospermon asperis & sublimibus locis gaudet. Satū etiam in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, eoquē tempore semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Lithospermi, cuius maximè vsus est, calidū & siccum esse facilè ex eiusdem facultatibus conijcitur. Omnia siquidem vrinam cientia, Galeno lib. 5 de simpl. medicamē facult. cap. 12. teste, calida & sicca sunt.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Semen cum vino albo potum, calculos frangit, & vrinam ducit.

EX PAVLO.

Semen cum vino albo potum, calculos conterit, & vrinam pellit.

EX PLINIO.

Lapillis eius drachmę pondere potis vino albo calculos frangi pellique constat, & stranguriam discuti.

De Lysimachia. Cap.

CLXXXVIII.

NOMINA.

Λ *υσιμαχίον* Græcè, Lysimachia Latinè, vulgò Salicaria, Germanicè [Vuciderich] Gallicè *Corneolle, ou chasséboffe* nominatur, Lysimachia verò ab eius inuētore Lysimacho appellata, aut quia vis tanta herbæ, vt iumentis discordantibus imposita iugo, asperitatem cohibeat. Quare a dissoluenta dissidentium pugna non ineptè Lysimachia videbitur nominata. Salicaria verò quod folia salicis, aut quòd inter salices nascatur, dicta est.

GENERA.

Lyfimachia duo esse genera ex Dioscoride & Plinio satis liquet. Plinij enim purpureū florem habet, hinc nos illā purpureā appellauimus. Germanicè [braum V ueiderich.] Dioscoridis verò rufos, hoc est, aureos, vt ipsemet interpretatur, flores obtinet, ideoque luteā nominauimus, Germanicè [Geel V ueiderich.] Et hæc quidē altera magis adstringit, inque vsu medico hoc nomine eidem præferenda.

FORMA.

*Lyfimachia purpurea.**Lyfimachia lutea.*

Caules profert cubitales, aut etiam maiores, tenues, fruticosos, quorum à geniculis folia exeunt gracilia, salici similia, gustum adstringētia, flores rufos, aut ad auri colorē declinantes, Ex qua pictura nulli non notum fit, plātas quas pictas damus esse *Lyfimachias*. Caules enim emittūt cubitales, & multò quoque longiores, tennes & fruticosos. Fo-
lia

lia etiam habent salicis cum lentore quodam adstringentia. Flores hæc rufos, illa autem purpureos habet, ut non contemnendus auctor est Plinius. His accedit locus natalis, & alia quæ referre non attinet.

LOCVS.

Nascuntur palustribus locis, & prope aquas, potissimum ubi salices proueniunt.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent, ac subinde purpurea in siliquis oblongis semen producit: lutea verò decidentibus floribus, semen exiguum, Coriandro haud dissimile profert: quod gustum non secus atque folia adstringit.

TEMPERAMENTVM.

Superantem adstrictoriam qualitatem, adeoque exiccatioriam vim obtineat.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius, cui adstringendi facultas est, ad sanguinis excreationes & dysenterias potus & infusus confert. Sistit & mulierum fluxum appositus. Contra erumpentem è naribus sanguinem herba ipsa utiliter inseritur. Vulneraria etiam est, & sanguinem compescit. Incensa acerrimum habet fumum, ut serpentes quidem abigat, & muscas enecet.

EXGALENO.

Vulnera glutinat, erumpentemque ex naribus sanguinem emplastri modo illita sistit: quin & reliquas sanguinis eruptiones compescere tum ipsa, tum succus eius multo magis potest. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebrem fluxum sanat.

EXPLINIO.

Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Pota vel illita, vel naribus indita sanguinis profusum sistit. Vulneribus, ijs priuatim quæ calceamento facta sunt, contrita & arida infricata efficax est.

ADNOTATIO.

Lysimachia officinarum nomen non habet.

De Lagopo. Cap. CLXXXIX.

NOMINA.

A *Λγώπος* Græcis, Leporinus pes Latinis, Trifolium hu-
mle & Trinitas à tribus folijs herbarijs dicitur. Offi-
cinis nostris ignota est herba. Germanis [Hafenswosfz, oder
Katzenklee, oder Katzle] Gallicè *Pied de-Lieure* nomina-
tur. Sic verò Græci atque Latini hanc herbam appellarūt,
quòd Leporino pedi similem paniculam habeat.

*Lagopus.*

FORMA.

A nullo quod sciam,
Lagopus describitur.
Herba autem quā pro-
co exhibemus, caules ha-
bet rotundos, hirsutos,
folia Loto trifoliæ quæ
in pratis gignitur simi-
lia, semen in paniculis
mucosis, lanuginosisq;
Leporino pedi simili-
bus admodum, adstrin-
gentis gustus.

LOCVS.

In segetibus, Plinio
etiam autore, & in hor-
torum arcis, vt testatur
Dioscorides, gignitur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus potissimùm apparet.

TEMPERAMENTVM.

Exiccandi facultatem obtinet, Galeno teste, Lagopus.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Vim habet Lagopus herba sistendi aluum cum vino po-
ta. Febrientibus autem cum aqua danda. Alligatur eadem
contra inguinum inflammationes.

EX

EX GALENO.

Fluxus alui probè exiccat.

EX PLINIO.

Lagopus sistit aluum è vino pota, aut in febris ex aqua.
Eadem inguini adalligatur in tumore.

APPENDIX.

Ex ijs omnibus abundè constat, herbam eam quam depictam damus esse Lagopum: siquidem & nomē & forma illi aptissimè respondent. Locus etiam conuenit, nascitur enim copiosissimè in segetibus. Nec temperamentum abhorret, quòd illi est adstrictorium & exiccans. His omnibus accedunt vires, vulgò enim omnes hac planta in dysenteria, & alui profluuiio vtuntur.

ADNOTATIO.

Lagopus in tritico mesibus frequens hic inuenitur.

De Larice. Cap. CXC.

NOMINA.

Apiſ Græcis, Larix & Larex Latinis, Officin. & vulgò Larga, Germanis [Lorchbaum] Gallicè *Arbre vert* à vn Pin, ou Sapin, appellatur.

FORMA.

Larix arbor est magna. Piceæ similis, crassior læuioꝛiq; cortice: folio villoso pectinum modo, pingui & denso, mollique flexu, materia præstanti, rubente, odore acri. Hinc erumpit nonnihil liquoris melleo, Dioscoride ac Plinio testibus, colore, atq; lento, nunquam dureſcentis. Est autem resina quam Larignam, aut certè Laricinam vel Lariceam vocant, qua hodie omnes ferè officinæ pro terebinthina, non sine errore vtuntur. Terebinthina enim candida est, pellucida, & in modum coloris vitri cœrulea & odorata. Lignum eius prope modum ignibus inuictum, neque flagrat, neque in carbones recidit, nec alio modo ignis vi consumitur, quàm saxum in fornace ad calcem coquēdam adhibitum, quòd quidem nec flammam recipit, nec carbonē remittit, sed longo spatio tardè comburitur. E ramis eius
panicu



Larix.

panicularum modo nuncamēta depēdent, quod pictura affabrē ostēdit.

LOCVS.

Larix, vt autor est Vitruuius, circa ripam fluminis Padī, & litora maris Adriatici nascitur. Copiosissimē autem in Silesia prouenit, vnde illustrissimus princeps GEORGIVS Marchio Brādenburgensis, dominus meus clementissimus, plures arbores Onoltzbachium transferre curauit, à quo sanē hanc etiam cuius hic damus picturā ad me. Tubingam transmisi. In Silesia ex eius arboris ligno hypocausta con-

struuntur, tantus illius ibidem prouentus est.

TEMPVS.

Larix nullo exhilaratur flore, sed turgens tantū ædit germina.

TEMPERAMENTVM.

Minimum in eius temperamento ignis & aeris, humoris autem terreni plurimum. Hinc cū non habeat spatia foraminū quā possit ignis penetrare, fit vt eius vim (quē admodū paulò antè diximus) reiiciat, nec patiatur ab eo citò lædi. Adstrictoriam itaque facultatem, haud secus atque piceæ, eius folia & cortices, vt statim dicemus, obtinent.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Cortex eius adstringit, ac intertriginibus tritus & illitus

H

tus

tus prodest, & vlceribus summam cutem occupantibus, ambustisque cum lithargyro & manna thuris. Vlcera in teneris corporibus cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. Tritus cum atramento sutorio, serpentia cohibet. Fœtus & secundas suffitu eiicit. Potus aluum sistit, & urinam mouet. Folia eius trita illitæque inflammationes leniunt, & vulnera ab inflammatione vindicant. Trita verò & in aceto cocta, calida collutione, dentium dolorem mulcent. Resina eius vt omnes aliæ, emollit, calefacit, discutit, expurgat. Tussientibus ac tabidis in eclegmate per se aut cum melle conuenit. Thoracis vitia expurgat. Vrinam etiam cit, maturat, & aluum molliet. Pilos in palpebris glutinat. Contra lepras cum æruginè, atramento sutorio, & nitro inungitur. Auribus saniem stillantibus cum melle & oleo, & in genitalium pruritu. Miscetur etiã emplastris, malagmatis & acopis. Lateris doloribus per se inuncta & imposita auxiliatur.

EX GALENO.

Cortex eius vincentem habet adstrictoriam facultatem vsque adeò, vt & intertrigines bellissimè sanet, & ventrem potus sistat. Sed ambustis cicatricem inducit. In folijs arboris, vt quæ multò sunt cortice humidiora, vis inest vulnereum glutinatoria. Resina eius desiccet & calefacit.

EX PLINIO.

Laricis folia trita & decocta in aceto, dentium dolori profunt. Cinis corticum intertrigini & ambustis medetur. Potus aluum sistit. Urinam mouet. Suffitu vuluas corrigit. Resina larigna tussi efficax habetur, pollétque contra viscera vlcera.

ADNOTATIO.

Larix in alpibus Delphinum frequens, Folia eius in nostrate Manna sunt plurima, quòd ex hac arbore serè decutiatur.

De Melissophylo. Cap. CXCI.


NO

NOMINA.

Mελισσόφυλλον ἢ μελίφυλλον Græcis, Apiastrum siue Citrargo Latinis, Officinis Melissa dicitur. Germanice [Melissen, Melissenkraut, Honigbluom.] Gallicè Melisse. Melissophyllum nō alio nomine appellatū est, nisi q̃ apes eius folio magnopere delectentur: neque enim μελισσόφυλλον aliud quā apum solum significat. Meliphyllon verò, quā voce Nicander vsus est, mellis solum indicat. Sic itaque nominari cœpit, quòd hinc apes mellis materiam colligant. Pari ratione Latini Apiastrum haud dubiè dixerunt, quòd ea herba apes plurimū lætentur, adeò vt si ea alucaria cōfricentur perunganturve, detentum in eis examen non fugiat. Citraginem autem ab odore Citri: nates enim si cōsulantur, Citrium malum olebit.



*Melissophyllum siue
Apiastrum verum.*



*Melissophyllum siue Apia-
strum adulterinum.*

G E N E R A .

Duo sunt ex vulgariū herbariorū sententia Melissophylli genera . Vnum verum , Alterum adulterinum , quod Germani [vvantzenkraut] nominant, vt paulò post dicemus.

F O R M A .

Folia & cauliculi veri Melissophylli, Balloto seu Marrubio nigro similia sunt , maiora tamen & tenuiora , nec ita hirsuta, citri mali odore. Perperam hodie officinæ pro vera Melissa vtuntur herba passim in hortis proueniente, quam Germani, vt diximus, quia cimices olere videtur, [vvantzé kraut] nominant. Fædus itaque cū huius herbæ odor sit non est cur apes ea delectentur : neque ei florenti insident, sed eam potius fugiunt. Contrā illa quam pro vera pictādamus vnicè oblectantur, quòd illius tam gratus odor sit, vt in ædibus strata, eas gratissimo odore compleat .

L O C V S .

Nascitur in syluis verum, Adulterinum autem in hortis.

T E M P V S .

Capitur æstate, Iunio potissimū mense , quo floribus prægnans est.

T E M P E R A M E N T V M .

Melissophyllon ex secundò ordine calefacientium censetur, desiccatur verò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc primi ordinis esse posuerit .

V I R E S E X D I O S C O R I D E .

Folia cum vino pota aut illita, contra scorpionum, phalangiorum, canumque morsus profunt. Decoctum eorundem, si eo perfundantur , idem potest . In infestationibus ad ducendos menses vtile est. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis iniectum prodest. Fungorum strangulationibus, folia cum nitro pota succurrunt. Torminibus auxiliantur. Dantur in eclegmate orthopnoicis. Illita cum sale strumas discutiant . Vlcera purgant. Articulares dolores illita mitigant.

E X G A L E N O .

Melissophyllon Marrubio facultate simile est sed plurimum

mum ab eo vincitur: quamobrem nec vitur illo quispiam. Supernacaneum siquidem foret præsente Marrubio (cuius tantus est vbique terrarum prouentus) velle vti Melissophyllo. Cæterum si cui fortè ad manum quandoque Marrubiū non fuerit, illo ad quæcunque vti licebit, modò quantò ab hoc exuperetur cognitum habuerit.

EX PLINIO.

Melissophyllo siue Melitæna si perungantur alucaria, non fugient apes: nullo enim magis gaudent flore. Copia istius examina facillimè continentur. Idem præsentissimum est contra ictus earum vespariumque & araneorū, item scorpionum, remedium: item contra vuluarum strangulationes adito nitro, Contra formina è vino. Folia eius strumis illinuntur, & sedis vitijis cum sale decocta. Succus foeminas purgat, & inflationes discutit, & vlcera sanat. Articulares morbos sedat, canisque morsus. Prodest dysentericis veteribus & cæliacis: orthopnœicis, lienibus, vlceribus thoracis, Caligines oculorum succo cum melle inungi eximiū habetur.

EX SIMEONE SETHI.

Ad stomachi ex frigiditate morsus, & à nigra bile tristitias & timores qui sine ratione ex illa fiunt, confert. Hilaritatem efficit, & ad melancholicum ac pituitosum humorem prodest. Fertur quòd industriam afferat, & quòd antè somnum sumptum, bonà somnia faciat, contraria ratione cum Brassica, quæ mala insomnia affert. Bubones lædit.

ADNOTATIO.

Vulgari Melissophyllo affricant apiaria rustici, vt illuc alliant apes, nec infeliciter.

De Marathro. Cap. CXCII.

NOMINA.

Mαράθρον Græcè, Fœniculum Latinè, Officinæ antiquum & Latinum nomen retinuerunt, Germanicè [Fenchel] Gallicè *Fenoil* dicitur. Marathrum Græcis dictū putant à marcescendo, quòd ad cōdienda plurima cū inaruerit commendatissimum sit. Fœniculum autem dici exi-

stimant, quòd satum magno cum fœnore semen reddat.

FORMA.



Fœniculum.

Fœniculum ferulacei generis est, hominisque plerûque proceritatem superat, caule geniculato, fungosa intus medulla, læui exterius cortice & herbaceo: folio Abrotoni, sed longiore molliori que, incûdo odore, umbella rotûda, ampla, lutea, in orbẽ radiatim circinata, in qua semen nudum dependet: radice candida, lōga & odorata.

LOCVS.

Passim in hortis satum prouenit. Sua etiã sponte interdũ ceu Anchum nascitur.

TEMPVS.

Colligitur caule turgescente. Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Fœniculum tam valenter excafcit, vt ex tertio ordine excafcientium censeri possit. Exicat verò non equè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat: quod, si admodum desiccaret, non sanè efficeret.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Fœniculi herba comesta mammas lacte replet. Idem potest semen porum, aut decoctum cum ptisana. Comæ decoctum subditum impositumve, renum & vesicæ vitijs utile, quippe quod vrinam ciere potest. Contra serpentium ictus
in vi

in vino potum prodest. Menses ducit. In febribus nauseam & stomachi ardorē ex aqua frigida potum, sedat. Radices contritæ & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caulibus & folijs expressis in sole siccatus, medicamenti, quæ ad excitandam oculorum aciem conficiuntur, vtiliter adijcitur. Extrahitur etiam succus ex semine viridi, folijs, ramulisque, ad eadem vtilis. Radix in prima germinatione exprimitur. In occidentali Iberia liquorem gummi similem reddit. Caulem medium dum herba floret incolæ demetunt, ignique admouent, quò facilius vi caloris exudans gummi remittat. Hoc efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

EX GALENO.

Fœniculum lac procreat. Suffusus auxiliatur. Vrinæ mensisque cit. In condimentis assiduus Anethi vsus: Fœniculi verò & in opsonijs. Apud nos in hoc reponunt, non secus ac Pyrethrum & Terebinthum condientes, vt in totum annum vsui sit, quemadmodum & cepas, & rapas, & alia huiusmodi quædam in solo aceto, alia in oxalme asseruantes.

EX PLINIO.

Ad scorpionum ictus & serpentium, semine in vino potum valet. Succus & auribus instillatur, vermiculosque in his necat. Id ipsum cōdimentis propè omnibus inseritur. Oxiporis etiam aptissimè. Quin & crustis subditur panis. Semen stomachum dissolutum adstringit. Nauseam ex aqua tritum sedat. Pulmonibus & iecinoribus laudatissimum. Ventrem sistit cū modicè sumitur, vrinam excitat, & tormina mitigat decoctum, lactisq; defectu potum, mammas replet. Radix cum ptisana pota renes purgat, siue decocto succo, siue semine sumpto. Prodest & hydropicis radix ex vino cocta: itē conuulsis. Illinuntur folia tumoribus ardentibus ex aceto. Calculos vesicæ pellunt. Genituræ abūdantiā quoquo modo haustum facit. Veredis amicissimū, siue ad fouēdum radice cū vino cocta, siue cōtrita in oleo illitū. Multi tumoribus & sugillatis cum cera illinunt. Et radice in succo vel cum melle contra canis morsum vtuntur.

H iij Et

Et contra multipedem ex vino.


EX SIMEONE SETHI.

Lac procreat, & suffusus remedio est. Vrinam cit, & menses ducit.


De Melanthio. Cap. CXCIII.

NOMINA.

MΕΛΑΝΘΙΟΝ Græcis, Papauer nigrum, Nigella & Gith Latinis dicitur: Gallicè Nielle Poiurette, ou Barbue Officinæ oēs Nigellā appellāt. Melanthion autē & Nigella, à nigro seminis colore hæc herba haud dubiè dicta est.



*Melanthium hortense
primum.*




*Melanthium hortense
alterum.*

GENERA.

Et si apud Dioscoridem aliósque veteres vna duntaxat Nigellæ species reperiatur, nobis tamen domesticas & hortenses tres videre contigit: quarum duæ quidem habent semina

mina nigra, tertia verò subflauum. Inter eas quæ habet semina nigra : primam [schvvartz Kommiel] Germanicè appellauimus: alteram [schvvartz Coriäder,] quòd folia eius Coriàdri folijs non dissimilia sint. Tertia, quòd ad folia & flores attinet, primæ per omnia similis est, in semine tantù quod flauescit, vt diximus, diuersa. Herbarij huius temporis Nigellam citrinam nominât. Præter has tres iam commemoratas est quarta, quæ syluestris Nigella dicitur, quòd scilicet sua sponte in aruis nascatur. Germanis [Vildschvvartzer Coriander] nominatur. Videtur autè esse potius tertium genus Cumini syluestris.

FORMA.



Melanthium sylvestre.

Capitulum planè Aquileiæ respondet, atque in se semina nigra & odorata continet,

Melanthion frutex est pusillus, ramulis tenuibus, altitudine palmarum duorum vel amplior: folijs paruis Sectionionis herbæ similibus, multò tamen exilioribus: capitulo in cacumine exiguo ceu Papaueris, oblongo, intercurfantibus internè distinctionibus loculos quinque aut sex, in summitate extrinsecus, corniculatis quibus semen nigrum, acre, odoratum includitur. Syluestre alteri hortensi ferè simile est, folia siquidem Anethi habet, flores primo similes, nisi quòd colore sint elegantiores.

LOCVS.

Melanthion domesticum non nisi in hortis satum prouenit. Syluestre autem, vt dictum est, in agris sua sponte prouenit.

TEMPVS.

Melanthion floret Iunio mense, Iulio autem & Augusto semine prægnaus est.

TEMPERAMENTVM.

Melanthion excalefacit atq; desiccet tertio ordine.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Capitis doloribus illitum fronti Melanthium, & incipientibus suffusionibus cum irino tritum & naribus infusum prodest. Tollit lentigines, lepras, œdemata vetusta, duritijsq; cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum vetere vino impositum. Dentium doloribus cum aceto & teda decoctum, si eo colluatur, succurrit. Rotundos ventris lumbricos expellit, ex aqua vmbilico illitum. Tritum autem & in linteo colligatum & olfactum, destillatione laborantes adiuuat. Pluribus diebus potum, vriam, menses & lac prouocat. Difficultatem spirandi cum vino potum finit. Phalangiorum morsibus drachmæ pondere cum aqua haustum auxiliatur. Suffitu serpentes fugantur. Tradunt largius eptum enecare.

EX GALENO.

Tenuium est partium Melanthium, vnde destillationes sanat calidum in linteo admotum, atq; assiduò olfactum. Quinetiam si intrò in corpus sumatur, vel maximè flatus extinguit. Hinc constat essentiae ipsum esse tenuis, & ad vnguem à caliditate elaboratae. Propterea sanè etià amarum est: Itaq; mirum non est si lumbricos interimat, non esum modò sed etià foris impositum. Neq; sanè etià miradum, si lepras, clauos, myrmecias eiiciat. Sic verò etià orthopnœa iuuat, & menses prouocat, qui ob trāsitiōe aut viscedinem retenti fuerint. In summa, vbi incisione, extersione, desiccatione, excalefactione est opus, præstantissimum id remediū est.

EX PLINIO.

Melanthion medetur serpentium plagis & scorpionum.
Illini

Illini ex aceto & melle reperio, iucenſoque ſerpentes fugari. Bibitur drachma cōtra araneos. Deſtillationem narium diſcutit tuſum in linteolo olfactum, Capitis dolores illitū ex aceto, & infuſum naribus mitigat. Cum irino oculorum epiphoras & tumores lenit. Dentium dolores coctum cum aceto. Vlceras oris tritum & cōmanducatum. Lepras & len- tiginēs ex aceto tritum emendat. Difficultates ſpirandi ad- dito vino potum. Duritias tumoresque veteres & ſuppura- tiones, illitum. Lac mulierum auget continuis diebus ſum- ptum. Colligitur ſuccus vt Hyoſciami. Oculos purgat, vri- nam & menſtrua ciet. Similiter largius venenum eſt, quod miremur, cū ſemen gratiſimè panes etiā condiat. Quin- imo linteolo alligatis tantum granis triginta, ſecundas tra- hi reperio. Aiunt & clavis in pedibus mederi tritum in vri- na. Culices ſuffitu necare, item muſcas.

EX SIMEONE SETHI.

Eſt tenuium partium, lumbricos in ventre necat, ſtatus diſcutit, pituitamque incidit. Ad orthopnœas & deſluxus ca- pitis facit odoratum, præſertim poſtquam calefactū fuerit. Dicitur verò quòd ſi teratur, & cū aceto ventri imponatur etiam ſic lumbricos necare. Et ſi cum melle fermentetur, & calida aqua hauriatur calculos in renibus & veſica minuit, urinam cit, menſes ducit, & veluti remedium contra vene- na eſt, ſi quis ipſum ieunus aſſumat.

De Malache. Cap. CXCIIII.

NOMINA.

MΑΛΑΧΑ Græcè, Malua Latinè, Officinis Latinum no- men retinuit, Germanicè [Pappel] Gallicè *Maule* dicitur. Malua autem Græcis ab emollienda aluo nomen traxit: *μαλάνειν* enim mollire ſignificat. Quinetiam Latinis Varro Maluam quaſi moluam, quòd aluum molliat, di- ctam eſſe contendit. Antiqui enim ea utebantur in aceta- rijs cum Lactuca ad ſubducendam aluum. Vnde Martialis libro decimo ait.

Exoneraturas ventrem mihi villica maluas
Attulit, & varias quas habet hortus opes.

GE

*Malva hortensis.**Malva sylvestris pumila.*

Malvarum genera esse duo Dioscorides & Galenus tradunt. Vna enim hortensis, altera sylvestris Malva dicitur. Hortensis, quæ in hortis sata pronenit, Germanis [Romische Pappel, vel Ernrosz.] quod scilicet messis tempore floreat, vel [Herbstrosz] nominatur. Gallis, *Maulue de iardin*. Huius iterum varia sunt genera: alia siquidem rosas purpureas: & has vel simplici vel multiplici foliorum textura cōstantes, ut pictura monstrat: alia candidas & iterum foliorum textura differentes producit. Nos vna pictura quatuor hæc hortensis Malvæ genera cōplexi sumus. Sylvestris non quæ in sylvis, aut asperis locis, sed quæ in incultis locis sine sponte nascitur, intelligi debet id quod Græca vox *χαρσαία*, quæ Dioscorides vitur, maximè docet. Hæc enim Græcis incultam & inelaboratā terram significat, qualis in semitis, pratis,

pratis, alijsque huiusmodi ruris & agri partibus est. Erratica hæc seu sylvestris Malua itidem in duas distribuitur species, Quædam enim pumila est, & humi serpens, hanc Germani [Genszpappel, Rasz oder Hasenpapel] Galli *Malua courte sauuage* vocant. Quædam altius attollitur, & ferè arborefcit, hanc Germani [Roszpapel] nominant. Gal. *Malua sauuage haute*.

FORMA.



Malua sylvestris elatior.

breuib. innixa petitiolis, & leuiter in mucronem fastigia-
ta primùm è caule profiliunt, ijsque paulatim intumescen-
tibus, prægnantia florū inuolucra fatiscunt, in quibus de-
hiscentes rosæ sese pandunt, & explicantur in folia quin-
que, interdum struētili quadam serie, vt diximus, numero-
sa: calycibus apices paucos complexis, qui lutei medijs emi-
cant, quibus decidentibus erumpūt purpurea stamina. His
fœtus succrescit multo citius tunicatus, atque in vmbilici
formam numeroso semine coagmentatus, in quibus cūm
decussa

Hortensis Malua grā
descit in arborē, eiusque
scapus tanta magnitudi-
ne pficit, vt baculi, vsū
præbeat. Folia huic am-
pla, circinatæ rotundita-
tis, multis in ambitu seg-
mētis. Caudex simplex,
luxuriôsæ proceritatis
attollitur, à medio ferè
ad verticē pulcherrimis
floribus decoratus, bre-
ui admodūm pediculo
dependentibus, qui ve-
nustate rosas nō cedūt,
& si suppeteret odor, de
principatu certarēt. Co-
lore constat purpureo,
vermiculatōve & can-
dido. Capitula quædā

decussa sunt folia, reliquarum Malvarum modò semina recluduntur. Sylvestris pumila & humi repens, folio rotundo, pingui: & in ambitu serrato constat: caule magno, floribus ex candido purpurascens: radice cãdida. Sylvestris altior, folio magis laciniato nascitur, floribus ex cœruleo purpureis: radice candida.

LOCVS.

Hortensis in hortis sata prouenit. Sylvestris autem locis incultis, pinguibus potissimum, & humidis.

TEMPVS.

Hortensis floret Iulio & Augusto præsertim mensibus: neque enim flos is vt rosa fugax est, sed diu vigor vitæ durat. Sylvestris pumila per totam æstatem, & in maximâ autumnii partem durat. Arborescens autem Iunio & Iulio mensibus, floribus quammaximè abundat.

TEMPERAMENTVM.

Malva sylvestris digerentis paululū, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis verò quantò plus habet aqueæ humiditatis, tantò facultate imbecillior est. Fructus eius tãtò validior est, quãtò & siccior. Inter Lactucam, Betam, & Maluam id est discriminis, nempe quòd sicciora sint sylvestria, satius humidiora. Permissū est Maluæ succo aliquid glutinosum, quo Lactuca caret. A refrigerãdi facultate manifestè abest, vt ante sumptionem cernere licet, si ex ambobus particulatim oleribus, quemadmodum scititare homines consueuerunt, cataplasma ad calidum quempiam affectum, qualis est erysipelas, componas, molliuscula folia diligenter tũdens donec ad lenoriẽ redacta sint exactissimum. Tum nanque cognosces Lactucam manifestè refrigerare, Maluam verò modicum, & quasi tepidum quendã calorẽ obtinere. Facile hoc olus deortum labitur, non tãtũ quia humidũ est, sed etiam quia glutinosum. Si horũ triũ olerũ succos inter se cõpares, tenuis & abstersorius Betæ, crassior glutinosiorque Maluæ, in vtriusque medio Lactucæ statuetur. Hæc Galenus lib. ij. de Alimentorum facultatibus.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Esui aptior hortensis multò quàm sylvestris. Stomacho nõ

xia, aluum bonam efficit, præsertim caules, intestinis & vesicæ vtilis. Folia cruda illita, & cū modico sale addito melle comānducata, ægilopas sanant. Verūm in inducēda cicatrice, ea sine sale vtendum est. Contra apum vel parūmq; ictus illita prodest. Et si cruda tritaque cum oleo antea se inunxerit aliquis, nō feritur. Achoras, furfurēsque cū vrina illita sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia tritaq; vtiliter cū oleo imponuntur. Eius decoctū vuluas infestatione mollit. Prodest erosionibus intestinorum, vuluæ sedisq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua omnibus lethalibus venenis auxiliatur, si continuò à bibentibus reuomatur. Cōtra phalangiorum morsus remedio est. Lac prorit. Semen eius, admixto Loti syluestris semine potum cum vino, vesicæ dolores lenit.

EX PLINIO.

Maluæ contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, præcipuè scorpionum, vesparum similiūmq;, & muris aranei. Quin & trita cum oleo qualibet earum peruncti antè, vel habētes eas non feriuntur. Foliū impositum scorpionibus torporem affert. Valent cōtra venena. Aculeos omnes extrahunt illitæ crudæ, aut cū † anetho potæ. Decoctæ verò † alias acetō. cū radice sua, leporis marini venena restringunt: &, vt quidam dūnt, si vomatur. De eisdem mira & alia traduntur, sed maximè, si quotidie quis succi ex qualibet earū sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturū. Vlcera manantia in capite sanāt, in vrina putrefactæ lichenas, & vlcera oris cum melle. Radix decocta furfures capitis & dentiū mobilitates. Eius quæ vnū caulem habet, radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadē strumas & parotidas panósque, addita hominis salua, purgat citra vulnus. Semen in vino nigro potum, à pituitis & nausis liberat. Radix mammarium vitij occurrat, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta & sorbitionis modo sumpta, quin diebus emendat. Stomacho inutiles Sextus Niger dicit. Olimpias Thebana, abortiuas esse cum adipe anseris. Aliqui purgari fœminas, folijs earum manus plenæ mensura, in oleo & vino sumptis. Vtique constat parturiētes substratis

stratis folijs celerius solui, protinus à partu reuocanda, ne vulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Quin & semen tritū adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoque ex Veneri nascuntur, vt semē vnicaulis aspersum genitali, foeminarum auaritates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta adalligatas, tenasmo & dysentericis vtilissimè infundi. Item sedis vitij, vel si foueatur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & insanientibus quaternis. Decoctæ comitialibus heminae succi. Hic & calculosis, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus & ambustis decocta in oleum folia imponuntur: & ad vulnerrum impetus cruda cum pane. Siccus decoctæ neruis prodest, & vesicæ, & intestinorum rosionibus. Vuluas & cibo & infusione mollit in oleo. Succus decoctæ pori meatus suaves facit.

EX SIMEONE SETHI.

Ventriculum facile subit, non solum propter humiditatem verumetiam glutinositatem, atq; imprimis si cum oleo & garo offeratur, vino, quo editur tempore, irrorata. Vesicâ, thoracem, pulmonemq; iuuat, & raucam vocem lenit Sylvestris malua, vt ferunt, comesta, dolores ex vesparum morfu tollit. Si quis morsus à vespis aut apibus, succo Maluæ, præsertim sylvestris, perungatur, cõfestim dolore leuatur. Dicitur etiam quod huius decoctum potum, lapides conterit, somnum conciliat, facilemq; partum præstat, si mulier ea crebrius vtatur. Illita inflammationes lenit, eaque quæ indurata sunt emoluit. Illud Maluæ peculiare est, vt imposita iactibus vesparum & apum, dolores leuet.

De Myrice. Cap. CXCV.

NOMINA.

MΥΡΙΞ Græcis. Myrice & Tamarix Latinis, Officinis Tamariscus, Germanis [Tamarisek, & Porst.] Gallicè Bruyere nominatur.

GENE

G E N E R A.

Dioscorides duo Tamaricis genera facit. Vna enim syluestris est, qualis est ea quæ in plerisque Germaniæ locis prouenit, quàmque hic pictam damus, Altera satina, quæ priori in cæteris similis est, nisi quòd fructifera est, & minimè, vt illa sterilis.



Tamarix sylvestris.

pro, vbi procerissimas æquat arbores, gignitur.

T E M P V S.

Perpetua coma frondet.

T E M P E R A M E N T V M.

Myrice abstergentis est ac incidentis facultatis, absque perspicua desiccatione: habet verò etiam adstrictione nonnullam. Cæterum fructus & cortex non paucam sortita est adstrictionem, adeò vt gallæ omphacitidi seu immaturæ proxima sint, nisi quod acerbitas euidentis est in galla, sed Myrices fructui tēperatura inest inæqualis: immista est enim naturæ eius multa partiū tenuitas, atque vis abstergendi,

I

quod

F O R M A.

Syluestris arbusculum frutēx ve humilis est, ramis ex herbaceo fuluòq; colore variegatis: folijs Sabinæ aut Ericæ: flore muscoso, qui demum in papos euolat. Satina cætera similis est syluestri, fructū tamen gallæ non dissimilem profert, qui gustu inæqualiter adstringit.

L O C V S.

Proximè paludes, re-fides stagnantesq; aquas nascitur, Syluestrisque copiosa in Germania ad Rhenum & Isarum, insignes fluuios, prouenit. Satina in Syria et Aegy

quod sanè gallæ haud inest. Porro Myricæ combustæ cinis admodum desiccatoriæ facultatis est, plurimam abstergendi facultatem habens, pauxillam adstringendi.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Fructu vice gallæ in oris oculorûmque medicaminibus vtuntur. Cruentis sputis in potu, cœliacis, fœminarum fluxionibus, morbo regio, & phalangiorû morsibus prodest. Oedemata illitus reprimat. Cortex eadem quæ fructus potest. Decoctum foliorum cum vino potum lienem minuit. Ad dolorem dentium in collutionibus salutare est, & mulierû fluxionibus in defensionibus. Aptè his in quibus pediculi & lendes abundant circumfunditur. Cinis lignorû eius appositus profluuium ex vtero suppressit. E trunco eius nonnulli potorios calyces fabricant, quibus in lienosis poculo vtuntur, quod datus in ijs potus proficiat.

EX GALENO.

Myrice prodest admodum lieni indurato, decoctis cum aceto aut vino radicibus, siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat verò etiam dentium dolores.

EX PLINIO.

Lenius sanari ea carcinomata in vino decocta tritaque cum melle dicit. Ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in vino bibatur. Adeoque mirabilem eius antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, vt affirmet, si ex ea alucis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini quoque splenetico cibum potumque dant in vasis ex ea factis. Lignum & flos & folia & cortex in eisdem vsus adhibentur, quanquam remissiora. Datur sanguinem reiicientibus cortex tritus, & contra profluua fœminarum, cœliacis quoque. Idem tusus impositusque collectiones omnes inhibet. Folijs exprimitur succus. Ad hæc eadem in vino decoquuntur: ipsa verò adiecto melle gangrænis illinuntur. Decoctum eorum in vino potum, vel impositum cum rosacco & cera sedat. Sic & epinyctidas sanat. Ad dentium dolorem auriûmq; decoctum salutare est. Radix, ad eadè, similiter & folia. Hæc amplius ad ea quæ serpūt, imponuntur cum polenta. Semè drachmæ pondere aduersus phalanga & araneos bibitur. Cum altium verò pingui, furunculis

lis imponitur. Efficax & contra serpentium ietus, præterquam aspidum. Necnon morbo regio, pthiriasi, lendibusque decoctum infusum prodest, abundantiamque mulierum sistit. Cinis arboris ad omnia eadem prodest.

ADNOTATIO.

Tamarix in Gallia Narbonensi luxuriat, nunc etiam in hortis regijs quos fons bella aqua irrigat, & in hortis Reuerendi Bellay Parisiensis Episcopi & Cardinalis, posterorum memoria & nostra omnium veneratione dignissimi, ut qui nullis parcat sumptibus, quò partem medicina plantariam reddat illustriorem & certiorè.


De Mecone Rhœade. Cap. CXCVI.

NOMINA.

MΗΧΩΡ ποικη Græcis, Papauer Rhœas, hoc est, fluidū aut erraticum Latinis, Papauer rubeum officinis & herbarijs. Germanis à strepitu quem ludentes pueri harū folijs cōcauo pugno impositis, altera palma incussa ædūt. [Klap per rosen,] quasi dicas crepitaculares rosas, & [Glitschen, & vild Maen, ac Kornrosen,] Gallicè *Cognelicot ou Pôreau* appellāt. Rhœas autem à flore, quæ ei ætinus decedit, dictū est.

FORMA.

Folia Erucæ, aut Cichorio similia, & incisa habet, lōgio ra tamen & aspera. Caulem lanuginosum, rectū, asperum, cubitalem. Florem puniccū, & aliquando candidum, similem sylvestris Anemones flori. Caput oblongum, minus tamen quàm Anemones. Semen rufum. Radicem oblongam, subalbam, minoris digiti crassitudine, amaram. Ex qua delinatione omnibus perspicuum fit, herbam quam Papauer rubeum hodie vulgò nominant, esse Rhœada, quòd sit folio Erucæ, laciniato, scabro & longiore: caule lanuginoso, recto, aspero, cubitali: flore sylvestris Ancinones puniceo, nonnunquam albo, oblongo capite, semine rufo, radice longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Errant itaque qui Anemonē esse arbitrantur, quòd folia eius, quæ Coriandri sunt, euidentissimè reclamant. Nos Rhœa dis vtriusque picturas damus. Vnus atque adeò primi, quòd Erucæ folia habet, alterius quod Cichorij.



Papauer erraticū primum. Papauer erraticum alatum

LOCVS:

Nascitur in aruis & segetibus passim.

TEMPVS.

Vere & æstate, dum frumenta messem appetunt, floret: quo etiam tempore decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat, vt alia genera Papaueris.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Huius Papaueris quinque sexve capita cū tribus vini cyathis decocta donec ad duas reducantur, potui dabis, quibus somnum accersere volueris. Semen acetabuli mensura cum aqua mulsā potum, aluum leniter emollit. At idem præstandum mellitis & dulciarijs immiscetur. Folia cum calycibus illita inflammationes sanant. Eorundem perfusione & fomento somnus allicitur.

EXGALENO.

Papauer quoddam Rhœas nūcupatur, quodd scilicet cele-
riter

riter flos eius defluat. Huius semē validiùs refrigerat, ita vt nequaquā eo quis innoxie solo vti possit, veluti satiuo meli admiscens. Admodum verò ita sumptum somnum conciliat. Sed & pusillum eius inspergunt ijs quæ ex melle conficiuntur bellarijs, placentis & panibus.

EX PLINIO.


Aluum exinaniunt capita quinque decocta in vini tribus heminis: pota somnum faciunt.

EX RECENTIORIBVS.

Sacro igni medetur. Mulierum menstrua profluua compescit. Sanguinem è naribus fluentem iecori impositum sistit. Lingua decocto eius lota, ardorem faucium sanat. Pudentorum tumores detumescere facit. Temporibus illitum phreneticis somnum conciliat. Calidos oculorum dolores linteo impositum mitigat. Vnde rursus omnibus liquet, Papauer hoc rubrum non esse Anemonem, quod scilicet hæc ipsa contrarias planè facultates oblineat.

De Mecone satiuo. Cap. CXC VII.

NOMINA.

MΗΚΩΡ  Græcè, Papauer satium Latinè dicitur. Officinæ antiquum nomen retinuerunt. Germanicè [Magsomen oder Man,] Gallicè *Panot* vocatur. Dictum autem Græcis *μηκωρ μηκονειρ*, hoc est, non ministrando, quod suis fungi munijs vscientes non patiatur.

GENERA.

Satiui Papaueris duplex genus, Album videlicet, cuius flos & semen candidum: Et nigrum, quod semine nigro cõstat. Nos vtrunque genus vna pictura complexi sumus.

FORMA.

Folijs constat longis, per ambitum serratis, nulloque pediculo cauli adhærentibus: floribus vel candidis, vel ex candido leniter purpureis: capitibus oblongis, in quibus semen atrum vel candidum.

LOCVS.

Pæssim in hortis satum prouenit.

I iij

TEM

pitis cum rosaceo perfusus facit. Aures dolentibus cum amygdalino, mirrha, & croco instillatur. In oculorum inflammationibus cū tosto oui luteo & croco. Igni sacro & vulneribus cum aceto, podagris cū lacte mulieris & croco, sedi pro balano subditus, somnum allicit.

EX GALENO.

Satiui Papaueris semen panibus vtiliter ceu dulciarium inspergitur, non secus ac Sefamū. Candidius nigriore præstat, vimque refrigerandi habet, ideòq; somnificum est. Si verò liberalius sumatur, soporem etiam inducet, ægréque concoquetur. Tussim præterea ex thorace & pulmone cōpescit. Cōfert aduersus tenues ex capite destillationes. Corpori nullum notatu dignum exhibet nutrimentum.

EX PLINIO.

Candidi semen tostum in secunda mensa cū melle apud antiquos edebatur. Calix ipse teritur & bibitur somni causa. Semen elephantij medetur. E nigro Papauere lacteus succus scapo iuncto exprimitur, hui densatur, & in pastillos tritus in vmbra siccatur, non vi soporifera modò, verum si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum: opion vocāt. Semine eius trito in pastillos, è lacte vtūtur ad somnum. Item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum his aurium dolori instillatum. Podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic & folijs ipsis vtuntur ad sacros ignes. Item vulnera cum aceto. Ego tamē damnauerim collyrijs addi, multoque magis quas vocant lexipyretas, quasque pepticas & cœliacas. Nigrum tamen cœliacis in vino datur.

EX SIMEONE SETHI.

Melius est album quàm nigrū. Somnificam vim habet, & difficilis est concoctionis, parūq; nutrit. Si autem cum melle edatur, semini genitali adijcit. Prodest & thoraci, & asperæ arteriæ, ac tussi. Ventrem sistit, etsi quidam falsò putauerunt ipsum mouere, cū contrariā habeat vim. Lædit caput, si copiosius sumatur, itemq; aggrauat. Sunt qui ipsum cōterūt, & vigilantium fronti imponūt, in hoc vt somnum conciliet. Cæterum nigrum Papauer frigidius est, & magis somniferū, adeò vt si quis eo immodicè vtatur, som-

no profundo similiter lethargicis capiatur. Cum rosaceo impositum capiti, eiusdem dolores à calore ortos sanat. Dicitur etiam quòd illitum cum lacte muliebri & croco, podagricos iuuet. Huius lachryma venenum est. Nigri autem succus est vocatum opium.

De Mecone Ceratite. Ca. CXCVIII.

NOMINA.

MΗΚΩΝ ΚΙΡΑΪΤΗΣ Græcis, Papauer corniculatum Latinis, Officinis Papauer cornutum, Germanis [Gelbolmagen] Gallis *Pauot Cornu* appellatur. Corniculatum à fructu quem producit, cornu modo inflexo, nominatū est.

FORMA.



Papauer corniculatum.

Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, per ambitum Papaueris sylvestris modo ferrata: caulem etiam similem: florem luteum pallidumve, fructū paruum ut cornu inflexum scænigræci corniculo similem, unde & nomen inuenit. Semen pusillū, nigrum, quale Papaueris. Radicem in superficie terræ hærentem, nigram, crassam.

LOCVS.

Dioscorides in maritimis & asperis locis peruenire ait. In Germania tamen nostra non nisi satum fuerit, nascitur.

TEM

TEMPVS.

Iunio floret mense: Semen autem circa messes legitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse, facultates eius, & in gustu nitrofitas, satis ostendunt.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix ad dimidias cocta in aqua & pota, ischiadas, & iecinoris affectus sanare potest. His etiam qui crassas & arenosas faciunt vrinas prodest. Semen acetabuli mensuræ cum aqua mulsa potum, aluum leniter purgat. Folia præterea florésque cum oleo illita crustas emarginant. Eadem inuncta iumentorum argema ac nubeculas emendant.

EX GALENO.

Papauer corniculatum nominatum quidem est à fructu leuem inuersionem habente, veluti & scenumgræcum, ut bouis cornu simile esse videatur. Vim habet incidendi & abstergendi. Proinde radix herbæ in aqua decocta ad dimidium, iecinoris affectus adiuuat. Folia & flores, sordida admodum & maligna vlcera iuuat. Sed ab his abstinere oportet vlceribus iam purgatis: ad eò enim abstergere valent, ut & puræ quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc facultatum robore nõ sordes dütaxat, sed & crustâ vlceribus detrahit.

EX PLINIO.

Semen aluum purgat dimidio acetabulo in mulso. Folia trita cum oleo, argemas iumentorum sanant. Radix acetabuli mensura cocta in duobus sextarijs ad dimidias, datur ad lumborum vitia & iecinoris. Carbunculis medentur ex melle folia.

ADNOTATIO.

In Papauere corniculato mirum cur Dioscorides omiserit rictû, seu colubri in summa siliqua conspicuum, notam planè illustrem.

De Moro.

Cap. CXCIX.

NOMINA.

Mορτα, ή αυκαμνία Græcis, Morus Latinis, Officinis & vulgaribus herbarijs Morus celsi, Germanis [Maulberbaum,] Gallis Meurier appellatur.

*Morus.*

Morus arbor notior est quàm vt describi desideret. Folia autem rotunda ferè habet, nisi q̃ in summo sunt acuminata, in extremitatibus ferrata, & ad Mêtæ hor tensis primi & secundi generis folia accedètia. Flores lanugineos, fructum statim ab ortu candidum, cum pubescit rubrum: vbi maturuit, atrum. Non est certè silentio transeundum, q̃ Mori folijs quadraginta ferè diebus à Vergiliarum exortu vsque ad solstitium, pastri vermiculi, qui cūpis Græcis, Latinis bombyces ac Se

res nominantur, sericem vellus, quo turget vterus, pedibus explicantes conficiunt: nulla enim in re alia natura sagacior deprehenditur, nec ars aliquid ab ijs accepisse videbitur, in quo ingeniosius laborauerit, si tam multas, dum id vellus perficitur, naturæ mutationes, & artis, dum ad vitæ vsum disponitur, labores æstimemus. Appescente siquidem vere oua, piscium ouis haud dissimilia, linteolo chartæuè adhærescentia, quæ proximo autumno producerunt, radijs solis exponuntur, aut calido in loco, hypocausto nimirum, seruantur. Quo fit vt vermiculi excludantur exigui, qui mox Mori folijs nutriuntur, quoad grandiores facti fuerint: tum statim penulæ cuiq; chartaceæ, vel potius inuolucra conficiuntur, quibus inclusi si mirabili naturæ opere lanicio sese inuoluunt, ac cōgesto glomeri

glomeri se condentes, postquam suum nendi obierunt munus emoriuntur, adedò vt semestris tantùm illis apud nos vita sit. Mortuis testacea subinde tunica inducitur, qua aliquot diebus obducti reniuisçùt, ac ascitis sibi alis in volucres papiliones degenerat, qui assiduè inuicè insidentes coeùtesq; tandè relictis ouis milij forma & colore, quibus sua rediuiua proles sequente anno renascitur, iterum moriuntur, atque adedò cum nullius præterea sint vsus abijciuntur. Oua autem ad veris vsque initia seruantur. Hanc mirificā metamorphosin quam non rarò summa cum admiratione ac delectatione sum contemplatus, non potui non commemorare, quò studiosis vermiculorum istorum, qui Mori folijs pascuntur, natura prorsus perspecta esset.

LOCVS.

Nascitur in hortis quibusdam. Amat autem in primis loca calida fabulosaque. Gaudet fossione & stercore.

TEMPVS.

Nouissima vrbanaum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Proinde cum hanc germinare viderimus, frigus minimè timendum erit.

TEMPERAMENTVM.

Immaturus Mori fructus vbi exaruerit admodum adstringit. Maturus autem mediocriter adstringit. Cortex radice arboris amaritudinis cuiusdam & purgantis facultatis particeps est. Folia & germina quodammodò media temperie inter adstrictionem & purgatoriam facultatem sunt prædita.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Mori fructus aluum soluit. Facile corrumpitur. Stomacho inimicus est. Præstat hoc idem eius succus. Decoctus autè æreo vase, aut insolatus, magis adstringit. Admixto mellis exiguo, ad fluxiones, nomas & tonsillarum inflammationes facit. Augetur vis eius adiecto scissili alumine, galla, croco & myrrha, item tamaricis semine, iride & thure. Mora verò immatura sicca tusaque. Rhois vice opsonijs miscetur & cæliacos inuant. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluū soluit, Latos ventris lúbricos expellit, ijs quoque
auxi

auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita & cum oleo illta, ambustis igne medetur. Decocta in aqua cœlesti cum vitis & nigræ fici folijs, capillos tingunt. Succus foliorum ryathi mensura potus phalangiorum moribus auxiliatur. Corticis & foliorum decocto colluuntur vtiliter in dolore dentes. Colligitur per messem succus, circumfossa & secta radice arboris: inuenitur enim postridie cœcretus, qui in dolore dentiũ vtilis est. Tubercula discutit, & aluum purgat.

EX GALENO.

Mori fructus maturus ventrem quidem subducit: immaturus arefactus medicamentum fit satis constringens, adeò vt ad dysenterias & cœliacos affectus, aliòsque omnes qui ex fluxionum sunt genere, efficax sit. Contunditur autè & opsonijs miscetur, veluti rhois fructus: aut si cui ita videatur, ex aqua aut vino bibitur. Porro quòd maturorũ succus ad stomatica medicamenta sit vtilis, propter eam videlicet quæ inest illi adstrictionem, neminè latet. Præterea ad alia complura particularia, quæ mediocrem poscunt adstrictionem competit. At immatura præter acerbicatem aciditate etiam participant. Tota quoque arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam obtinere facultatem ex constringente & purgante compositam videtur. Attamen in radice cortice, purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeò, vt & latum lumbricum interficiat. In alijs autè partibus constringens vincit. In folijs tamen & germinibus media quodammodò comprimentis & subducentis facultas est. Cæterum Mora vbi in ventriculum purum, & prima fuerint ingesta, citissimè per intestina transeunt, & alijs cibus suo veluti ductu viam struunt. Verum secundo loco assumpta, aut prauum in ventre humorem inuenientia, celerrimè alijs vnà cum cibus corruptuntur, extraneam quandam atque inexplicabilem corruptelam inducentia si militer cucurbitis. Tametsi enim fugacibus hæc omnia sint esculentis innocentiora: corruptione tamen nisi velociter deorsum concedant, nõ secus ac Pepones, vitiantur. Porro quando ventriculi os squalidum calidũque erit, tum sicut peponibus, ita & Moris vtendum. Tale nãque iecur etiam

tunc esse necesse est. Immatura Mora ab arbore decerpta, siccataque in hyemem reponunt, vt sibi medicamen ex ijs parent, vtile ad dysenteria, aluique diuturnū fluorem per sanandum. Quòd quidem faciliè descendant fortè eis vsu venit sola substantiæ humiditate & lubricitate, fortè etiā admistione acrioris facultatis, quæ stimulandæ ad excretionem aluo sit satis. Nam adstringens qualitas adeò nihil ad deiectionem opitulatur, vt etiam reprimere stipareque sit nata. Proinde Moris exiguam quandam eius facultatis portiunculam inesse conijcio, cuius permagna in purgantibus medicamentis habetur: quæ facit non solū vt faciliè deijciatur, verum etiam vt diutius morata in ventre corrumpantur. Quòd si corruptionem effugiant, omninò quidem humectant, sed non planè refrigerant, nisi frigida accipiātur. Parcissimè corpus alunt, similiter vt Pepones, haud tamen vomitum cient, nec stomacho vt illi aduersantur.

De Myrrhide. Cap. CC.

NOMINA.

MΥΡΡΙΝΗ ἢ μύρρα Græcis, Myrrhis Latinis, vulgaribus herbarijs Cicutaria, quòd scilicet caule & folijs Cicutæ similima sit. Hac similitudine quidam decepti, veram esse Cicutam putauerunt, cū tamen ab ea, viribus potissimum diuersissima sit. Germanis [Vuilder korffel] appellatur. Gallis verò *Perfil d' Asne*.

FORMA.

Cicutæ caule & folijs similis est: radicem obtinet longā, teneram, rotundam, odoratā, in cibo non insuauē. Hęc tota Dioscoridis delineatio, nulla prorsus reclamante nota, herbe, cuius effigiem damus pictam, suffragatur. Siquidem caule striato, folijs & flore Cicutæ similima est, adeò vt eā nonnulli à Cicutā discernere nesciant. Radicem etiam habet longam, teneram, rotundam, cibo iucundam & odoratam.

LOCVS.

Passim in hortis & pratis nonnullis prouenit.

Tem

*Myrrhis.*

TEMPVS.

Maio mense loca in quibus nascitur huius floribus quasi candicant.

TEMPERAMENTVM.

Ex secundo est ordine ex calfacientium, adiuncta partium tenuitate.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Phalangiorum moribus radix Myrrhidis succurrit cum vino pota. Menses purgat & secundas educit. Cocta in sorbitione tabidis vtiliter datur. Ferunt præterea aliqui eam bis terve die potam ex vino in pestilentialibus constitutionibus, à morbo seruire incolumes.

EXGALENO.

Radix eius menses mouet, quæque in thorace & pulmone sunt expurgat.

EXPLINIO.

Cit menstrua & partus cum vino. Aiunt quoque eandem potam in pestilentia salutarem esse. Subuenit & phthisicis in sorbitione. Auiditatem cibi facit. Phalangiorum morsus restringit. Vlcera quoque in facie aut capite succus eius in aqua triduo maceratus sanat.

ADNOTATIO.

Myrrhis etiam in segetibus nobis frequens.

De Meliloto.

Cap. CCI.

NOMINA.


MΕΛΙΛΩΤΟΣ Græcis, Melilotus, Sertula campana, & Corona regia Latinis dicitur, Meliloti nomen officinæ retinuerunt. Sertulam verò dixerunt, quòd flos eius coronamentis dicatus sit, & quia ex ea antiquitus coronæ & serata factitata sint. Coronam autem regiam, quoniam luteis floribus supernè coronetur. Gallicè *Melilot*.

GENERA.

Tria Meliloti hodie faciunt genera. Primum vulgarem, statim à radice fruticosam, cubitalem, folio scæni græci minuto ac lentè sîmbriato, flosculo luteo, odoris suauis, tereti per ramos diffuso semine. Hoc quanquã tertio generi (quod nos verum esse putamus) folijs & floribus simile sit, tamen cum nullam gustu præ se ferat adstrictionem, quã summè requirunt Dioscorides, Galenus, & alij veteres medici, & præter amaritudinem haud exiguam acrimoniam habeat, sit vt inter Melilotos, meo quidem iudicio, rectè connumerari non possit. Hiuc est quòd nos infra, hanc alio nomine dignati simus, Saxifragamque luteam appellauerimus. Alterum aspectu cano, Croci flore, folijs Trifolij, minutissimis, vt paulò pòst fusiùs dicemus. Hoc sanè genus nos Melilotum germanicam vocauimus, quòd illa, & nò prior in Germania nostra pro vera Meliloto sit vsurpanda, ob adstrictionē illam manifestam quã gustu præfert. Accedūt folia quæ pingua sunt, & flores Croci colorem referentes, quos Dioscorides requirit. Sententiā nostram cōfirmat antiquus manuscriptus herbarius, qui hanc pro Meliloto pingit. Neque obstat quòd hæc herba nò admodum odorata sit, fatemur enim nò esse laudatissimam Melilotum, sed eā quam Germania nostra profert. Nam quū Plinio lib. xxj. cap. xj. teste, Melilotus vbiq; nascatur: suam quæuis habeat ferè regio necesse est. Nihil igitur mirum si huic herbæ nò adsint singulæ notæ, quas illi veteres Græci & Latini attribuūt. Satis autem est ei mistam quādam, nempe adstringentem & digerentem inesse facultatem, haud secus quam optimæ,

timè, Germani hanc herbam nominant [Vnser frauent-
chuo chlinvel V vildenklee.] Tertium genus nos optimā
& legitimam esse arbitramur Melilotum, quam nos maio-
ris discriminis causa Italicam nuncupauimus, quòd mos
fit patrius Germaniæ nostræ, omnia ferè peregrina vocare
Italica. Germanicè itaq; haud ineptè [vuelscher Stemklee]
nominabitur.

FORMA.



Melilotus Germanica.



Melilotus Italica & uera.

Vulgaris Meliloti descriptionem inuenies suo loco. Ger-
manica, herba est humilis, palmi altitudine: folio pratensis
Trifolij, pingui & cano: flore pisi, minore tamen, luteo: se-
mine in siliquis, radice rufa. Italica (quam è Campania al-
latam in Germaniam arbitror) caulem habet subrusum, ro-
tundū, foliū foenigræci, in ambitu serratū: flore lutco, odo-
rato: semine in siliqua lunata, vt pictura luculenter ostēdit.

Tota

Tota etiam herba odorata est, vt hinc etiam conijcere liceat veram esse Melilotum.

LOCVS.

Germanica passim in pratis Germaniæ, montosis potissimum, nascitur. Italica in Germania, nisi sata fuerit, non prouenit. In Campania verò circa Nolam, Dioscoride teste, copiose nascitur.

TEMPVS.

Floret ferè per integram æstatem vtrunque genus. Siliquas tamen in fine Iulij & Augusto mense proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Mixtæ est facultatis: habet enim quiddam adstringens, sed & discutit & maturat: copiosior enim in ea est substantia calida quàm frigida.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Melilotus adstringendi facultatē obtinet. Mollit omnes inflammationes, præcipuè autem oculorum, vteri, sedis & testiu in passo decocta & illita. Aliquādo autem addito oui luteo assato, aut fœnigræci farina, aut lini semine, aut poliline molario, aut capitulis Papaueris, aut Intybo. Recentes meliceridas per se cum aqua, & achoras cum creta Chia, & vino aut galla illita sanat. Stomachi dolorem cum vino cocta, & cruda cum antedictis leuat. Auriū etiam dolores crudæ expressus succus, & cum passo instillatus sedat. Capitis dolorem lenit, cum passo & rosaceo inspersa.

EXPLINIO.

Melilotos oculis medetur cum lacte, aut cum lini semine. Maxillarum quoque dolores lenit, & capitis cum rosaceo: item aurium è passo, quæque in manibus intumescunt vel erumpunt. Stomachi dolores in vino decocta, vel cruda triraq;. Idem effectus est ad vuluas. Testes verò & sedē proci duam, quæque ibi sunt vitia, recens ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosaceo illinūtur ad carcinomata. Deferuescit in vino dulci. Peculiariter & cōtra meliceridas efficax.

ADNOTATIO.

Ab vtraq; tua Meliloto nostræ est diuersa, & odoris gratia nobis iucundissima, vt etiam cubicula, præsertim dum recens est, aut

K etiam

etiam dum cælum fit æstate pluvium, odore grato repleat.

De Mandragora. Cap. CCII.

NOMINA.

MΑΝΔΡΑΓΟΡΑ, ἢ ΝΕΡΚΙΑ Græcis, ἀνθρωπομορφον Pythagoræ, Latinus Canina aut terrestris malus, Officinis Mādragora, Germanis [Alraun] Gallicè Mandragore dicitur. Qui Circæam vocarunt, nomen illi à Circe fecerunt, quoniam creditur, radix eius ad amatoria conducere Pythagoras haud dubiè ab humana forma, quam radix eius referre videtur, Anthropolomorphon appellauit. Hinc sumpta occasione, agyræ & impostores illi circumforanci, radices humana effigie insignitas circūferūt, quas Mandragoras esse testantur, cum tamen constet eas esse fictitias, & manu factas ex cannarum radicibus humana specie sculptis, postea plantatis. Nascuntur autem subinde radiculæ parvæ, quæ repræsentant capillos, barbam, pectinis pilos, & ex terra cū acquirunt colorem, ut radices esse appareant. Sunt & alia multa quæ nebulous illi fabulantur, ut pecuniam ab imperitis extorqueant, quæ conuincere in præsentia nihil attinet. Terrestris malum Romani dixerunt, quod mala proferat, nec in altum ut reliquæ arbores surgat.

GENERA.

Duo Dioscoridi & Plinio Mandragoræ sunt genera. Mas candida ἢ μώρπον Græci vocant. Huius hic effigiem, citrà tamè poma, quæ habere nō potuimus, damus. Fœmina nigra, Græcis θριδάκτας à similitudine foliorum appellata. Theophrastus tamen lib. vj. de historia plantarū, cap. ij. tertium quoddam genus Mandragoræ cōstituere videtur, cuius fructus sit μίλας, καὶ ραγώδης, καὶ δινώδης τῷ χυμῷ, hoc est niger, acinosus, & sapore vinosus. Et nisi hoc genus à prioribus diuersum esse statuas, discrepare inter se non leuiter Theophrastum & Dioscoridem necesse est fatearis. Nam Dioscorides palàm asserit poma priorum duorū generum vitellis ouorum esse similia, & pallida: cōtrà Theophrastus nigra, acinosa, ut diximus, & sapore vinosa esse tradit. Accedit quod idem Theophrastus eodē loco Mandrango

dragoræ caulem tribuat, perinde atque Plinius, quem Dioscorides penitus aufert: vt hoc nomine necesse sit hæc omnia ad tertium hoc genus Mandragoræ referre, quod nos tamen infra inter Solani genera recensebimus, vbi etiam eius picturam offendes.

FORMA.

*Mandragora.*

Fœmina angustioribus & minoribus quàm Lactuca folijs est, graui ter odoratis & virosis, per terrā sparsis, iuxtaq; folia pomis vitellis oui similibus, pallidis, odoratis, in quibus semen quale pyri, radicibus magnis binisternisve, sibi inuicē implicitis, in superficie nigris, intus candidis & crassi corticis. Caulē verò non fert. Maris folia sunt magna, cādida, lata læuia vt Betæ. Mala duplò maiora quàm fœminæ, croci colore, cum aliqua grauitate odorata, quæ comedentes pastores quadā tenus soporantur. Radix supradictæ similis,

maior tamen candidiorque. Orbata & hæc est caule.

LOCVS.

Prouenit in syluis & vmbrosis locis. Nunc in hortis etiā plantatur.

TEMPERAMENTVM.

Mandragora vincentē habet facultatem refrigeratoriā, adeò vt tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen nō nihil etiam caloris inest, & in pomis humiditatis. Radicis cortex non tantum refrigerat, sed & desiccet.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Succus colligitur è cortice recentis radiceis tuso, & prælis subiecto: quem insolatam cū iam concreuerit, in fictili vase reponere oportet: Colligitur itidem è pomis succus, ignauior tamen. Delibratur radiceis cortex, & traiectus lino ad usum suspenditur. Quidam Mādragorę radiceis in vino ad tertias decoquunt, & traiectum per colum ius seruāt, vrentes cyathi vnus mensura in peruigilijs, & doloribus, & in his quos sine doloris sensu secare aut vrere voluerint. Potus obolorū duorū pondere cum multa aqua Mandragorę liquor, pituitam, nigramque bilem veratri modo purgat. Verum maiore copia potus vitam adimit. Miscetur medicamentis ocularibus, & ijs quę dolores finiunt, pēsis quoque emollientibus. Per se semioboli pondere appositus, menses & fœtus trahit. Sedi pro balano subditus somnū facit, Radix ebur emollire fertur, si senis horis cum eo decocta sit, & in quam voluerit aliquis formā fingi & formari facilem reddere. Folia recentia oculorum & quas vlcera excitarunt inflātionibus cum polenta illita profunt. Discutiunt eadem omnem duritiē, abcessus, strumas, tuberculaque, quinque aut sex diebus leniter confricata. Stigmata sine vlceratione delent. Folia condita sale seruantur in eosdem vsus. Radix autem trita ex aceto ignibus sacris, & serpentium ictibus ex melle aut oleo medetur. Strumas atque tubercula ex aqua dissicit. Articulorum dolores cum polenta sedat. Conficitur citra coctionem vinū è cortice radiceis. Ternæ heminae in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut vri debent, vt antè dictū est. Si quidē nullo tunc afficiuntur dolore, eò quod somno quodā pressi torpescāt. Mala olfactu, & comesta soporem afferūt: Potest idem & eorum succus. Nimiū tamen eorundē vsus obmutescere facit. Semen malorum potum vterū purgat, appositumque cū sulphure ignem non experto rubra fœminarū profluua sistit. Colligitur ex radice liquor, ea scarificata multifariam, & eo quod erumpit, in cauum vas recepto. Est autem liquor succo efficacior. Sed non ferūt omnibus locis liquorem radiceis, idque experientia ostendit.

EX GALENO.

Soporem conciliandi vim habent Mandragoræ poma. Radicis cortex valentissimus est: reliquum quod intus est imbecillum existit.

EX PLINIO.

Succus fit & è malis & è caule, deciso cacumine, & radice punctis aperta aut decocta: utilis hæc vel surculo. Concisa quoque in orbiculos seruatur in vino. Succus nō vbique inuenitur, sed vbi potest, circa vindemias quæritur. Odor grauis eius, sed radicis & mali grauior. Mala matura in sole siccantur. Succus ex ijs sole densatur: item radicis tussæ, vel in vino nigro ad tertias decoctæ. Folia seruantur in murijs efficacius, aliàs recentium succus pestis est: sic quoque vires noxiæ. Grauedinem afferunt etiam olfactu, quāquam mala in alijs terris mandantur, nimio tamē odore obmutescunt ignari. Potu quidē largiore etiam moriuntur. Vis somnifica pro viribus bibentium. Media potio cyathi vnus bibitur & contra serpentes, & ante sectiones punctionesque, ne sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnum odore quesisse. Bibitur & pro Elleboro duobus obolis in mulso. Ad strumas radix Mandragoræ ex aqua bibitur. Articulis profunt folia cum polenta, vel radix recens tusa cum cucumere syluestri, vel decocta in aqua. Cum cerato apostemata & vlcerata tetra, folia Mandragoræ recentia sanant. Radix vulnera cum melle aut oleo.

De Malis insanis Cap. CCIII.

NOMINA.

QVAE mala insana hodie appellantur, & à Neapolitanis Melanzana, ab alijs amoris poma, à Germanis verò [Melantzan] Gallicè *Pommes d'amours* num veteribus cognita fuerint assenerare non ausim. Non latet tamen Hermolaum in Corollario suo in ea esse sententia, vt putet esse tertiam Mandragoræ speciem, quam Morion vocant. Quam tamen sententiam cur non probem, facit imprimis Theophrastus, qui lib. vj. de historia stirpiū cap. ij. eius fructum esse nigrum, acinosumque scribit, qualia mala insana

na non sunt. Dein quòd Morij fructus lethalis sit: mala verò infana minimè, vt paulò pòst dicemus. Mala autem infana dicta sunt, non quòd lethalia sint, sed quòd difficulter concoquantur. Amoris autem poma. quòd propter elegantiam & pulchritudinem digna sint quæ amentur.

GENERA.

Duo sunt malorum insanorum genera. Aliqua enim purpurea ferè tota, aliqua verò lutea, aut candorem aliquem præ se ferentia. Primi generis poma Germanicè [Braun melanzân.] Alterius autem. [geel Melanzan] vocatur.

FORMA.



Mala infana.

Mala infana in frutice nascuntur, qui Persona tiâ propemodùm caule & folijs refert. Differunt autem huius folia à Personatiq. quòd longiora, magisquelacinata sint. Flores habet purpureos speciosos, sex folijs è calathostellatim radiatis. Fructus oblongi mali forma & magnitudine, in quibus semè siliquaastro non dissimile. Radicem multis capillatam fibris luteamque.

LOCVS.

In hortis apud nos feruntur, sed frequenter in fictilibus & pensilibus fenestrarum hortis. Et eodem cultu quo cu-

cumeres & melones gaudent.

TEMPVS.

Floret Augusto & Septembre mensibus, ac subinde fructum

ctum profert.

TEMPERAMENTVM.

In his malis haud dubiè vt in cucumere esculéto aut fungo, frigida humida temperies superat.

VIRE S.

Nullum, quod sciam, in medicina vsum habét. Eduntur autem à nonnullis ex oleo, sale & piperè fungorum modo cocta. Alij vbi paululum inferbuerūt igni, in orbiculos vel talcolas digerunt, & in acetarijs ex oleo, vel pipere & aceto comedunt. Salgamarij in muria acida seruât, cibo per hycmem & ver ori grato, sed tamen qui ægrius concoquatur. Quid multa? Delicatorum & omnia degustare volentium cibus est malum insanum. Quare qui sanitatis studio aliquo tenentur, ij statim nomine ipso territi, vsum illorum cuitabunt.

ADNOTATIO.

Poma amoris etiam hodie vulgò dicuntur mala hæc insana.

De Nymphæa. Cap. CCIIII.

NOMINA.

NΥμφæα Græcis, Nymphæa Latinis, Officinis Nenuphar barbara voce nominatur. Germanis [Seebluõ, Vvasser mahen] Gallicè *Blanc d'eau, ou Iauuet d'eau, ou Lis d'estang*. Nymphææ autem nomen sibi vindicasse videtur, quòd aquosa amet loca: vel, vt ex veteribus aliqui fabulari sunt, à Nympha, quæ zelotypia Herculis intrabit & mortua est, inq; palustrem hanc plantam mutata.

GENERA.

Duo eius genera. Vna enim à flore candido, Lilij simili, candida appellatur. Germanicæ [Vveisz Seebluomen.] Altera itidem à floribus, qui lutei sunt, lutea nominatur. Germanicè [geel Seebluomen.] Possent etiam radicibus discerni, cum prior nigra, altera verò candida constet, adèd vt hoc nomine prima candida, altera autè nigra diceretur. Multò verò consultius est à floribus quàm radice discriminare, quòd illi nunquam non oculis expositi sint, radices autem non nisi effossæ, intueri possint.



Nymphaea candida.



Nymphaea lutea.

Prima, folia Ciborio similia habet, minora tamen & longiora, quadamtenus super aquam eminentia, aliqua tamen etiam sub aquis, plura ab vna radice prodeuntia. Flos candidus, Lilio similis, in medio quod croceum sit obtinens. Hic cum defloruerit rotundus, & malo circumferentia, aut Papaueris capiti similis, colore niger fit. In quo sane semen clauditur nigrum, latum, densum, gustu glutinosum. Caulis illi laevis, minime crassus, niger, Aegyptiae fabae similis. Radix nigra, aspera, clauae persimilis. Haec singulae notae alteri Nenuphari vocato quadrant. Folio enim conspicitur orbiculato, laevi, herbaceo, amplo, in stagnantibus aquis supernatante: flore candido, Lilio simili, in medio croceum habente, & cum defloruerit capite Papaueris, in quo semen latum, amarum, pingue. Caulis gracilis est & laevis. Radix nigra & ampla, dulcis,

cis, nodosa, clauæ formam repræsentās. Altera, folia antedictæ similia habet, sed radicem albam & asperam: florem luteum, splendētem, rosæ similem. Quæ itidem notæ in vniuersum omnes alteri Nenuphari, quæ luteis est floribus, respondent.

LOCVS.

Nascitur in paludibus & aquis stagnantibus.

TEMPVS.

Flores in fine Maij & Iunio mense colliguntur, Radices autem in autumno effodiuntur.

TEMPERAMENTVM.

Nymphææ tum radix, tum semen refrigerandi & citra morsum desiccandi vim obtinent.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Radix prioris sicca cum vino pota, cæliacis & dysentericis prodest. Lienē absumit. Stomachi vesicæque doloribus illinitur. Alphos ex aqua exterit. Alopecias cum pice imposita sanat. Eadem contra veneris insomnia bibitur, siquidē ea compefcit. Paucis diebus, si quis continuò bibat, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Alterius, quæ lutea dicitur, radix & semen contra muliebria profluvia ex vino nigro bibuntur.

EXGALENO.

Nymphææ radix & semen, ventris profluvia cohibent, semēq; genitale, siue per somnia, siue alio pacto immodicē profluēs, retinēt. Iuuāt dysentericos. Cæterū Nymphæa quæ candidam radicem habet, potentioris est facultatis, vt & muliebri profluvio medeatur. Verū & hæc, & ea quoq; quæ atram habet radicem, ex vino nigro austero bibitur. Porro nonnullam etiam abstergendi vim obtinent, ita vt alphos & alopecias sanēt. Ad alphos verò macerātur aqua ad alopecias pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

EX THEOPHRASTO.

Nymphæa trita plagæ imposita sanguinem sistere traditur. Vtilis & ad difficultates intestinorum pota.

EX PLINIO.

Venerem in totū adimit Nymphæa, semel in quadragin

K v t a d i

ta dies pota. Infomnia quoq; Veneris à ieiuno pota, & in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inlubet non solùm venerem, sed effluentiam genituræ: ob id corpus alere, vocémque dicitur. Semen cum vino potum dysentericis auxilio est. Teneſino radix eiused ex vino bibitur. In vino quoq; pota lienem cōsumit. Dolores vesicæ sedat ex vino. Manantia sanat vlcera. Maculas omnes emendat Trita plagi imponitur. Vlceribus, priuatim ijs quæ calceamento facta sunt, prodest arida infricata.

De Napy.

Cap. CCV.

NOMINA.

NΑΠΗ, ἢ σΙΝΑΠΙ Græcè, Sinapis & Sinapi Latinè vocatur. Officinæ nomen retinuerunt. Perperam tamen faciunt, quòd altero genere pro Eruca, quam suo loco depinximus, vtuntur. Germanicè [zam oder Gartensenff] Gallicè *Senene ou Moustarde* nominatur. Sinapis autè nomē ē Græcia venit in Latium, censētq; dictum Athenæus libro nono Dypnosoph. Sinapi, δτι σινιτι τὸς ἀπὸς ἐν τῇ ἰδμῇ, hoc est, quòd olfactum luminibus officiat. Plærāq; Græcia Napy nominat quasi Naphy, vt idem eodem in loco interpretatur, quoniam non sine natura sit, sed acri & proinde incommoda donetur. Alij Napy per prinationem videlicet *νιπιον*, quasi immitte dici volunt, quoniam acrimoniæ vehementis particeps sit.

GENERA.

Sinapis duo inueniuntur genera, folijs, floribus, & semine distantia. Primum siquidem genus rapitiam frondē exprimit, florémque luteum obtinet, ac semen album profert. Nos floribus luteis Germanicè [geelen Gartensenff] nominauimus. Alterū in Erucae solum laciniatur, floréq; albicante, & semine vesco pullòq; constat. Nos genus hoc ab albicantibus floribus [Vveissen Gartensenff] appellauimus, vt esset huius aliqua ab Erucae nomenclatura diuersitas, quam Germani simpliciter [Vveissen Senff] vocant.

FOR

*Sinapi primum genus**Sinapi alterum genus.*

Primum, caulem habet hirsutum, longum, ramosum, folia rapi, minora tamen & asperiora, flores luteos, siliquas rotundas ac hirsutas, plenas semine candicante. Alterum genus itidem hirsuto caule præditum est minore tamen: folijs Erucæ, maioribus tamen ac latioribus laciniatis: floribus albicantibus, crucisque effigiem referentibus: siliquis teretibus & oblongis, semine pullo rufescente ve refertis.

LOCVS.

Vtrunque in hortis satum prouenit. Et quanuis nullo cultu plerunque germinet, terram tamen aratam & congestitiam magis amat.

TEMPVS.

Floret vtrunque Iunio ac Iulio mensibus, eodemque tempore semina in siliquis suis profert.

TEM

uersionem suffitum excitat odore aceto mixto. Item lethargicos: & si vehementior somnus lethargicos premat, cruribus aut etiam capiti illinitur cum fico & aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, coxendicum, humerorum, & in quacūque parte corporis ex alto vitia extrahenda sunt, illitum: caustica vi emendat pustulas faciendo. At in magna duritia sine fico impositū: vel si vehementior virgo timeatur, per duplices pannos. Vtuntur ad alopecias cum rubrica, & foras, lepras, phthiriasēs, tetanicos, opisthotonicos. In ungunt quoque scabras genas, aut caligantes oculos cum melle. Succusque tribus modis exprimitur in fictili, calefcitque in eo in sole modicè. Exit & è cauliculo succus lacteus, qui ita cūm induruit, dentiū, dolori medetur. Semen ac radix cum inmaduere musto, conteruntur, manusque, plenę mensura sorbentur ad firmandas fauces, stomachum oculos, caput, sensusque omnes. Mulierum etiam lassitudines, saluberrimo medicinę genere. Calculos quoque discutit potum ex aceto. Illinitur & liuoribus sugillatisque cum melle & adipe anserino, aut cera Cypria. Fit & oleum ex semine madefacto in oleo expressoq; quo vtuntur ad nerorum rigores, lumborumque & coxendicum perfrictiones.

EX SIMEONE SETHI.

Sinapi vim habet dissoluendi & discutiendi humiditates quę in capite & stomacho sunt. Confert etiam lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita cōtracti sunt: ad hęc & podagris à pituita factis. Officit verò visui: & calido capiti: ac iecori. Adiuuat concoctionem & distributionem ciborū crassarum partium. Minuit quę in ventriculo sunt humiditates. Illitū lepris, eas in melius mutat. Linguas etiam humiditate gauatas siccat. Si cum melle sumatur, tussēs resoluit. Cum caricis verò ischiadicis illitum, & lienosis vtile est: trahit enim quę intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum verò & insensum, serpentes fugat.

De Nerio.

Cap. CCVI.

NO

NOMINA.

Nηριον, η ροδονδενον, η ροδονδισος Græcis Nerion & Rhododendron Latinis, Officinis & barbaris Oleander, Germanis[olander] Gallis *Rosage*, ou *Rosagine* dicitur. Rhodaphnem autem Græci dixerunt à rosæ floribus & lauri folijs, quæ fruticis huius præcipuæ sunt notæ. Nec refert quod Dioscorides amygdalæ folijs eius folia cõparauerit: lauro enim & amygdalæ non dissimilis magnopere foliorum figura est. Fecit idem rosæ flos & arbor, vt eadem gens Rhododendrum nominauerit.

FORMA.



Nerium.

Notus frutex, amygdalæ longiora & crassiora folia habens, florem rosarum figura: fructû amygdalæ similem, veluti cornu, qui dehiscens lanca natura plenus est pappis acanthinis simili. Radix illi est acuminata, longa, lignosa, gustanti salia.

LOCVS.

Nascitur in hortis, maritimis, & secundum amnes locis.

TEMPVS.

Quo mense floribus & fructu prægnans sit Nerion, non satis constat:

neque enim vel flores vel fructus eius nobis videre licuit. . Hinc est quod etiam pictura quam exhibemus iisdem careat.

TEMPERAMENTVM.

Nerium Arabes calefacere in principio tertij ordinis, & in se

in secundo ficcare tradunt.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Flores & folia canes, asinos, mulos & quadrupedes plurimos enecant: hominum verò cum vino pota contra venenatorum morsus præsidia salutaria sunt, præsertim si rutæ commiscueris. Infirmiora verò animantia, vt oues, caprasque, si aquam biberint in qua folia eius maduerint, moriuntur.

EX GALENO.

Neriū aut Rhododaphne notus omnibus est frutex. Foris quidem illitus discutiendi vim obtinet. Intrò autem in corpus assumptus, perniciosus ac venenosus non tantum hominibus, verum etiam plerisque pecudibus

EX PLINIO.

Rhododendros ne nomen quidem apud nos inuenit Latinum: Rhododaphnem vocant, aut Nerium. Mirum, folia eius quadrupedum venenum esse, homini verò contra serpentes præsidium, ruta addita, & è vino pota. Pectus etiam & capræ si aquam biberint in qua folia ea maduerint, mori dicuntur.

De Xanthio. Cap. CCVII.

NOMINA.

Ξανθιον, ἢ φέσγανον Græcè, Xanthium Latinè nomina tur. Ab herbarijs nostræ tempestatis Lappa minor & Lappa inuersa vocatur. Germanicè [Betlers leusz, oder Buobeleusz.] Xanthion dictū, quòd ξανθίος, hoc est, flauos capillos faciat. Gallicè *Gratteron tenant aux robbes*, Bardana minor. Officinis.

FORMA.

Caulem habet cubitalem, pinguem, angulosum, & in ipso alas multas. Folia Atriplici similia, incisuras habentia: odore Nasturtij. Fructum rotundum ceu grandem oliuā, aculeatam vt Platani pila, contactu vestibis adhærentem. Ex qua quidem delineatione nemo non videt herbā cuius picturam damus esse Xanthion, quòd illi omnes notæ ad amussim respondeāt. Caule enim est cubitali, pingui, anguloso, crebras fundente alas, folijs Atriplicis incisuras habentibus

tibus, Nasturtiū manifestissimè olentibus, fructu magnæ oliuæ modo rotundo, vt Platani pila spinoso, contractu vestes apprehendente. Nucleus qui in echinata pilula clauditur à pueris estur dulci & grato cibo.

LOCVS.

Nascitur lætis & pinguibus locis, & lacubus paludibúsve exiccatis.

TEMPVS.

Fructus Autumno maturescit, quo sanè tempore colligi debet.

TEMPERAMENTVM.

Cùm discutiendi vires habeat, facilè colligitur temperamento esse calido & sicco præditum, id quod ex sapore etiam, qui est amarus & subacris, deprehendi potest.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Potest fructus antequam penitus inarescat collectus, tusus, & in fictili vase reconditus, capillos flauos reddere, si quis cum vsus exigit, tryblii pondus ex eo sumès, tepidâque aqua madefaciès, nitro priùs capite præparato illinat. Alij cum vino tustum iptum reponunt. Fructus etiam cōmodè tumoribus illinitur.

EX GALENO.

Xanthion vocatur etiam Phàsganion. Fructus discutiendi facultatem obtinet.

ADNOTATIO.

Xanthium ad portam Antoninam frequens, cancrorum ardori extinguendo efficax.

De Xylo.

Cap. CCVIII.

NOMINA.

XYLON & Gossipium Plinio & alijs Latinis dicitur. Græci, quod sciam, eius nusquā meminerūt. Barbaris ac Arabibus Cotum & Bombax seu Bombasum, Germanis [Baumvuoll] Gallis *Coton* appellatur. Linum eius cotonium vulgò vocatur, sicut lanugo ipsa cottonum. Ab huius generis planta vestes xylinae, & lina xylina nominata sunt. Iurisconsulti lanam hanc lineam nuncupant.

FOR

FORMA.

*Xylon.*

Frutex est exiguus, folio vitium, sed minore: floribus luteis in medio purpurascetibus, fructu baibate nuci simili, lanugine pleno, quæ ne tur in lignum candidissimum mollissimumque. Nux autem ipsa cum harescens fatiscit, lanuginis globos repræsentat.

LOCVS.

Superior pars Aegypti in Arabiam vergens, Plinio lib. xix. capite primo teste, fruticem hunc gignit. In Creta etiam nascitur, & in Apulia, ac Maltha prope Siciliam insula. Nunc in Germania nostræ hortis plantatur, ut plurima alia pere-

grina, nobis antea prorsus incognita.

TEMPVS.

Tam fertilis hic frutex est, ut simulatque adoleuit, quod duorum mensium spacio accidit, nunquam desinat florem & fructum proferre, donec asperitate & inclementia hyemis impediatur.

TEMPERAMENTVM.

Arabes, ut annotauit Serapion, fruticis huius lanugine calidam & humidam esse statuunt.

VIRESEX ARABIBVS.

Foliorum succus medetur infantium alui profluuiio atque torminibus. Semen, tussi & thoracis vitij. Oleo seminis

L emacu

emaculantur lentigines & faciei pustulæ. Semen etiã eius
genitale semen procreat.

De Oxyacantha. Cap. CCIX.

NOMINA.

Oξυανθα Græcis, Oxyacantha Latinis, Officinis Berberis, Germanis [Paisselbeer, Saurich, Erbsel, Versich,] Gallis Espinette, Vinette, ou Berberis, ou Fusiet vocatur. Haud dubiè Græci à spinarũ acuminatis cuspidibus Oxyacantham dixerunt.

FORMA.



Oxyacantha.

do & subaustero, duobus intus granis, radice numerosa.

LOCVS.

Multis nascitur locis, syluis nempe, frutetis, campestribus

Sylvestri pyro similis arbor est, sed minor & nimis spinosa. Fructum fert Myrto similem, plenum confertumve, rubentem, fractu facilem, intus nucleos habentem. Radicem multifidam & altã. Huins delineationis notæ, nulla prorsus reclamante, arbori quam vulgò Berberim barbaræ voce nominant, ad amussim respondent. Nanq; arbuscula est pyri sylvestris aspectu, sed humilior, ramis ex interuallo spinosis, folio lentè per ambitum aculeato, acinis rubentibus, in pediculo iuxta & racemo pendulis, gustu aci-

bus, montanis, siccis & aquosis.

TEMPVS.

Germinat incunte vere, ab occasu autem Vergiliarū fructifera. Per Septembrem itaque ac Octobrem menses carpitur, campos sylvasque exornans.

TEMPERAMENTVM.

Oxyacantha adstringit & desiccatur, atque adeo quorundam sententia frigida & sicca in secundo est ordine. Fructus tamen tenuium est parrium, & paululum quiddam incisium habet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius fructus potius & comestus,alui profluuiū & muliebrem fluxum sistit. Radix trita & illita aculeos & spicula extrahit. Abortum facere tradunt, si sensim venter ter ra dice feriatur aut perungatur.

EX GALENO.

Oxyacanthus arbor ut pyro sylvestri similem habet speciem, ita & facultates minimè dissimiles. Quin & ipsi fructus. Pyri quidem sylvestris prorsum atque absolute austerus est, Oxyacanthus autem tenuium partium est, & modicè incidit. Porro arboris huius fructus, pyri sylvestris similis non est, sed Myrti potius fructui, rubens scilicet & rarus. Habet verò & nucleos. Cæterum non tantum esus, sed & bibitus omnes fluxionum affectus cohibet atque sistit.

EX RECENTIORIBVS.

E baccis vinum exprimitur eodem ferè vsu, quo vinum ex malo punico. Condiuntur item acini vel melle vel saccharo ad restringendam sitim, depellendamque febrecitantium malaciam, quorum morosum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit. E languescens appetentia grato huius acore recreatur.

De Osyride. Cap. CCX


NOMINA.

Osyris Græcis, Osyris Latinis, Officinis Linaria, nonnullis herba vrnalis appellatur. Germanicè [Flachsakraut, Lynkraut, Harnekraut, Vnser fravnen

L ij flachs

fläschz V vildefläch, Krotenschlächz, Nabelkraut] Gallicè
Liniaune saunage, Linariam autem dixerunt recentiores à
 folijs quæ lini faciem referre videntur.

FORMA.



Osyris siue Linaria.

Virgultum fermen-
 tumve nigrum est Osy-
 ris, tenues virgas lentas-
 que habes. In quibus fo-
 liola sunt terna & qua-
 terna, modò quina, inte-
 rim & sena, ceu Lini ni-
 gra initio, dein colore
 mutato subrubescencia
 Iam si rem diligèter ex-
 pendas, nullam delinea-
 tionis notam Osyridi
 traditam, in Linaria di-
 cta hodie deesse reperies.
 Siquidem hæc cauliculis
 fruticat nigricantibus,
 & qui ob suum lentorè
 haud facile franguntur:
 tenuibus, atris quoque
 folijs, Lini facie. Conco-
 lori denique semine tã-
 tilper dum maturescit,

postquam ematuruit rubescence. Senescentes quoque ramu-
 li nigritiã in ruborem vertût. His accedit antiqui & manu-
 scripti herbarij testimonium, qui Linariam esse herbam tra-
 dit, quæ Dioscoridi Osyris dicitur, floremque habere luteû
 inquit. Respondet etiam per omnia pictura.

LOCVS.

Passim in campestribus prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate tota & autumnò.

TEMPERAMENTVM.

Osyridi amara inest qualitas, & obstructions aperiendi,
 adco

adeóq; vt calida sit necesse est. Amara nanque, Galeno lib. iiii. cap. x. de simpli. medica. faculta. teste, qualitate prædicta, omniã calida sunt. Sic etiam eodem authore lib. v. cap. xj. eiusdem tractationis, singula quæ potos & meatus expurgant, ab infractúque liberant medicamenta, calida sunt & tenuium partium. Vehementer itaque errant, qui Linariam frigidam & humidam esse asserunt. Et certè præter ea quæ iam dicta sunt, vel hoc vno argumêto erroneam illorum sententiam confutare omnium maximè licebit. Cùm etenim Linariæ vrinam mouendi facultatem inesse scribât vulgares etiam herbarij, colligitur illam non esse frigidam & humidam: quando Galeno libro iam citato cap. xj. attestante omnia quæ vrinam ducunt ex acriumarque adeò calidorum & siccorum sint genere.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius decoctum potum morbo regio affectos iuuat.

EX GALENO.

Osyridi, ex qua medicamenta ad exterendam læuigandamq; cutem, Græci κορμιατα vocât, fieri solent, amara inest qualitas, & obstructions expediendi facultas, quare & in iccinore consistentes obstructions adiuuat.

ADDITIO.

Κορμιατα enim non solum scopas, vt quidam arbitratur, verum etiam κισμητρα, Suida & Phauorino testibus, hoc est comptoria & venustantia faciem medicamenta Græci dixerunt: è quorum sanè numero Osyris est, quæ cum amara sit, extergere etiam quæ sunt in corpore, facie potissimum, maculas potest. Hinc rectè Plinius ex eius folijs mulieribus (vtpote quæ plus alijs comere & venustare faciem solent) smegmata fieri tradit.

EX AETIO.

Osyris est herba subfruticosa, tenuibus virgulis, fractioni renitentibus, folijs Lino similibus, nigris primò, postea subrubescens, gustu amaris: vnde regio morbo conserunt.

EX PLINIO.

Smegmata mulieribus ex Osyridis folijs faciunt. Radi-

L iij cum

cum decoctum potum, sanat arquatos. Eadem, priusquam maturefcit fermen, concisæ, & sole siccata, alium sistunt. Post maturitatem verò collectæ, & in sorbitione decoctæ, rheumatismis ventris medentur & per se trita ex aqua caelesti bibuntur.

De Origano. Cap. CCXI.

NOMINA.


O *Πύρον* Græcis, Origanus vel Origanum Latinis, Officinis nomen suum retinuit, Germanis [Vvolgemnot, Dasten, Braundosten,] vel [Bergmuntz,] Gallis *Origan*, *Mariolaine bastarde* nominatur. Origanum verò quod mōtibus gaudeat appellationem apud Græcos inuenit, ἀπὸ τῆς *ἱερᾶς*, id est, monte, & χαρᾶς, gaudio. Herodianus quod visum exacuat nomen duxisse testatur, ab ἱερᾷ videre, & γὰρ clarifeco, quasi aciem oculorum illustrans. Theodorus grammaticus nomen ex aduerso datum putat, ἀπὸ *ῥιζῶς*, quod est algeo, fieri *ῥιζανον*, quasi rigens, censet, & tandem ascita litera principe, o, in Origanum esse confictum, contrario tamen sensu, quod minime refrigeret.

GENERA.

Origani genera seu rectius cognomina quatuor esse cōstat. Est enim Heracleoticum, Onitis, Tragoriganū, & sylvestre. Primum ab Heraclea Ponti dictum, cætera à pecoribus cognomina desumpserunt. Onitis, quod ab a sinis im peteretur, ac in cibo gratum esset. Tragoriganum, quasi hircinum Origanum, non alia forsitan ratione quàm quod eius pabuli voluptate animal hoc carperetur. Sylvestre, quod sine cultura, & sua sponte proueniat, cognominatū fuit. Cæterum quum in tanta cūm nomenclationum, tum historię ambiguitate varietateque, tam Græcorū quàm Latinorum nō facile sit quidquam in solidum de his statuere: satis sit vnum genus, sylvestre nimirum & vulgare, pro omnibus pictum exhibere, quod, vt Paulus ait, vtcūque nominibus distinguatur, vna tamen omnium sit facultas, adeoque in re admodum incerta, multum operæ aut laboris temere insumere minime necessarium putavi.

FOR

FORMA.



Origanum vulgare fruticulus est, tam folijs quàm ramis Serpyllo syluestri similis, comante supra cacumen umbella, in qua flores haud secus quàm in Serpyllo in albo pupurei, odore iucundo præditi emicant. Ex qua sanè delineatione satis liquet, *Origanum* hoc vulgare, *Tragoriganum*, vel saltem eiusdem speciem quandam esse, quòd hoc vt Dioscorides refert, folijs & ramulis syluestri Serpyllo simile existat.

LOCVS.

Origanum syluestre seu vulgare. Montibus cliuosisque locis gaudet *Origanum* nostrum, passimque in his propter sepes nascitur.

TEMPVS.

Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Omnes *Origani* species, Galeno & Paulo testibus, calefaciunt & exsiccant in tertio ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Heracleoticum excalescit, vnde decoctum eius cum vino potum venenatorum moribus prodest: cum passo autè ijs qui cicutam, aut meconium: cum oxymelite ijs qui gypsum aut ephemerum hauserunt. Ruptis, conuulsis, hydro picis cum fico manditur. Aridum acetabuli mensura potù

L iiij cum

cum aqua mulsa, atros humores per aluum ducit, mensesq; ciet. Linctum ex melle tussibus medetur. Prurigines itidē scabies, regiumque morbum, decoctum eius cum in balnea descensum est, iuuat. Succus eiusdem adhuc virentis, tonsillas, columellas: orisque vlcera sanat. Per nares cum oleo irino infusus trahit. Cum lacte aurium dolores mitigat. Conficitur ex eo & cepis, & rhu opsoniorum vomitorium medicamentum, omnibus ijs in ære Cyprio sub Canis ardenti æstu per quadraginta dies insolatis. Herba verò substrata serpentes fugat. Onitis eadem quæ Heracleoticum Origanum præstat, nō tamen eadem efficacia. Sylvestre priuatim folijs & floribus cum vino potis, venenatorum moribus auxiliatur. Omnia autem Tragorigani genera calefaciūt, vrinam mouent, bonam faciunt aluum, si decoctum eius bibatur: biliosa enim deiciunt. Lienosis cum aceto pota vtilia: cū vino autē his qui Ixiam hauserūt. Menses ducūt. Tussientibus, peripneumonicis, ex melle in celegmate dantur. Est & efficax potio, quare cibum fastidientibus, & stomacho male affectis, & acida ructantibus datur. Item ijs quibus † a maris iactatione nausea, & hypochondriorum calor excitatur. Oedemata cum polenta illita discutiant.

† *Alias repletioe.*

EX GALENO.

Origanus Heracleotica efficacior est Onitide. Sylvestris verò vtraq; valentior. Omnes autem incidendi, extenuandi & calfaciendi facultatem obtinent. Tragoriganus quipiam etiam adstrictionis assumpsit.

EX PLINIO.

Origani priuatim vsus contra torsiones stomachi in tepida aqua, & cruditates. Cōtra araneos scorpionésq; in vino albo. Luxata & contusa in aceto & oleo & lana. Tragoriganum vrinā ciet, tumores discutit, cōtra viscum potum viperæq; ictum efficacissimum, stomachoque acida ructanti & præcordijs. Tussientibus quoque cum melle datur, & pleuriticis, & peripneumonicis. Heraclum serpētes fugat. Percussis esui datur decoctū, Potu vrinam ciet. Ruptis, cōnulsis medetur cum Panacis radice. Hydropicis cū fico, aut cum hyssopo, acetabuli mensuris decoctum ad sextā. Item scab

ſcabiem, pruriginem, pſoras, in deſcenſione balnearũ. Suc-
cus auribus infunditur cum lacte mulieris. Tonſillis quoq;
& vuis medetur. Capitis vlceribus. Venena opij & gypſi
extinguit decoctum, ſi cũ cinere & vino bibatur. Aluum
mollit acetabuli mẽſura, Sugillatis illinitur. Item dentium
dolori, quibus etiã & candorem facit cũ melle & nitro, San-
guinem narium ſiſtit. Ad parotidas decoquitur cum hor-
deacea farina. Ad arterias aſperas cũ galla & melle teritur.
Ad lienem folia cum melle & ſale. Craſſiores pituitas &
nigras extenuat coctum cũ aceto & ſale ſumptũ paulatim.
Regio morbo tritum cum oleo in nares infunditur. Laſſi
perungũtur ex eo, ita vt ne venter attingatur. Epinyctidas
cum pice ſanat. Furunculos aperit cum fico trita. Strumas
cum oleo & aceto & farina hordeacea. Lateris dolores cum
fico illinitum. Fluxiones ſanguinis in genitalibus tuſum ex
aceto illitum. Reliquias purgationum à partu.

De Orchi.

Cap. CCXII.

NOMINA.

Oρχις ἡ κανὴς ὀρχις Græcis, Orchis & Cynosorchis La-
tinis, Teſticulus canis officinis. Germanis [Knaben-
kraut,] Gallis *Satyrium* ou *Couillon de chien* vocatur. Orchis
dicta hæc herba eſt, quòd radices ſibi inuicem haud ſecus
atque duo teſticulari cohæreant. Cynosorchis verò, quòd
canum teſticulari ſimilem radicem habeat.

GENERA.

Orcheos duo eſſe genera animaduertimus, marem nimi-
rum & fœminã. Mas in vniuerſum maior quam fœmina
proceriôrque eſt, vt pictura ipſa pulchrè declarat. Eſtque duo-
rum generum. Vnum latioribus folijs & candidãtibus ſerè
floribus, quod Orchin marem latifoliam vocauimus. Alte-
rũ quod anguſtioribus folijs, & maculoſis magis floribũſque
purpureis conſtat. Nos maioris discriminis rationem ha-
bentes, Orchin marem anguſtifoliam nuncupauimus. Fœ-
mina itidem duorum eſt generum: vna enima maior, altera
minor eſt, vt pictura ſatis demonſtrat.

L v FOR

*Orchis mas latifolia.**Orchis mas angustifolia.*

Folia habet circa caulem & ima eius parte per terram strata, oleæ molli similia, angustiora tamen, læuia & longiora: Caulem dodrantali altitudine, in quo pupurei flores. Radicem bulbo similem, oblongam, duplicem, in modum oliuæ angustam, superiorem alteram, inferiorem alteram: & hanc quidem mollem ac rugosam: illam verò plenam.

LOCVS.

Nascitur locis, Dioscoride autore, petrosis & arenosis. In Germaniâ certè nostra in hortis & pratis, locisque sabulosis copiosè prouenit.

TEMPVS.

In Maio & Iunij principio carpitur.

TEM

*Orchis fœmina maior.**Orchis fœmina minor.*

TEMPERAMENTVM.

Radix eius maior calida & humida est, gustantibusque dulcior esse apparet. Minor admodum elaborata est, ad calidius sicciusque tendit.

VIR EX DIOSCORIDE.

Radix editur vt bulbus cocta. Fertur de ea, si maiorem e dāt viri, mares generari, minorem verò fœminæ, fœminas. Addunt etiam in Thessalia mulieres paruam cum capri- no lacte bibendam dare, vt ad venerea excitent: aridam ve- rò ad inhibenda atque dissipanda. Alterum etiam alterius potu resolui.

EX GALENO.

Radix maior Orchios multam videtur habere humi- ditatē excrementitiā & flatuosam: quapropter pota Vene- rem

rem excitat. Altera verò, minor videlicet, cōtrā non modò non stimulat ad coitum, sed planè cohibet ac reprimat. Eduntur bulborum more assæ.

EX PLINIO.

Tumores & vitia partium earum erumpentia, cū polenta illita radix sedat, vel per se trita. Eadem ex lacte ouillo neruos intendit, & ex aqua remittit.

De Orchis serapiade. Cap. CCXIII.

NOMINA.

Oρχις σεράπιας ἢ τριόρχις, Paulo & Actio testibus, Græcis dicitur. Orchis siue testiculus, Serapias Latinis. Officinæ eius cognitionem non habent: Germanicè [Rag vuurtz.] Gallicè *Satyrium à trois couillōs* dicitur. Serapias autem ab Andrea medico ob multos radicis vsus, vt inquit Dioscorides, appellata est. Sunt qui à Sarapi Alexandrinorum deo nominatum velint, ppter lasciuiam impudentē, qua is deus Canopi (vbi templum & cultu & religione excellens habebat) colebatur de quo Strabo in xvij. suæ Geographiæ libro. Triorchis verò, manifesto ex ea appellatione argumento, quòd non duabus, sed tribus testiculatis radicibus in terra nitatur. Qua vna quidem re facilè à prioribus discriminatur Orchibus.

GENERA.

Duo esse Orchis, Serapiadis, seu Triorchis, genera, res ipsa satis mōstrat. Est enim in folijs ac radicibus nihil aut parū discriminis habeant, tamen in floribus manifestè differre videntur. Nam alterū genus q̃ nos marem vocauimus, floribus constat purpureis, & parum per albicantibus. Alterum verò, quòd nos, vt certius à priori discerneret, fœminā nominauimus, flores obtrinet diuersis coloribus distinctos purpureo videlicet, candido, viridi ac nigricante, inferioreque parte fuci planè effigiem exhibent.

FORMA.

Folia habet Porro similia, oblonga, latiora & pinguis, in alarum cauis inflexa. Cauliculos dodrantes, subpurpureos flores. Radicem minimis testiculis similem.

*Triorchis Serapius mas.**Triorchis Fœmina.*

LOCVS.

Prouenit in pratis & campestribus.

TEMPVS.

In fine Maij mensis & initio Iunij hoc genus apparet,
dein nusquam inueniri potest.

TEMPERAMENTVM.

Valentiùs quàm primo ordine exiccat.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix illita tumores disijciendi vim obtinet, atque vlce-
ra expurgat. Herpetas cohibet. Fistulas abolet, inflàmatio-
ne laborantia illita mitigat. Sicca nomas compescit, vlcera-
que putrescentia & maligna oris sanat. Cum vino pota al-
uum sistit. Feruntur de hac etiam quæcunque Cynosor-
che dicta sunt.

EX

EX GALENO.

Orchis Scrapias ad Venerem non similiter accommodus est. Oedemata illitus discutit, & vlcera fordida purgat. & herpes sanat. Siccatus multò magis desiccatur, adeò vt & putrescentia contumaciaque vlcera sanat. Habet etiã quidpiam subadstringens, ac proinde ventrem in vino potus sistit.

EX PLINIO.

Eius radices sanant oris vlcera, thoracis pituitas, aluum sistunt è vino potæ.

De Oenanthæ. Cap. CCXIII.

NOMINA.

O *Ἰνάνθη ἢ Ἀτόκανθος* Græcis, Oenante Latinis Filipendula Officinis, & Saxifraga rubea, Germanis [Rot Sieinbrech] Gallis *Filipende ou perce pierre rouge* nominatur.

Oenanthæ autem dicta haud dubiè est quòd cū vino floreat. Leucantho verò à florum quos producit candore. Filipendulam à numerosis illis & rotundis in radice capitibus tuberibusve, quæ quasi ex filo quodam pendere videntur, appellatam esse constat.

*Oenanthë.*

FORMA.

Folia Pastinacæ sylvestris habet, flores candidos, caulem crassum, dodrantalem, sēmen Attriplicis, radicē magnā multa

multa habentem capita rotunda. Ex qua descriptione palam apparet. Oenanthen eam esse herbam, quam ætas nostra Filipendulam vocat, quòd nulla prorsus sit nota, quæ illi non conueniat. Folijs enim Pastinacæ erraticæ est, quæ planè eius herbæ quæ vulgò Petroselinon hodie appellatur folijs similia sunt. Hinc est quòd in vulgaribus herbarijs scribatur folia Petroselino similia habere, quâuis Staphylino legendum esse putem. Manuscriptus etiam herbarius Filipêdulam folia Dauci agrestis habere tradit. Flores deniq; illi albi, caulis crassus, dodrantalis, Atriplicis semen. Radices quoq; multa, quinq; interdum aut sex, nonnunq; etiam plura capita rotunda, tanquam à filo pendentia, vt ait antiquus herbarius, habêtes: ita vt hinc esse Oenanthen abundè constet. Sed demus non esse, nihil tamen inde periculi erit, quòd scilicet Oenanthe easdem quas Filipendula (sicut ex paulò pòst dicendis patebit) facultates obtinet.

LOCVS.

Nascitur in petris & montibus asperis. Tubingæ certè in monte Austriaco nominato copiosissimè prouenit, & in sylua non procul ab arce eius oppidi distante.

TEMPVS.

Iunio mense floret, quo sanè tempore, quia facilè ex floribus agnoscitur, carpi potest. Radices tamè inter autumnii initia colligendæ erunt.

TEMPERAMENTVM.

Amara admodum est Filipêdula: ita, vt non temerè hæc recentiores calidam & siccam in tertio ordine statuunt.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Oenantes semen, caulis & folia cum mulso ad secundas eijciendas bibuntur. Radix cum vino contra stranguariam conuenit.

EX PAVLO.

Oenanthe secundas eijcit, vrinæ stillicidio, morboque regio medetur.

EX PLINIO.

Caulis eius & folia cū melle ac vino nigro pota, facilitatè parien

pariendi præstant, secundasque purgant. Tussim è melle tollunt. Vrinam cicut. Radix vesicæ vitij medetur.

EX RECENTIORIBVS.

Filipendula in lotij stillicidio & vrinæ remoratu, neque non renum doloribus, atque lapide eorundem, conuenit. Eadem stomachi inflationes discutit, medetur & suppuriosis & anhelantibus, & omnibus morbis quos causa frigida cōcitauit. Farinam eiusdem cibus comitialium inspergunt.

De Oxy. Cap. CCXV.

EX PLINIO.

Oxys Græcè, Oxyς Plinio & Latinis, Trifolium acetosum & Alleluya officinis, vulgò Panis cuculi, vel cuculus auis eo vescatur, vel quia hoc erumpente, cuculus vocem suam addere incipiat. Germanis [Saurerklee, Buchklee, Buchampffer, Buchbrot, Gaucklee, Guckgauchklee, & Hasenklee] Gallis *Pain à coquer* appellatur. Oxyς verò ab acido sapore dicta est.



Oxys siue Alleluya.

FORMA.

Humilis herba est, longis tantum pediculis, tria summata folia perinde atque Trifoliū proferens, exigua, & in cacumine laciniata, sapore acido. Florem habet candidum, in simplici stylo inter folia profilientem: rufum in lunatis siliquis semen. Radicem in transversum

sum longam, geniculatam ac rufam. Antiquus & manuscri-
ptus herbarius putat hanc herbam esse Lotum satiuam, cuius cer-
te sententiam, quod à Dioscoride non describatur Lotus,
neque probo, neque improbo. Cur tamen non sequar, facit
quod herba, quam Alleluya barbari vocant, non sit satiuam,
sed passim in syluis & alijs locis vmbrosis, nascatur futuræ
tempestatis prænuncia. Siquidem appropinquante aliqua
tèpestate, arrigitur contrà tanquàm tèpestati colluctatura.

LOCVS.

Multis locis prouenit, nam in syluis circa petrosa &
aquea loca nascentem conspeximus. Nullibi autem copiosio-
rem quàm Tubingæ in primo statim conscensu montis
Austriaci ad dexteram prouenire vidimus.

TEMPVS.

Aprili atque interdum Maio mense floret, dum scilicet
Cuculi vox primùm ex auditur, atque hinc Cuculi panem
dictam esse puto, vt dictum est antea. Obseruatum autem
est à nobis, atque adeò multorum aliorum experientia co-
gnitum, quod eius herbæ copiosi flores, crebras illius anni
pluuias, & aquarum inundationes certò portendant: pauci
contrà siccitatem.

TEMPERAMENTVM.

Quum acidum in gustu saporem præ se ferat, idem cum
Oxalide habere temperamentum, frigidum nempe & sic-
cum, euidentissimum est.

VIRESEX PLINIO.

Datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui entero-
cælen habent.

EX RECENTIORIBVS.

Ulcerebus, vulneribus & fistulis, potissimùm autem oris,
medetur. Sitim arcet, & vt summatim dicam, easdem quas
Oxalis, acetosam nostri nominant, facultates obtinet.

De Ophri. Cap. CCXVI.

NOMINA.

OPHRIN hanc herbam nominare placuit, quod
inuenerim plantam binis duntaxat folijs cōstantem

hac appellatione insigni. Germanicum nomen nullum extorquere potuimus: neq; enim ea est quæ [Durchwachs,] hoc est, Perfoliata vocatur, ideóque hanc à geminis folijs [zuueyblatt] nominauimus.

FORMA.

*Ophris.*

stibus floret, dein statim euanescit. Quapropter hoc potissimum tempore colligenda.

TEMPERAMENTVM.

Gustanti glutinosa esse apparet, & quodammodo dulcis, ideóq; calidam & siccam esse conijcere licebit.

VIRE S.

Iuxta dictarum qualitatum mistionem contrahendi & constringendi facultate præditam esse nemini nõ constat. Hinc est quòd ad rupta, & vulnera conglutinanda hac herba commodè vtantur recentiores.

ADNO

Caulem à radice singularem ac rotundum emittit, per bina, quæ tantum habet, folia penetrantem, à cuius medio ad summum vsq; calyculi multi sunt, & in his veluti linguæ dissectæ nutantes flosculi. Radix verò illi subest tenuis, adnascētes sibi radículas multas, obliquas & odoratas obtinens.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & nullibi maiori copia, quàm Tubingæ in pede montis Austriaci prouenit.

TEMPVS.

Maior & Iunior mens-

ADNOTATIO.

Ophris vulgò *Elleborus albus* dicitur, *pratensis* herba, qua praecedunt, aut nomen retinent, ob id à nobis emissã.

De Ormino. Cap. CCXVII.

NOMINA.

Oρμινον Græcis, Orminum & Geminalis Latinis, Gallitricū Officinis; Germanis [Scharlach] Gallicè *Asperge sauvage*, ou *Ormate*, *Preudhomme*, ou *Toute bõne*, appellatur. Orminon autem Græcis haud dubiè dictum est, quia Venerem extimulat.

GENERA.

Ormini duo sunt genera. Vnum sativum, quod Gallitricum simpliciter nominant, & Germanicè [Scharlach.]



Orminum sativum.



Orminum sylvestre.

M ij

Alte

Alterum syluestre, quod alio nomine Saluiam syluestrem herbarij vocant. Germani [Vilden Scharlach, oder Vilde Salbey.]

FORMA.

Orminum satium herba est folijs Marrubio similis, caule quadrangulo, semicubitali, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt, ad radicem versus nutantes, in quibus semen est. Ex qua declinatione abundè liquet herbam quam hodie Gallitricum vocant, esse Orminū satium: hæc enim folijs Marrubio similis est, nisi quod sunt maiora & mirificè odorata: caule semicubitali, quadrangulo, ab imo rufescente, calyculis circa caulem filicarum effigie prominentibus, & ad radicem deorsum spectantibus, in quibus semen nigrum & oblongum includitur: flosculis in candido purpureis, aut in dilutum ruborem inclinatis.

Syluestre priori non admodum dissimile est, folijs satis ad Saluiam accedentibus, rugosaque asperitate præditis: caule sesquipedali, leniter hirsuto, in quadrangulum striato: floribus è cæruleo in purpureum vergentibus, ad aquilini rostri effigiem falcatis, calyculis pluribus in terram inclinatis, in quibus ad summum quatuor semina, parua, rotunda & fuluescentia reperiuntur.

LOCVS.

Satium nusquam non in hortis satum prouenit. Syluestre autem passim omnia prata exornat, suæque sponte in ijs nascitur.

TEMPVS.

Vtrunque Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Orminum calidum & mediocriter siccum est, id quod amaritudo atque adstrictio in gustu satis monstrant.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Creditur semen satii cum vino potum Venerem stimulare. Cum melle argema & oculorum albugines purgat. Illitum cum aqua ædemata discutit. Surculos extrahit. Herba ipsa illita eadem potest. Syluestre vehementiorem facultatem

tatem habet, quare vnguentis miscetur.

EX PAVLO.

Orminon Venerem stimulat, oculorum crassities cum melle repurgat, œdemata discutit, & extrahit aculeos. Syluestre domestico est valentius.

EX PLINIO.

Semen ad Venerem stimulamdam, & ad oculorum argema & albugines valet. Vtroque genere tuso extrahuntur aculei ex corpore, per se illito ex aqua. Folia ex aceto imposita, panos per se, vel cum melle discutiunt. Item furunculos, priusquam capita faciant, omnesque acrimonias.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores etiam easdem facultates suo Gallitrico attribunt: potissimum autem conferre ad albugines & oculorum caliginem tradunt, vt hinc etiam colligi possit, herbam hanc Orminon esse Dioscoridis.

ADNOTATIO.

Orminum Oruale, quod aurum valet, & Toute bonne ab insigni virtute Gallis dicitur.

De Orobo. Cap. CCXVIII.

NOMINA.

Orob³ Græcis, Equum Latinis dicitur. Officinæ Græcam appellationem retinuerūt. Germanis [Eruen] ad imitationē Latini nominis appellari possunt. Gallis *Vesfe noire*, ou *Ers*.

GENERA.

Duo sunt genera Erui, vnum enim candidum, alterum autem rufum inuenitur. Nec inter se nisi floribus & radicibus differunt, quemadmodum pictura affabrè monstrat. Rufum verò syluestre est, suæque sponte in aruis, & interdumeta prouenit.

FORMA.

Exiguus frutex est, tenuis, angustis folijs: floribus vel cādidis, vel in candido cœruleis aut puniceis: feminibus in siliquis sine septo cylindraceis, quemadmodum pisa, se inuicem tangentibus.



Eruum albu & satium. Eruum rufum & sylvestre.

LOCVS.

Lætatur loco macro, non humido, quia plærunque luxuria corrumpitur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, ijsdemque semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat quidem Eruum excessu secundo intenso, calefacit verò primo.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Capitis grauitatem facit Eruū. ventrem turbat, sanguinemque per vrinam ducit si comedatur. Coctum tamen appositū boues saginat. Farina eius bonā facit aluū, vrinam cit, corporis colorem commendat. Frequentior in esu aut poti sanguinem cum torminibus per aluum & vesicā ducit. Vlcera cum melle purgat, & lentigines, & aspredinem

cutis in facie, eiusdémque maculas & reliquum corpus. No-
mas, gangrenáque cohibet, & mammarum duritias emol-
lit. Fera vlcera, carbunculos, fauósque rumpit. In vino ma-
cerata canum, hominum, viperarúmque morsus illita sanat.
Cum aceto autem difficultates vrinæ, tormina & tenes-
mos lenit. Prodest etiam ijs, qui cibo nō nutriuntur, nucis
magnitudine frixa & cum melle sumpta. Decoctum eius
fouendo perniones, & in corpore pruritus sanat.

EX GALENO.

Orobis quatenus amaritudinis est particeps, eatenus
incidit, extergit, atque obstructions expedit. Cæterum si
sumatur copiosè, sanguinem per vrinas euocat. Hominum
cibis prorsus hoc semen damnatur: est enim & insuauissi-
mum & prauis succi. Eruo autem instar lupini præparato,
ex melle vtimur, vt medicamento crassos pulmonis thora-
císque humores expurgante. Candidum minus est medi-
camentosum, quàm id quod ad flauum aut pallidum colo-
rem tendit.

ADNOTATIO.

*Ernum prius semine in cunei modum figurato, cicercula magis
videtur.*

De Oreoselino. Cap. CCXIX.

NOMINA.

O Πιροσλινον, ή πιπρροσλινον ήγειον Græcis sylvestre Pe-
troselinon, & Apium montanum Latinis, Officinis
& barbaram sectantibus medicinam Petroselinum dicitur.
Id quod hinc accidisse puto, quòd linguæ Græcæ inscitia,
Oreoselinum dictionem in Petroselinum mutauerint: vel
quia simpliciter enunciauerint quod cum adiectione nomi-
nandum erat Petroselinum sylvestre, ad differētiam nimi-
rum Macedonici, quòd verè est Petroselinum veterū. Ger-
mani [Peterfilgen] vocant. Nos [teusch Peterfilgen, oder
Peterlin] nominauimus, vt discerneretur à Macedonico,
de quo suo dicemus loco. Galli *Persil de montagne.*

M iij)

FOR

*Oreoselinum.*

Caulem habet vnum
dodrantalem à radice te
nui exeuntem, circa quē
ramuli & capitula Ci
cutæ similia, multò ta
men tenuiora. In his se
men oblongum, acre, te
nue, odoratum, Cumi
no simile. Ex qua sanè
descriptione sole clarius
apparet, Petroselinum
officinarum esse Oreos
selinum veterum: caule
enim vno prouenit do
drantali ex radice pette
nui, qui per ambitum ra
mulos spargit capitulis
Cicutæ, tametsi multò
tenuioribus: in ijs se
men, acrimoniam gustu
præferens, odoratum, te
nue, Cumino proximū.

Neq; obstat q̃ in plerisque exemplaribus Dioscoridis capi
tulum Papaueris fiat mentio: error enim haud exiguus
subest, quòd scilicet nō μικρόν παρὰ μέρει, hoc est, Papaueri
similia, sed κοινόν, id est, Cicutæ legendum sit. Id quod in
primis cōfirmant ea quæ scribit Plinius lib. xix. cap. viij. in
hunc modum. Oreoselinum est Cicutæ folijs, radice tenui,
semine Anethi, minutiore tamen. Quòd si tamen hæc sen
tentia minus arriserit, nihil moror quin dicas Petroselinū
germanicum, cū forma parū admodum à verò Petroseli
no distet, vt palàm sit vtriusq; picturas intuenti.

LOCVS.

Nascitur in locis petrosi & montanis, vnde etiam no
men accepit. In Germania verò nostra in hortis passim
plantatur.

TEM

TEMPVS.

Iunio & Iulio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo gradu extenso, siccum verò in medio tertij.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Semen & radix in vino pota vrinam cient. Menses etiam ducunt. Miscetur antidotis, necnon medicamentis vrinam cientibus & excalfacientibus. Nō hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in petris prouenit: aliud enim ab hoc est Petroselinum.

APPENDIX.

Vtunque autem diligenter hoc monuerit Dioscorides, tamen cauere nō potuit quin posteritas medicorum Oreoselinum esse Petroselinum certò crediderit.

EXGALENO.

Oreoselini similis Apio vis est.

EXPLINIO.

Oreoselinum vrinæ & menstruis efficax. Eo etiam purgantur fœminæ è vino.

De Ois.

Cap. CCXX.

NOMINA.

OH Græcis, Sorbus Latinis, est arbor cuius fructus Græcis βαρυκαρυα Galeno teste, Latinis verò Sorba appellantur. Officinæ Latinā nomenclaturam retinuerūt. Germanis [Speierlin, vel Sporopffel] corrupta puto voce pro [Sorbopffel] nominantur. Vel sic ab austeritate vocata sunt, quasi mala austera Gallicè *Cormier ou Sorbier*.

GENERA.

Sorborum duo genera tradit Theophrastus lib. iij. de historia stirpium, cap. xij. fœminam fructiferam, & masculā sterilem. Differre quoque fructibus idem scribit, quod aliæ orbiculatum, aliæ ouatū ferant. Fructus autem orbiculati dulciores sentiuntur, ouati sæpenumero acidi, minúsque odorati. Plinius lib. xv. cap. xxj. in Sorbo quatuor differentias Latinis nostræ memoriæ prodidit: alijs enim corū ait,

M v rotun

rotunditas mali est, alijs turbinatio pyri, alijs ouata species ceu malorum. Quartum genus torminale appellant. Nos picturam eius generis damus, quod turbinatū pyri instar fructū ædit, qui Germanis [Sporbirn] corrupta voce pro [Sorrbirn,] aut quasi austerum pyrum dicitur.

FORMA.



Sorbus.

Sorbus arbor est pro-cera, recto caudice, cor-tice læui, pinguiusculo, colore ad flauum albicā-te, cuius folia pediculo singulari, prolixo, nerua ceoq; in versus condita, alæ modo à lateribus exeuntia, tanquam ex omnibus vnum fiat, ad neruum vsque laciniatū, verū ampliusculo in-teruallo distātia. Omni-bus ramulis in extremo pediculi folium impar prominet, cuius acces-siōe impar numerus effi-citur. Figura laurum te-nuifoliam imitantur, ve-rū ambitu serrata: bre-uiorāque sunt, nec in

extremum acutum mucronata, sed in rotundius orbicula-ta. Flos racematim singulari petiolo, è multis minutis & candidis constans. Fructus vel orbiculatus, vt dictum est, vel ouatus, vel pyri instar turbinatus. Radices haud mul-tas, nec altè descendentes, validas tamen & crassas & incor-ruptibiles agit.

LOCVS.

Loca amat humida, montana & frigida, eodem Theo-phrasto autore.

TEM

TEMPVS.

Autumno fructus suos Sorbus ostentat.

TEMPERAMENTVM.

Adstringentem obtinet qualitatem Sorbus, sed multò imbecilliozem quàm Mespilus.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Sorba malorum colorem referentia, necdum maturefcentia, dissecta & in sole siccata, cùm manduntur aluū sistunt. Farina eorum cùm mola teritur, polentæ loco in eundem vsus sumitur. Potest idem & decoctum eorum.

EXGALENO.

Sorba quidem adstringunt, sed multo fortius Mespila quàm Sorba. Quamobrem aluo fluenti in cibo accommodatissimè exhibentur. Sorba maiori cum voluptate sumuntur: prorsus enim initio nihil acerbi vti Mespila habent, sed succus eorum citra acerbitem duntaxat austerus est. Illud porro neminem puto latere, hæc omnia parè, nō largè vt ficus, vnasque asse comedèda. Nequaquā enim eis vt cibis, sed magis vt medicamentis egemus.

De Ophiogloss.

Cap. CCXXI.

NOMINA.

HERBA hæc appositissima voce Græcè *ἰφίγλωσσος* appellari potest, non quòd sic eam veteres aut recentiores græci nominauerint, sed quòd cum germanica nomē clatura optimè quadret. Neque enim certò constat an Græcis, & sub quo nomine herba illa cognita fuerit. Quapropter vt nonam ei iinderemus appellationem necessum erat: meliorem verò hac ipsa quam retulimus, innenire haud potuimus. Latine Ophioglossum, aut lingua serpentina dici potest: Germanicè enim [Naterzvnglin] Gallicè *Langue de Serpent* vocatur, à forma & figura quam refert. E singulis nanque folijs singulari pediculo prodit, quod ligulam serpentis forma sua referre videtur, vt pictura affabrè monstrat.

FOR



Ophioglossum aut lingua serpentina.

TEMPERAMENTVM.

Circa caliditatem insignem exiccat, id quod gustus satis docet.

VIRE S.

Vulneraria est herba, maligna siquidem & curatu difficilia vulnera sanat. Tumores etiam discutit, & ferè Symplicti facultates obtinet.

De Parthenio. Cap. CCXXII.

NOMINA.

Παρθένιον ἀμάρρακος, χαμαίμηλον Græcis : Parthenium, Amaracum, Solis oculus, Millefolium Latinis: Thufcis Cauta, officinis & herbarijs *Cotula foetida* dicitur.
Germa

Folium vnicum obtinet pingue, digiti longitudine Plantagini aquatica vocatæ haud dissimile, è cuius sinu inferiore pediculus exit, cui quæpiam herbacei coloris infidet, quod serpentine lingue vocati lapilli similitudinem refert.

LOCVS.

Copiosè in mōte prope Tubingam Austriaco nominato prouenit. Amat & alia prata in montanis sita.

TEMPVS.

Maior mense reperitur subinde autè euanescit ac nusquam apparet.

Germanis [Kortendill, Vvndszbluom, Vvild Chamillen]
Gallicè *Espargoutte ou Matricaire*. Cæterùm cogitabūt hoc
loco studiosi, Amaracum de quo nūc agimus diuersum esse
ab eo quem alio nomine Sampsychum Græci vocant, vt
suo loco fufius dicemus.



Parthenium.

FORMA.

Folia Coriandro si-
milis habet, tenuia. Flo-
res per ambitum candi-
dos, in medio luteos, o-
dore graui & subuiroso
gustūque amaro. Hæc
Dioscoridis descriptio
pulchrè & per omnia
herbæ illi quæ hodie vul-
gò cotula fœtida nomi-
natur, respondet. Siqui-
dem ea folijs est Coriā-
dri, tenuibus: flore per
ambitum albo, intus lu-
teo, odore graui, & sa-
pore amaro. Folijs au-
tem Coriandri, nō qui-
dem iam erumpentis &
paulò antè enati, nec-
dum inaturescētis, quæ

sunt quadam tenuis lata & subrotunda, atque in extre-
mitatibus incisa: sed maturi, cuius quidem alto folia ad
Chamæmeli aut Fœniculi foliorum formam accedunt,
capillataque sunt, constare scias. Sic enim vtriusque folia si-
milis sunt, vt Coriandrum Parthenij, & rursus Parthe-
nium Coriandri prorsus referre folia videatur. Quod vt
disertè innueret Dioscorides, *φύλλα λεπτά*, id est, folia tenuia
dixit, vt scilicet hac voce latiora, quæ in infima sunt Co-
riandri parte, secluderet. Quòd autem de ijs folijs Diosco-
rides locutus sit, ex tractandi ordine abundè liquet de tri-
bus, Chamæmelo, Parthenio & Buphthalmo: quæ sanè
inter

inter se congeneres, atque folijs admodum similes sunt, ordine agit, quod nunquam fecisset, si nulla inter has similitudo intercederet foliorum, adde etiam florum. Bupththalmum tamen folijs ad Fœniculi formam propius quàm reliquæ duæ accedit. Sententiam hanc nostram confirmat, quòd aliqui Parthenium, ob similitudinem quam habet cum Anthemide, Chamæmelō dixerint. Tam similis enim est Chamæmelo, vt frequenter etiam ab imperitis pro illa capiatur. His accedit & hoc, quòd ob foliorum tenuitatem nonnullis Mlefolium appellatum sit Parthenium, quod fieri minimè potuisset si ad latiora Coriandri folia Dioscorides respexisset. Præterea esse Parthenium Cotulam, nomen quod illi Thufci indiderunt satis declarat. Cautem enim appellarūt, vnde diminutiuum Cautula deductum est, & tandem corrupta voce Cotula. Fœtidam autem esse, grauis odor qui in ea omnium maximè sentitur, euidenter declarat, Nequaquam itaque ea esse herba potest, quā Matricariam vulgò vocant, vt Hermolaus, & alij multi docti viri hunc sequentes putāt: quòd huius folia latiora sint quàm vt cum Chamæmeli, Bupththalmi aut Coriandri tenuibus folijs comparari queant, tantum abest vt similia sint. Huc accedit (quod omnium maximè euertere videtur aduersariorum sententiam) nemo vniquam ex recentioribus Matricariæ herbæ bilis & pituitæ per inferna tractricem facultatem tribuit, quam tamen Parthenio Dioscorides, Paulus, & alij veteres assignant, vt etiam hoc nomine Parthenium non possit esse Matricaria herba dicta vulgò.

LOCVS.

Nascitur inter segetes & iuxta semitas, intermixta serè semper Chamæmelo. In hortorum etiam sepibus, Plinio teste prouenit.

TEMPVS.

Primo statim vere, Maio potissimùm mense, erumpit, ac totam æstatem durat.

TEMPERAMENTVM.

Haud iostrenuè, Galeno autore qui amaracum vocat, calefacit, non autem vehementer desiccet. Itaque in caliditate

tate tertij est ordinis, in siccitate verò secundi.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Sicca cum oxymelite, aut sale pota, non secus atque Epithymum bilem atram & pituitam per inferna ducit. Asthmaticis & melancholicis prodest. Herba ipsa floribus demptis à calculosis asthmaticis vtiliter bibitur. Decoctum eius ad insidendum prodest in vuluæ duritia & inflammatione. Illinitur cum floribus sacris ignibus, & inflammationi.

EX PAVLO.

Parthenium aridum in potu sumptum atram bilem per inferna deducit.

EX PLINIO.

Siccatum cum melle & aceto potum, bilem trahit atrā: Ob hoc cōtra vertigines vtilis & calculosis. Ad insidendum decoctum in duritia vuluarum & inflammationibus. Illinitur & sacro igni, item strumis cum axungia inueterata. Magi contra tertianas sinistra manu euelli eam iubent, dicique cuius causa vellatur, nec respicere: dein eius folium ægri linguæ subijcere, vt mox in cyatho aquæ deuoretur.

De Polygonato. Cap. CCXXIII.

NOMINA.

ΠΟΛΥΓΩΝΑΤΟΝ Græcis, Polygonatum Latinis dicitur. Officinis, itē herbarijs & vulgò, sigillum Salomonis, Germanis [Vneiszvurtz,] hoc est, radix alba nominatur. Polygonatum autem à radice geniculorum frequentibus nodis ex interuallis tumente appellauerunt. Galli *Signet de Salomon.*

GENERA.

Duo eius genera damus. Vnum verum latioribus folijs: Alterum multò angustioribus, quemadmodum pictura graphicè ostendit. A folijs vtriq; nomina sunt indita.

FORMA.

Frutex est cubito altior, folia lauro similia habēs, latiora tamen & læuiora, sapore mali cotoneæ aut puniceæ: gustum enim adstrictionē quandā respicit. Per singulos folio-

rum

*Polygonatum latifolium.**Polygonatum angustifolium.*

rum exortus candidos flores promit numero maiore quàm folia, supputatione à radice facta. Radicem habet candidā, mollem, longam, geniculis plenā, dēsam, graucolentem, digiti crassitudinem obtinentē. Iam si singulas Salomonij figilli notas libeat prosequi, omnes, ne vna quidē reclaman-
te, adesse comperies. Nanque in montibus gignitur, frutice cubito proceriore, folijs lauri latioribus, & læuoribus, quæ gustatæ quendam mali cotoneæ aut punicæ saporem refe-
rant cum aliqua adstrictione. Flores per singulas foliorum eruptiones exiliunt candidi, qui folia numero longè supe-
rent, à radice ad cacumen supputata. Siquidem bini, terni, aut plures ab vnoquoque foliorum sinu prodeunt. Radix illi candida, mollis, lōga, crebris nodis articulata, dēsa, gra-
uiter olens, digitali crassitudine. Floribus ex cussis bacce pi-
si ferè

si ferè magnitudine dependent, ex viridi nigricantes, & in quendam ordinem digestæ.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

TEMPVS.

Maior mense floret, quo etiam tempore carpi debet.

TEMPERAMENTVM.

Polygonatum mistam habet qualitatem. Est enim in eo adstrictionis pariter & acrimonie, quippiam, necnon fastidiosa cuiusdam amaritatis explicatu difficilis.

VIRE EX DIOSCORIDE.

Radix illita vulneribus auxiliatur. Quinetiam vultus maculas delet & aufert.

EX GALENO.

Radicem Polygonati quidam vulneribus illinunt. Sunt etiam qui illo nruos maculasque in facie detergant.

APPENDIX.

Hodie quoque mulieres sigillo Salomonis sibi faciem extergunt & fucant, ut planè nullum subsit dubium, quin Polygonatum esse constanter credamus.

De Polypodio. Cap. CCXXIIII.

NOMINA.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ Græcè, Polypodium, Filicula Latinè, Officina Græcam appellationem retinuerunt, Germanicè [Engelsusz, Banmssarr, Dropffvurtz,] Gallicè *Polypode* vocatur. Polypodio nomen à radice quæ polyporum modo cirros obtinet, inditum est. Filiculam autem Latini à similitudine foliorum cum Filice nuncupauerunt.

FORMA.

Herba est palmi altitudine, Filici similis, subhirsuta, incisuris diuisa, nō tamen adeò tenuibus. Radix illi est hirsuta, cirros polyporū modo habens, minimi digiti crassitudine. Perasa hæc intus viridis est, acerba, gustu subdulcis. Parte auersa folia fuluis maculis notata, sine semine.

LOCVS.

Gignitur in muscosis
petris, & in agrestibus
quercuum truncis.

TEMPVS.

Radix in fine Augu-
sti carpenda.

TEMPERA-
MENTVM.

Polypodium dulcem
simul & austeram ha-
bet vincentem qualita-
tem, vt facultatis fit ad-
modum desiccantis, ci-
tra morsum tamen,

VIRESEXDIO-
SCORIDE.*Polypodium.*

Purgadi vim obtinet.

Coquitur autem cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut
Malua ad purgationem: Arida aque mulsæ insparsa, bilem
& pituitam ducit. Radix trita & illita luxatis confert, &
ad fissuras quæ inter digitos sunt.

EX PAVLO.

Polypodium exiccat admodum citra morsum, & potum
per inferna purgat.

EX PLINIO.

Radix in vsu. Exprimatur succus aqua madefacta, & ipsa
concisa inspergitur oleri, & Betæ, & Maluæ, vel salsamen-
to, vel cum pulicula coquitur ad alium leniter soluendam,
vel in feбри. Detrahit bilem & pituitam. Stomachum offen-
dit. Aridæ farina indita naribus Polypum consumit. Illita
luxatis medetur.

De Prasio. Cap. CCXXV.

NOMINA.

Πρασίου Græcis, Marrubium Latinis, Prasium Officinis vocatur. Germanis [Andorn das vveiblid, vveisz Andord, Marebel Gottsz vergesz.] Gallis *Marrouchin*.

FORMA



Marrubium.

Frutex est ab vna radice ramosus, subhirsutus, albicans, virgis quadrangulis. Folium pollicis æquale, subrotundum, hirsutum, rugosum, gustu amarum. Semen per intervalla in caulibus est. Flores asperi verticillorum figura. Hæc delineatio adamussim Marrubio hodie dicto respondet. Siquidem singulari radice, ægulosis ramulis fruticat, lanuginosum: folijs ferè orbiculatis, pollicis magnitudine, incanis, hirtis, amaris, lacteo flore, verticillato cinctu caule ex intervallo amplectente, cui succrescit teres & asperum semen.

LOCVS.

Nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera.

TEMPVS.

Colligitur herba in æstate, Iulio potissimum mense, dum semine est prægnans.

TEMPERAMENTVM.

Marrubium in caliditate quidem secundi ordinis iam

N ij com

completi est, in siccitate verò tertij mediij, aut completi,
VIRESEXDIOSCORIDE.

Huius folia arida cum semine decocta in aqua, aut viridium expressus succus, datur cū melle asthmaticis, tussientibus & tabidis. Crassa è thorace cum iride sicca ducūt. Datur mulieribus quæ non purgantur, vt menstrua & secundas pellant. Item difficilè parientibus, his qui à serpentibus morfi sunt & qui lethale quid biberunt. Vesicæ tamen & renibus nocent. Folia cum melle illita sordida vlcera purgant, pterygia nomasque cohibent. Dolores laterum mitigant. Ad eadem pollet ex folijs confusis expressus succus & sole coactus. Cum vino & melle illitus, oculorum claritatem exacuit. Morbum regium per nares expurgat. Aurium doloribus per se, aut cum rosaceo instillatus prodest.

EXGALENO.

Prasium vt gustu amarum est, ita si quis vtatur consentientem huic saporis actionem habet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemque expurgans, ac menses promouens. Sed & illitū detergit ac discutit. Succo eius cum melle ad aciei oculorum claritatem vtūtur. Quin etiam & per nares morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus vtique obstructionem dissijcere, meatumque ipsum & explantationes membranarum expurgare necesse est.

EXPLINIO.

Huius folia semenque contrita profunt cōtra serpentes, pectorum & lateris dolores, tussim veterem. Iis qui sanguinem eieciūt eximie vtile, scapis eius cum panico aqua decoctis, vt asperitas succi mitigetur. Imponitur strumis cū adipē. Sunt qui viridis semen, quantum duobus digitis capiāt, cum farris pugillo decoctū, addito exiguo olei & salis, sorbere ieiunos ad tussim iubeant, Alij nihil comparāt. In eadem causa Marrubij & Foeniculi succis ad sextarios ternos expressis, decoctisque ad sextarios duos, si cochlearij mēsurā in die sorbeat in aquæ cyatho. Virilium vitij tussim cum melle mirè prodest. Lichenas purgat ex aceto. Rupris, epnuulsis, neruorum cōtractionibus salutare. Potum aluū soluit

foluit cum sale & aceto. Item menstrua & secundas mulierum. Arida farina cum melle ad tussim siccam efficacissima est. Item ad gangrænas & pterygia. Succus verò articulis, & è naribus morbo regio, minuendæque bili cum melle prodest. Item cōtra venena inter pauca potens. Ipsa herba stomachum & excreationes pectoris purgat. Cum iride & melle vrinam ciet. Cauenda tamen exulceratæ vesicæ, & renum vitijs. Dicitur succus claritatem oculorū adinuare.


De Peristereone. Cap. CCXXVI.

NOMINA.

Π *Epistēmon, ἡ ἐκ βοτάνης* Græcè Verbenaca, Verbena, Columbaris seu Columbina, herba Sagminalis Latine, herbarijs & Officinis Verbena vocatur. Germanicè [Eisenkraut,] vel [Eisernhart,] hoc est, ferraria, quod nomen ut olim sic hodie quoque habet, Gallicè *Verueine*, Peristereō nomen inditum à columbis, qui in ea versari plurimum delectantur. Hierobotane autem, hoc est, sacra herba ideo dicta, quòd ea olim apud Romanos domus purgabatur, familia lustrabatur, louis mensa ad sacrificium & epulas verrebatur, & fœciales in sacris legationibus illa coronabantur, vel, ut Dioscorides inquit, quòd in expiationibus suspensa & alligata mirè utilis sit. Sagminalis verò, quod inter sagmina, hoc est, gramina ex loco sacro, præsertim arce Capitolij, cum sua terra euulsa, primum hæc honorem haberet.

GENERA.

Duo Verbenacæ & Græci & Latini fecerunt genera. Dioscorides & alij Græci à plantæ habitu rectam & supinam. Plinius à sexu marem & foeminam. Recta Dioscoridis, est Plinij mas, alioq; nomine Crusta gallinacea, à ferratis folijs quæ gallinacæ cristæ formam referunt, dicitur. Recta autè nominata est, quòd rectis ramulis assurgat. Supina autè Dioscoridis, apud Pliniū foemina est, Romanisque Cincinnalis vocatur. Supinam vero vocarunt, quòd semper humi supinè procumbat, Germani etiam per sexū genera illa distinguunt, vocantque rectam Verbenacam [Eisenkraut das mennle,] Supinam verò [das vveible.]

*Verbenaca recta, siue mas.**Verbenaca supina, siue foemina.*

Recta siue mas herba est altitudinis palmi, aliquādo etiā maioris. Folia huic incisa, subalbida, è caule prodeūtia, qui ei vnus est magna ex parte, quemadmodum & radix vna. Flos luteus, quo solo ferè à foemina differre videtur. Hæc descriptio pulchrè Verbenacæ mari respōdet: est enim herba dodrantalis, interdum verò procerior, quemadmodū ea est quæ in Germania nostra prouenit: nunquam enim aut rarissimè palmi altitudinem nō excedit. Folia habet incisurā diuisa, albescentia, erumpentia è caule. Singularis denique illi, ut plurimum, caulis & radix vna. Supina seu foemina ramos profert cubitales, aliquādo etiam maiores, angulosos, circa quos folia sunt per intervalla quernis similia, angustiora tamē & minora, per ambitum incisa, colore subcæsiō. Radicem habet longam, tenuem. Flores purpureos, tenuēs,

tenues. Cuius iterum delineationis notæ, Verbenæ fœminæ adamussim conueniunt. Siquidē multis statim à radice angulosis coliculis constat, coma subtus incana, folio quærno nō dissimili, nisi quod minus est & angustius, multis per ambitum incisuris: flosculo ex albore & purpura versicolore. Quibus omnibus manuscripti codicis, qui Peristereon interpretatur Verbenam, accedit testimonium, & cōmunis omnium consensus: à quo sine manifestis coniecturis & rationibus nunquam est discedendum.

LOCVS.

Vtrâque in planis & aquosis locis prouenit.

TEMPVS.

Mas citius quàm fœmina apparet. Colligi debêt, potissimum fœmina, circa Canis ortum, nam hoc tempore floret.

TEMPERAMENTVM.

Vtraque desiccet & adstringit.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Rectæ Verbenacæ solia, cum rosaceo, aut adipe suillo recenti apposita, vuluarum dolores finire putantur. Ignem sacrum cum aceto illita reprimunt. Putrescentia vlcera cohibent, Vulnura glutinant, veterâq; ex melle ad cicatricem perducunt. Supinæ autem solia & radix in vino pota illitâq; aduersus reptilia serpentēve faciūt. Eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina, quadragenis diebus ieiuno contra regium morbum bibuntur. Vetera œdemata, & inflamationes illita mitigât. Sordida vlcera purgant. Totâ autē herba in vino decocta tonsillarum crustas abrumpit, & oris nomas gargarissata cohibet. Fertur sparsa aqua triclino qua maduerit, lætiores cōuiuas fieri. Datur potadum in tertianis febribus tertium à terra geniculum cum adiacētibus folijs: quartanis, quartū.

EXGALENO.

Vim habet aded̃ desiccantem vt vulnura glutinet.

EXAETIO.

Verbenaca recta ad capitis dolores summo præsidio esse testatur Archigenes, si ea coronetur patiens, aut si tera-

N III tur

tur eum aceto & rosacco & illinatur, aut oleo decoquatur, ac foueatur caput. Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoque fluentes compescit. Radicis decoctum calidum ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisque vlceribus medetur. Ad colicos radices semiconfusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato: efficacissimum id esse experientia comprobatum est. Facit & ad calculos atque ad inchoantem elephantiasim, si eum melle propinetur. Vtere itidem ad epilepticos, & ad quotidiana, quartanaue febre laborantes. Ad podagricos vero & coxedicum morbo affectos, vino decocta exhibetur. Succus e radice expressi collutio ad fistulas commodissima est. Et si mororum liquori ac melli mixtus exuratur, & acidus illinatur, fistulas sanat. Potest etiam melle assumi, & fistulae tanquam collyrium iniici, ac mirum in modum prodest.

EX PLINIO.

Aiunt si aqua spargatur triclinio qua maduerit Verbenaca, laetiores conuietus fieri. Aduersus serpentes conteritur ex vino. Omnibus visceribus medetur, lateribus, pulmonibus, iecinoribus, thoraci, peculiariter autem pulmonibus & quos ab ijs phthisis tentat. Dysenterias emendat ex aqua data carentibus febre, aut ex vino Aminaeo cochlearibus quinque, additis in cyathis tribus vini.

EX SIMEONE SETHI.

Verbenaca recta facit ad capitis dolores & defluentes capillos inuncta. Dentium dolores sedat, & motos atque concussos confirmat. Oris vlcera sanat. Decoctum eius colicos & calculosos iuuat. Pota ijs, qui primum elephantia laborare incipiunt, & comitiali morbo affectis succurrit. Item quotidiana & quartana laborantes similiter iuuat. Podagricos vero & coxendicis morbo captos, vulneratosque illita sanat.

De Pteride. Cap. CCXXVII.

NOMINA.

PΤέρηδ, ἢ Πτέρηδ Græcis, Filix Latinis dicitur. Officinae Latino nomine vtuntur. Germanice [Valdtfarr,] Galli

Gallicè *Feuchiere ou Fongiere*, Pteris autè & Pterion ab alis auum, quarum formâ in ramulis disposita cius folia referunt, Græcis dicitur: pennatus enim & pennatis folijs frutex filix est.

GENERA.

Duo Filicis sunt genera, mas scilicet & fœmina. Mas Græcis simpliciter $\pi\tau\epsilon\rho\iota\varsigma$, Latinis Filix mas, Germanis [Vvaldt farrmennle] Gallis simpliciter *Feuchiere ou Fongiere* dicitur Fœmina, Græcis $\theta\epsilon\lambda\upsilon\chi\iota\varsigma$, Latinis Filix fœmina, Germanis [Vvaldt farr Vveible] Gallis *Fongiere femelle* appellatur.

FORMA.



Filix mas.



Filix fœmina.

Filix mascula folia habet sine caule, sine flore, sine semine, ex vno pediculo cubitali longitudine exeuntia, incisa, alarum auum modo explicita, odore subgrauia. Radicem in terræ superficie foris nigram, crassam, oblongam, adnascantias appendicisve multas habentem. Ex qua siquidem

N ▼ descri

descriptione satis constat hanc quam sub hoc nomine præstatimus herbam, esse Filicem masculam: hæc enim neque caulem (quod enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem obtinet) neque florem, neque semen habet: folia ex vno pediculo cubitali à terra statim, aut ex stipite eius exeunt, utroque latere pinnata, subgravi odori. Radix denique illi est per summa cespitum nigra, & ut Theophrastus ait, crassa, oblonga, multis adnatis capillamentis fibrata, atque, ut summatim dicam, omnes illi notæ adamussim respondent. Filix fœmina folia priori similia obtinet, non tamen vno singulari; pediculo ut illa hærentia, sed adnascētes ramulos multos altioresque habentia. Radix illi longa, obliqua, in nigro colore subflaua, aliquando verò rubescens. Quæ descriptio iterum per omnia cū ea herba cuius picturam exhibemus ita conuenit, ut nulla prorsus sit nota, quæ illi nō respondeat.

LOCVS.

Nascuntur vbique, sed maxime in montibus, syluis, & saxosis locis.

TEMPVS.

Effodiuntur Vergilij occidentibus, hoc est, autumnò.

TEMPERAMENTVM.

Amaræ sunt Filices, paululum habentes adstrictionis, ut euidentissimum sit has calefacere & exiccare posse.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Filicis masculæ radix pellit latos lumbricos pondere drachmarum quatuor cum aqua malsa pota. Melius autem si cum Scammonia, aut veratri nigri quatuor obolis detur: veruntamen oportet sumentes allia præsumpsisse. Lienosis ut restituatur prodest pota. Radix etiam cū axungia illita cōtra ictus ab harundine factos utilis est. Eius autem hæc probatio: Peribit Filix quam per ambitum copiosior harundo coronet: & cōtrā euanescit harundo, quam obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Fœminæ radices cum melle in eclegmate sumptæ, latos lumbricos pellunt. Cum vino autē pondere trium drachmarum potæ, rotundos lumbricos eijciunt. Mulieribus datæ sterilitatē faciunt.

Et

Et si pręgnans sumat, abortum. Sicca & in farinam trita, humidis & ijs quę difficulter sanantur vlceribus interperguntur. Medentur iumentorum ceruicibus. Folia eius nuper prodeuntia olerum modo elixa comeduntur, aluūmq; molliunt.

EX GALENO.

Filix mas radicem habet maximę vtilem : latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmarum pōdere in aqua malsa sumpserit. Ad eundem modum fœtum quidem viuum necare, mortuum autem eijcere mirum nō est. Vlceribus imposita valenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

EX THEOPHRASTO.

Thelypteris seu fœmina Filix, contra lumbricos ventris & latos & graciles vtilis est. Contra latos quidem cum melle mixta, contra tenues autem in vino dulci cum polenta data. Quinetiam mulieri si detur, pręgnanti quidem abortum: simpliciter autem fœminis sterilitatem facere, affirmant.

EX PLINIO.

Vsus radice in trimatu tantū, neque antę neque postę. Pellunt interaneorum animalia. Ex his tineas cum melle, cętera ex vino dulci triduo potę. Vtraque stomacho inutilissima. Aluum soluit, primo bilem trahens, mox aquam. Melius tineas cum Scammonij pari pondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post vnius diei abstinentiam bibitur, melle pręgustato, cōtra rheumatismos. Neutra danda fœminis quoniam grauidis abortum, cęteris sterilitatem facit. Farina earum vlceribus tetrīs inspergitur. Iumentorum quoque ceruicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt, ideo substerni vtile est in locus suspectis. Vstę etiam fugant nidore.

APPENDIX.

Falsum & commentitium haud dubiū est quicquid neo-terici aliqui de Filicis semine fabulantur : quod scilicet vna solstitiali nocte floreat, eadēque hora eam defloruit maturum.

turum in terram semen cadat, ideoq; nisi quispiam tunc affuerit, nec videri florem, nec colligi semen posse, tum quia incredibilia sunt, tum quod omnes, Theophrastus scilicet, Galenus, Dioscorides, Plinius, sterilem & sine semine dixerunt. Neque etiam medici vel Arabes vel Persæ, ad magicas vanitates nati, seminis huius meminerunt. Quapropter omnia hæc agyrtarum commenta esse videntur humanæ ignorantie ad quæstum impudenter illudentium, quæ certe vel vna hæc ratio abundè satis confutari possunt, quod cuncta illa fieri & observari natali nocte diui Ioannis Baptistæ præcipiunt, cum natalis ea nox & solstitialis illa duo decim dierum numero nunc inter se distent

De Peucedano. Cap.

CCXXVIII.

NOMINA.



ΠΕΥΚΙΔΑΥ. Græcis, Peucedanus Latinis, officinis & herbarijs nostræ ætatis Fœniculus porcinus dicitur. Germanis [Harstrang, Sevvnsfechel, oder Schvvefelvuurtz,] quod lachryma è radice sulphuri aut thuri similis exudet. Gallicè *Peucedane ou quene de pourceau* Peucedanum autem nomē inuenit à pinu, quæ Græci *πινυς* dicitur, cui folio par est. Hic posteriores Latini Pinastellum eum vocauerunt.

Peucedanus.

FOR

FORMA.

Caulē emittit tenuem, macilentum, Fœniculo similē comam habet: circa radicē copiosā & densā. Florem luteum, radicē foris nigram, intus albā, graui odore, crassā, liquore plenā. Hæ sanē omnes notę, nulla prorsus reclamante, huic quā pictā exhibemus herbæ conueniūt. Officinæ, quæ non rarō adulterinas pro genuinis vendunt herbas, Peucedanum ostendunt radicē non succosa, sed ligrosa, nec graui odore, sed iucundo: vnde satis constare potest verum non esse.

LOCVS.

Gignitur in montibus opacis, potissimū in monte pape Tubingam, cui olim arx imposita fuit, in itinere versus Rotenburgum sito.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, atq; deinceps semen producit. Radix foditur exitu Autumni.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit ordine secundo iam completo: deficeat verō tertio iam incipiente.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radice adhuc tenera Peucedani cultello incisa liquor est, funditur, profluensq; statim in vmbra reponitur: in sole siquidem languescit. Facit cū colligitur capitis dolores & vertigines, nisi quis antea rosaceo nares præungat, & caput irrigat. Radix assata inutilis fit. Colligitur & ex caulibus & ex radice sicut ē Mandragora liquor atque succus: Minus tamen efficax succo liquor, & velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma thuti similis, caulibus radicibusque adhærens. Ex aceto & rosaceo inunctus lethargicis, phreneticis, vertiginosis, comitialibus, diurnis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: in vniuersumque neruorum affectionibus ex oleo & aceto inungitur. Strangulatu vuluę laborantes olfactus, soporeque profundo correptos reuocat. Sufficit serpentes fugat. Aurium doloribus cum rosaceo instillatus prodest. Causis dentium erosio inditus, eorundem dolores mitigat. Contra
tussum

tussum in ovo sumptus facit. Difficultati spirandi, torminibus & inflationibus subuenit. Aluum leniter mollit. Lienem minuit. Difficiles partus egregiè adiuuat. Ad vesicæ renumque dolores & distentiones potus confert. Aperit vuluam. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Sicca trita sordida purgat vlcera, ossiû- que squamas detrahit, veteraque cicatrice obducit. Ceratis malagmatisque calefaciendi vi præditis miscetur. Eligi debet recens, non cariosum, solidum, odoris plenum. Succus ad potiones amaris amigdalidis, au ruta, aut pane calido, aut anetho dissoluitur.

EX GALENO.

Peucedani radice quidem maximè, sed tamen etiam succo & liquore utimur. Sunt autem hæc omnia eiusdem specie facultatis, sed valentior liquor, admodum exalfaciens & digerens, Quare affectibus omnibus circa nervos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine atque viscositate humorum factis. Et intrò quidem in corpus sumpta, sed tamen etiam olfactu profunt. Porro quòd incidat atque extenuet, sepe etiam dentiû perforatorum dolores cavitati impositus prorsus sedauit, quia videlicet est tenuium partium, & exalfactorius. Quinetiam lienes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo, & extenuando crassos humores. Sed & radice ad hæc uti licebit, quæ & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia videlicet validè desiceat, minùs tamen quàm succus exalfaciens. Et vlceribus malignis arida illita optimum est remedium: ipsa enim expurgat, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

EX PLINIO.

Peucedani radices coneiduntur in quaternos digitos ossis cultellis, fundûtque succû in umbra, capite prius & naribus rosacèo perunctis, ne vertigo sentiatur. Et alius succus inuenitur caulibus adhærens: incisq; manat. Probatur crassitudine mellea, colore ruffo, odore suauiter graui, feruens gustu. Et hic in usu & radix: & decoctum eius pluribus medicamentis. Succo tamen efficacissimo, qui resolu-
tur

tur amaris amygdalis, aut ruta, bibiturque contra serpentes, & ex oleo perunctos tuetur. Idem pectoris doloribus subuenit. Pituitam & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta lieni & renibus prodest. Perungunt & radicem sudoris causa eliciendi, quoniam caustica vis ei est. Peucedano ad recentia vulnera tanta vis est, ut saniem ossibus extrahat. Cum semine Cupressi bibitur, si sanguis per os redditus est, fluítque ab infernis, Strangulatus vuluæ nidore vltum recreat, laxanturque suffocationes eo: sed quidam admiscunt in vino semen Cupressi contritum. Potum cum coagulo vituli marini æquis portionibus comitiales sanat. Succus infantium ramici, & vmbicilis eminentibus inungitur. Stranguriæ cum melle medetur. Item semine lethargici excitantur, & ut perhibet ex euphorbio naribus tactis Peucedani succo.

De Persica arbore. Cap. CCXXIX.

NOMINA.

Περσική μάλια Græcis, Persica malus Latinis: antiquum nomen herbarij vulgares retinuerunt: Germanis [Pfersichbaum,] Gallis *Peschier* appellatur. Persica fortè dicta, quòd ex Perside primum aduecta sit.

FORMA.

Persica folijs amygdalæ maioribus constat: flore subpunico, pomo carnosio, succulento, foris lanuginoso, dura intus & scabra nuce, in qua nucleus qualis amygdalus.

LOCVS.

Passim in hortis, vinctis potissimum, nascitur. Gaudet autem aquosis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere, fructus verò eius autumnì serè exitu maturefcit, celerrimè marcescens.

TEMPERAMENTVM.

Persica arbor in germinibus & folijs vincetem amaram qualitatem habet, ut hoc nomine calidam esse nemo dubitare possit. Fructus eius in secundo ordine frigidus & humidus existit.

*Persica malus.*VIRES EX DIO-
SCORIDE.

Persica poma stomacho grata sunt, matura bonam faciunt alium, cruda verò alium constringunt. Siccata vehementius adstringunt. Siccorum decoctum haustum stomachi & ventris fluxiones sistit.

EX GALENO.

Folia Persicæ trita & super umbiculus imposita lumbricos necant. Alioqui sanè etiâ discutiens medicamentum est. Pomorum verò eius succus & veluti caro facile

corrumpitur, omninoque noxam infert, quapropter haud post alios cibos ultimòque, sicut nonnulli solent, illa offerri oportet: nam in summo natantia corrumpuntur. Huius verò quod omnibus comune est, meminisse oportet: quæcunque vitiosi succi, quæ humida & lubrica sunt, facileque descendunt seceduntve, præ alijs comedenda esse: sic enim & ipsa celeriter subeunt, & alijs præeunt, ac quasi iter muniant. Postremò autem sumpta, vna secum alia quoque in corruptionem trahunt.

EX PLINIO VALERIANO.

Persicorum cibus est quidem stomacho inutilis, eò quòd citò succus eius inacciscat, & caro æquè in digestionem vitietur, verum minimè gravis, dum non diutius in intesti

nis moratur, & ad ima semper exitu celeri festinat. Persicorum cibus negatur à medicis membra nutrire. Sed & Gálenus suadet nunquam omnino post cibum sumere, corrumpi affirmans si cibis ceteris innatent. Persicorum folia trita & imposita, ventris animalia perimūt & expellūt. Eadem sicca & in puluerem rusa, recentes plagas cruentorum vulnerum claudunt. Nucleus Persicorum capitis dolori cum oleo & aceto tritus, illinitur: quamuis quidam cum solo ro sacco terere maluerint. Gummi gutta quam Persici trūcus illachrymat, fluenti aluo medetur. Eadem mixta cū vino, etiam in vesica lapillos frangit. Trita ex aceto impetigines reprimat. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperam arteriæ canalem leuiorem facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstructos sinus reserat: vitia pulmonis expurgat.

APPENDIX.

Flores Persicæ saccharo conditi, instar rosarum aut violarum, aluum haud leuiter mouent atque subducunt.

De Peplo. Cap. CCXXX.

NOMINA.

ΠΕΠΛΟΝ Græcis, Peplos Latinis, Officinis & vulgò Esula rotūda, Germanis [Teufelfz milch,] Gallis *Reneille* *matin des vignes* appellatur.

FORMA.

Exiguus frutex est albo liquore plenus: folijs paruis vt Rutæ, latioribus tamen: tota eius coma dodrantalis, rotunda, humi fusa: semine sub folijs paruo & rotundo, minore quàm candidi papaueris. Radice vna, ex qua totus frutex prouenit.

LOCVS.

Nascitur in hortis & vineis.

TEMPVS.

Colligitur mæsisibus, siccaturque in vmbra, & continuè vertitur.

TEMPERAMENTVM.

Idem cum Tithymallis habet temperamentum, atque
O aded



Peplos seu Esula rotunda.

adeò ex quarto calefacientium ordine est.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa multos habet vsus, radix verò inutilis. Semen eius tustum, feruidaque aqua madefactum reconditur. Pituitam & bilem acetabuli pondere cum hydromelitis cyathopotum, ducit. Opsonijs mixta herba aluum cõturbat. Cõditur in muria.

EX GALENO.

Peplos frutex liquorem similem Tithymallis habet, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

EX AETIO.

Pituitam ac bilem ducit acetabuli mensura cum mulsæ cyatho bibitum Pepli semen. Sale etiam herba maceratur, flatúsque discutit, vt Hippocrates asserit. Summopere igitur confert flatuosis affectibus qui in melancholia dominantur, item diuturnis lienis & vteri & coli flatibus, tumefactisq; œdematibus in abdomine.

EX PLINIO.


Semine Pepli potio aluus soluitur, bilis ac pituita detrahitur. Media potio est acetabuli mensura, in aquæ mulsæ heminis tribus. Et cibus inspergitur opsonijsq; ad molliendam aluum.

De Pilosella. Cap. CCXXXI.

NOMINA.

QUO nomine veteribus Græcis aut Latinis nominata sit hæc herba ingenuè fateor me ignorare. Neque enim est *μυδῆς βοῦς* Dioscoridis. Cùm itaque Græco & Latino nomine destitueremur, barbaro vti nobis necesse fuit, nisi planè herbam hanc vulneribus glutinandis mirè vtilem, præterire voluissimus. Herbarij itaque nostræ ætatis à copiosis pilis quibus vestitur, Pilosellam: Germani [Meuszerlin] Galli *Peluette* vocant.

GENERA.

*Pilosella maior.**Pilosella minor.*

Duo eius herbæ genera reperiuntur, in nullo ferè nisi floribus distantia. Vnum genus maioribus folijs, & quæ se à solo sustollunt, floribusq; luteis, maior Pilosella nominatur.

O ij Ger

Germanis propriè [Nagelkraut.] Alterũ minoribus folijs, in terra sessilibus, floribus purpureis, & quasi in papum enascentibus, Germanis [Meufzoerlin, oder Hasenpfatlin] peculiariter appellatur. Sic etiam suam Pilosellam manuscriptus herbarius in maiorem & minorem digessit.

FORMA.

Herba est folijs in terram graminis modo sparsis, pilosis, albicantibus à terra, supernè virentibus, floribus luteis aut purpureis, radice in exilitatè multà extenuata. Ex qua descriptione sole clarius fit, eam herbã quæ à Græcis Myosotis, à Latinis autem Auricula muris dicitur, non esse Pilosellam: nam, vt reliqua taceã, neque maior neque minor Pilosella cœruleum flosculum velut Anagallis obtinet: vt nõ parum errent herbarij nostri temporis qui Pilosellam alio nomine Muris auriculam appellari tradunt.

LOCVS.

Nascitur vtrunque genus locis montosis & collibus terrenis. Maior autem inuenitur etiam in asperis & incultis agrorum limitibus.

TEMPVS.

Maior & Iunior potissimùm mense florent. Minor tamen Pilosella paulò post initia Iunij mensis disperit, & nusquã subinde inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Esse calidas & siccas Pilosellas gustus palàm declarat: habent enim adstrictionem eũ exigua quadam acrimonia cõiunctam, vt hoc nomine ad purificanda ac subinde glutinãda vulnera sint mirificè vtilis.

VIRES EX RECENTIORIBVS.

Ferunt foliorum farinam vulnera mirum in modum glutinare. Herbæ recentis succum exprimunt ad cohibendos quartanæ febris horrores. Eodem tinguunt gladiorũ aciem, vt omne ferrũ aliud domet, secetque: ferrum enim, quod huius succo commaduit, tantam contrahere duritiã, tamquæ magnum induere robur produnt, vt chalybis aciem respuat. Has certè omnes facultates manuscriptus herbarius Pilosellæ adscribit. Recentiores huius herbæ radicem Ma-

io mense effossam, siccata, & in puluerem redactam, ac subinde potam, aut in cibo datam, efficacissimum esse aduersus ramicem remedium tradunt.

De Pimpinella Cap. CCXXXII.

NOMINA.

VT appellata sit Græcis aut Latinis herba hæc quã hodie vulgus herbariorum & Officinæ Pimpinellam vocant, nondum nobis certò scire licuit. Sunt qui Pampinulam & Bipennulam nominent. Germani [Bibinellen & Bibernellè] Galli *Pimpinelle* ou *Pimprenelle* appellant.



Pimpinella maior.



Pimpinella minor.

GENERA.

Duum est generum Pimpinella. Vna maior, radice admodum
O iiij modum

modum longa, folijs multifariam scissis, Sisaro haud dissimilibus, caulibus angulosis, floribusque in summo exiguis & candidis. Altera minor, caulibus rufescentibus, folijsque minoribus, & non dissectis multifariam, sed serratis tātū alīas priori per omnia similis.

FORMA.

Herba est folio mucronato, dissecto, aut in extremitatibus serrato, caulibus ab eadem radice binis aut trinis, angulosis, & interdum rubentibus, in quorum summo nascuntur flores minuti & candidi, & ijs decidentibus semen exiguum Oreoselinī semini simile. Radice crassa, longa, & subrubente, acri admodum.

LOCVS.

Lucis & opacis locis minus, in pratis autem maius affatim citra cultum erumpit.

TEMPVS.

Aestate in Autumnum vsque floret.

TEMPERAMENTVM.

Quin acrimoniam non exiguam in gustu præ se ferat, haud dubiè in secundo ordine calida & sicca erit, imò secundum calefaciendi ordinem excedere credibile est, & ad tertium ferè accedere.

VIRESEX RECENTIORIBVS.

Pimpinellæ succus bibitur cōtra serpentium morsus. Et vino pota calculos terit. Stranguriam etiam decocta leuat. Succus eius potus omne venenum discutit. Aqua eius ignis vi expressa, oculorū caliginem discutit. Hæ sunt facultates quas illi antiquus herbarius tribuit. Alij tradunt succum eiusdem faciei maculas detergere posse. Est autē radicis Pimpinellæ tum vsus præcipuus, quū sæuientis populatim pestilentiae contagia arcere conamur: vnicè enim venenis aduersatur, & corpora ab hac lue vindicat, vt adfirmāt, si tantū in ore teneatur. Quod certè non potest ea quam hodie Sanguisorbam vocant herba. Quare mirum in modum errant, qui hanc cum Pimpinella confundunt, vt fusiùs suo dicemus loco.

Adno

ADNOTATIO.


Neutra ex his Pimpinelli nostram exprimit, qua odore est cicutæ, coliculi rubentibus, & flosculis in capitello purpureascentibus, quam post sanguisorbā vocat.

De *Pastoria bursa*. Ca. CCXXXIII.

NOMINA.

QUO nomine herba, quam vulgus *Pastoriam burfam* appellat, Græcis & Latinis medicis dicta sit, ignore me ingenuè fateor. Sunt qui petram etiam pastoris nominant, à folliculis in exigua vulgæ similitudinem compressis turbinata cordis effigie. Germanis [Deschelkraut & Hirtenfckel] vocatur: Gallicè *Bourse à pasteur*.

FORMA.



Bursa pastoris.

Herba raro pedē altior, ramosa, Erucæ folia habens, at minora. Flores exiguos, candidos. Semen in vulgus minutum & nigrum. Radicem candicantem & oblongam.

LOCVS.

Nascitur propter vias passim & in parietinis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus legitur.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & adstringit.

VIREB EX RECENTIORIBVS.

Ex aceto trita collectionum inflammationes refrigerat, ac eò confluentes humores cohibet. Imponitur sacris ignibus, & quibus stomachus æstuat. Succus eius purulentis auribus infunditur. Cruenta sanat vulnera. Medetur dysentericis, sanguinem excreantibus, neq; non muliebri profluvio. Manuscriptus herbarius addit hanc sanguinem è naribus profluentem sistere mirificè posse. Herbam quoq; manu tantùm gestatam, mox idem efficere tradit. Quid multa? mirè efficax est in comprimendis omnibus sanguinis eruptionibus.

De Pede Leonis. Cap. CCXXXIII.

NOMINA.

QVAM vulgus herbariorum Pedem Leonis nominat, non est Dioscoridis Leontopodion: id quod descriptio satis monstrat.



Pes Leonis.

Quo verò nomine Græcis & Latinis appellata sit, mihi nondum constat. Sunt ex barbaris qui Alchimillam, alij etiam qui plantam Leonis nominant. Sic autem dicta, quòd folia habeat instar Leonini pedis lata & rotunda. Germanis [Synnavv Loeventapen Leo véfuosz et vnser frau vvm mantel] Gallis *Pied de Lyon* vocatur.

FORMA.

Dodrantalís est herba, folia lata, crispa & rotunda.

rotunda octo ferratis incisuris distincta, non tamen ad pediculos vsque, qui statim è radice exeunt, fissi habens. Flores item exiguos & luteos profert. Radicem digito crassiorē, & sesquipalmo longiorem subrubescētem.

LOCVS.

Pasim in pratis, in alto potissimū sitis, nascitur.

TEMPVS.

Maior mense erumpit, ac inter Iunij initia floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & radix adstrictione vehementi participant, atq; adeo exiccant. Recentiores idipsum in secundo efficere ordine tradunt.

VIRES EX RECENTIORIBVS.

Vulneribus glutinandis aptissima est. Decocto enim illius lauantur vtiliter omnia vulnera. Linteum quoq; in eo madefactum illis commodè imponitur. Mulierum mēas impensè laxas linteum decocto eiusdem intinctū & impositum, duras solidasq; efficit. Decoctum denique hoc epotum, interanea vulnera, rupturasq; glutinat. Et quod dictū mirū est, tanta eius plantæ in glutinando vis est, vt ramices intestinorum, in pueris potissimū, sanare possit.

De Poligono mare. Cap. CCXXXV.

NOMINA.

PΟλύγονον ἄρριον Græcè, Proserpinaca, Seminalis à seminis multitudine, & Sanguinalis à cohibendo sanguine nominatur. Officinis Corrigiola & centumnodia, Germanicè [Vegggrasz, Denngrasz, Veggdrijt] appellatur. Polygonon à geniculorum frequentia, & multitudine dictum est Gallicè *Corrigiole masle* nominatur.

FORMA.

Herba est ramis tenuibus, teneris, copiosis, geniculis interfectis, in terra graminis modo repentibus. Folijs Rutæ similibus, longioribus tamen. Iuxta singula folia semine, vnde masculum vocatur. Flore albo aut puniceo.

LOCVS.

Nascitur pasim, quotidieque pedibus conculcatur, sua sponte in aggeribus & semitis proueniens.


O V TEM

TEMPVS.

Aestate floret, quo
etiam tempore legitur.

TEMPERA-
MENTVM.

Vti adstrictionem
quandam obtinet Poly
gonum, ita sanè vincit
in eo aqueū frigidum,
vt videlicet secundi sit
ordinis medicaminum
refrigerantium, aut e-
tiam quodammodo in
initio tertij. Est etiam
exiccatorium.

VIRES EX DIO-
SCORIDE.

Polygonum mas.

Vim habet adstringendi & refrigerandi succus Polygoni
potus. Prodest sanguinem expuētibus, & alui defluxioni-
bus, cholericis & urinæ stillicidio: Urinam enim euidenter
ducit. Cum vino potus venenatorū morsibus auxiliatur.
Valet etiam ad febrium circuitus vna hora ante accessione
sumptus. Muliebri profluuium appositus sistit. Aurium
doloribus, & purulentis auribus instillatus confert. Cum
vino decoctus melle adiecto, eximiè ad genitalium vlcera
facit. Folia contra stomachi ardorem, sanguinis reiectio-
nem, herpetas, ignes sacros, inflammationes, & demata, &
vulnera recentia illinuntur.

EX GALENO.

Polygonū ijs sanè quibus stomachus æstu feruet, extrin-
secus illitum auxiliatur: veluti etiam ignes sacros & calidas
phlegmonas iuuat. Porro tale cū sit, & fluxiones reprimat,
& hac

& hac ratione videtur exiccatorium esse. Quare cum herpetum, tum vlcerum, aliorūque bonum est remedium: efficacissimum autem inflammatione & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum vulnorum glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest: & si vel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccet. Easdem ob facultates & muliebri profluum, & dysenteriam, & sanguinis eiectiones, & vndeque aliunde immoderationes impetus sistit. Refert Dioscorides quod & vrinam prouocet exhibitum stillicidio affectis. Non tamen affectum exactè discriminat in quo dari ipsum expediat.

EX PLINIO.

Succus eius infusus naribus, supprimit sanguinem & potus cum vino, cuiuslibet partis profluum excreationesque cruentas inhibet. Vis eius spissare ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, vrinam ciet, rheumatismos cohibet: qui si non fuere, non prodest. Stomachi feruori folia imponuntur. Vesicæ dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorum dolori per se. Dabatur & in febribus ante accessiones, duobus cyathis in tertianis quartanisve præcipue. Item cholericis, dysentericis & in solutione stomachi.

ADNOTATIO.

Poligonum mas herba innocentium vulgò dicitur, quod Parisijs cæmeterio Innocentibus sacro Luxuriat.


De Pegano. Cap. CCXXXVI.

NOMINA.

Πήλον κηπιὺν Græcè, Ruta hortensis Latinè, Officinæ retinuerunt nomen Latinum: [Rauten & Vvein rauten] Germanicè: Gallicè Rue vocatur. Peganon Græci, Plutharcho lib. 3. sui symposij teste, à facultate, quod calore siccitateque genituram coagularet, dixerunt: πηγνυσθαι enim coagulare, & quasi in glaciem contrahere est. Hinc vterū gestantibus inimica, etiam coronis inserta putatur.

FOR

FORMA.

*Ruta Hortensis.*

Frutex est Ruta Hortensis grauiſſimi odoris ſemper ſerè virens: folio exiguo, penè rotundo, caſij coloris, denſo, ſurculotiſ ramis: flore luteo, anguloſiſ calycibus, in quibus ſemen album continetur.

LOCVS.

Prouenit paſſim in hortis, amat aprica & ſicca loca.

TEMPVS.

Floret æſtate ſemen autem Autumno matureſcit, quo etiam tempore carpendum venit.

TEMPERAMENTVM.

Gultu non ſolum acri, ſed & amaro eſt, ex tertio ordine excalfacientium, & ſtrenuè deſiccantium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vrit, calfacit, exulcerat, vrinam mouet, menſtruaque ducit. Aluum ſiſtit pota & comeſta. Lethaliū venenorū antidotum eſt, ſi ſemen acetabuli mentura in vino bibatur. Folia per ſe ante cibum ſumpta, & cum nucibus iuglandibus, aridiſque ficis, inefficacia venena reddūt. Contra ſerpentes ſimiliter ſumpta proſunt. Geniturā tam in cibo quā potu extinguit. Coctū cum anetho ſicco, tormina ſiſtit. Facit etiam ad lateriſ thoraciſque dolores difficultatem ſpirādi, tuſſes, pulmonis inflammationem, coxendicū, articulorum que cruciatus, rigores circuitibus certis repetentiū febrium,

vti

vti prædictum est, pota. Ad inflationes coli, vteri & recti in testini, decocta cum oleo & infusa, Vuluæ strangulatu liberat trita cū melle, si à genitali vsque ad sedem imponatur. Feruēfacta eum oleo & pota, lumbricos excutit. Articulorum doloribus cum melle, aquæ inter eutē, quæ hyposarca dicitur, cum ficis illinitur. Eisdem pota auxiliatur, in vino decocta ad dimidias partes, & si ea abstergantur. Cruda saleque condita ac comesta, visus aciem exacuit, & oculorum dolores cum polenta illita sedat. Cum rosacco & aceto eapitis doloribus succurrit. Sanguinis nariū profuua, trita & imposita sistit. Testium inflammationibus cum Lauri folijs illita, & exanthematis cum myrto & cerato prodest. Cum vino autem, pipere & nitro conficta, albæ vitilagini medetur. Cum iisdem illita thymos & myrmecias tollit. Cū melle et alumine imposita lichenibus prodest. Succus in malicorio calfactus & instillatus auriū doloribus succurrit. Oculorum hebetudinibus cum succo Fœniculi & melle inunctus subuenit. Ignēs sacros, herpes & achores cum aceto cerussa & rosaceo inunctus sanat. Ceparum & alliorum acrimoniam commanducata domat.

EX GALENO.

Ruta incidere atque digerere crassos lentosque humores potest. Ob eam autem vim & vrinas mouet. Quinetiam tenuinum est partium, flatūsque extinguit. Quare ad inflationes prodest, ac Veneris appetitum cohibet. Discurtit atque exiccat strenuē: est enim ex eorum medicamentorū numero quæ valenter exiccant.

EX PLINIO.

Quæcūque Ruta & per se pro antidoto valet, folijs tritis & ex vino sumptis, contra aconitū maximè & ixiā: Item fungos, siue in potu detur, siue in cibo. Simili modo contra serpentium ictus, vt potè quū mustellę dimicaturę cū his, Rutā prius edendo se muniāt: Valēt & cōtra scorpionū ictus, & araneorū, apum, crabronū, vesparum aculeos, & cāthartidas, ac salamādras, canisve rabiosi morsus, acetabuli mēsurā si succus ē vino bibitur, & folia trita vel cōmanducata imponuntur eum melle & sale, vel cum aceto & pice decocta.

Succo

Succo verò perunctos, aut etiā habentes, negāt feriri ab his maleficijs: Serpentesq; si vratur Ruta, nidorem fugere. Efficacissima tamen est sylvestris radix cum vino sumpta: eandem adiungunt efficaciorē esse sub dio potā. Pythagoras oculis noxiā putauit falsò, quoniā sculptores et pictores hoc cibo vtuntur oculorū causa. Cū pane quoque vel nasturtio satius atque sylvestris propter visum. Vt autē, multi succo eius cum melle attrito inuncti discusserunt caligines, vel cū laetē mulieris puerum enixæ, vel puro succo angulis oculorum tactis. E piphoras cum polenta imposito. Lenit autem capitis dolores potā cum vino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si verò sint cephalæa, cū farina hordeacea, vel aceto. Eadem cruditates discutit, mox inflationes, dolores stomachi veteres. Vuluas aperit, corrigitque conuersas, illita in melle toto ventre & pectore. Hydropicis cum ficu, & decocta ad dimidias partes potaque ex vino, Sic bibitur ad pectoris dolores laterumque & lumborum, tusses, suspiria, pulmonum æccinorum, renum vitia, horrores frigidos. Ad crapulæ grauedines decoquuntur folia poturis. Et in cibo vel cruda vel decocta conditave prodest. Item torminibus in Hyssopo decocta, & cum vino. Sic & sanguinem sistit interiorum, & narium, indita: sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoque in dolore succus infunditur, custodito vt diximus modo. E sylvestri verò contra tarditatem & sonitum cum rosaceo, vel cum laureo oleo, aut cumino & melle. Succus & phreneticis ex aceto tritzæ instillatur in tempora & cerebrum. Adiecerunt aliqui & Serpyllum & Laurum, illinentes capita & colla. Dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendum. Dederunt & comitialibus bibendum decoctę succum in cyathis quatuor ante accessiones, quarum frigus intolerabile est. Alsiosisque crudā dari in cibo. Vrinā quoque vel cruentam pellit. Fæminarū etiam purgationes secundæque, etiam emortuos partus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro pota, Itaque illitā & vuluarū causa etiam suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Et contra ileū decocta farina in oleo, & yelleribus collecta. Multi verò & contra purulentas excretaiones sicæ drachmas duas, sulphuris vnā & diuiniā sumi

mi censent. Et cōtra cruentas, ramos tres in vino decoctos. Datur & dysentericis cum caseo in vino contrita. Dederūt & cum bitumine infrictam potioni propter anhelitū. Ex alto lapsis seminis tres vncias, ex olei libra, viniq; sextario. Illinitur cum oleo coctis folijs, partibus quas frigus adusse rit. Si vrinam mouet, vt Hippocrati videtur, mirū est quosdam dare velut inhibentem potui contra incontinentiam vrinæ. Psoras & lepras cum melle & alumine illita emendat. Item vitilignes vel rugas, strumas, & similia, cum hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Item ignem sacrum ex aceto & oleo, vel psimmythio. Carbunculum ex aceto. Nonnulli laserpitium vnā illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas curant. Imponunt & mammis turgentibus decoctam, & pituitę eruptionibus cum cera. Testium verō epiphoris cum rainis laureæ teneris, adeō peculiari in visceribus his effectu, vt syluestri Ruta cum axungia veteri illitos ramices sanari prodant. Fracta quoq; membra semine trito cum cera imposito. Radix Rutæ sanguinem oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat. Ex reliquis quoq; quæ traduntur, mirum est, cum feruentem Rutæ naturam esse conueniat, fasciculum eius in rosaceo decoctum addita vncia aloes, perunctis sudorē reprimere. Itemque generationes impediri hoc cibo, ideo profluuiogenitali datur, & Venerem crebrō per somnia imaginantibus. Præcauendum est grauidis, abstineant hoc cibo: necari enim partus inuenio. Eadem ex omnibus satis quadrupedum quoque morbis in maximo vsu est, siue difficile spirantibus, siue contra maleficorū animalium ictus, infusa per nares ex vino: aut si sanguisugam exhauserit, ex aceto, & quocunque in simili morborum genere vt in homine temperato.

EX SIMEONE SETHI.

Incidit crassos & tenaces humores, perq; vrinam vacuat, & ad inflationes conducit, appetentiamq; Veneris compescit, ac strenuē exiccat. Ad inflatas aquas inter cutem, & anasarcam, morsos à vipera, succum Papaueris aut aconitū bibentes, colicósq; pota & iniecta. Traditur quod comesta visum

visum acuat, ob id antiqui pictores hanc assidue degustabant. Nonnulli & succum eius melli commiscentes, medicamentum ad oculorum aciem acuendam conficiunt. Succurrit difficultati urinae si cum oleo coquatur, & ea vesica foueatur. Item difficulter spirantes cum melle data, confestim iuuat, Lethargicis pota, & per clysteres iniecta remedium fit. Intestina corroborat, non solum caliditate, sed proprietate quadam. Fertur etiam quod si praegrans mulier ex eius succo bibat, abortiat. Et si in dies quindecim folia assumat, idem facit. Obstructiones iccoris & lienis tollit. Si ieiunus quisquam ipsam assumpserit, eo die à veneno non laedetur.

De Potentilla. Cap.

CCXXXVII.

NOMINA.



Potentilla.

QVO nomine Graeci & Latini hanc herbam appellarint, à nullo, quod sciã, adhuc proditum est. Recetiores herbarij Potentillam, aliqui ob similitudinem Agrimoniam & Tanacetum sylvestre nuncupant. Germani, quod herba illa anseres in cibo delectentur. [Genserich,] Galli *Tinaciefauuage*, ou *Bec d'oye* vocant.

FORMA.

Herba Eupatorio, quod Agrimoniam hodie vocant, haud dissimilis.
Caules

Caulēs ex vna radice multos profert, humi stratos. Folia Eupatorio similia, supernè viridia, infernè candicantia. Flores luteos singulari pediculo pendentes. Radicem extrinsecus rufescentem, intus candidam.

LOCVS.

Nascitur passim circa semitas & loca aquosa, atque in fluuiorum ripis ac marginibus.

TEMPVS.

Aestate floret, quo etiam tempore legi debet.

TEMPERAMENTVM.

Quum folia eius & radix adstringant, temperamento à Pentaphylo seu Quinquefolio nihil differre videtur. Quare hæc, potissimum autem eius radix, ex tertio ordine desiccatoria est, minimūq; euidentis caliditatis habet. Errant itaque mirum in modum recentiores, qui hanc humidam esse statuunt, nulla alia moti ratione, quàm quòd in humidis locis proueniat: quasi verò Nasturtium aquaticū, quod Sisymbrium cardamine Dioscoridi vocatur, haud obstare quòd in aquosis nascitur, non etiam in tertio desiccet ordine. Debuisset certè illos ab hac sententia detertere non leuis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim, Galeno libro quarto, de simplici. medica. faculta. capi. vj. teste, terrena sunt de crassa corporis consistencia, atque adeò sicca.

VIRE S.

Recentiores Potentillam fluxionibus & puncturis oculorum prodesse, recentia vulnera glutinare, & excrementa sanare, mulierum menstrua compescere, artus & membra confirmare, rectè tradunt: nam id ipsum posse, adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, abundè docet. Et cum habeat Quinquefolij temperamentum, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentium itaque dolorem finit. Excrementa oris vlcera sanat. Dysentericis & alui profluuijs, coxendicis articulorumq; doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliæque potest quæ à Dioscoride Quinquefolio tribuuntur. Quòd verò adiiciunt hanc etiam lumbricos exterminare posse, id minus rectè faciunt. Ea siquidem

P facul

facultas non huic, sed illi inest herbæ quæ verè Tanacetum dicitur, quæ quidem est tertia, vt suo diximus loco, Artemisiæ species. Proinde non sine magno errore, Potentillam cum ea quæ propriè Tanacetum vocatur herba confuderunt.

De Prunella. Cap. CCXXXVIII.

NOMINA.

NONDVM nobis constat quo nomine hæc herba veteribus tum Græcis, tum Latinis appellata sit. Vulgus tamen medicorum & herbariorum Prunellam nominat. Germani [Braunellen oder Gottheyl,] Galli *l'Herbe au charpentier* vocant.

FORMA.



Prunella.

Caules habet in medio striatos, pingues & hirsutos: folia Ocimo similia, coloris herbaei, & acuminata. Flores in summis caulibus spicatos, Lauandulæ vocatæ herbæ non dissimiles. Radicem tenuem, multis capillamentis fibratam.

LOCVS.

Nascitur passim in pratis.

TEMPVS.

Maiò & Iunio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse constat, id quod ex gustu patet:
glu

glutinosa enim admodum & modicè amara est.

VIRE S.

Vulnerariam esse herbam euidentissimum est. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, vehementes capitis dolores sedare recentiores vno consensu tradunt, si tempora ex eo inungantur. Aphthas & oris vlcera, fauciumque vitia succus eiusdem sanat.

De Pentaphyllo. Cap. CCXXXIX.

NOMINA.

Πεντάφυλλον Græcis. Quinquefolium Latinis & Officinis, Germanis [Fijns fingelkraut, oder Fijnffblatt,] Gallis *Quintefueille* appellatur. Nomen à numero foliorum habet: in vnoquoque enim pediculo quinque esse comprehenduntur.


GENERA.

Et si Dioscorides vnum duntaxat Pentaphylli genus faciat, tamen nos ad nostras respicientes terras tria eius genera in vniuersum produximus. Vnum quod maius appellauimus, prorsus ad Dioscoridis picturam accedens, vt hoc nomine verum esse Quinquefolium putemus. Estque duū generum: vnum quod pallidos seu candidos flores obrinet, hinc est quòd Quinquefolium maius candidum appellaue rimus. Germanicè [grofz Vveisz Fijns fingelkraut.] Gallicè *Grande Quintefueille blanche*. Alterum floribus ornatur auri colorem æmulatibus, seu luteis. Nos vt discerneremus à priori, Quinquefolium maius luteum nominamus gallicè *Grande Quintefueille jaune*. Dioscorides etiam hæc duo genera innuere videtur, cùm inquit florem habere vel cādīdum vel auri æmulum. Tertium minus diximus, quod priori haud dissimile est, nō tamē passim vt illud quinque folia obtinens. Hoc, cū non haberemus aliud nomē quo ipsum appellaremus, inter Quinquefolij genera connumerare placuit. Illud Gallis *Quintefueille petite* appellatur. Videtur verò Hippocrates etiam duo Quinquefolij genera nouisse, vnum humilius, alterum procerius, vt hoc nomine nobis etiam liceat minus & maius statuere.



Quinquefolium mains candidū. *Quinquefolium mains luteum*

Ramulos habet festucarum instar graciles, dodranta-
les, & in ijs semen. Folia Menthae similia, in singulis pedicu-
lis quina, raro plura, per ambitum serrae modo incisa: flore
in candido pallidum, auri æmulum, Radicem subrubram,
oblongam, Elleboro nigro crassiores, Ex qua sanè descri-
ptione omnibus liquet, mains Quinquefolium esse legiti-
mum. Ex vna siquidem radice subrubra & oblonga, ramu-
los profert tenues, ac prorsus festuca ceos, & in ijs semen, fo-
lia Menthae, quina in singulis pediculis, per ambitum serrae
modo crenata: flore in luteum, aut aureū. Quibus accedūt
natalis locus (in riguis enim nascitur) & immensa adstrin-
gēdi facultas: quae quidem singula verū esse Quinquefoliū
docent, Adcoque mirari satis non possum, cur nonnulli
adulte



Quinquefolium minus.

sus ex tertio est ordine desiccātum, minimum habens eui-
dentis caliditatis.

VIRES EX DIOSCO- RIDE.

Radice Quinquefolij decoctum ad tertias depressum
deductumve, si in ore retineatur, dentiū dolores sedat. Pu-
trescentia oris vlcera collutione sistit. Arteriz asperitates
gargarizatum emendat. Contra alui proflutia: & dysente-
rias auxiliatur. Item articulorum & coxendicium dolores
potū sanat. Cocta in aceto & illita, herpetas cohibet. Stru-
mas discutit, duritias: œdemata, aneurysmata, abscessus, e-
rysipelata, digitorum pterygia, condilomata, scabiesq; sa-
nat. Teneræ radice succus, contra iccinosis pulmonisque
affectiones & venena prodest: Folia cum hydromelite, aut

P ij vino

adulterina hæc esse Peti-
taphylla sibi persuase-
runt.

LOCVS.

Prouenit aquosis lo-
cis, & iuxta aquedu-
ctus. Interdum etiam
in incultis, siccis & are-
nosis locis.

TEMPVS.

Floret Maio & Iuni
mensibus potissimum.

TEMPER A- MENTVM.

Vtriusque certè folia
flores & radices vehemē-
ter adstringunt: atque-
adeo, vt Galenus ait, ra-
dix, cuius multus est, v-

vino diluto, & exiguo pipere, contra febrium circuitus bibuntur: in quartana quidem quaternorum ramulorum folia, in tertiana verò trium, in quotidiana vnius. Tricenis diebus pota comitiali morbo medentur. Succus foliorum per dies aliquot trium cyathorum mensura potus, celeriter regium morbum sanat. Vulneribus ac fistulis cum sale & melle illita medetur. Enterocelicis, id est, intestinorum ramice laborantibus succurrunt. Sanguinis eruptiones potum & illitum Quinquefolium sistit. Inciditur ad expiationes lustrationesve, sanguinis profluvia & castimonias.

EX GALENO.

Pentaphylli radix desiccatur vehementer, minimum vero acris est: quare in multo est usu, velut alia quoque omnia, quæ quum sint tenuium partium, citra morsum desiccant.

EX PLINIO.

Quinquefolium adhibetur purgandis domibus. Stru-
nis medetur, & pectoris vitij. Idem ischiadicis bibitur &
imponitur. Panos sanat. Impositum articulis vtilissimum.
Fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale &
melle. Phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de
Quinquefolio potus cyathis tribus anginae medetur. Idem
iecinoris & pulmonis vitij, sanguinemque reiicientibus,
cuicunque sanguinis vitio intus occurrit. Multi supra o-
mnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefolium
decoctis in lacte radicibus & potis. Item decoctum ad ter-
tias in vino ictericis dari atque illini vtilissimum est. Eius
folia ex aqua comitiales sanant. Item contrita ex vino sum-
pta triginta diebus in betonicae farinae pondo denario-
rum tredecim cum aceti scillitici cyatho, comitialibus
morbis liberant. Celerrimè succus regio morbo mede-
tur, tribus cyathis cum sale & melle potus. Quinquefolij
folia quidam terna tertianis dedere, quartana quartanis,
plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pipere ex aqua
mulla.

De Pisus.

Cap. CCXL.

NOMINA.

Πισος ἢ λικος. Græcè, Pisum Latinè dicitur Officinis hoc nomine notū. Germanicè [Erbisz, oder Ervveyssen,] Gallicè *Pois*. Sic autem à Pisa loco in quo olim copiosissimè nascebatur, nominatum est.

GENERA.


Duo apud nos genera Pisorum reperiuntur. Vnum in aruis caducum, humi serpens, quod genus Germani [Kleinfeld Ervveyssen] nominant. Huius, utpote vulgaris, picturam haud damus. Alterum in altum scandit, arboribus aut palis quibus accubet adfixis, quibus sese capreolis vinciens illigat. Hoc Germani [Groszgarten Ervveyssen] vocant.

Genus hoc pictum exhibemus.

FORMA.

Caules in terrā spargit concauos, ramososque, prætenui surculo, folio frequenti, præter cæterorum morem longiusculo, flore papilionis forma, circa umbilicum purpureo: siliqua oblonga seu cylindracea, granis rotundis, & ut Plinius lib. xvij. capit. xij. ait, angulos multos inæquales habentibus: radice imbecilla, ut mirari satis non possim unde plerisque suspicio orta sit, ut Pisū nostrū legitimum esse dubita-

P iiij uerint.



Pisum.

uerint. Scio autem esse, qui legumen hoc, quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse Cicer arietinum, quòd scilicet valvulæ seu siliquæ eius cornu arietini formam habeant. Quorum certè sententiam probare non possum, quòd, Plinio teste, Cicer arietinum sic non sit dictum, quia valvulæ effigiem arietini cornu exprimant, sed quia legumen ipsum seu granum Ciceris arietino capiti simile sit. Eam autem formam legumen hoc, quod Pisum nominamus, non refert.

LOCVS.

Apricis gaudet locis, frigorum nanque impatientissimum. Tepidum itaque locum & cœlum frequentis humoris desiderat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, & subinde etiam semina in valvulis profert.

TEMPERAMENTVM.

Quum Pisum simile quid tota substantia cum faba, vt testatur Galenus, obtineat, necesse est vt non multũ à medio temperamento in refrigerando & exiccando recedat.

VIRESEXGALENO.

Simile quid tota substantia cum fabis obtinent Pise, nec alio quam illæ modo manduntur. In duobus autem euariant. Non enim similiter ac fabæ inflant, nec abstergendi facultatem habent, ideòque segniùs quàm illæ per aluum secedunt.

EXPAVLO.

Pisum molle quidem & laxum est, non tamen adeò inflat.

De Polytricho Apuleiano. C. CCXLI.

NOMINA.

NON temerè adiectum est Apuleij, ne scilicet quispiã Dioscoridis & aliorum Græcorum intelligeret Polytrichon: quod sanè forma ab eo quod nunc describimus alienissimum est. Germanicè à colore aureo quem habet [Guldiner Vviderthon] vocatur. Officinis incognita est hæc herba. Polytrichon dicta est à ramulis, qui capillorum instar

instar tenues sunt: Gallicè *Especce de Mouffe.*

GENERA.

Duo Polytrichi Apuleiani damus genera Vnū maius, alterum minus: neq; enim differunt nisi sola magnitudine.

FORMA.



Ramulos habet capillorum instar tenues, colore aurum referentes, circūque hos folia multa capillacea, in summo capitula lentis aquaticæ ferè forma, eiusdem cum ramulis coloris.

LOCVS.

Maius nascitur in pratis humidis & vliginosis. Minus in petris ac muris humidis.

TEMPVS.

Polytrichum Apuleii, maius & minus.

Mense Iulio vtrūq; reperitur.

TEMPERAMENTVM.

In caliditate & frigiditate symmetra sunt: desiccant tamen, extenuant & digerunt.

VIREs.

Decoctum eorundem in aqua aut lixiuia capillorum radices firmat, ideòque in alopecia caput glabrum capillis vestit. Potum, viscosorum crassorumque è thorace pulmonèque excreationibus non mediocriter confert: lapides frangit, & vrinas ducit. Morbo regio correptis & lienosis auxiliatur. Strumas discutit, & in summa eadem quæ Adiatum

P v potest

potest. Recentiores superstitione quadam ducti, illis multa ridicula & incredibilia tribuunt.

De Persicaria. Cap. CCXLII.

NOMINA.

NON clām me est quān variē à multis diuinatum sit, quo nomine Persicaria vocata veteribus sit. Sed mea quidem sententia, in vniuersum omnes coniecturis vsi nō satis firmis, decepti sunt. Et ego quidē fateor ingenuē, nec mihi constare num à veteribus descripta sit, tantū abest vt scire queam quo illam appellauerint nomine. Vulgus herbariorū vno cōsensu hodie, quòd folia Persicę habeat, Persicariam nominant. Germani [Flohkraut,] Galli Curaige.

FORMA.



Persicaria.

Folia Persicę arboris habet, fusca in medio macula plumbaginea: caule geniculato, rubente, longo: flore spicaceo, primum candido, dehinc purpureo: semine minuto, radice lutea, numerosa.

LOCVS.

In humidis & palustribus locis frequētius prouenit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floribus ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Frigidam & admodum siccā esse gustus abūdē monstrat:
miri

mirificè enim gustata adstringit.

VIRÈS.

Vulnerariam herbam esse, temperamentum eius satis docet. Rectè itaque iuniores medici in vulneribus, & maximè fistulis curandis vtuntur. Vtilis haud dubiè in dysenteria, alijsque malis que refrigerationem & adstrictionem requirunt.

De Perfoliata. Cap. CCXLIII.

NOMINA.

AN hæc herba veteribus cognita fuerit Græcis & Latinis, affirmare certò nō possum. Ego planè Cotyledonem putarè Dioscoridis, nisi radix in diuersam me traheret sententiam, quæ oliuæ instar rotūda non est. Hodie ta-

men, quod caulis eius singula folia dissecat atque penetrat, Perfoliata ab omnibus appellatur. Germanicè [Durchwachsz, & Bruchvrtz] dicitur.

FORMA.

Caulis illi rotundus, rubescens, folia singula penetrans, quæ Pisorum folijs haud dissimilia sunt, tenuia admodum & glabra: in summo colliculorū capitula, & in ijs flores lutei, & semina formam serè Tithymalli, quā vulgò Esulā
nōmi



Perfoliata.

nominant præ se ferentia. Radix candida, fibris capillata.
LOCVS.

Nascitur in hortis sata, & interdum sua sponte in arenosis locis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, & subinde semina producit.

TEMPERAMENTVM.

Amara modicè est & adstringit, vt hinc colligi liceat calidam & siccam esse.

VIRE S.

Vulneribus & vlceribus tam externis quàm internis curandis aptissima est herba, hæc enim glutinat. Valet autem potissimum ad ramices puerorum sanandos. Auxiliatur etiam exulcerationibus & prominentijs vmbilici. Plurimus huius apud chirurgos vsus.

De Porro. Cap. CCXLIII.

NOMINA.

Π *Πάρον* Græcis, Porrum Latinis & Officinis, Germanis [Lauch] Gallis *Pourreau* appellatur. Porrum autem dictum putant, quòd porro eat, & longè latèque grassetur.

GENERA.

Porri duo genera signauit antiquitas. Vnum capitatū, sic nominatū quòd eius radix in caput increseat atque extuberet. Alterum sectiuum, qui frōdens coma super terram eminens aufertur amputatū rve. Hoc Germani pulchrè ad nomen Latinum alludentes, [Schnittlauch] nominant, & [Bryszlauch.]

FORMA.

Capitatum simplici capite ex albæ ceruicis angustijs extuberante constat, frōde super tetram carinata, & in angulū oblōga. Sectiuo verò caulis est longus, intus cauus, multis in vertice floribus aceruatim collectis, & in speciem absoluti orbis conglomeratis, id quod in bimo accedit: quod etiam sementescit, sparso per eius cacumen semine, & emoritur

*Porrum capitatum.**Porrum scellium.*

ritur. Radix cādicans, crassa, multis fibris capillata, ac tuni-
cis quibusdam vestita,

LOCVS.

Læto solo gaudet, odit rigua.

TEMPVS,

Duodeuigesimo die à satū prorsūpit, bimātūq̃ue perfert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & extenuat perinde atque cepa, vt ex eius fa-
cultatibus euidentius innotescet. Symeon Sethi calidum &
siccum in secundo facit ordine,

VIRESEX DIOSCORIDE.

Porrum capitatū inflationem facit, noxium succū creat,
difficilia insomnīa parit, yrinam ciet, aluo accommodum.
Extenuat, Oculorum obcuritatem facit. Menses pellit, ve-
sicam

sicam exulceratam, renesque lædit. Cum ptisana verò coctum & comestum, ea quæ in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in defectionibus ad præclusiones vuluæ & duritias utilis habetur. Vna & altera aqua coctum, aut aqua frigida maceratū, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acius est, & quaudam adstrictoriâ vim habet. Quare succus eius cum aceto, addito thure aut māna, sanguinem, maximè naribus prorumpentem, sistit. Venerem stimulat. Contra omnia thoracis vitia pro delinctu efficax est, & ad tabem comestum. Purgat etiam arteriam: sed si assiduè estur, visus obscuritatem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, cōtra bestiarum morsus auxilio est. Idem quoque illitus potest. Cum aceto, thure et lacte, aut rosaceo instillatus, aurium doloribus & sonitui prodest. Varos tollunt folia, cum rhoe opsoniorū illita. Epinyctidi medentur. Crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis drachmæ binæ cum æquali baccarum Myrti pondere potæ.

EX GALENO.

Corpus calefacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinososque incidit. Bis tamen aut ter in aqua decoctū, acrimonia spoliatur: quanquam ne sic quidem vim perdit extenuandi.

EX AETIO.

Porri capitati acris saporis veluti & cepe sunt, cuius ratione corpus calefaciunt, crassosque humores attenuant, ac lentos incidunt, vrinam prouocant, sanguinem purgant. Præstantissimus vsus eorū qui bis coquuntur, ita enim acrimoniam deponunt, neque amplius deprauatum succum retinent.

EX PAVLO.

Porrum mali succi est & acre. Vt autem Dioscorides ait, grauius facit insomnia, aluumque bonam, vrinam cit & extenuat: Habet & abstergerendi vim aliquam, cum ptisana, siquidem coctum, ea quæ in thorace sunt educit. Semen verò eius nephriticis miscetur medicamentis. Folia etiam nonnihil adstringunt, ob eamque causam succus ipsorum san

sanguinem supprimit.

EX PLINIO.

Porro sectino profluuiā sanguinis sisti in naribus, contrito eo obturatis, vel gallæ mixto, aut menthæ. Item ex abortu profluuiā potō succo cum lacte mulierum. Tussi etiā veteri, ac pectoris & pulmonis vitijs medetur. Illitis folijs sanantur ambusta, epinyctides: ita vocatur vlcus acie hebetās, & in angulo oculi perperim humor emanās. Quidam eodē nomine appellant pustulas luentes, ac noctibus inquietantes. Et alia vlcera cum melle trito: Vel bestiarum morsus ex aceto: Item serpentiū. Aurium verò vitia cū felle caprino, vel pari mensura mulsi. Stridores cum lacte mulieris. Capitis dolores si in nares fundatur, dormiturisve in aurem, duobus succi cochlearibus, vno mellis. Succus & ad serpētium scorpionūmq; ictus in potu bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreantibus & phthisicis, destillationibus longis, vel succus, vel ex ipso cibus prodest. Item morbo regio, vel hydropicis. Et ad renum dolores, cum ptisanæ succo acetabuli mēsurā. Idem modus cū melle, vuluas purgat. Tostus verò editur & contra fungorum venena, imponitur & vulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietatē discutit. Sed oculorum aciem hebetare traditur, inflationem quoq; facere, quæ tamen stomacho non noceat, ventrēmq; molliat. Capitato maior est ad eadem effectus. Sanguinem reijcientibus succus eius cū caule aut thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, vuluāsque contractas aperiri putat. Fœcunditatē etiā fœminarum hoc cibo augeri. Contritum ex melle vlcera purgare. Tussim & destillationes thoracis, Pulmonis & arteriæ sanat vitia, datū in sorbitione ptisanæ: vel crudum, præter capita, sine pane, ita vt alternis diebus sumatur: vel si purulenta excreantibus. Sic voci vel Veneri, somnūque multum confert. Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistunt, & inflationes veteres. Cortex decoctus illitūsq; inficit canos.

EX SIMEONE SETHI.

Yrinam cit, & mali succi est. Assiduē eomestum visus hebetu

betudinem efficit. Difficilia inuehit somnia, & stomacho nocet. Semen genitale calefacit, & capitis dolores excitat: Iecur, renes & vesicam lædit. Confert ad hæmorrhoidas. Bis verò aqua coctum, & aceto, & garo & oleo, cum inóq; conditum, salubre est ijs qui frigido sunt stomacho.

De Pulmonaria. Cap. CCXLV.

NOMINA.

VT veteribus Græcis & Latinis nōminata sit hæc herba, nondum scire licuit. Hodierni temporis medici & herbarij Pulmonariam vocant. Germani [Lungenkraut,] Galli *Herbe à poulmon, ou espèce d'Hepatique*. Sic autē haud dubiè appellari cœpit, quòd pulmonum vitij, exulcerationibus potissimū eorundem, præsens remedium sit.

FORMA.



Pulmonaria.

Folia mollia habet, inuicem incumbētia, leuiter laciniata, canis multis prædita, superiore parte viridia, inferiore in luteo albicantia, ac veluti pūctis aut pustulis quibusdam notata atque hoc nomine aliquam pulmonis humani formam referentia: vnde etiam Pulmonariam dictam esse conijcimus.

LOCVS.

Prouenit in quercu arbore, & saxosis locis.

TEMPVS.

Tota æstate inuenitur locis iā monstratis:

TEM

TEMPERAMENTVM.

Recentiores frigidam & humidam esse, mea quidem sententia, falsò statuūt: admodum enim adstringit, vt hoc nomine idem cum quercu in qua nascitur habeat téperamentum. Desiccatur itaq; & paulò infra media calefacit, in genere eorum quæ tepida sunt.

VIRE S.

Desiccandi & adstringendi facultatem obtinet, quam obrem vulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis. Ad incipientes quoq; ac crescentes phlegmonas utilis: nam quæ iam vehemētes sunt, adstringentia respuunt. Confert autem haud dubiè etiam ad muliebri profluuiū, & sanguinis expuitiones, & diuturnos alui fluores.

De Ptarmice. Cap. CCXLVI.

NOMINA.

Pταρμικὴ Græcis, Strenutamentaria Latinis dici pōt. Sunt qui Sylvestre Pyrethrum nominent, quodd scilicet Pyrethri modo, quanquam mitius, linguam vellicet. Atque hinc est quodd nonnulli pro verò Pyrethro, seducti eius titillante acrimonia, descripserint. Germanis [Vilder Bertram] appellari potest. Gallis *Pyrethre Bastard*. Ptarmice dicta est, quodd flores eius naribus obiecti sternutamenta eliciunt.

FORMA.

Breuis frutex est, paruis, multis, teretibus, & Abrotono similibus ramulis, circa quos folia multa, oblonga, oleaginis similia. In summo Chamæmeli capitulum, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, vnde nomē inuenit. Hactenus Dioscorides. Quodd si itaq; naturam atq; imaginem eius fruticis rectè expendas, vndiquaque ei plantæ, cuius picturam damus, hæc descriptio quadrabit. Nam surculis fruticat exiguis, multis, rotundis, Abrotono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui folijs frequētibus, longiusculis, oleæ similibus, angustis, vtrinque leniter serratis ambiunt, cacumine Anthemidis umbellam obtinent e, quæ acri suooore nares feriens, sternutamentum irritat.

*Ptarmice.*

Inuenitur sæpius in montibus altis, & saxosis locis.

TEMPVS.

Floret æstate : radix eius extremo effoditur autumno.

TEMPERAMENTVM.

Eius temperies est calida et sicca, viridis etiam ordine secundo, siccatæ tertio.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus illita sugillata emendare possunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent.

EX GALENO.

Ptarmices flores ciedæ sternutationis vim obtinent, vnde & herbæ nouien. Sugillatæ & reliquas ecchymoseis discutit.

EX PAVLO.

Ptarmices folia sternutamenta mouent. Totus autem frutex viridis sugillata, liuoresque alios disijcit.

De Pirethro. Cap. CCXLVII.**NOMINA.**

Π *Υπερπον* Græcè, *Saliuaris* Latine dicitur. Officinæ Græcam appellationem retinuerunt, Germanicè [*Bertram*.] Gallicè *Pyrethre* nominatur. *Pyrethron* autem à *feruido*, ac ignis simili, qui in eius radice est sapore, Græci dixe

dixerunt . Saliuaris verò, quòd mansa vel ore tantùm de-
renta eius radix, copiosam saliuam eliciat. Romanis appel-
lata est.

FORMA .



Pyrethrum.

Herba est caulem folia
que sylvestris Dauci, &
Fœniculi instar profe-
rens. Umbellam Anetho
similem, orbiculatam .
Radicem Pollicis crassi-
tudine, longam, sapore
feruidissimam. Hæc Dio-
scorides. Vbi nobis mo-
nendus venit lector, Py-
rethrum nostri soli non
ex omni parte huic de-
scriptioni respondere .
Non enim umbellâ ane-
tho similem, sed anthe-
midis potius orbicula-
tum capitulum, quod
Parmiaci tribuit Diosco-
rides, habere deprehendi-
tur. Cætera omnia ada-
mussim respondent . Si-
quidem habet Pyrethrū

caules & folia Dauci sylvestris & Fœniculi, radicem polli-
cis crassitudine, gustus ardentissimi.

LOCVS.

In Germania nostra, quod sciam, non nisi plantatum
prouenit.

TEMPVS.

Floret æstatis maxima parte.

TEMPERAMENTVM.

Excalfacit & siccatur in tertio ordine, vel, ut aliqui putant,
in quarto.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Pituitam elicit radix: ideoque dentium doloribus decocta in aceto, collucto inde ore, auxiliatur. Mansa pituita extrahit. Sudores ciet, inuncta ex oleo. Diuturnis rigoribus efficax. Contra refrigeratas partes corporis ac resolutas eximie conducit.

EX GALENO.

Pirethri radice potissimum utimur, vrentem facultatem obtinente, qua utique dentium etiam refrigeratorum dolores mitigat. Et ad rigores ante circuitum cum oleo infricatur. Ad hæc stupidos & resolutos adiuuat.

EX PAVLO.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentium qui frigori patuerunt, dolores lenit. Item ad febrium rigores ante circuitum infricatur cum oleo. Ad hæc ipsorum corpora ex refrigeratione stupent, & resoluta sunt, efficacissime adhibetur.

De Pixo Cap. CCXLVIII.

NOMINA.

ΠΥΣ. Græcis, Buxus Latinis, Germanis [Buchszbaum] Gallis *Buys* dicitur.

FORMA.

Arbor immortalis coma virens: folio Myrti, exiguo, subrotundo: flore herbaceo, semine rufo & rotundo, omnibus animantibus inuiso,

LOCVS.

Gaudet frigidis & apricis plurimaque ubique Buxus.

TEMPVS.

Perpetua fronde viret, neque ei vlllo tempore decidunt folia. Quo nomine potissimum hanc celebrat Germanica illa cantilena, eiusdem ac salicis contentionem continens.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores temperatam eius arboris essentiam esse statuant, id quod ob multas causas, quas recensere superuacuum est, non videtur verisimile. Haud dubie vero adstringit, atque adeo exsiccat.

VIREs.

Non admodum magnus Buxi in medicina vsus est. folia eius in lixiuo decocta rufant, aut flauescere efficiunt capillos. Scobem eius decoctā in aqua, alui profluum sanare tradūt. Sōnum capere sub hac arbore, cerebro vehementer incommodat, q̃ eius odor naturæ prorsus auerſetur. Ferunt serpentes vulneratas eius radice degustata, statim sanitatem recuperare.

De Petasite Ca.

CCXLIX.

NOMINA.

Π *Elastris* Græcis, Petasites Latinis appellatur, Officinis penitus ignota. Germanis [Pestilenz vurtz] nominatur, quod nimirum eius radix præsentaneum sit contra pestilenciales febres remedium, Gallis verò *Eſpece de Napelier*. Petasites autem à petaso, pileum significante, dicta est, quod folium eius pediculo superpositum, petasi modo amplum, vt fungus dependeat.

FORMA.

Pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, in quo petasi figura folium magnum, vt fungus dependet. Ex qua sanè descriptione satis perspicuum fit, herbam cuius picturā damus esse Petasiten. Hæc enim statim inter initia Martij, flores suos in albo purpureos, agglomeratos, & botri figuram referentes profert, citra quidem folia, quod Dioscorides omisit. Hi marcescentes sine fructu abeunt ac decidunt. Postea purpureos emittit pediculos, cauos, hirsutos, quibus

Q ii) folia



BUXUS.

*Petasites.*

folia supposita sunt magna, pilei ampli figuram obtinentia, supernè viridia, infernè verò candicantia : quæ in tantâ crescunt amplitudinem, vt vnum interdum orbicularem mēsam prorsus tegat. Radix illi crassa & longa, intus candida, vehementer odorata & amara. Quibus accedit, quòd vires huius herbæ à viribus Petasites, vt ex sequentibus patebit, nō discrepant, vt hoc nomine nihil euidentius sit, quam eam herbam esse plane veterū Petasiten.

LOCVS.

Nascitur copiosissimè in pratis humidis, & iuxta riuulos sitis.

TEMPVS.

Initio Martij mensis, vt cōprehensum est, floribus suis cōspicua est herba, qui Aprili imminente, statim citra fructū decidunt. Quo factō folia cum pediculis suis prodeunt.

TEMPERAMENTVM.

Ex tertio est ordine desiccantium, id quod amaritudo eius quam gustu deprehendimus, facillè monstrat.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Facit ad maligna & phagedænica vlcera tritum & illtū.

EX GALENO.

Ad maligna & phagedænica vlcera, ea vtuntur. Idem etiam de Petasite tradit Paulus.

APPENDIX.

Experimento comprobatum est radicem hanc mirificè conferre pestilentialibus febribus, quòd sudorem vehementer moueat, si in puluerem redacta cum vino sumatur. Nec
minori

minori efficacia bibitur à mulieribus quas vteri tormina & præfocationes exercent. Valet etiam vnicè ad enecandos lumbricos. Succurrit quoq; ijs, qui spiritus difficultate laborant. Ducit vrinam & menses. Efficax est ad vulnera præhumida, & ad reliquas cutis fœditates. Hæc verò posse, amartudo eius euidentissimè docet, cuius quidem hæ sunt facultates, vt ex ijs, quæ sæpe iam diximus, & Galenus lib. iiii. de simp. medic. faculta. capi. xviij. fusiùs docet, manifestum est.

De Periclymeno. Cap. CCL.


NOMINA.

Περικλόμενον Græcis, Volucrum maius Latinis, Scribonio Largo Syluæ mater, vulgò Caprifoliū & Mater-sylua, & nonnullis Liliū inter spinas dicitur. Germanis [Geysblatt, Speck oder Valdgilgen, & zeunling.] Sic sanè dictum, q̃ circūuoluendo ad se vicinas arbores aut frutices vocet. Gallicè *Cheuresneille ou Vmbosse*.

FORMA.

Simplex frutex est, ex interuallis folia spargens ipsum amplectētia, subcādida, Hederæ similia: flores cādidos, Fabæ similes, subrotundos, quasi in foliū procubentes: semen durū, & quod difficile vellitur: radicē crassam, rotundam. Ex qua quidē descriptione perspicuum sit, fruticē quē pictum exhibemus esse Periclymenon: siquidē caulibus suis vicina amplectitur, gemina per interualla vmblicata folia habēs, à terra cæsis, supernè herbosis ad He-

Q. iij deræ



Periclymenon.

deræ similitudinem: flores albos. Fabæ non dissimiles, subrotundos, potissimum antequam dehiscant, baccas hederaeas aut Rusci, radicem crassam.

LOCVS.

Nascitur in arvis ac sepibus, conuolvens se vicinis frutibus. Nunc in hortis etiam passim plantatur.

TEMPVS.

Floret Innio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Vehementer calefacit & desiccatur, id quod gustu etiam ipso deprehenditur. Folia siquidem acrimoniam quandam præ se ferunt gustata.

VIRÆ EX RECENTIORIBVS.

Huius semē postquam maturuit collectum, & in umbra siccatur, drachmæ pondere datur in vino quadraginta diebus, ut lienem minuat absumatque, & lassitudinē discutiat. Orthopnoæ & singultui prodest. Urinam cit à sexto die cruentam. Partum accelerat. Habent easdem vires & folia: quæ triginta septem diebus pota, sterilitatē facere produntur. In periodicis febribus cum oleo inuncta, earum horrores mitigant.

EX GALENO.

Periclymeni utilis est tum fructus, tum folia, ad eò vehementer incidentis & excalefacientis facultatis, ut si plussculū bibantur, urinā sanguinolentam efficiant. Principio quidem urinam tantum mouent: porro foris cum oleo illita calfaciunt. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes. Competens potionis mensura est, drachmæ vnius pondus cum vino. Cæterum desiccatur quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnino bibentibus afferre. Sunt etiam qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, quemadmodum Dioscorides, qui septem & triginta dies eos tradi refert. Hic quoque cruentam urinam reddi à sexto die memorat.

EX PLINIO.

Semen eius in umbra siccatur tunditur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis die

nis diebus ad lienem, eumque vrina cruenta, aut per aluum absumit, quod intelligitur à decimo statim die. Vrinam cient & folia decocta, quæ & orthopnoicis profunt.

APPENDIX.

Ex iam commemoratis facultatibus nemo non intelligit fruticem hunc esse Periclymenon: cum enim gustu acrimoniam præ se ferat, necesse est omnia hæc quæ veteres Periclymeno tribuunt, possit. Quibus accedit, quod recetiores etiam herbarij suo Caprifolio easdem vires assignent. Exiccare enim ipsum tradunt vlcera humida & sordida, sanare impetigines, & alias cutis sceditates, lienem absumere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere, & alia posse quæ non attinet referre.

De Pyro.

Cap. CCLI.

NOMINA.

PΥΡΟΣ Græcis, Triticum Latinis dicitur. Officinæ antiquum Latinum nomē retinuerūt. Germanis [Vveyssen] Gallis *Blé, ou Froment* appellatur. Triticum verò dicitur, quod tritum ex spicis sit, ut autor est Marcus Varro.

GÉNÉRA.

Tritici summa genera tria obseruant, qui frumentariæ rei periti sunt. Primum quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstet, Germanis simpliciter [Vvessen] nominatur. Secundum trimestre, & nonnullis Sitanium dicitur. Trimestre quidem, quod tertio ferè satum mense maturescat: id quod tamen nostro in orbe non fit, in quo Martio mense satum, quinto tandem, hoc est, Iulio mense metitur. Germanis [Amelkorn] dicitur, haud dubiè non alia ratione nisi quod ex hoc genere tritici amyllum optimum conficiatur. Eius picturam dare hoc tempore non potuimus. Tertium genus tritici, non vndiquaque notum, Germanis [Vveischer Vveyssen & Vveissenkolb] dicitur.

FORMA.

Primum tritici genus culmo est quàm hordeum altiore, tribus geniculis constante, folio arundineo, spica à folijs

Q v

rema

*Triticum primum genus.**Triticum tertium genus.*

Exeritur in area, vt alia quædam frumenta. Alterû culmo, geniculis, granisque priori simile, nec ab eo differt, nisi quod spicam multis aristis vallatam, & in duos versus dispositam obtinet.

Tertium genicula habet quaterna, aliàs præcedenti per omnia propemodum simile.

LOCVS.

Pæssim prouenit Triticum primi & secundi generis. Postremum in Alsatia, & agro Tubingensi gignitur.

TEMPVS.

Floret, vt alia ferè omnia frumenta, Iunio mense: in Iulio autem metitur.

TEMPERAMENTVM.

Triticum vt medicamentum foris impositum, primi est
ordi

ordinis excalescentium, non tamen nec resiccare, nec humectare manifestò potest. Porro quod ex eo cõficitur amyllum, eo tum frigidius est, tum siccus.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Optimum ad secundæ valetudinis vsum Triticum habetur, quod recens & iam perfectè, adultū, & colorem malì refert. Crudum in cibis rotundos lumbricos gignit. Canū moribus prodest mansum & illitum, Confectus ex eius similagine panis, plus alit quàm cibarius, quem Græci *σιτρομυρον* vocant. E. Sitani farina panis leuiorem cibum præbet, & qui faciliè in membra demandetur. Farina eius cum hyosciami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones. Item contra intestinorum inflationes, Lentigines ex oxymelite tollit. Furfures autem acri in aceto elixi & calentes illiti, lepras pellunt. Incipientes etiam inflammationes omnes illiti leniunt. In rutæ verò decocto elixi, mammae turgentes sedant. Viperarum ictibus auxiliantur: & torminosi profunt. Confectū ex farina triticea fermentum calefacienti extrahendique vim habet. Prinatim quæ in plantis pedū sunt, extenuat. Cætera tubercula, furunculosque ex sale concoquit, & aperit. Sitani farina contra venenatos ictus cum aceto aut vino commodè illinitur. Eadem si decocta in glutini modū delingatur, cruenta excreantibus succurrit. Contra tussim & exasperatam arteriam, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsâ, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & cum melicrato coctus & crudus, inflammationes omnes illitus mulcet, cum emolliat, & quadantenus refrigere, mixtus herbis succisque quibusdam. Vetus autem & aridus per se, adiectisque alijs quibusdam, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus & illitus, vetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

EX GALENO.

Triticum quiddam lentoris, & obstruentis naturæ habet. Quod verò ex pane sit cataplasma, vim obtinet magis
dige

digerentem, quàm quod ex Tritico: nimirum quum & sale
& fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum vim habeat attrahendi digerendique ea quæ in alto resident. Plura de Tritico petenda erunt ex capite primo libri primi de alimentorum facultatibus, quo in loco variorum panis species exponuntur.

EX PLINIO.

Grana Tritici ferro combusta, ijs quæ frigus vsserit præsentaneo sunt remedio. Farina ex aceto cocta, neruorum contractionibus auxiliatur: cum rosacco verò & ficu sicca myxisque decoctis. Item suppuratis neruis cum hyoscyami succo illinitur. Ex aceto & melle lentigini. Furfures tonsillis faucibusque gargarizatione profunt. Sext. Pompeius prætorij viri pater, Hispaniæ citerioris princeps, quum horreis suis ventilandis præsideret, correptus dolore podagræ, misit in Triticum sese super genua, leuatusque siccatis pedibus mirabili modo, hoc postea remedio usus est. Vis tanta est, ut cados plenos siccet. Paleam quoque tritici vel hordei calidam imponi ramicum incommodis experti iubent, quæque decoctæ sunt aqua foueri.


De Potamogetone. Cap. CCLII.

NOMINA.

Ποταμογίσσω, ἡ σαχὺρίς Græcè, Fontalis & Potamogeton Latinis dicitur. Officinis ignota est herba. Germanis [samkraut] vocatur. Potamogeton autem quasi fluminibus vicina dicta est: siquidem aquosis & palustribus locis nasci amat. Stachites verò quasi spicata, ob caulem quæ ex se mittit floribus & semine spicato: Gallicè *Espi d'eau*.

FORMA.

Folium Betæ simile habet, densum, & paulum extra aquam eminens. Ex qua quidem breui admodum delineatione satis intelligi potest, herbam cuius picturam damus esse Potamogetona. Caulem nanque rotundum habet, geniculis intersectum, è quibus pediculi exeunt folijs Betæ aut Plantaginis vestiti, paulum supra aquam eminentibus. Flores etiam spicatos, Plantaginis instar, præfert, ac subinde semen. Quid multa



Potamogeton siue Fontalis.

EX GALENO.

Adstringit & refrigerat similiter Poligono, sed essentia eius crassior quàm Poligoni est.

EX PLINIO.

Potamogetō ex vino dysentericis & cœliacis medetur. Peculiariter refrigerat, spissat. Vsus in folijs, cruribus viciosis vtilia, & contra vlcerum nomas, cum melle vel aceto.

De Pede Anserino. Ca. CCLIII.

NOMINA.

QVO nomine veteribus tum Græcis tum Latinis sit appellata hæc planta, nondum cognoscere potui, quia propter nouam vt illi nomeuclaturam inderem necesse fuit. Aliam autem & commodiorem non licuit inuenire, præter

multa? Folia huius herbaræ planè reterunt foliū Indū vocatū officinis.

LOCVS.

Nascitur in lacustribus & aquosis locis.

TEMPVS.

Floribus prægnās est Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat vt gustus etiam abundè docet.

VIRESEXDIO SCORIDE.

Refrigerat & adstringit: pruritibus, vlceribusque vetustis, & ijs quæ pascendo serpunt, confert.

præter eam, quam alludentes ad germanicam appellationem imposuimus. Nam si folia eius spectes in ambitu laciniata, planè anserini pedis formam ac similitudinem repræsentant. Hinc appositissimè Germanis nostris vocata est. [Gensz fuosz oder Gentz fuotzle:] Gallicè *Pied delars*. Quum verò eadem herba suis inimica admodum sit, atque adeò mortem inferat, factum est ut à mulierculis etiam sit nominata. [Scutod, & Schvventzod]. Et si verò in officinis eius herbæ nullus sit vsus, tamen quia passim nascitur, & temerè fortassis à nonnullis vires eius ignorantibus usurpati posset, eam silentio transire nolimus, quò scilicet facultas tam vulgaris herbæ omnibus patefieret.



Pes Anserinus.

FORMA.

Caulem profert cubitalem, striatum: folia ad Halicacabi formam accedentia, in ambitu tamen laciniata, atque adeò anserini pedis speciem referentia: flores exiguos, tubentes, semen racematim, veluti in *Attriplice sylvestri*, singulis ramis insidens: radicem obliquam, multasque adnascantias habentem.

LOCVS.

Passim in hortis, alijsque locis ubi solum reponitur, nasci solet.

TEMPVS.

Iunio mense potissimum flet.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Haud dubiè in secundo refrigerat ordine, non secus atq;
Solanum hortense.

VIRE S.

Suibus exitium affert herba hæc comesta, id quod experientia cognitū est. In humano corpore idem potest quod Solanum hortense. Quare facultates eiusdem suo quæres loco.

De Petroselino. Cap. CCLIIII.

NOMINA.

Π *Ἐρπονίσιον* Græcis, Apium saxatile Latinis, et Petroselinum appellatur. Germanicè [frembder Petersilien] Gallicè *Persil de Roches* & *liens pierrenx*, ou *Macherons* nominari commodè, ad alterius quod Oreoselinum est, ut suadiximus loco, differentiam, potest. Officinæ eius herbæ cuius nunc picturam damus semine pro Amomo vtuntur, nō tamen sine magno errore, quum constet omnibus (modò conferre inter se vtiusq; historiam non pigeat) Amomum ab ea herba esse diuersissimum. Nōs vt tandem sciremus è qua stirpe semen hoc decerperetur, terræ illud mandauimus, & hæc cuius pictura formam ostendit herba erupit, quam nos verum esse Petroselinum, vt paulò pōst ostendimus, credimus.

FORMA.

Petroselinum, inquit Dioscorides, semen Ammi simile obtinet: odoratius tamen, acre, & aroma olens. Breuis quidem delineatio hæc est, atq; imperfecta, vt nihil mirum sit, nos hætenus quod verum esset Petroselinum non potuisse cognoscere. Merito itaque hoc loco, vt compluribus etiam alijs, Dioscorides negligentiæ in simulari potest, vt qui mancas ac mutilas plerāq; posteritati relinquere stirpium historias voluerit. Si verò quispiam paucas etiam has notas expendat, haud dubiè herbam hanc cuius picturam oculis subiecimus, Petroselinū esse cōperiet. Semen enim eius Ammi tam simile est, vt ab eo vix discerni queat: odoratius etiā existit, & acre, ac aroma olet. In summa, nulla est nota quæ illi non

*Petroselinum.*

illi non respondeat, vt hoc nomine verum Petroselinum esse credam. Quinetiā tota eius herbae forma, quae nō multū à nostro & Germanico Petroselino abest, atq; odor, Selini specie esse docent, vt pro Petroselino vsurpare hāc ipsam officinae tutò possint: semē enim quo hodie vtuntur, non Macedonicum Petroselinum, sed Hypposelynum, vt suo diximus loco, existit.

FORMA.

In Macedonia frequens optimūque nascitur: hinc Macedonicum dicitur: inque saxis

& praeuptis potissimū locis, vnde coepit appellari Petroselinum. Nascitur & alijs in locis, vt lib. j. de Antidotis testatur Galenus, at minus laudatum.

TEMPVS.

Floret Augusto mense, atque subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Petroselinum vt gustu acre est cum amaritudine, sic & in operibus calidum. Fuerit itaque & ipsum tertij ordinis tum exalfacientium, tum desiccantium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, & menstrua ducit. Stomachi & coli inflammationibus auxiliatur, & torminibus. Laterum quoque, renum, & vesicae doloribus in potu sumptum, succurrit.

Misce

Miscetur antidotis vrinam cientibus.

EX GALENO.

Petroselini semen maximè vsui est, quum tota etiam herba vnà cum radice similem, sed imbecilliozem, facultatem sortiatur. Incidendi etiam vim habet: hinc menses & vrinæ largiter prouocat. Flatus quoque extinguit.

APPENDIX.

Sunt, qui hanc herbam quam pro Petroselino damus, Sisona esse putent: quosum sententiæ cur non magnopere repugnem, facit in primis Dioscorides, qui Sisona perinde atq; Petroselinum suis notis haud descripsit. Dein quòd viribus non discrepent, atq; adeò in vsu huius aut illius nullum sit periculum. Nos tamen nostram sententiã propter adductas paulò antè rationes deferere, nisi euidentibus conuicti argumentis, non possumus.

De Rosa.

Cap. CCLV.

NOMINA.


PΟΡΟΡ Græcè, Rosa Latinè, Officinis eodem seruatò nomine appellatur. Germanicè [Rosen] Gallicè *Rose* Rho don autem Græcis, Plutarcho autò nominatur, quòd largum odoris effluuium emittat.

GENERA.

Theophrastus lib. vj. capi. vj. de plantarum historia, genera rosarum multa esse tradit, quæ foliorum multitudine, paucitate, asperitate, læuitate, colore & odore differunt. Plinius etiam lib. xxj. capi. iij. ex loci diuersitate multa rosarum genera colligit. Nos simpliciter duo duntaxat illarum genera faciemus, sylvestres scilicet & domesticas. Sylvestres (quæ etiam Caninæ rosæ vocantur) asperiores tum virgis, tum folijs sunt, ac odore, colore, magnitudine à domesticis superantur, Germani [Heydrosen, & Vildrosen] vocant. In vtroque verò genere duplices existunt, puniceæ nimirum & candidæ. Nos vtrunque genus vna pictura complexi sumus.

FORMA.

Vulgò omnibus nota est Rosa. Virgas siquidem fuscis
R macu



Rosa.

maculis tinctas, & aculeis plenas emittit: folia incisuris diuisa, nigricantia & aspera. Germinat primùm inclusa grauioso cortice, quo mox intumescente, & in virides alabastros fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantis complexa luteos apices staminâque capillamentis insidentia, quæ propriè flores dicuntur. Sylvestris spongiosas etiam producit, quas pleræque Officinæ Germaniæ nostræ, non sine detestando errore pro Bedegar vsurpant: fructum quoque parit rotundû, ini-

tio viridem, dein puniceum.

LOCVS.

Domestica passim in hortis prouenit. Sylvestris etiam nusquam non in campestribus & dumetis nascitur.

TEMPVS.

Rosa vt nouissima inter vernos flores erumpit, ita etiam statim deficit. Decerpenda itaque erit Iunio mense ubi primùm erupit, ne mox nusquam compareat.

TEMPERAMENTVM.

Rosarum vis ex aquea calida substantia duabus alijs qualitatibus, adstringenti videlicet & amara mista, composita est. Flos earum magis etiam ipsis Rosis adstringit, ac proinde sanè exiccatorius est.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca magis adstringit. Succus recentibus folijs exprimendus, detracto forfice vngue (Sic appellatur quod cādidum est in folio) reliquū mortario premi & teri debet in vmbra donec densetur, & ita ad oculorum citcūlitiones recōdi. Siccantur etiam folia in vmbra crebro versata, ne mutescant. Ex aridis rosīs in vino decoctis expressus liquor, ad capitis, oculorum, aurium, gingiuarum, sedis, recti intestini ac vuluæ dolores penna illitus, collutus infususve, cōducit. Eadem sine expressione contusa & illita, præcordiorum inflātionibus, stomachi humiditati, & sacris ignibus medentur. Siccæ ac trite femoribus insperguntur. Misceri solent cōpositionibus quas antheras vocāt, & vulnerarijs antidotis. Vrūtur folia ad honestādas palpebras. Flos qui in medijs Rosīs inuenitur siccatur, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota, aluum profluentem, & sanguinis reiectiones sistunt.

EX PLINIO.

Vsus succi ad aures, oris vlcera, gingiuas, tonsillas, gargarizatu: stomachum, vuluas, sedis vitia, capitis dolores. In febre per se vel cum acetō ad somnos, nauſeas. Folia vruntur in calliblepharum. E siccis semina asperguntur. Epiphoras quoque aridas leniunt. Flos somnum facit, Inhibet fluxiones mulierū, maximē albas, in posca potus, & sanguinis excreationes. Stomachi quoque dolores, quantum in vini cyathis tribus. Semen his optimum crocinum, nec ar. niculo verustius, & in vmbra siccatur. Nigrum inutile. Dentium doli illinitur. Vrinam ciet. Stomacho imponitur. Item igni sacro nō veteri. Naribus subditū caput purgat. Capita pota, sanguinem & ventrem sistunt. Vngues Rosæ epiphoris salubres sunt: vlcera enim oculorum Rosa sordescunt, præterquam initijs epiphoræ, ita vt arida cū pane imponatur. Folia quidē vitijs stomachi, rosionibus, & vitijs ventris: & intestinorū, & præcordijs vtilissima vel illita. Cibo quoque Lapati modo condiuntur. Cauendus quoque in ijs situs celeriter insidens. Et aridis & expressis aliquis vtus. Diapasmata inde fiunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis ina

R ij rescāt

refcant corpora, dein frigida abluantur. Sylvestris cum adipe vrsino alopecias mirificè emendat.

EX SIMEONE SETHI.

Odorata calidis capitibus prodest, humida verò offendit, eaque destillationi obnoxia reddit. Sumpta verò febres ex flaua bile procreatas iuuat, & roborat stomachū & iecur. Proprietate autem quadam testes lædit, prohibetque acres exhalationes ne in caput ferantur.

APPENDIX.

Spongiolæ ac fructus Cynorrhodi seu sylvestris Rosæ mirificè valent contra calculum, & vrinæ difficultates; si læuigatæ in puluerem exhibeantur.

De Raphano. Cap. CCLVI.

NOMINA.

P *ῥαφαν*, ἢ *ραφανίς* Græcis: Raphanus, Radix, Radicula Latinis: Gallis *Rave*, ou *Raisfort* dicitur. Hæc autem generis sunt nomina, ideoque errant non pauci nostræ ætatis medici & herbarij, qui Radiculæ nomen ad satium dū taxat Raphanum transferunt. Raphanus autem sibi nomē *ῥαφ* το *ῥαφάνιον*, id est, quod faciliè appareat, adsciuit: nam die tertio à satū profilit. Radicis verò nomen sibi arrogauit, quod cæteras amplitudine corporis superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat. Etenim plærunque in tantam molem coalescit, vt frigidis locis quibus gaudet, sicut in Germania, Plinio lib. xix. cap. v. teste, infantium pueroꝝ magnitudinem æquet. Et memini me stupendæ magnitudinis Raphanos Erfodiz, Turingiæ celeberrimo opido, vidisse,

GENERA.

Raphani Græci duo faciunt genera, satii & sylvestris. Satius Officinis hodie peculiariter Raphanus minor dicitur. Germanicè [Rettich.] Gallicè *Raisfort commun.* Sylvestris Latinis Armoracia appellatur. Germani ad vocem Romanam alludentes, [Merrtich & Kren] nominant. Galli, *Raisfort sauage*. Nostri hodie herbarij, sua potius quàm veterū autoritate freti, Radicem simpliciter, generis nomine, vocant

vocant. Nonnulli Raphanum maiorem appellant, propter folia ipsa, quæ satiui folia magnitudine superât: aut quia acrimonia maiore, aut viribus efficacioribus præditus est.

FORMA.

*Raphanus sativus.**Raphanus sylvestris.*

Radix satiua caudice vno assurgit nõnunquam arboreo radice ad Rapi similitudinẽ, folijs laciniatis, angulisq; horrida: floribus candidis, & semine in siliquis. Sylvestris dicta Armoracia fronde copiosior quàm corpore, folia satiua se re similia habet, magis tamen ad Lampsanæ formã accedẽtia, longa & acuta: radicem gracilem, mollem, Sinapi instar acerrimam, adedò vt caput tenter, & lacrimas incitet.

LOCVS.

Raphanus in hortis nascitur. Amat autẽ terrã pinguem Palladio lib, 9. cap. quinto teste, solutam & diu subactam,

R iiij Sylue

Syluestris etiam hodie in hortis habetur, sicque translatus ad culta, edomita feritate mitescit meliorque fit. Crescit aliàs circa margines itinerũ, & loca arenosa, inque pratis nõnunquam sua spõte copiosè prouenit, vt fit in prato ad opidum Tubingam sito, sacrificorum vocato.

TEMPVS.

Cùm frigoris patientissimus sit Raphanus, solùm æstate, verum etiam hyeme colligi potest. Estque illius vsus quotidianus. Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Raphanus satiuus excalfacit quidem ordine tertio, desiccatur verò secundo. Syluestris autem in vtroque efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Raphanus satiuus excalfacit, flatus gignit, ori suavis est. sed stomacho inimicus. Ructus & vrinam cit. Bonam facit aluũ. Si quis à cibo ipsum sumpserit, distributioni eius magis cõferet. Præsumptus autem, cibum subleuat. Prodest antè cibum datus vomituris. Sensus exacuit. Decoctus contra veterem tussim, & crassitiem in thorace natã prodest. Cortex eius cum oxymelite sumptus maiorj efficacia vomitiones citat. Hydropicis utilis. Illitus lienosis etiam confert. Cum melle ea quæ serpendo pascunt sistit. Sugillata tollit. Contra viperarum ictus auxiliatur. Alopecias pilis explet. Lentigines cũ farina loliacea exterit. His qui à fungis strangulantur subuenit. Menses trahit. Semen eius vomitum puritat, vrinamque mouet. Cum aceto potum lienem extenuat. Coctum cum oxymelite calido angina laborantibus vtiliter gargarizatur. Contra Ceraſtis morsum ex aceto potum auxilio est. Cum aceto illitum gangrænas efficaciter disrumpit, scarificatve. Syluestris tam folia quàm radix olerum modo in cibo coquuntur. Excalfacit autem, vrinã cit, æstuosus est.

EXGALENO.

Facultas inest Raphano discutiendi, itaque ad sugillata, & alios id genus liuores ob eam facultatẽ conducit. Radix eius ex cornu numero est, quæ opsonij potius quam nutrimenti

menti nomine frequenter comeduntur. Vis illi extenuatoria, cum qua cōspicue vna excalefacit: acris enim in ea qualitas exuperat. Verno tempore caulem in altum assurgentem producere solet, ceu alia quæ nata sunt excaulescere. Hic elixus estur ex oleo, garo & aceto, vt Rapæ caulis, Sinapi & Laetucæ. Et sanè caulis hic magis quàm crudus Raphanus nutrit, vt qui acrimoniam in aqua deponat: quantuā minimam sanè & ipse alendi potestatem habeat. Quidam nō solum caulem, sed vna Raphanos ipsos elixantes comedunt Raparum modo. Cæterū cū medicos, tum idiotas illos mirari subit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuuandæ gratia edunt. Ipsi quidem se experientia id abudè compertum habere dicunt, nullus tamen exēplum illorum sine damno imitari potuit. Hactenus Galenus. Cuius equidem verba eò libentiùs recitauimus, quòd vulgi errorē Raphanos à cœna comedentis lepidè notare videantur.

EX PLINIO.

Raphani decocti mane poti ad ternos cyathos, comminuunt & eijciunt calculos. Idem, in posca decocti, contra serpētium morsus illinūtur. Ad tussim etiam mane ieiunis prodest Raphanus cum melle. Semē eorum tostum, ipsūque cōmanducatum ad Lagonoponon. In aqua folijs eius decoctis, bibere vel succū ipsius cyathis binis. Cōtrā phlegmoni ipsos illinire tusos vtile. Inchoantibus autem recentem corticē cū melle, veteriosis verò quàm acerrimos mandere. Semēq; tostum, dein contritum cū melle suspiriosis. Idem & cōtra venena prosunt. Cæterū cerastis, scorpionibus aduersatur, vel ipso semine infectis manibus impinè tractantibus. Imposito Raphano scorpionibus, moriuntur. Salutares & contra fungorum aut hyoscyami venena æquè, vt Nicander tradit. Et contra ixiam quoq; dari duo Apollodori iubent, sed Citieus semē ex aqua tritū, Tarētinius succū. Lienē itē extenuat, iccinori p̄sunt & lūborū doloribus. Hydropicis quoq; ex aceto & sinapi sumpti, & lethargici, Praxagoras & iliosis dandos censet. Plistonius & colicis. Intestinorū vlcera sanant. At purulenta præcordiorum, si cū melle edantur. Quidā ad hæc coquere eos in luto

illitos malunt, sic & fœminas purgari. Ex aceto & melle sumpti intestinorum animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum potio cum vino enterocelis profunt. Sanguinem quoque inutilem sic extrahunt. Medius ad hæc & sanguinem excreantibus coctos dari iubet. Et puerperis ad lactis copiam augendam. Hippocrates cappillos mulierum defluos fricari Raphanis & super vmbilicum imponi, contra tormenta vuluæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoque ex aqua impositum sistit vlcera quæ phagedænas vocant. Democritus Venerem hoc cibo stimulari putat, ob id fortassis voci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis tantum nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Vbi verò acrior Raphani medicina admoxa sit, Hyssopum dari protinus imperant. Hæc antipathia est. Et aurium grauitati succum Raphani instillant. Nam vomituris, summo cibo esse eos, vtilissimum est. Sylvestris vrinæ duntaxat eiiciendæ vtilior.

De Ribe. Cap. CCLVII.

NOMINA.

GRÆCIS cognitus fuerit necne frutex ille, nondum compertum habeo. Mauritanis & Officinis hodie Ribes nominatur. Germanis, [S. Iohanz treublin oder beerlin,] quòd scilicet circa diui Ioannis Baptistæ diem, fructus eius fruticis ad maturitatē ptingāt. Gallicè *Groselier Rouge*.

FORMA.

Frutex est nullis spinis horridus, sed topiarius magis, vitis pusillæ folijs, baccis rubentibus ex pediculis longis dependens refertus, vt pictura ipsa abundè docet. Vnde manifestum sit Mauritanorum Ribes à nostro diuersum esse, quòd non vitis, sed lata potius, magna rotunda & viridia folia habeat. Quanquam non lateat Arabes etiam in Ribes descriptione non admodum concordēs esse.

LOCVS.

Passim in hortis nascitur, ac eorundē puluinos et areas sepit.

TEMPVS.

Circa diui Ioannis Baptistæ natales ferias, & Iulio pontifici

trifissimū mense, baccis
ac vuis rubentibus fru-
tex ille ornatur.

TEMPERA-
MENTVM.

Folia & fructus vehe-
mēter adstringūt. Mau-
ritani frigidum & siccū
faciunt in secundo or-
dine.

VIREs EX MAV-
RITANIS.

Baccæ acido sapore
placent. Refrigerant ex-
stuantem stomachum:
sitim restringunt, quæ
cum aliis, tum maxime
febricitantes exeruiat.
Cibi fastidia discutiūt,

Ribes.

& appetentiam inuitant. Fædam ventris proluuiem cohi-
bent, Vomitiones sistunt, stomachum firmant. Alui proflu-
uium quod bilis attulit, retinent: erosiones & vellicationes
eiusdem tollunt. Sanguinis feruorem demulcent, & bilis
acrimoniam domant. Sepalsarij succum eius fructus con-
diunt, ad anni totius vsum, Rob de ribe appellantes.

De Rhodia radice. Cap. CCLVIII.

NOMINA.

POSIA *ρῶσα* Græcè: Rhodia radix Latine nominatur. Of-
ficinis ignota, Germanicè [Rosenwurtz] vocatur.
Rhodiā autē tam Græci quā Latini dixerūt, quoniā con-
trita Rosas redolet. Quapropter Rosæ, quas Græci *ρῶσα* no-
minant, non Rhodus insula, vt imperiti putāt, huic radici
nomen fecerunt: Gallicè, *Racine sentant la Rose.*

R v FOR

*Rhodia sine Rosea radix.*

Radix Rhodia Costo
similis est, læuior tamen
minorisque ponderis &
inæqualis. Roseam Ro-
sarum cum teritur red-
dens. Reliqua eius facies
Telephium refert, nisi
quod flore & semine ca-
rere videtur, id quod Ga-
lenus etiam asserit, & in
Corollario suo annota-
uit Hermolaus. Diosco-
rides etiam illorum nul-
lam facit mentionem.

LOCVS.

Nascitur potissimum
in Macedonia. Nunc in
multis Germaniæ hortis
plantatur.

TEMPVS.

Radix Autumno effodienda.

TEMPERAMENTVM.

Rhodia radix in calefaciendo secundi ordinis, aut certè
tertij incipientis.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Vtilis est capitis doloribus, si madefacta fronti & tem-
pori cum modico rosæfacto imponitur.

EX GALENO.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis.

De Sampsucho. Cap. CCLIX.

NOMINA.

Σ Αμάρυκος, ἢ ἀμάρυκος Græcis, Maiorana, Amaractus
Latinis. Officinæ Latinam appellationem retine-
runt

runt Germanis[Maioram.]vel[Meyran,] Gallis *Mariolai*
ne, ou Marone dicitur. Animaduertendum autem nos hic de
 Amaraco ea loqui quę iucundo placet odore. Duplex enim
 Græcis Amaracus est. Vna quę Dioscoridi alio nomine Par
 thenium dicitur, ingrato prorsus & viroso odore prædita.
 meritoque ea de causa hodie *Cotula fætida* nominata. Al
 tera de qua hic agimus, odorata, quā Sāpsuchon Græci pri
 uatim nominant. Id, ne imperitis vox illa *πολύσχη* im
 poneret, monendum esse duximus.

FORMA.



Amaracus seu Maiorana.

Herba est Sampsu
 chum surculosa, per ter
 ram serpens: folijs hirsu
 tis & rotundis, Calamin
 the tenuifolię similibus,
 admodum odoratis. Hęc
 delineatio ad amussim
 herbę Maioranę vulgō
 dictę fauet: est enim sur
 culis lentē rubentibus,
 folijs pilosis & rotundis,
 iucundo odore, semine
 copioso, quod bullulis
 quibusdam continet: flo
 re candido & exiguo.
 Serpit etiam per terram
 verū id non vbique fit
 interdum enim recta sur
 git in altum.

LOCVS.

Pasim in hortis & scitilibus vasis prouenit. Gaudet au
 tem locis vmbrosis, aqua & fimo.

TEMPVS.

Æstate dum floribus prægnans est carpitur.

Tcm

TEMPERAMENTVM.

Sampsuchum tenuum partium, & digerentis est facultas
tis desiccet enim & calefacit ordine tertio.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi vim obtinet, & coronamenti apta. Deco-
ctum eius potum, incipienti aquæ inter cutem prodest, &
ijs quos urinx difficultas, & tormina discruciant. Arida so-
lia ex melle illita, singillata tollunt. In pesslo subdita menses
ducunt. Contra scorpionis ictû ex sale & aceto illinuntur.
Luxatis cerato excepta imponuntur, Similiter & œdema-
tis. Aduersus oculorum inflammationes cum polline polen-
tæ illinitur. Mitætur acopis & malagmatis calefaciendi
gratia.

EX PLINIO.

Sampsuchum scorpionibus aduersatur ex aceto & sale il-
litum. Menstruis quoque multum confert impositum. Mi-
nor est eidem potio vis. Cohibet oculorum epiphoras cum
polenta. Succus decocti tormina discutit. Urinis & hydro-
pitis utile. Mouet & narium sternutamenta. Fit ex eo o-
leum quod Sampsuchinum vocatur, aut Amaracinum, ad
excaltaciendos emolliendosque nervos. Vulvas calefa-
cit. Et folia sugillatis cum melle, & luxatis cum cera
profunt.

De Spanachia. Cap. CCLX.

NOMINA.

Σπαναχία Græcis recentioribus, Spinacia, vel Spina-
ceum olus Latinis appellari potest. Arabicæ factionis
principes Hispanach, hoc est, Hispanicum olus nuntiant.
Germani [Spinet, oder Spinnar] Galli *Espinars*. Spana-
chiam haud dubiè ab oleris raritate dixerunt Græci: raro
enim illo utebantur medici, quòd cibo magis forsità, quàm
medicinæ nata esset, nec quicquā illustre sortita. (Vel quòd
etiam simile veri est) ab alijs nationibus emendicato spi-
naceo nomine, Spinacia vulgo dicta est ab insigni semini
spiculo

spiculatorum nota. Eſſi enim herba ipſa glabra & mollis ſit, ſemen tamen in ſpinas coalleſcit. Hiſpanicum verò olus nominatur, forſitan quòd inde primum duxerit originem, ad cæteras tandem nationes tranſlata.

LOCVS.

Exit ſeptem diebus à ſatu, folio primum triadgulo, molli, mox intybi, plærunque quâ pediculo cohæret laciniato, inerti ſapore, exigua radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali nonnunquam altiore, intus cauo: floribus in vertice rotandis, racematim coeuntibus, exiguis: ſemine ſpinulis horrido.

LOCVS.

Nullum ſolum reſpuit, ſed vbicunque ſatum fuerit hic lætiſſimè prouenit.

Spanachia ſeu Spinacia.

TEMPVS.

Seritur Septembri menſe, non horrens hyemis frigora, vt verno tempore cibum ſuppeditare poſſit. Martio etiã menſe ſeritur, Iunio autem & Iulio menſibus ſemen & flores proſert.

TEMPERAMENTVM.

Spanachia primi refrigerantium & humectantium ordinis eſt.

VIREs.

Aluum emollit. Melius Atriplice ſuppeditat alimentum, ſed aluo parum hærens facilè exigitur. Flatus colligit, & vomit



vomitiones cōcitāt, nisi excrementitius humor abijciatur. Ventrem decoctæ ius proluit. Stomacho inutile. Et exte-
rasferè omnes Attriplicis vires sibi fertur arrogasse.

De Sanicula. Cap. CCLXI.

NOMINA.

HERBA quam omnes hodie Saniculá vocant, à nul-
lo, quod sciam, veterum descripta est, sed à recentiori-
bus inuenta, vt multæ aliæ vulnerariæ herbæ. Sunt autem
qui Diapensiam nominent. Germanis [Sanickel,] Gallis
sanicle dicitur. Nomen Saniculam à sanandis vulneribus
traxisse vulgò constat.

GÉNÉRA.



Sanicula m. s.



Sanicula fœmina.

Duum est gēnerum. Vna quæ propriè appellatur Sani-
cula, ideoq; marem, vt certius esset discriminè appellauimus.

Get

Germanicè [Sanickel mennle.] Altera ab omnibus ferè herbarijs pro specie Osteritij vulgò vocati habetur, sed falsò, quando neq; in folijs, neq; in radice vlla appareat acrimonia, sed perinde atq; in mare Sanicula, amaritudo et adstrictio. Germanis errore etiam quodā [Die klein Meister wvrtz] nominatur. Nos eandem (cum & forma & facultate ad veram Saniculam, quam marem fecimus, proximè accederet) Saniculam fœminam nuncupauimus. Germanicè [Sanickel vveible.]

FORMA.

Sanicula vera, atque adeò mas herba est folio vitis, aut Apij, in quinque partes dissecto, rubentibus in fine sectionū maculis quibusdam: surculis quoq; rubris ad radicem, quæ multis ei capillamentis fibrata subest: capitulis in summis coliculis pusillis, herbaei coloris & subnigris, Fœmina quòd ad folia attinet priori similis, rubentibus tamen maculis caret, itémque rubris ad radicem surculis, quòd in ea hæc singula candida sint. Flores in summo candidos, ac subinde semen striatum & oblongum profert.

LOCVS.

Nascitur in syluis & vmbrosis locis.

TEMPVS.

Carpenda cum suis capitulis Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Non est simplicis naturæ, sed, vt indicio est gustus, adstringit simul & amara est, vt hoc nomine calefactoriâ & exiccatoriâ esse nulli dubium sit. Statuunt autem calidam & siccam ordine secundo.

VIRE S.

Saniculæ herbæ succum vulneratis in potu mirificè conferre experientia compertum est. Tumores quoque reprimere decoctam herbam impositam, aut eius succum illitū tam in homine quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud præsentius est auxilium, cum ad fauces vel pulmones vitium decubuit. Et in summa, omnia quæ Symphyton, præstat etiam Sanicula. Potissimùm verò sanguinis sputo, dysenterix, renūque vitij medetur.

DE

De Soncho. Cap. CCLXII.

NOMINA.

Sonchus Græcè, Sonchus, Cicerbita Latine dicitur. Sũt qui Lactucellam & Lacteronem appellant, quòd scilicet caulis eius dissectus copioso diffuset lacte. Germanicè [Mosz, oder Genszdistel,] Gallicè *Laiteron*, ou *Palaisan lieure* vocatur. Sonchus autem sibi nomen vendicauit ἀχί τοῦ σῶος χιός, eò quòd salubrem fundat succũ, vtpote qui sua sorbitione stomachi rosiones leniat, & lactis abundantiam nutritibus subministrat: genitalibùsque locis collectione laborantibus præsidio sit. Cicerbita tamen vocabulum (quo omnis Hetruria adhuc vtitur) recēs esse adiectionũq; & ex nō multo tẽpore Dioscoridi accreuisse videtur.

*Sonchus aspera.**Sonchus non aspera.*

GENE

G E N E R A.

Sonchi duo sunt genera. Alterum syluestrius, aculeatius, & nigris, quod [Genſzdiſtel] Germanicè vocatur. Alterum tenerius esculentumque, ac minùs nigrum. Germanis [Hasenkol] dicitur. Et Apuleio Lactuca leporina, quòd cùm leporem animus defecit æſtu, hac ſibi herba mederi ſoleat.

F O R M A.

Cubitalis & anguloſus Soncho caulis eſt, cauus & aliquàdo rubefcens, & qui fructus copioſo lacte manat. Folia habet per intervalla in ambitu ſciſſa. Florem luteum, qui: vt Senecionis, breui digeſtus abit in pappos, vanefciturque in lanugines.

L O C V S.

Vbique ferè in macrijs hortorum, potiſſimùm autem in vineis Sonchus provenit.

T E M P V S.

Floret Iunio & Iulio menſibus Sonchus vterque.

T E M P E R A M E N T V M.

Temperamentum eius quodammodo mixtum eſt: conſtat enim ex aquea terreàque eſſentia, vtraque leuiter frigida. Nam & adſtriſtionis cuiuſdam eſt particeps. Et ſiue cataplaſmatis in morem imponatur, ſiue edatur, manifeſtè refrigerat. Poſteà verò quàm planè reſiccatus fuerit, terreſtre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem.

V I R E S E X D I O S C O R Ì D E.

Viſ vtriq; Soncho refrigeratoria, modicèq; adſtringens. Proinde ſtomacho æſtuanti & inflàmationibus illiti proſunt. Succus eorum in ſorbitione datus ſtomachi roſiones morſusve mitigat, & lactis abundantiam efficit. In lana ap- poſitus, ſedis ac vuluæ inflàmationibus opitulatur. Tam herba quàm radix illita ſcorpionum ictibus ſubuehit.

E X G A L E N O.

Sonchus vbi adoleuerit, ex ſpinolis plantis eſt. Cæterùm viridis etiamnum & tener eſtur periinde vt cætera olera ſylueſtria.



*Intubum satium latifolium, Intubum satium angustifolium
sive Endiua sive Scariola.*

cinis. Nam qua hodie sub hac voce vtuntur, non est vera Endiua, sed Lactuca sylvestris, vt suo diximus loco. Germanicè [Endiuen] vocari potest, Gallicè *Endiue*. Altera angustiora folia habet, & subamara est. Hæc diminutiuo à Seris nomine Seriola dicitur, quod deinde corrumpentes recentiores Scariolam fecerunt. Germanicè [Scariol] appellari poterit: Gallicè *Scariole*. Erraticus iterū Intybus in duas species, Plinio loco antea citato autore, degenerat. Vna, quæ Græcis ab insigni amaritudine *πικρὴ, & κικλῶσις* nominatur, Latinis autem Ambubeia. Vulgus herbariorū & Officinæ Cichoreā vocant, Germani [Vegvarten], quasi viarum custodem, vel [Vvgvveisz,] quod peregrinis quasi viā indicare videatur: Gallicè *Cichoree*. Altera quæ latiore folio prodit. Plinio Hedypnois nominatur, haud dubiè non alia

ratione nisi quòd suauiter dormire, somnumque irrepere faciat. Vel (si paulò durior hæc videtur interpretatio) quòd flos eius præter alias Serides suauiter admodum spiret. Theophrasto libro septimo de plantarum historia, capite septimo, & Plinio libro vigesimoprimo, capite. 15. Aphaca alio nomine appellatur: diuersa tamen ab ea quam supra descripsimus, & quæ aliàs Viria syluestris dicitur. Vulgò Dens leonis, quòd folium sinuatim per lacinias denticulatū sit, & Rostrum porcinum nominatur. Officinis nostris (quæ barbaris delectantur vocibus) Taraxacon, aut Altaraxacò dicitur, Germanis [Korlkraut, Pfaffenrorlin, Pfaffenblatt,] Gallis Dent de Lyon.

FORMA.



*Intubum sylvestre siue
Cichorium.*



*Hedypnos siue Dens
Leonis.*

Satinus Intubus caulem edit magnū, rotundum, striatū, frequentibus surculis brachiatum. Germinat foliati statim à radice

à radice venoso. Flos illis in ramusculis cœruleus, & nonnunquam etiam cãdidus emicat. Prima autem eius species, vt diximus, folio latiore, altero angustiore cõstat. Erratici Intubi genus primum, quod Cichorium vocãt, germinat à radice post Vergilias, folio Betæ laciniato ferè semper in solo procumbente: caule magno, fistuloso, frangi contumace, multis ramulis brachiato, ad vinctum quoque lentis: flore cœruleo, interdum albo, particulatim vsque in autumnũ erumpente, qui nubilo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper compressus, & interdum hiscens. Hinc panditur rudissimus quorundã error, qui hanc herbam quã Germani [V vegvvar] nominant. Heliotropiũ esse contendũt: cùm tamen primũ folia repugnent, quæ non sunt Ocimo similia, neque candida, sed nigricantia magis: Deinde non candidum, sed magna ex parte cœruleum florem habet. Radix denique eius, vt Heliotropij, non inutilis, sed experientia teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cũ alijs satius Intubis similitudo, quæ vna satis docet Intubum esse sylvestrem: & non Heliotropium: Vt quorundam temeritatem non satis mirari quæam, qui contrã apertam veritatem, & omnium medicorum cõsensum, secus pronunciare audent. Alterum, quod Leonis dens nominatur, folijs multis constat, verinque denticulatis, in terra scissilibus, cauliculis dodrantalibus, concauis, læuibus & enodibus, flore luteo, stipantibus in circulum foliolis coronato, qui senescens euanesce in lanuginem, quæ cum aura raptim fertur,

LOCVS.

Satius non prouenit nisi in hortis cultu & diligentia humana: haud tamen difficulter vbi satus fuerit, emergit. Erratici prima species passim iuxta itinera nascitur. Altera in hortis, & passim ferè etiam sponte sua gignitur.

TEMPVS.

Satius Iunio & Iulio mensibus floret, Cichoriũ eodem ferè tempore incipit florere, & in autumnum vsque durat,

Hedypnoidis in Martio erumpunt flores, & in æstatem vsque perdurant.

TEMPERAMENTVM.

Seris olus est subamarū, & magis quod syluestre est, quod ob id ipsum Picrida quidam nūcipant, quidam verò Cichorium appellant. Est autem ea sicca frigidaque temperaturæ. Vtrunque secūdo abscessu. Porro domestica magis etiā quam sylvestris refrigerat. Sed & humiditatis multæ admixtio siccitatem extinguit. Vtraque autem adstringētis qualitatis particeps est.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Omnes adstringunt & refrigerant, & stomachum adiuvant. Aluum sistunt coctæ, si cum aceto assumantur. Sylvestres autem stomacho meliores. Comesti imbecillum & æstuantem leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta vtiliter illinuntur. Podagris & oculorum inflammationibus succurrūt. Herba & radix illita, percussis à scorpiōe subuenit. Ignibus sacris cum polenta medetur. Succus eorum cum cerusa & aceto vtiliter ijs quæ refrigerationem desiderant inungitur.

EX PLINIO.

Intubi quoque nō extra remedia sunt. Succus eorū cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Idemque cū vino potus, iecinoribus & vesicæ & epiphoris imponitur. Cichoriū refrigerat. In cibo sumptum & illitum collectiones, succusque decocti ventrē soluit. Iecinori & renibus, & stomacho prodest. Item si in aceto decoquatur, vrinx tormina discutit. Item morbum regium è mulso, si sine febre sit. Vesicam adiuvat. Mulierum purgationibus quidem decoctū in aqua adedō prodest, vt emortuos partus trahat. Adijciunt magi, succo totius cū oleo perunctos fauorabiliores fieri, & quæ velint facilius impetrare. Hedypnois stomachum dissolutū adstringit cocta: crudaque sistit aluum. Et dysentericis prodest magis cum lente. Rupta & cōnulsā vtroque genere iuvantur. Item quibus genitura valetudinis morbo effluat. Seris vtraque stomacho vtilissima, præcipuè quæ humor vexat. Cum aceto in cibo refrigerant vel illitę discutuntq; &
alios

alios quàm stomachi. Cum polenta syluestrium radices stomachi causa sorbètur, & cardiacis illinuntur super sinistrā mammam ex aceto. Omnes hæ & podagricis vtilis, & sanguinem reiicientibus. Item quibus genitura finit, alterno dierum potu.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonū est Intubum, si cum aceto quis eo vtatur. Postquam decoctum est, aluū sistit. Obstructiones auferendi vim habet, vt nullum aliud olus. Sanguinis feruorē sedat, & inflammationes iccoris discutit, & ictericos iuuat. Iecur proprietate quadam corroborat. Mediocriter somnū inducit. Tradūt quidam post venæ sectionem, aut cucurbitas, si quis cum aceto vtatur, iccinoris sanitatem cōseruare. Veneris appetētiā extinguit, & semen genitale in ijs qui frigidam habēt temperaturam, minuit. Vtile est ad sanguinis excreationem. Huius etiam decoctum iccinori admodum vtile. Semen febres ex flaua bile ortas iuuat: at lienī nocet.

De Staphylino. Cap. CCLXIIII.

NOMINA.


Σταφυλινός Græcè, Pastinaca Latine dicitur. Germanicè [Pastiney, oder Pastnachen,] Gallicè *Pastinades Carottes ou Panet* ζ. Pastinacæ verò nomen à pascendo dictum videtur: natura enim ei calens, sapor vehemens, aliè corpus, & Venerem cit.

GENERA.

Duplex Pastinacæ genus. Vna enim satiuā est, quæ iterum duorum est generum. Vnum genus, quod vulgò Carota dicitur, Germanicè [zam Pastiney, & rot Ruoben.] Alterum, quod quidam inter Rapa connumerant. Hinc est quòd Germani [Geel Ruoben] vocant. Sylvestris altera, quæ propriè Staphylinus Græcis nominatur, Germanicè autem [Vild Pastiney, oder Vogelneft.]

FORMA.

Folia Gingidij habet Pastinaca sylvestris, latiora tamen & subamara. Caulem rectū, asperūmq; vmbellam Anetho

*Pastinaca sativa prima.**Pastinaca sativa altera.*

similem obtinentem, in qua flores candidi, exiguum quiddam purpurei in medio habentes, & ferè ad croceum accedentis. Radix digiti crassitudine, dodrātalī, odorata, quæ cocta manditur. Hortenses sylvestribus per omnia similes sunt, nisi quod flores in medio purpureum quiddam non habeant, & radix vnins in suprema sui parte purpurea sit, alterius autem magis lutea.

LOCVS.

Pasim circa itinera, loca petrosa, & hortorū maceries sua sponte proneniunt erraticæ. Satiuæ in hortis nascuntur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus flores & semina Dauco similia producit vtraque.

TEM

TEMPERA-
MENTVM.

Calcfacit & abftergit
vtraque, magis tamen
fylueftris.

V I R E S E X D I O -
S C O R I D E .

Erraticæ fermen potū
aut appofitum menses
ducit. Vrinæ difficul-
tatibus, hydropicis, &
pleuriticis in potu con-
fert. Contra venenato-
rum morfus & ietus vti-
le. Ferunt non lædi à ve-
nenatis, qui id præfumi-
pferint. Conceptus ad-
iuuat. Radix ipfa vri-

Pastinaca erratica.

nam cit, & Venerem ftimulat. Fœtus ex vtero pellit appo-
fita. Folia trita cum melle impofita vlcera depafcentia ex-
purgant. Hortenfis Pastinaca cibo aptior eft. Ad eadem,
fed minori efficacia, prodeft.

EX GALENO.

Pastinaca fatiua imbecillior, fylueftris ad omnia poten-
tior. Vrinæ mouet, & menses prouocat cum herba quidem
tota tum maximè fermen & radix. Habet porro etiam ab-
fterforium in fe quippiam: quãobrem pafcentia vlcera qui-
dam folijs eius cum melle, quò pura reddant, illinunt.

EX PLINIO.

Pastinacæ erraticæ fermen contritum, & in vino potum,
tumentem aluum, & fuffocationes mulierum, dolorésq; le-
nit in tantum, vt vuluas corrigit. Illienum quoq; è paffo vè-
tri earum prodeft. Viris verò cum panis portione æqua tri-
tum. Ex vino potum contra ventris dolores. Pellit et vrinā

S v & pha

& phagedænas ulcerum sistit recēs cum melle impositura. Vel aridæ farinæ inspersam radicem eius Dieuches contra iecinoris & lienis, ilium, lumborum & renū vitia, ex aqua mulsa dari iubet. Cleophrantus & dysentericis veteribus. Philistion in lacte coquit, & ad stranguriam dat radices vncias quatuor. Ex aqua hydropicis, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis comitialibus. Habentes eam feriri à serpentibus negantur, aut qui ante gustauerint, non lædi. Percussis imponitur, cum axungia. Folia contra cruditates manduntur. Orpheus amatorium inesse Staphylino dixit, fortassis quoniam Venerem stimulari hoc cibo certum est: ideo conceptus adiuuare aliqui prodiderunt. Ad reliqua & satiuā pollet, efficacior tamē sylvestris. Semen satiuæ quoque cōtra scorpionum ictus, ex vino aut posca salutare est. Radice eius circumscalpti dentes, dolore liberantur.

De Strychno. Cap. CCLXV.

NOMINA.

ΣΤΡΥΧΝΟΣ Græcè, Galeno per vnus literæ abiectionem *πύχνος*, Solanum Latine, Officinis Solatrum, vulgò Cuculus, Vua lupina, Vua vulpis, Morellaque dicitur. Germanicè [Nachtschatt.] Gallicè Morelle.

GENERA.

Quatuor, Dioscoride & Galeno autoribus, Solani sunt genera. Primum hortense dicitur, quod scilicet olim in hortis cū alijs oleribus quæ edendo sunt, seminabatur. Hodie sua sponte, & inuitis cultoribus prouenit. Nigrum alio nomine, à nigris nimirum folijs aut in extrema maturitate fructu nigro, appellatur. Germanis simpliciter [Nachtschatt,] Gallis Morelle vocatur. Secundum, quod priuatim Halicacabum nominatur, Vesicariam quoque vocant à folliculis quos producit, vesicarū in animantibus speciem imitantibus, vel quoddam vesicæ calculis medeatur. Officinæ Arabes secutæ, corrupto Halicacabi nomine. Alkakengi appellant. Germani nostri [Iudenhuetlin, oder Doklin, Iudenkirschen, Schlutten, Boberellen, Kot Nachtschatten,] Galli *Bagnenandes*. Est præterea alia Halicacabi species

oies nuperrimè inuenta, & aliunde in Germaniam allata, cuius nemo antiquorum scriptorum, quod sciam, mentio nem fecit. Nos discriminis gratia Halicacabum peregrinum nominauimus, Germanicè [Vulsck Schlitten] non ineptè nuncupauimus. Gallicè *Bagueaudes sauvages*. Tertium Solanū somnificum ab effectu scilicet nominât. Sunt qui solatrum dormitorium vel marinū dicant, quòd rupibus non longè à mari inueniatur: Gallicè *Morelle marine*. Quartū Græcis *μαυρίδι*, hoc est, furiosum nominatur, offi-
cinis Solatrum mortale.

FORMA.



Solanum hortense.

Solanū hortense frutex est esculentus, exilis, alas multas habens, folia nigra Ocimo maiora & latiora, fructū rotundum, viridem, cū autem maturuerit nigrum, aut rufum. Flos huic cādicat. Halicacabum folijs priori simile, latiori-
bus

*Halicacabum peregrinum.**Solanum somniferum.*

Pēderota vocant, accedens. Caules à radice proceros decem aut duodecim emittit, vlnarū cubitorumve quatuor altitudine, capitulum effigie oliuæ incidens, sed hirsutum vt Platanī pilulæ, maius tamen & latius. Florem nigrū, post hūc fructum racemosum, rotundū, nigrum, denis aut duodenis acinis cōstantem, Hederæ corymbis similibus, mollibus vt vuz. Radicem candidam, crassam, cauam, cubitalem. Ceterum plantatur nunc in hortis Germaniæ herba Italis vocata Stramonja, & pomū spinosum, quā nonnulli inter Solani species numerant, non quòd descriptioni respondeat, sed quod eius folia opij odorem referre videātur, Quare vt alijs occasionem daremus cogitandī de hac planta, hoc loco eius picturam inserere placuit. Flores huius herbæ suauem Liliij spirant odorem. Videtur viribus parum à posterioribus



*Stramonia siue solatrum
mortale.*

cit, Halicacabum vesicas illas suas in fine Augusti, & inter initia Septembris mensis colore primum viridi, mox paulatim rufescente, profert.

TEMPERAMENTVM.

Hortense refrigerat & adstringit in secundo ordine, mediū autē absolutē in humectando & exiccando. Galeno li. 5. simp. cap. 9. teste. Idem faciunt Halicacabi folia. Somnificum tertij est refrigerantiū ordinis. Manici seu furiosi cortex radice refrigerat secundo ordine incipiente, & desiccet in secundo iam completo, & tertio incipiente.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Hortense refrigerandi facultatem obtinet, quā propter folia ignibus sacris, herpetibus cū farina polentę illita profuunt. Per se autē trita & imposita ægilopas, capitisque dolores

bus generibus Solani distare. Germanicē à pomis appellare libuit, [Stechend oder rauch oepffelkraut.]

LOCVS.

Hortense passim in opacis locis, & semitis obuivum est. Nasceitur & in hortis. Halicacabū in vineis copiosissimē provenit. Somnificum in saxosis nec procul à mari locis producit. Furiosum in montanis, ac vento perflatis locis, & ubi plantani nascuntur.

TEMPVS.

Hortense tota serēestate floret, autumno autem fructus eius maturet.

lores sanant. Stomacho æstuantī auxiliantur. Parotidas cū sale trita & illita discutiūt. Succus eius valet aduersus ignes sacros, & herpetas cū cerusa, rosaceo & lythargyro. Ad ægilopas verò cum pane. Infantium quoque ardori, quem syriasin vocant Græci, cum rosaceo persusus proficit. Miscetur collyrijs pro aqua aut ouo contra acres fluxiones ad inunctiones. Aurium dolori instillatus prodest. Muliebria profluvia in lana appositus, sistit. Succus fuluo gallinarū in domibus oberrantiū fimo subactus & linteo appositus ægilopis remedio est. Halicacabum vim vsūmq; hortensis Solani habet, verū nō comeditur. Fructus eius potus, eo quòd vrinam mouet, regiū morbum expurgat. Vtrorūque herba exprimitur, & succus siccatus in vmbra reponitur, ad eadē utilis. Somnifici radices cortex in vino drachmæ pondere potus, somnificā facultatem obtinet, Papaucris succo mitiorem. Fructus vehemēter vrinā cit. Corymbi eius serè duodecim hydropicis dantur. Plures autē poti ecstasin faciūt. Remedio est aqua malsa copiosa potui data. Succus eius medicamentis dolorem leuantibus & pastillis miscetur. In vino decoctus & in ore retentus dentium doloribus succurrit. Radicis succus cum melle inunctus oculorum hebetudines tollit. Furiosi radix in vino drachmæ vnus pondere pota, non illepidas neque iniucundas imagines speciēsve efficit. Duarum verò drachmarum pondere pota, ad tres vsque dies ecstasin affert. Quatuor autem drachmæ haustæ interimunt. Remedio est aqua malsa maiore copia pota, & vōmitione reiecta.

EX GALENO.

Solanum esculentum quod in hortis nascitur, notum est omnibus, vtunturq; illo ad ea omnia quæ refrigerari & adstringi postulant. Cæterorū verò non esculētorum vnum quidem nūcupatur Halicacabum, fructum habens rufum, acino vūc tum figura, tum magnitudine adsimilē, quo etiā ad coronas vtūtur. Alterum autē fruticosum, quod somnificum, & tertium quod furiosum dicitur. Halicacabum igitur in foliorum facultate hortensi simile est, fructū habens eiendæ vrinæ idoneū: proinde multis compositis facultatibus

genus, licet præferatur hortēsis saporibus. Et nihil esse corporis malorum, cui non salutare sit Strychnos Xenocrates prædicat. Somnifici radicem bibunt qui sunt vaticinādi cal lentes, quod furere ad cōfirmandas superstitiones aspici se volunt. Remedio est (id enim libentius retulerim) aqua co piofa mulsā calida potui data. Nec illud præteribo, aspidū naturę Solanum somnificū in tantum aduersum, vt radice eius propius admota soporentur, illud sopore enecāte vim carum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur.

APPENDIX.

Quod nos somnificum esse dicimus Solanum, aliqui hor tensē non sine maximo errore esse putāt, plurimūmq; suis bus conferre, ac easdem à lethalibus morbis præseruare asserunt. Nos tamen non laboramus magnoperē quomodo suis succurrat, sed quid in homine possit magis conside ramus, quum constet plerāque alijs animantibus esse cibū, quæ homini venenum sunt. Experientia verò cognitū est, geminos pueros statim ex esu acinorū huius generis Solani mortuos esse. Quod sanē exēplum nos mouet vt somni ferū esse credamus, potissimum cum in vniversum ferē illi descriptio quadret, vno hoc dempto, qđ semen nō habet in siliquis croceū. Sunt autem notæ quædā in hortēsis etiam delineatione quæ illi nō conueniunt. Neq; enim exilis est frutex, sed propemodum arborescens; neque etiam florem candidum, sed spadiceum obtinet. Quod verò ad flores & fructum attinet, videtur accedere ad historiam Solani fu riosi, vt suspicio ferē sit duorum horum generum historias esse confusas: quam quidem auget Theophrastus, qui in eorūdem descriptione nonnihil à Dioscoride variat. Quic quid verò sit, certum est Solani esse speciem, quod forma ipsa foliorum abundē docet: atque huic vehementem refri gerandi vim, maximē si paulō copiosius sumatur, inesse: vt hoc nomine pro somnifero Solano eius vsus medicis nullo periculo esse queat. Nos vulgi sententiam sequuti, appella uimus [Dolkrant.] posset etiā Germanicē vocari [Schlaff Nachtschatt.] Sunt qui [Sevvrant] nominant. Quòd si ta men hæc nonnullis haud satisfecerint, certē necesse erit

T

Man

Mandragoræ speciem esse fateantur tertiam, quam pingit Theophrastus lib. vj. de Hist. planta. cap. ij. ijs verbis: ἰδί-
δι δὲ καρπὸς τοῦ μανδραγόρος τῷ μίλκι καὶ ῥαγώδην καὶ σινώδην
ἴσκι τῷ χυμῷ, hoc est, fructus Mandragoræ peculiaris, quia
niger, acinosusq; , & vinosus suo sapore sentitur. Hæ enim
omnes notæ in fructu huius fruticis reperiuntur. Sed plu-
ra ea de re in capite de Mandragora diximus.

ADNOTATIO.

Halicacabum peregrinum & *Stramonium* ex horto sancti Ger-
mani pratenfis iam vulgariis multis sunt.

De *Symphyc*o magno. Ca. CCLXVI.

NOMINA.

*Symphytum magnum.*

Συμφυτον, ἢ σιμφυ-
τον μίλα Græcis,
Symphytum & Solida-
go Latinis, Officinis &
herbarijs Consolidatio ma-
ior, Germanis [Vval-
vvurtz, Schvvartz-
vvurtz, Schmervvurtz,
grösse beynvell,] Gal-
lis Consyre. Nomen illi
apud Græcos Latinos-
que egregia constringē-
di & conglutinandi vis
fecit.

FORMA.

Caulem emittit bi-
num cubitorū, aut ma-
iorem, læuem, crassum,
angulosum, Sonchi mo-
do inanem, circa quem
folia sunt non magnis
inter

interuallis distantia, hirsuta, angusta, oblonga, ad Buglossi foliorum figuram accedentia. Habet caulis secundum angulos eminentias quasdam productas. Folium tenue ex singulis alis prodit. Flores lutei, & semen Verbasci. Totus vero caulis & folia quandam lanuginem modicè asperam, tactu pruritum mouentem habent. Radices in superficie extræ nigrae, intus candidae & glutinosae, quarum est usus. Hæc siquidem delineatio adamussim huic herbæ quæ vulgò Consolida maior appellatur, competere videtur, quod nulla prorsus sit nota quæ illi non quadret. Sed obtrudet quispiam, florum colorem non respondere, quem Dioscorides luteum esse dicit, quum in nostra Consolida alius sit. Cui ita responsū volo. Coloris ista in floribus diuersitas non tanti momenti est, vt aliud à Consolida maiori Symphyton esse, conuincere possit: neque enim vbique terrarum, etiam earundem herbarum, flores similes sunt. Exemplo est Buglossum, quod Borraginem hodie officinae vocant: hoc enim interdum albos, quos nos Norimbergæ & Culmachij sæpe vidimus: magna autem ex parte purpureos producit flores. Sic quoque Symphytum frequenter flore subrubro, vel leniter purpurascente, vt Onolzbachij, rarius candido conspicitur. Tubingæ tamen omnia flore albo visuntur. Luteis floribus nullum in Germania vidisse me memini. Quod autem alios quam luteos nonnumquam proferat flores Symphytum, satis docet Apuleius in commentariolo illo quem de herbis conscripsit, qui illius flores nigros esse tradit, subrubros aut subpurpureos haud dubiè innuens. Nos vna pictura utrosque flores exhibemus. Germani candidis floribus Symphytum fœminam, subrubris verò marem appellant. Cæterum non est quod in Symphyti descriptione te perturbet aut remoretur, quod idem caulis simul læuis & angulosus dicitur: id enim sic intelligendum venit, quod caulis non perpetuò læuis aut angulosus sit, sed modò hunc, modò illum producat pro solidiueritate.

LOCVS.

Locis aquosis, palustribusque abundè pronenit.

T ij

TEM

TEMPVS.

Per integram æstatem floret. Radix tamen in Autumno carpenda venit.

TEMPERAMENTVM.

Modicè, ordine scilicet secundo, calefacit, exiccat & contrahit.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Radices tritæ & potæ cruenta expuentibus, ruptisque profunt. Recentia vulnera illitæ glutinât. Carnes si vnâ coquantur cogunt. Inflammationibus, sedis potissimùm, cū Senecionis folijs vtiliter illinuntur.

EX GALENO.

Symphitum magnum similem petræo facultatem habet, non tamen gustantibus dulce, neque odorantibus odoratum apparet, sed ijs sanè ab illo diuersum est. Cæterùm quatenus viscositatem quandam & mordacitatem obtinet, Scillæ simile est. Vtitur eo ad omnia quæ petræo. Potest autem petræum, collectū in thorace pulmoneque pus expurgare. Habet etiam contrahendi vim, qua sanguinis eiectionibus auxiliatur. Enterocelis imponitur, & ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. In vino decoctum ad dysenteriam, & profluuium muliebri rubrum constringendum exhibetur.

EX PLINIO.

Symphyti radix illita enterocelas cohibet. Vulneribus sanandis tanta præstantia est, vt carnes quoque cum coquuntur, conglutinet addita, vnde & Græci nomen imposuere, Ossibus quoque fractis medetur.

SYMPHYTI PETRAEI VIRES.

Quum Dioscorides & Galenus ad Symphyti facultates lectorem in Symphyti magni historia ablegent remittantque, necesse est, vt illas ordine connumeremus more quidem nostro, primùm ex Dioscoride, Deinde ex Galeno & Plinio.

EX DIOSCORIDE.

Decoctum in aqua mulsa & potum Symphytū petræū, quæ in pulmone sunt expurgat. Sanguinem reiicientibus
& re

& renum doloribus cum aqua datur Ad dysenteriam & rubra scæminarum profluuia in vino decoctū bibitur. Ad cōuulsa & rupta ex aceto mulso sumitur. Cōmanducatum sitim arcet. Gutturis asperitatibus prodest. Recētia vulnēra glutinat, & intestinorum ramices illitum coarctet. Carnes cū vnā coquitur conglutinat.

EX GALENO.

Symphytum petræum ex contrarijs constat facultatibus habet enim incidendi vim quāpiam, qua collectum in thorace & pulmone pus expurgare potest. Habet etiam quādam cōtrahendi facultatem, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas inest humiditas quēdam non immodicē calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu iucundū. Mansum sitim extinguit, & arteriæ asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarum virium mixturem simul digerere abundē potest, simulq; corpora contrahere & constringere. Proinde enterocelis imponitur & ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. Cæterum qui ipsum in vino decoctum ad dysenteriam, & rubrum muliebre profluuium exhibent, tanquam desiccante & contrahente vtūtur. Qui verō ad nephritim renūve dolorē, tanquam expurgante & incidente.

EX PLINIO.

Vtilissimum lateribus, lienibus, renibus, torminibus pectoris, pulmonibus, sanguinem reiicientibus, faucibus asperis. Bibitur radix trita, & in vino decocta, & aliquando superlinitur. Quin & commanducata sitim sedat, præcipuēque pulmonem refrigerat. Luxatis quoq; imponitur & cōuulsis, lienī, interaneis. Aliū sistit coacta in cineres. Detrahis quoque folliculis trita cum piperis nouem granis & ex aqua pota. Vulneribus sanandis tanta præstantia est, vt carnes quoque cū coquūtur, cōglutinet addita, vnde & Græci nomen imposuerunt. Osibus quoque fractis medetur.

De Sicyfatina. Cap. CCLXVII.

NOMINA.

Σ *Ἰσος, ἡδίστη* Græcis, Cucumis & Cucumer

T iij

Lati

Latinis dicitur. Officinę latinā appellationem retinuerūt. Aetius Anguriū etiā vocari tradit. Germani [Cucumern:] Galli *Concombres Pepons & Melons* vocant. Cucumer autem, vt Varroni placet, dicitur à curuore, quasi Curuimer. Sicyn verò Græci ex aduerso ἀπὸ τοῦ σιδήρου καὶ πύρι, quòd scilicet appetentiam concumbendi minimè stimulet, nominasse videntur. Hinc celebratum Græcis prouerbiū est, vt ex Athenæo annotauit Hermolaus: Texens pallium mulier cucumerem deuoret: quòd textrices magna ex parte, si Aristoteli credimus, impudicę sint, & opportunę Veneri. Vt ergo ijs impetus infrenetur & elanguescat, adagium edendos cucumeres textricibus consulebat.


GENERA.

Cucumerū genera sunt Pepones & Melopepones in quos statim degenerant, figura tantum & quantitate inter se diffidentes. Siquidem qui magnitudine excedūt, aut in lōgitudinem procedunt, quales multis locis nascuntur, Pepones quondam vocati fuerunt. Sed qui formam & effigiem mali referunt, & humi rotundantur, Melopepones Græcis vocantur, factō ex Pepone & malo nomine neque inter Pepones & Melopepones aliud quā quod sumitur ex figura quondam, vt diximus, discrimen fuit. Totum hoc genus Palladius Melones, quasi μέλωνες id est, pomeos, à malorum figura appellauit, quo nomine maior pars hodie medicorum simul cum officinis vtitur. Sunt itaque in vniuersum tria Cucumerum satiuorum genera. Primum genus absolutè Cucumis, à nostrę ætatis herbarijs, cum adiectione Cucumis citrinus, hoc est, flauus, à colore quem habet cum maturuerit, appellatur. Aetius, quòd equidem sciam, primus Anguria vocari tradit, quę veteribus σκῆρα, id est, Cucumeres nominantur. Horū sanè plura sunt genera: nos quatuor potiora commemorabimus, quorum etiam picturas exhibemus. Primū generis est vulgaris Cucumer. fructum obtinens oblongū & maculosum, Germanicè vocatur [Gemeyn Cucumern] Gallicè simpliciter *Concombre*. Sunt qui illum priuatim anguriā appellent. Ad quod sanè nomen alludentes Germani nostri, alio nomine [Gurchen] nomināt. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quē vul-

que Turcicum nuncupat, priori multò maior ac procerior
folijs, floribus & fructu, qui vt in primo non est maculosus,
sed tamè oblongus etià. Germani [Turckisch Cucumern]
appellant. Galli *Concombre Turc.* Fructus eius admodum
flauus existit, hinc est quòd multi eundem priuatim Citru-
lum & Citreolum, quasi citrinum, hoc est flauum vocent.
Huius semina alba & lata sunt. Tertij generis Cucumer



Cucumis sativus vulgaris.



Cucumis Turcicus.

est qui marinus dicitur, Turcico, quod ad folia, flores & se-
mina attinet, ferè similis: nisi quòd in hoc omnia sint mino-
ra: Fructus verò rotundus, vt pictura mōstrat. Vulgus Zuc-
co marin vocat. Germani [meer Cucumer.] Gal. *Concōbre
marin.* Officinis pinde atq; Turcicus ignotus. Quartij ge-
neris Cucumer est, quā officinè hodie Citrulū vocāt. folia ha-
bet ferè Colocyntidis, multifariā dissecta & incisa: fructū

T iij

rotun

rotundum, herbacei coloris, & in eo semina lata, & colore spadicea, hoc est, in rufo atra. Nos officinas respicientes nominauimus hunc Cucumerē citrulum, Germanicē [Citrullen,] Gallicē *Citrulle*. Alterum genus Cucumeris est, qui nunc simpliciter Pepon, *πέπων τὸν κίτρινον*, hoc est, maturescere dicitur. Is enim mitis ac tener maturitate flaccescit. Germani [Pfeben] appellant Galli Pepon. Tertium genus




Cucumer maritimus.



Cucumer citrulus.

Cucumeris hodie Melon ab omnibus vocatur. Germani [Melaum] nominant: Gallicē *Melons*. A priore forma & suauitate differt: rotundior siquidem & mali cotonei quasi formam referens, mitiorq; existit. Discrimen hoc sentiētes posteriores Græci *στέρον* simpliciter dixerunt, quem nos priuatim modò Cucumerem vocamus. Adiecta autē Peponis voce, hūc quem nostra ætas priuatim Peponem nominat,

στέρον



Pepo.

σίκον κίτρον, id est, Cucumeré. Peponem dixerunt, mitem scilicet & maturitate tenerum Cucumini innuentes. Sub quo eum etiam, quem à tereti ac rotunda mali effigie *μύλανα* peculiariter dixerūt, complexi sunt.

FORMA.

Cucumis sarmétis viticulisque prælongis serpit, in ramósque vitis modo se diffundit, tamen ob caulis infirmitatem humi spargitur, ni propius adsit cui caducus incumbat: folio anguloso, flore luteo, fructu cartilagineo, &

interdum maculoso, coloris tum herbacei, tum citrini, tum nigri. Pepo vite serpit prælonga, & flagellis vltro citroq; reptantibus, vitigineis serè frondibus, scabris, flore luteo, fructu cartilagineo, orbiculatim striato, prominulis pulvinorum toris, strigilibus in vertice pomi & umbilico coeuntibus, ibidémque stellatim decussatis, cute aspera velut lentiginibus occupata, carne intus suavi, seminibus in vtero lratim digestis.

LOCVS.

Pingui gaudet solo, locisque apricis vberior prouenit Cucumis. Nascuntur & Pepones bene cultis locis, eóq; lætius si subinde rigentur. Amant tamen aprica loca, & sole irradiata: idèoque cum annus est pluviosus & nubilus, non æquè vt in siccis annis proueniunt. Libertate etiā gaudet,

T v qua

qua possint vltro vagari. Magna copia Peponum & Melonum apud Norimbergam, celeberrimum Germaniæ nostræ oppidum, prouenit.

TEMPVS.

Aestatis fine, Iulio potissimum mense, maturescunt. Citius tamen Melones quam priuatim Cucumeres dicti.

TEMPERAMENTVM.

In Cucumeribus superat humida & frigida temperies, non tamen vehementer, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed iam desiccantis, idque in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Satius Cucumis bonam facit aluum, stomachoque accommodatus est. Refrigerat, nec corruptionem sentit. Prodest vesicæ. Olfactu animo deficientes restituit. Semen eius mediocriter urinam cit. Cum lacte aut passo vesicæ exulcerationibus subuenit. Folia eius cum vino illita, morsus canum sanant, cum melle verò epynictidas. Peponis autem caro comesta urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Superior eius cortex contra adustionem infantium, quam siriasin vocant, synicipiti imponitur. Fronti ut oculorum fluxiones auertat, imponitur. Mixtus farinæ, & cum semine in sole siccatus succus, smegma fit ad extergendam cutem, & nitorem in facie conciliandum. Radix sicca, & cum hydromelite drachmæ pondere pota, vomitiones mouet. Quod si quis modicè à cæna vomere cupiat, gemini oboli satis erunt. Sanat & vlcera in modum faui concreta: ceria vocat cum melle illita.

EX GALENO.

Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentiae est, qui verò immaturus est, crassioris. Sed & abstergendi & incidendi facultate participant: quare & urinam mouent, & corpus splendidum reddunt: at magis si quis semine arefacto contusoque atque cribrato, vice pulueris absterforij vtatur. In semine & radice maior abstergendi facultas,

tas,quàm in fructus ipsius carne. Vniuersa Peponum natura frigidior cum larga humiditate existit. Habent & quandam abstergeudi vim, ideoq; vrinã cient, & deorsum expeditius quam Cucurbita & Melo pepones rapiuntur. Quòd porrò abstergant, discere licet sordidam cutem defricando. Quamobrem maculas etiam solis calore factas & lenticulas faciem occupâtes, & in superficie alphas extergere possunt. Semen quod in eorum veluti carne cõtinetur, ad hoc efficacius, adedò vt renibus etiã calculo infestatis sit accõmodatum. Gignit in corpore vitiosum succũ, potissimũ quando nõ recte cõcoquitur. Tum verò morbum etiã qui cholera dicitur, inducere cõsuevit. Etenim priusquã ad corruptionem peruenit, vomitioni quoque idoneus est: largiũsque ingestus, nisi quis aliquid eorum quẽ boni sunt succi supermãdet, omnino vomitum concitabit. Melo pepones minũs humidi quàm Pepones sunt, nec adedò prauis succi, segnius item prouocant vrinam. tardiusq; deorsum descendũt. Ad vomitum excitandum nõ eandem vim Peponibus obtinent sicut nec celeriter in ventriculo (quando illi prauus humor coaceruatur, aut alia corruptionis causa illum infestauerit, corrumpuntur. Ventriculo haud quaquam ceu Pepones officiunt. Cucumeres autem vrinã mouendi facultatem, perinde atque Pepones habent, sed imbecilliores: minus namque substantia humidi, ideoque non faciliẽ, vt illi in ventriculo corrumpũtur, Inuenies qui hos ceu alia multa, quẽ bona hominũ pars concoquere non potest, conficiant, ob totius scilicet naturæ cum eis proprietatem.

EX PLINIO.

Pepones qui vocantur, refrigerant, maximè in cibo, & emolliũt alium. Caro eorum epiphõris oculorum, aut doloribus imponitur. Radix sanat vlcera concreta in modũ fatui, quæ ceria vocant. Eadem contra vomitiones siccatur, in farina rufa datur, quatuor obolis in aqua mulsã, ita vt quĩ biberit, quingentos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adijcitur. Cortex quoque vomitionem mouet, faciem purgat. Hoc & folia cuiuscunque fatui illita. Eadem cum melle epinyctidas sanant: cum vino canis

mor

morsus. Cucumis odore defectum animi.

EX SIMEONE SETHI.

Anguria, quæ Cucumeres dicuntur, secundū verò cōmunem sermonem Tetrangura, ob frigidum & humidū temperamentum noxia sunt, & mali succi. Ex ijs autem parua magnis anteferre oportet. Hæc urinā ducunt, & si in aceto macerentur, in acutis præsertim febribus, mitiorem calorem reddunt. Crebrior verò horū vsus semen genitale minuit, in Veneremque impetum aufert. Semen autem horum desiccatur, caliditatem quandā possidet, contrariamque his actionem efficit, urinamque magis prouocat. Pituitā glutinosā Tetrangura in ventriculo gignūt, quæ cruda per venas diffunditur. Propterea qui his crebrius vtuntur, illi propter humores temporis spatio in venis, & alijs corporis cavitatibus coactos, longis corripiuntur febribus. Semē verò horum urinam cit, sed minus quā Peponum, quoniam celerius in ventriculo corrumpuntur. Meliora in his sunt quæ habent semen exiguum. Calidos autem & siccos stomachos iuuant, & si in ardente febre cum aceto porrigantur, valde profunt. Proprium verò horum est Nauseas ventriculi calore excitatas, sedare. Horum autem interiora esse oportet: nam quæ foris sunt mali succi existunt, & difficulter admodum coquuntur, & ferè venenata. Habent verò & alias proprietates, vt animo deficientes propter excessentem calorem reficiant. Si autem pituitam in ventriculo nanciscantur, nauseas faciunt, & colicos affectus, & hypochondriacas passiones.

De Sicy sylvestri. Cap. CCLXVIII.

NOMINA.

Σικὸς ἄγριος, ἡ λατρίσις sic autem propriè vocatur succus eius Græcis, Cucumis anguinus, sylvestris & erraticus Latinis: Officinis & barbaris Cucumer asininus, Germanis [Vuild Cucumer,] vel [Efels Cucumer] Gallis *Cenombre sauvage* appellatur.

FORMA.



*Cucumis sylvestris sine
Asininus.*

Solo fructu à satiuo
Cucumere distat, quem
multò minorem habet,
glandibusque longius-
culis similem. Folia &
sarmenta satino similia,
Radicem albam & ma-
gnā. Totus frutex ama-
rus.

LOCVS.

Ruderibus sabulo-
sisque locis prouenit.
Nusquā tamen in Ger-
mania, quod sciam nisi
satus nascitur.

TEMPVS.

Augusto mense flo-
ret, atque subinde au-
tumno fructum tempe-
stiuū producit, qui semī-
nibus ac succo plenus
est, qui decepto pedicu-
lo cōfestim exilire solet.

TEMPERAMENTVM.

Calidus & siccus est Cucumis sylvestris, vt ex viribus la-
tius patebit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Foliorum succus instillatus aurium dolori cōuenit. Illi-
ta ex polenta radix omne vetus œdema discutit. Imposita
cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Decocta ex ace-
to & illita podagras discutit. Ischiadicis infunditur eius de-
coctum, eoque in dolore dentes colluuntur. Arida trita, al-
phos, lepras & impetiginem abstergit. Cicatrices nigras, &
in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pon-
dere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pitui-
tamq;

tâque deiiciūt. præsertim in hydropicis. Purgat verò citra stomachi iniuriã. Radicis selibram accipere oportet, inque duobus vini, præsertim Lybici, sextarijs cõterere, ac dandi ex eo terni cyathi, donec tumor abundè subsederit. Quod verò Elateriũ vocatur, ex fructu huiusce Cucumeris paratur ad hũc modũ: Eligito Cucumeres qui tacti saliendo succum ex se profundũt, ac nocte vna repositos, dimitte. Postridie cribrũ rarius, neque crebra foramina habens, crateri superponito, supinoque cultro sursum versus aciem habente sigillatim Cucumeres vtrisque manibus prehensens diuidito, & per cribrũ in subiectũ craterẽ humorem exprimito, simulque carnosum in eis quod iam cribro adhæret exprimito, vt & illud descendat. Quæ expressa sũt in paratã peluim conijcito. Coaceruatis autem in cribro quæ antea dissecta fuerunt, ea dulci aqua perfundito, & cum expresseris abijcito. Humorem in pelui agitatũ & linteo opertũ, soli exponito, dumque steterit, totã supernatãtem aquã cum humore cõcreto percolato. Facitoque id sæpius donec supernatans aqua subsidat, quam cũ diligenter excolaueris, coniectum in mortarium sedimentum terito, & in pastillos conformato. Elaterium verò à bimatu ad decennium purgationibus vtile. Integra quantitas obolus est, minima semiobolus, pueris chalciduo. Copiosius enim potum, periculum adfert. Pituitam & bilem per inferna pariter & superna trahit. Optima autem per ipsum difficulter spirantibus fit purgatio. Quòd si itaque in animo est per aluum purgare, adiecto salis duplo, & stibij quod colorari sufficiat, ex aqua catapotia crui magnitudine dato. Postea cyathus vnus aquæ tepidæ sorbeatur. Ad citandas verò vomitiones aqua diluens Elateriũ, subiectas lingue partes penitissimè penna oblnito. Quòd si quispiã difficilius vomat, oleo aut vnguento irino diluito. Somnũ inhibeto. Porro ijs qui supra modũ purgãtur, vinũ cum oleo mixtum continuo dare conuenit: etenim vomendo emendantur. Quòd si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densare possunt offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Fœtus enecat in passo subditum. Morbo re

gio medetur, cum lacte naribus infusum. Diuturnos capitis dolores finit. Efficaciter angina laborantibus inungitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

EX GALENO.

Cucumeris sylvestris, & fructus ipsius succus, quem Elaterium vocant, & nō minimè radice ac foliorum, ad meditationes perniciosus est. Elaterium itaq; menses ciet, & foetum interimit appositū ceu alia omnia amara & subtilium partium, maximè si aliquam habeat caliditatem, veluti Elaterium. Summè siquidem anasarum est, leuiter calidum, vt ex secundo sit ordine calefaciētium, Porro tale protinus quoque digerendi vim obtinet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectis fusum cū lacte in nares. Hoc etiam vsu dolores capitis sanat. Atq; Elaterium quidem cuiusmodi est. At radice succus, vt & foliorum, licet similem vim habeat, imbecilliores tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet, abstergit nanq; digerit atque emollit. Porro cortex eo potentius desiccatur.

EX PLINIO.

Ex Cucumere sylvestri fit medicamentum quod vocatur Elaterium, succo expresso è fructu. Cuius causa nisi maturius incidatur, succus exilit oculorum etiam periculo. Obscuritates & vitia oculorum sanat, genarūq; vlcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus vitium, nō attingi vnas ab auribus. Radix enim ex aceto cocta podagris illinitur, succoq; dentium dolori medetur. Arida cum resina impetiginem & scabiem, quā psorum & lichenas vocant. Parotidas & panos sanat, cicatricibus colorem reddit. Et foliorū succus auribus surdis cum aceto instillatur. Nullum ex medicamentis Elaterio longiore tempore durat. Incipit à trimatu. Melius autē quod vetustius erit, quod iam ducētis annis seruatum esse, auctor est Theophrastus. Et vsq; ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguit. Hoc enim veri experimentum est, si ad motum prius quam extinguat, scintilla re sursum ac deorsum cogat. Efficax est cōtra scorpionum ictus Elaterium, & ad purgandum vterum, aluūq;.

Me

Modus portione virium à dimidio obolo ad solidum. Copiosius necat. Sic & contra phthiriasin bibitur & hydropiscy. Illitum, anginas & arterias cum melle, & olco veteri sanat.

De Smilace hortensi.

Cap. CCLXIX.

NOMINA.

Σ *Μίλας κικασία* Græcè, *Smilax hortensis* Latinè, Officinis inusitata. Recentiores Græci ac herbarij, & qui Arabum præsertim Serapionis & Auicennæ, sectantur placita, *Phasiolos* vel *Faseolos*. Galenus & alij veteres Græci *Dolichos* appellant. Germani [*Faselen*, *Vuelsch* oder *Vuild Bonen*] Galli *Phaseoles* vocant.

FORMA.



Smilax hortensis.

Folia *Hederæ* similia habet, molliora tamen: caules tennes, & capreolos vicinis fruticibus se implicantes, in tantum incrementum, ut tabernacula effingere possint. Fructû *Fœnogræco* similem profert, longiorè tamè maiorèmq; in quo semina renibus similia, non vnius coloris, sed ex parte subrufa continentur. Ex qua certè delineatione sole clarius fit, *Smilacem hortensem* *Dioscoridis* non esse nisi *Phaseolos* vulgò vocatos, cum sint folijs *Hederæ*, mollioribus atque venosis, cauliculis tenuibus, clauicu-

lis propinquis fruticibus se implicantibus, ramis incremento suo tentoria & hortorum cameras fornicéve facientibus, siliquis Fœnogræco haud dissimilibus, longioribus auté & maioribus, seminibus intus versicoloribus, & renibus in vniuersum similibus. Quæ certè vnica nota ad docendum Smilacem hortensem esse Phaseolos sufficere posset. Accedit quòd Phaseolorum apud Serapionem descriptio non sit alia quam apud Dioscoridem Smilactis hortensis: id quod manifestè patebit vtrasque cõferenti. Cæterùm etsi duo Phaseolorum videantur esse genera: sunt enim aliqui candidi, nonnulli verò rubentes: tamen quia in folijs nulla est prorsus diuersitas, & Dioscorides quoque innuat semina hæc non esse vnus coloris, sed vt Serapion interpretatur, quædam ad candorem, quædam verò ad ruborem accedant, ideo sub vnica pictura vtriusque coloris Phaseolos exhibemus: neque enim distant alia ratione, quàm quòd albi producant flores candidos, rubentes verò purpurascens. Licet non ad candidos & rubentes tantùm hæc Dioscoridis verba, *οὗκ ἰσχυρὰ* referenda esse, existimem, sed ad alios etiam: sunt enim nonnulli fusci, alij verò gilui, cœrulei & cæsij, alij maculis & orbibus atris variegati, nisi quis omnes iam dictos colores sub candido & rubro, ex quibus ij commixti esse videntur, complecti velit.

LOCVS.

Smilax de qua hic agimus, vt ex nomine satis constat, in hortis sata prouenit, & cum longis serpat flagellis, propè poni ridicæ palive debent, quas capreolis suis, vbi increuerit, complectatur.

TEMPVS.

Aestate florent, ac subinde siliquas & in ijs semen producunt.

TEMPERAMENTVM.

Simeon Sethi & Mauritani in primo ordine calidos & humidos esse Phaseolos statuunt. Galenus etiam in libro primo de Alimentorum facultatibus, humidiore natura esse asserit.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Olerum modo esui apta est siliqua cum semine, Asparagi modo elixa. Vrinam pellit, insomniâque grauiâ & tumultuosa facit.

EX GALENO.

Dolichi non minùs quàm Pîsa nutriunt, similiter etiam flatu carent: sed quod ad suauitatem attinet & deiectione, peiores sunt. Alibiles itaque sunt, nisi quando integri & etiamnum virides vnâ cum suis siliquis ex oleo & garo ab hominibus ingeruntur. Aliqui vinum etiam adiiciunt. Sed horum in repositione, vt Pîsorum nullus est vsus: quippe quum natura sint humidiores, citò corrumpi consueuerunt. Attamen si quis hos tutò reponere cupiat, siccare prius diligenter & exactè oportebit. Siquidem eo modo & à putrefactione & à corruptione tota hyeme vindicâtur, eundem quem nobis Pîsa vsu exhibentes.

EX AETIO.

Siliquæ seu Lobi, qui nunc passim vocâtur, apud omnes antiquos Dolichi & Phasioli appellati, de genere Pîsorum sunt, similes illis quantùm ad minimam flatu generationem: quantùm verò ad iucunditatem cibi & egestionem, peiores. Peculiariter autem Lobi dicuntur, quoniam ferè isti tantùm eorum omnium quæ siliqua vestiuntur, cum siliquis suis comeduntur.

EX SIMEONE SETHI.

Qui ex ijs magis rubri sunt, calidiores. Manifesta quoque in ijs humiditas, quòd citò putrescant. Humorem generât crassum & pituitosum. Medium locum habent, vt ait Galenus, inter ea quæ facîle & difficulter concoquuntur, celeriter & tardè transeunt, inflant, & nō inflant, parum & multum nutriunt. Ante alios cibos cum sapa sumpti, ventrem proritant. Cum sinapi oblati, plurimum noxæ deponunt. Albi igitur Phasioli crassiores, & difficilioris coctionis, ac humidiores sunt quàm rubri. Proprietate autem quadam turbulenta somnia faciunt, sed ad bonam habitudinem corporis conferunt, et urinas mouent. Et horum decoctum menses mouet.

De Satyrio Trifolio. Cap. CCLXX.

NOMINA.

Σ Ατύριον τρίφυλλον Græcis, Saryrium trifolium Latinis. Officinis nostris incognitū aut inusitatum: vulgò Testiculus vulpis aut sacerdotis. Germanis [Stendelvretz,] Gallis *Satyrium à trois feuilles* nominatur. Satyrio autem nomen fecerunt Satyri, qui primi sylvestres dij colludentes nymphis per sylvas & antra ad firmiorem Venerem herbam hanc inuenerunt. Trifolium verò, quoniam tria fert folia ad terram versa.

FORMA.



Satyrium trifolium.

Folia tria fert Rumi-
ci aut Lilio similia, mi-
nora tamen & rubentia.
Caulē nudum, longū,
cubitalem. Florem Lilio
similem, album. Radi-
cem bulbo similem, mali
modo extuberantem, fo-
ris rufam, intus omni mo-
do albam, gustu dulcem,
& ori gratam. Quod ve-
rò hic dicimus Lilio simi-
lem: non sic intelligen-
dum venit quasi quanti-
tate & tota figura Lilio
similis flos sit, quando
evidentissimum sit Li-
lium quantitate sua Sa-
tyrij florem multis mo-
dis superare. Denique
nec figura etiam per om-
nia respondet: quare hæc
similitudo ad colorem & floris essentiam referri potius de-
bet, quæ planè eadem est cū Lilij colore & essentia, id quod

conferenti hos duos flores manifestum fiet.

LOCVS.

In montosis & apricis nascitur.

TEMPVS.

In Iunio mense potissimum comparet.

TEMPERAMENTVM.

Calidū & humidū est, quamobrem gustu dulce apparet.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix in vino austero nigro, ad opisthotonum bibitur. Ferunt etiam hanc impetum ad Venerem excitare.

EX GALENO.

Satyriō excrementitiam & flatuosam humiditatem pos-
sident, quocirca ad Venerē incitat. Hæc verò & herbe ipsius
radix præstare potest. Porro vt nonnulli scribūt, cum vino
nigro austero potum, opisthotonum sanat.

EX PLINIO.

Radix cum Satyrio gemina sit, eius inferior pars & ma-
ior mares gignit, superior ac minor fœminas.

De Satyrio Basilico. Cap. CCLXXI.

NOMINA.

Σ *Ατύριον βασιλικόν* posterioribus Græcis, Satyrium regiū
Latinis, Officinis Palma Christi, Arabibus Bucheidē,
Auicennæ Digiti citrini, Germanis [Kreutzbluomen]
Gallis *Satyrium royal* vocatur. Palmam Christi propter si-
militudinem quam eius radix cum humana habet manu,
dixerunt,

GENERA.

Duo eius sunt genera, quorum alterum mas folia nō ma-
culosa, floresque purpureos habet. Alterum fœmina macu-
losa est & paulò latioribus folijs, floribus in purpureo al-
bescentibus. Radieum etiam in colore est differentia, quod
maris quidem radix flanescat citra albedinem, fœminę au-
tem cum albedine. Quam sanè differentiam Auicenna etiā
expressisse videtur, dum vnā ex flauo & albo commistam
esse colore, alteram verò ex flauo sine albedine inquit.

For

FORMA.



Satyrium Basilicum mas. *Satyrium Basilicum femina.*

Folia cū reliqua superficie Cynosorcho similia sunt. Radix tamē ei subest lutea aut flauescēs, instar manus ramosa: modo enim quatuor modo quinq; modo sex aut plures radices prodeūt, quæ ferē humanos digitos imitari videntur.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & locis soli expositis.

TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus inuenitur. Mas quidem Iunio, fœmina verò Maio.

TEMPERAMENTVM.

Vtrunque amarum est, magis tamen amarum quod maculosis cōstat folijs. Ideoque non perperam censent Auicenna & alij quidam ex recentioribus medicis, quī calidum esse & siccum in secundo ordine tradunt.

VIREs EX RECENTIORIBVS.

Vsus eius ad erugandam cutem, ad neruorum dolores, & contra noxia medicamenta. Fertur & amuletum esse radix gustata. Sement ex vino sumptū nouem diebus, comitiales sanat. In eundem effectum vinum diluitur herbę decocto. Scobs radiceis propinatur in vino ad arcendam quartanam quam & vomitiōe curat paulò ante accessionem pota. Plura in præsentia rescire de huius facultatibus non licuit.

De Succisa. Cap C CLXXII.

NOMINA.

QVO nomine veteres aut posteriores Græci appellerint hanc herbā, cognitamque illam habuerint nec ne, nobis nondum constat. Nonnulli Geum esse arbitrantur. Nos Succisam nominare voluimus, partim q̃ id nomi-

*Succisa.*

nis latinum esset, & pulchrè huic herbæ quadraret, cuius radices circunrosæ sunt, partim quòd antiquus manuscriptus herbarius sic vocaret. vulgus superstitione quadā motum credit cacodæmonia, tantę efficaciz radicem inuidere hominibus, atque hac ratione vbi succreuerit statim cū vndiquaq; circūrodere. Hinc est quod diaboli morsum appellitēt. Quā etiā superstitionem plus quam muliebrem secuti Germani [Teuffels abbissz,] Galli *Mors de Diabole*, hoc est, præmorsam à diabolo, nominant.

FOR

FORMA.

Binum cubitorum fastigiatur altitudine, folijs Plantaginis minoris, aut Cirsij, læuioribus, solidioribusque, leniter laciniatis. Floribus purpureis, Radicibus subnigris, succis & circumrosis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis & montanis, saltibus, ac interdum etiam pratis & dumetis.

TEMPVS.

In Augusto eius magna & passim in locis ita dictis copia.

TEMPERAMENTVM.

Supra modum amara est, vnde calidam & siccam esse satis constare cuius potest.

Præsentaneo remedio ad maturandos, atque adeò sanandos carbūculos adhibetur, si herba viridis trita imponatur, aut vinū in quo decocta fuerit bibatur. Radix per se estus aut vinū eius decocti in vuluæ doloribus bibitur. Hæc manuscriptus herbarius. Hodie, cū habeat facultatē discutiēdi & incidendi, vtuntur ea ad dissoluēdos sanguinis grumos.

De Scabiosa. Cap. CCLXXIII.

NOMINA.

ET hæc herba quo nomine Græcis vocetur, fatemur nos ignorare. Sunt qui Aetio *ῥάρα* dictam velint: verū cum nomine tenus eam tantum prosequatur non adiecta descriptione, nihil certi cōstitui potest. Vulgus Scabiosam vocat, quo nomine nobis vtēdū crit donec legitimū cōperitū fuerit. Germani [Scabiosen, oder Apostemkraut.] Galli *Scabieuse* nomināt. Scabiosam verò aut à scabro herbæ habitu, aut q̃ scabiei medeatur, appellatā esse euidentissimum est: id quod etiā Psora vox præterevidetur. Stæben Dio scoridis nō esse multis argumentis constat, quæ prætereo.

FORMA.

Folia carnosæ: F. rucæ modo laciniata & multifida habet, subhirsuta, non tamen aculeis horrentia. Flores speciosos, diuturnos, coloris ex cæsis aut purpureo albicantis. Radicem crassam.

*scabiosa.**De Smilace aspera. C. CCLXXIIII.*

NOMINA.

Σ *Μίλαξ πρᾶχινα* Dioscoridi, *μίλαξ* Galeno, *Smilax aspera* Latinis dicitur: Officinis nostris incognita. Germanicè [Grosz Stechend oder scharpff Vvindt,] ab aculeis quos habet, nominari aptè pòt: Gallicè *Phaseoles espinenses*.

FORMA.

Folia habet *Peryclimeno* similia, vel, vt *Theophrastus* ait, *hederacea*: ramulos multos, tenues, *Paliuri* aut *Rubi* modo aculeatos. Circunuoluitur arboribus, sursum deorsum se circumagens. Florem candidum, fructum racemosum fert, cum maturuerit rubentem, gustu leuiter mordentem. Radicem crassam & duram.

LOCVS.

In palustribus & asperis nascitur. *Plinio* autem teste in conuallibus opacis.

TEM

LOCVS.

Pasim in omnibus, potissimum autem humidis pratis prouenit.

TEMPVS.

In Iunio, antequam gramine denudentur prata, pasim floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum sit vehementer amara, calidam & siccam esse nemo nescit, idemque cum *Succisa* temperamentum habet.

VIREs.

Easdem quas *Succisa* facultates obtinet. Potissimum autem scabiè & tussim sanat.

TEMPVS.

*Smilax aspera.*

Smilacem quidē asperam nascentem non vidi: sicca enim aliunde ad me transmissa est, ita vt certò indicare quo tēpore floreat aut fructū producat, haud possim. Id quod ideo referre volui, ne nos calumniandi ansam habeat osor peruersus, si non ex omni parte picturam nativæ ipsius herbæ formæ respondere viderit. Cogitet enim non viridem, sed siccā nos pingēdam tantūm dedisse. Theophrastus tamen lib. iij. capi. vlti. de Histo. plan. hanc verno tempore florere scribit.

TEMPERAMENTVM.

Quale sit eius temperamentum, vires satis declarant, & folia ipsa atque fructus, quæ singula in gustu lenem quandam mordicationem præ se ferūt, vt calidam esse & siccam haud dubium sit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius folia & fructus si antè & post bibantur, contra lethalia venena efficacia sunt. Traditum est, quòd si quis tritum eorum aliquid nuper genito infanti bibendum dederit, nullum illi postea venenum nociturum. Conciditur etiam in alexipharmaca.

EX GALENO.

Milax aspera clauiculis plena est, vt arboribus sursum deorsum diuersimodè circumuoluatur. Folia gustata acrimoniam aliquā habent, & alioqui si illis vtaris calefaciunt.

V V EX

autumno autem folia cadunt. Ex qua descriptione planū fit omnibus, herbam hanc quam vulgus herbariorum Volubilem maiorem vocat, esse Similacem læuē, quod illi sci licet singulæ notæ à nobis commemoratæ conueniant. Id quod etiam pictura smilacis asperæ, si cum hac conferas, factis demonstrat, quā vno hoc nomine dedimus, vt ex eiusdem collatione manifestiūs læuis ipsa agnosceretur. His accedit antiqui & manuscripti herbarij testimoniū, qui Smilacem læuē Volubilem maiorem interpretatur. Eius etiā pictura Volubilem quā maiorem appellamus, penitus exprimit.

LOCVS.

Nascitur passim per fruteta, & sepibus sese inuoluit. Amat culta, & in ijs etiam potissimū gignitur.

TEMPVS.

Aestate floret, Autumno semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Modicam amaritudinem in gustu præ se fert.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Huius semen cū Dorycnio, & vtrunque trium obolorū pondere potū, somnia multa & turbulenta facere fertur.

EXGALENO.

Milax læuis facultate quodammodo prædictæ similis est.

EXPLINIO.

Nullius est effectus.

APPENDIX.

Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidas venter passionēs, capitis potissimū & oculorum.

ADNOTATIO.

Smilax laevis Lise & Liseron à ligandis quibus adnascitur plantis hic pingitur.

De Sisymbrio. Cap. CCLXXVI.

NOMINA.

Σισυμβριον Græcis, Sisymbrium Latinis appellatur, Sisymbrium dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit
vete

veteribus comædijs meretricula. Coronam etiam Veneris nonnulli dixerunt, vel quòd ob odoris suauitatem quam præ se fert, eo iuuentus, quæ amoribus gaudet, coronata, in comessationibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras commendaret. Vel potius, quòd Sisymbrij caulis articulatum per internodia verticillato florû ambitu con-
cinnè coronetur.

G E N E R A.

*Sisymbrium.**Sisymbrium cardamine.*

Sisymbrij duo sunt genera. Vnum quod simpliciter Sisymbrium dicitur: hoc seplasiarj Balsamitam, vt manuscriptus etiam testatur herbarius vulgus autem Mentham aquaticam, Germani [Fischmuntz Vuassermuntz, oder Bachmuntz,] vocant: Galli *Mente aquatique*. Alterum cum adiectione Sisymbrium cardamine nominatur. Officinis Nasturtium aquaticum Germanis [Brunenkresz,] Gal-
lis

lis *Cresson de ruyssaux*. Sic verò dictum, quòd sapore Cardamum, hoc est, Nasturtium imitetur.

FORMA.

Sisymbrium hortensi Menthæ simile, quadrato caule, quadantenus purpurascens, folijs Menrhæ, serratis, latioribus & odoratioribus: floribus internodiageniculatim coronantibus, verticillato semper ambitu. Sisymbriū cognomento cardamine folia inter initia orbiculata habet: cum autem creuerint, vt Erucæ foliū laciniatim finduntur. Caulis profilit cauo, sesquipedali, ima sui parte pluribus radicalium fibris subinde capillato, è cuius alarū canis cirri frequentes sinuatim erumpūt. Flore candido. Semine Erucæ instar in siliquis acris & exiguo.

LOCVS.

Vtrunque riguos tractus amat: Primum autem potissimum circa stagna & piscinas nascitur. Alterum nusquam non in aquatilibus.

TEMPVS.

Aestate, potissimum verò Augusto mense, cum Mentha florent.

TEMPERAMENTVM.

Sisymbrium primum excalfacit atque desiccatur in tertio ordine. Alterū autem quum siccum est, itidem tertij est ordinis excalfacientium, & exiccantium: quum humidum & viride secundi.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Sisymbrium primum vim calfaciendi obtinet, Semen eius ad strangurias & calculos cum vino potum prodest. Tormina & singultus sedat. Folia temporibus & fronti illinuntur contra capitis dolorem. Aduersus etiam apum & vesparum ictus valent. Vomitiones potum sistit, Alterum cardamine cognominatum calefacit, urinā ciet. Comeditur quoque crudum. Lentigines & cutis à sole nigritiem & asperitatem exterit tota nocte illitum. manè autem ablutum.

EXGALENO.

Sisymbrium primum tennium partium est digerentis,
cale

calefacientis, & exiccantis facultatis. Semen quoque eius tenuium partium est & calidum. Quocirca ipsum quidam cum vino exhibet singultientibus, & tormina parientibus. Sisymbrium, quod quidem Cardaminem vocant, quandoquidem Cardamo id est, Nasturtio simile quiddam gustu præfert, eadem ferè potest.

EX PLINIO.

Vtrunque Sisymbrium efficax aduersus aculeata animalia, ut sunt crabrones & similia. Sedant capitis dolorem, item epiphoras. Alij panem addunt. Alij per se decoquunt in vino. Sanat & epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierum intra quartum diem noctibus impositum, diebusque detractum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet, siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendum grauidis nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum eijcit. Mouet urinam cum vino potum. Syluestre & calculos. Quos vigilare opus sit excitat, infusum capiti cum aceto.

ADNOTATIO.

Sisymbrium alterum seu Cardamine Crescio, à crescendo celeritate vulgò dicitur.

De Sio. Cap. CCLXXVII.

NOMINA.

Σ *Ιορ, à αναγallis ἰουστ* Græcis: Sion, Lauer & Anagallis aquatica Latinis dicitur. Officinis ignota herba. Germanis [Vuasser pungen, Bach pungen, oder Pungen.] Gallis Berle appellatur. Sium autem nomen sibi adscriuit à concussu, quod Græci *σις* dicunt: nam excutiendi vim nactum est, utpote quod à renibus calculos pellat, urinam & menses ducat. Anagallis aquatica. quod flores eius Anagallidis feminae floribus per omnia respondeant. Lauer nomen haud dubiè à lauando contraxit, quod sonantibus aquis enatum semper elui gaudeat.

FORMA.

Puillus est frutex, rectus, pinguis, folijs latis. Olusatro similibus, minora tamen, & odorata. Quæ delineatio prorsus astipulatur huic herbæ quæ Germani [Vuasser pügen] nomi

*Sium seu Lauer.*

Quum amara admodum sit hæc herba, vt calefaciat & exiccet necesse est. Atq; hinc iterum colligere licebit, vt patebit ex verbis Aetij, eam esse Sium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Sij folia cocta crudâque comesta calculos comminunt & excernunt. Vrinâs mouent. Fœtus & menses educunt. Dysentericis vtiliter comeduntur.

EX GALENO.

Sium quantum gustu odoratum est, tantum etiam calefacientis facultatis est particeps. Digerit autem & vrinâ mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

EX AETIO.

Sium quatenus gustu odoratum est, eatenus calefacit, & exiccat. Discutiendi etiâ vires habet, vrinâ mouendi, calculos in renibus dissoluendi, ac menses ciendi.

nominant. Hæc enim riuis gaudet, frutex pinguisq; est, latis folijs, Hippofelino similibus, & digitis leniter friata, iucundum expirantibus odorem. Floribus cœruleis, Anagallida fœminam referentibus.

LOCVS.

Inuenitur in aquis citato lapsu repentibus, aut etiam resedibus. Sæpe verò intumescētib; demersum videtur.

TEMPVS.

Iunio mense floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

EX PLINIO.

Prodest vrinis, renibus, lienibus, mulierumque mensibus, siue ipsum in cibo sumptum, siue ius decocti, siue semè è vino drachmis duabus. Calculos rumpit, aquisq; quæ gignunt eos, resistit. Dysentericis prodest infusum. Item lenitigini illitum, & mulierum vitijs in facie, noctu illitū mōtō cutem emēdat, & ramices lenit, & scabiem equorum.

APPENDIX.

Veterinarij in hodiernum vsque diem hac herba in tumoribus discutiendis, & scabie equorum sananda vtuntur, vt hinc manifestum fiat illam esse Sium.

ADNOTATIO.

Sion seu Lauer diuersissimam pingit ab ea quam medici & officina syllabarum metathesi vocant Verlam, & ad nephriticos affectus, vti & Cardamine plantam persimilem & congenerem feliciter vsurpant.

De Stratiote millefolia. Cap.

CCLXXVIII.

NOMINA.

Σ Τρατιώτης ἢ χιαιόφυλλος Græcis. Stratiotes millefolia Latinis, Officinis & herbarijs Millefolium, Germanis [Garben, Schafgarben, Schafripp, Tausendblatt, & Geruuel] Gallis Millefeuille, ou Cumin, ou Anet sauvage nominatur. Stratiotes verò Græcis, id est, militaris dicta est, quòd vulnera ferro facta sanet, atque adeò in militia & castris multus eius vsus sit.


FORMA.

Frutex est exiguus, dodrantalis & maior. Folia habet, pulli auium pennis similia. Suntq; foliorum exortus admodum breues, incisuris diuisi. Breuitate verò & asperitate Cumino syluestri maximè assimilantur, & etiamnum breuiora. Huius denique umbella densior & plenior: surculos enim in cacumine paruòs habet, in quibus Anethi modo umbellæ sunt. Flores illi candidi & exigui sunt.

LOCVS.

Nascitur in agris asperis, & præcipuè circa vias ac semitas.

TEM

*Stratiotes Millefolia.*

TEMPVS.

Per integram floret
æstatem.

TEMPERA-
MENTVM.

Nonnihil adstrictio-
nis habet, atque adeò
exiccat.

VIRES EX DIO-
SCORIDE.

Eximiè utilis est her-
ba ipsa ad sanguinis e-
ruptionem, et ad vlcera
vetera ac recentia, item
ad fistulas.

EX GALENO.

Vulnera glutinare potest, & vlceribus utilis est. Sunt qui
ea ad sanguinis eruptiones vtantur, & ad fistulas.

EX PLINIO.

Hetruria Millefolium appellat herbam in pratis tennem
à lateribus capillamenti modo foliosam, eximij vsus ad vul-
nera. Boum neruos abscissos vomere, solidari ea, rursusque
iungi addita axungia affirmant.

APPENDIX.

Recentiores ad eòdem vsus millefolium sunt adhibèt,
ad sananda nimirum omnis generis vulnera, dissolutum
sanguinem concretum, & ad constringendos menses. Vn-
de à Stratiote millefolia non esse diuersum omnibus per-
spicuum fit.

De Sarracenica Solidagine.

Cap. CCLXXIX.

NOMINA.

QVVM nobis non constet quo nomine veteribus nominata sit herba hæc, placuit vsitatam ac tritam nostri temporis herbarijs appellationem vsurpare, donec veriorem comperire contingat. Non tamen latet à nonnullis corrupta voce Carrafilaginem, vel magis deprauata Filaginem nominari, cum dicendum esset Ceratophylacem, quia nimirum partem oculorum ceratoida, hoc est, corneam defendat, salutiq; percussam ac læsam restituat. Cur verò hoc nomine non appellandam censeam, facit in primis quòd

*Solidago Sarracenica.*

descriptio Ceratophyla eis illi non conueniat. Dein quòd pictura eius de in manuscripto herbario illi herbæ quam Fortem vocant, prorsus non respondeat. Herbā itaque Fortem, vel ut alij habent Sortis, nominamus eam quæ Germanis [heydnisch Vvūd kraut] Gallis *Herbe forte* vocatur, quòd fortè à Sarracenis reperta putetur. Hinc, ni fallor, à quibusdam Consolidasarracenica dicitur. Fortis verò à vehementi odore.

FORMA.

Caulem rubescētem, duum triūve cubitorum ac cauum habet, è quo prodeūnt folia oblonga, in extremitatibus serræ modo incisa, Salicique

eiſque ſimilia. Flores luteos in pappos euaneſcentes. Radicē multifidam, foriſque rubentem.

LOCVS.

Nāſcitur in ſyluis & in montibus altis. Copioſè autem in monte poſt arcem Tubingēſem, quem germanico nomine [die Odenburg] vocant, prouenit.

TEMPVS.

Auguſto menſe floret.

TEMPERAMENTVM.

Gūſtu adſtringit, modicèque amara eſt, atque adeò ſicca re, euidentiffimum eſt.

VIRESEXRECENTIORIBVS.

Vulneraria herba eſt id quod germanica appellatio abū dè ſatis monſtrat. Impoſita itaque vulneribus carnem primū generat, dein ſtatim glutinat. Sicca in puluerem triſta recentia vulnera, ſi inſpergatur, celeriter ſanat. Fiſtulis etiam medetur, malignaque vlcera mundificat, ac conſeſtim ſanat.

De Saxifraga. Cap. CCLXXX.

NOMINA.

Σ Αſſιφραγον, ἡ ſαſſιφραγον, ἡ ἱμπεριτον Græcis, Saxifragon & Saxifraga Latinis. Officinis quibuſdam perperam Capillus Veneris dicitur, vt in Adianto docuimus. Rectius muraria Ruta vocaretur. Sūt qui Saluiam vitam hodie nominent. Germanis [Maurrauten & Steirauten] appellatur Gallis verò *Saulue vie*. Saxifragon, quòd calculos è corpore pellat frangātq;. Empetron verò, quoniam in ſaxis proueniat. Officinæ hodie alias præter hanc latinorum Saxifragas oſtendunt, de quibus ſuo dicemus loco.

FORMA.

Surculofus frutex ſaxis hærens, iuncis tenuibus, Epitymi non diſſimilibus, nigris, breuibus, folijs Trichomanis, maioribus, interius læuibus, auerſa verò parte annexa puncta habentibus, ſine flore, ſine ſemine, radice nigra, ſuperſternacua.

*Saxifraga.*

tur, stranguriæ & singultui medetur. Lapides vesicæ frangit, & vrinam mouet.

EX PAVLO.

Saxifraga vrinam ciet, & calculos conterit.

De Siliquastro. Cap. CCLXXXI.

NOMINA.

SILIQVASTRVM conuenientissimo nomine à Plinio lib. xx. cap. xvij. dicta est herba hæc, à siliquis mirum magnis & oblōgis quas producit. Eadem etiam ab eodem Piperitis, quod semen eius gustatū piperis saporem & acrimoniam præ se ferat, nominatur. Alia tamen est ab ea quam vulgò Piperitim appellant, vt suprâ etiam monuimus. Sunt qui piper Hispanum, alij piper Indianū, nonnulli etiam piper ex Chalechut vocant. Auicenna videtur appel-
lare

LOCVS.

In faxis & asperis locis prouenit. Idèd eius magna copia inuenitur apud vetusta ædificia, in lapidum commissuris.

TEMPVS.

Vere & æstate inuenitur, potissimū autem Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Satis ex facultatibus eius gustūq; (in quo manifesta quædam adstrictio apparet) colligitur hanc herbam calidam & siccam esse.

VIRESEXDIOSCORIDE.

In vino cocta & pota febricitantibus opitula-

Iare Zingiber caninum Germanicè dici potest [Chalechutischer oder Indianischer Pfeffer,] Gallicè *Guinee*.

GENERA.



Siliquastrum minus &
minus.



Siliquastrum ob-
longius.

Maius & minus est Siliquastrū. Maius siliquas producit maiores, & colore subnigras, aut fuscas. Minus contrā minores profert, & colore puniceas. Nos tamen vtrunque genus vna. pictura complexi sumus, utque hiantes duæ pingrentur siliquæ curauimus: non sanè quòd sponte sua sic rūpātur, sed ut quale intus esset semen cerneretur. Præter hæc genera, alia sunt bina, quorum vnum longissimas & colore puniceas, alterum verò latiores multoque breuiores producit siliquas. Damus itaque quatuor Siliquastrī distincta genera, ut ex pictura manifestissimè deprehenditur. Horū pri-

mum discriminis gratia maius, alterum minus, tertium longum, quartum latum appellauimus Siliquastrum.

FORMA.



Siliquastrum latum.

Herba est caule rubro & longo, crebris geniculis, folijs Lauri, floribus candidis, semine in filiquis oblongis & magnis albo, vel potius flavescente, tenui, gustu Piperis acerrimo. Radice vnica, subalba, capillamentis fibrata. Ex qua nimirum delineatione satis constat herbam cuius picturam damus esse Plinij Siliquastrum seu Piperitim. Caule siquidem, vt ex Castore collegit Plinius, rubro & longo, densis etiam geniculis, vnde folia Lauri folijs similia erumpunt semine albo, tenui admodum gustu piperis. Quibus omnibus etiam Sil-

quastri & Piperitidis nomenclaturæ, quæ huic optimè quadant, accedunt.

LOCVS.

In Germania iam in fœtilibus ac testaceis satum passim ferè prouenit. Perpaucis antè annis Germanis incognitum fuit.

TEMPVS.

Aestate quidem floret, atque mox decedente flore siliquæ primum herbaceæ, dein puniceæ aut fusci coloris subnascuntur, plenæ semine.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Valenter excalfacit atque deficcac, id quod feminis im-
mensa acrimonia, & foliorum amaritudo euidentissimè
monstrat: vt certè non temerè plæriq; hoc semine loco veri
Piperis vtantur: easdem enim facultates haud dubiè habet
quas etiam ex Dioscoride sumptas subiiciemus.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Piper communiter calefaciendi facultatem habet, urinā
mouendi, concoquendi, extrahendi, discutiendi, & quæ pu-
pillas oculorum obtenebrant exterendi. Prodest rigoribus
circuitu certo inuadētibus potū & inunctum. Venenato-
rum moribus succurrit. Fœtus ex utero ducit, Tusci, &
omnibus thoracis affectibus in eclegmate & potu sumptū
auxiliatur. Cum melle inunctum angina correptos iuuat.
Tormina cum teneris Lauri folijs potum soluit. Pituitam
ex capite purgat cum Staphisagria commanducatum. Do-
lores leuat, valetudinēque tuetur. Appetentiam mouet.
Concoctionem adiuvat ad intinctus additum. Strumas
cum pice exceptum discutit. Cum nitro alphas abstergit.

EX PLINIO.

Siliquastrum vtile gingiuis, dentibus, oris suauitati, &
ruētibus.

APPENDIX.

Auicenna Zinziber caninum abstergere cutis & faciei
maculas, lentēsque tradit. Item strumas aliōsque tumores,
eius semen digerere scribit: vt hinc etiam easdem cum verò
Pipere habere facultates colligere liceat.

ADNOTATIO.


*Siliquastrum & piperitū quæ quibusdam Piper Indicū dicitur,
alijs Cardamomi genus putatur, in silijs pyramidalibus semē ha-
bet rufum, latū, iura croci colore tingēs, & piperis sapore cōdiens.*

De Scorodo. Cap. CCLXXXII.

NOMINA.

Σκородον Græcè Allium Latinè appellatur. Officinæ La-
tinum nomen retinuerunt. Germanicè [Knobloch,
oder Knoblauch] Gallicè Ail, ou Aux. Scorodon autem
dicitur, vt nonnullis placet, quasi σκαίδον, id est, rudis

Rosa, quòd asperè supra modum redoleat, & olfacientium nares offendat. Latini Allium à Græco fortassis verbe ἄλλισθαι, id est, exilire, vocant, quòd nimirum exilendo crescat.



Allium hortense.




Allium sylvestre primum.

GENERA.

Tria in vn̄uersum Allij sunt genera. Vnum hortense & satium domesticumve, quod Germani [garten oder hey-misch Knoblauch] vocant. Alterum sylvestre, quod Græci ἀφισκίροδορ, id est, anguinum Allium nominant: in aruis accampesribus sponte nascens. Cuius nos duo genera damus, quorum primum Germanis [vvilder Knoblauch] dicitur, Alterum verò [Feldknoblauch.] Tertium itidē sylvestre, vrsinum cognominant, in syluis proueniēs, Germanis [vvaldknoblauch] appellatur.

FOR

FORMA.

*Allium Sylvestre alterum.**Allium ursinum.*

Allium hortense fronde viret cepitia, caule tereti & inani. In cacumine flores in globum circumaguntur, in quo semen emicat. Radicis bulbis tenuis velatur membranis, mox pluribus coagmentatur nucleis, & ijs separatim velitis, in cuius vertice complures fibrę cirrorum exemplo crispantur, rædioso habitu, & aspero sapore. *Sylvestre* folijs constat prælongis, teretibus, intus concavis, iunceam speciem repræsentatibus, caule procero, leni, purpureos flores ostentante: cacumine tum colore tum forma conspicuo: radice bulbosa & capitata, nucleis spicatim cōpactilibus intumescente, summo vertice capillamentis fibrato. *Ursinum* odore molli, folijs grādibus, & *Ephemeræ* nō lethalis folijs similibus, floribus in summo candidis, capite prætenui.

LOCVS.

Hortense passim in hortis satum & plantatum prouenit

X v

Sylue

Syluestre spontè in aruis, vt diximus, & campestribus nascitur. Vrsinum autem in nemoribus.

TEMPVS.

Hortense & Syluestre æstate florent. Vrsinum autem vere, Aprili & Maio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Allia desiccant & calfaciunt quarto excessu.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Facultas Allio est acris, calfacit, status excernit, aluum turbat, stomachum exiccat. Sitim efficit. Inflammationes permutat alteratve, & summam corporis cutem exulcerat. Eadem, potest Anguinū Allium. Comestum latos ventris lumbricos expellit. Vrinam ducit. Cōtra viperarum morsus & hæmorrhoidum prodest, ita vt non aliud magis, si vinū iugiter sumatur, aut in eodem tritum bibatur. Contra rabioforum morsus vtiliter illinitur. Alliū ipsum in cibo sumptum contra aquarum mutationes cōfert. Asperas arterias clarificat. Vetērem tussim crudum & coctum comestum lenit. Cum Origani decocto potum, pediculos & lendes enecat. Vstum & cum melle subactum illitūmq;, hypopya & alopecias sanat. Exanthemata cum nardino vnguēto, sale & oleo curat. Alphos, impetigines, lentigines, achoras, lepras, furfurēsq; eximit. Cum teda & thure decoctum, si in ore contineatur, dentiū dolorem leuat. Contra muris aranei morsus cū ficulneis folijs, & Cumino illinitur. Comæ decoctum in infesionibus menses & secūdas trahit. Eiusdem gratia sufficit. Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Græci *μυρωτήν* vocant, vrinam cit, & obstructions aperit. Vtile etiam hydropicis.

EX GALENO.

Excalfacit corpus, crassos in eo humores extenuat, glutinososque incidit. Bis tamen aut ter in aqua decoctū, acrimonia spoliatur: quanquam nec sic quidem vim perdit extenuandi, verū facultatem quandam obscurissimam alendi corporis acquirit, cuius antea quā coqueretur, nihil prorsus obtinebat. Cæterū Allium nō modo vt opsoniū, verum etiam vt medicamentum sanitati accomodum, quod obstru

obstruēta soluere & discutere possit, vsurpatur. Est autem Allium ex eorum ciborum genere, qui & flatum discutiāt, & minimē sitim inferāt. Ophioscorodon dōmestico, vel reliqua omnia syluestria, valentius est.

EX AETIO.

Allium comestum flatu discutit, sitim reprimat, crassos & lentos humores incidit. Habet tamen quidpiā virosum, & mali succi, quod amittit, si aqua elixetur. Ab eius assiduo vsu præsertim calidas temperaturas cauere oportet.

EX PLINIO.

Allio magna vis magnæ etiā vtilitates contra aquarum & quorūlibet locorū mutationes. Serpentes abigit & scorpiones odore: atque, vt aliqui tradidere, bestiarum omnium ictibus medetur, potu vel cibo, vel illitu. Priuatim contra hæmorrhoidas prodest, cum vino redditum vomitu. Ac necōtra araneorum murium venenatum morsum valere miremur, aconitū (quod alio nomine pardalianches vocatur) depellit: item Hyoscyamum: cōtra canū morsus, inque vulnera cū melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus potū cum restibus suis, efficacissimē ex oleo illinitur. At tritisque corporum partibus, vel si vesica intumuerit. Quin & suffitu eo, secūdas partus euocari existimauit Hippocrates, cinere eorum cum oleo, capitis vlcera manantia sanitati restitues. Suspiriosis coctum, aliqui crudū id dedere, Diocles hydropicis cū Centaurea, aut in fico duplici ad euacuandam aluum: quod efficacius præstat viride, cū Coriandro in mero potum. Suspiriosis aliqui & tritum in lactæ dederunt. Praxagoras & contra morbum regiū vino miscuit: & contra ileum in oleo & pulte, sic illinēs. Strumis quoque. Antiqui & insanientibus dabāt crudum. Diocles phreneticis elixū. Cōtra anginas tritū imponi & gargarizare prodest. Dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis imminuit: vel, si decocta aqua colluātur, addaturque ipsa in caua dentium. Auribus etiā instillatus succus cum adipe anserino. Phthiriasēs & prurigines potū, tustum item in aceto & nitro. Cōpescit & destillationes cum lactæ coctum, vel tritum permixtūmve casco molli: quo genere & & rauitātē extennat vel

vel phthisin, in fabæ sorbitione. In totum autem coctū vti-
lius est crudo, elixumq; tosto, sic & voci plus cōfert. Tineas
& reliqua animalia interaneorum pellit, in aceto mulso co-
ctum. Tenasmo in pulte medetur. Temporum doloribus il-
litum, elixum, & pustulis coctum cum melle, deinde tritū.
Tussi cum adipe vetusto decoctū, vel cum lacte. Aut si san-
guis etiā excreetur, vel purulenta sint. Et pituitę sub pru-
na coctum potum, & cum mellis pari modo sumptum. Cō-
uulsis & ruptis cum sale & oleo. Nā cum adipe tumores su-
spectos sanat. Extrahit fistulis vitia cum sulphure & resina
etiam harundines cum pice. Lepras, lichenas, lētigines ex-
ulcerat, sanatque cum Origano, vel cinis eius ex oleo & ga-
ro illitus: Sic & sacros ignes. Sugillata aut liuentia ad colo-
rem reducit, combustum ex melle. Credunt & comitalem
morbū sanare, si quis eo in cibo vtatur aut potione. Quar-
tanas quoque excutere potum caput vnum cum Laserpitiij
obolo. In vino austero tussim, & alio modo acceptū. Sup-
purationes quanta sibi sanat, fractæ incoctū fabæ, atque
ita in cibo sumptū, donec sanitatem restituat. Facit & som-
nos, atque in totum rubicundiora corpora. Venerem quo-
que stimulat cum Coriandro viridi tritū, potumque ē me-
ro. Cæterum contra pituitā & gallinæ & gallinaceis pro-
dest. Mixtum farre in cibo, iumentis vrinam reddere, atque
non torqueri tradunt, si eo trito natura tangatur.

EX SIMEONE SETHI.

Commodissimum est crassum & tenacem aut crudū hu-
morem aggregantibus: eum enim incidit, & obstructions
ab eo factas tollit. Habet verò quippiā mali succi, quod de
coctum: aqua abijcit. In frigidis temperaturis sepe sanitatē
præferuat. Temperatura verò calidos ledit, & maximè ocu-
los, caput, pulmonē, & renes corū. Proprietate autem qua-
dam sitim à falso humore factam sedat, & lumbricos eijcit,
& flatu discutit. Et si verò sanū visum offendar nihilomi-
nus tamen eius hebetudinem propter humiditatem ortam
sanat. Semen in calidis corporibus exiccat. In frigidis verò
& humidis corporibus idem calefacit, Veneremq; excitat.

Est

Est etiam remedium cōtra venena, & morsus venenatorū, perinde atque theriaca: vnde Galenus hoc theriacā rusti-
corum vocat. Hoc ipsum fugiunt serpentes, tanquam Ru-
tam. Quapropter p̄ersæ coquithas ipsorum Allijs replent.
Non solum autem flatus discutit, sed etiam horū generatio-
nem prohibet. Colicos affectus à flatibus ortos, & diutur-
nos coxendicem qui à pituita proueniunt dolores, inuat.
Alimentum & sanguinem extenuat, & faciem rubrificat,
asperamque arteriā purgat. Si verò assetur, & corrosis den-
tibus aut propter humiditatem dolentibus imponatur, p̄-
dest. Non solū verò sumptum ad venenatorum morsus cō-
fert, sed etiam postquā tritum est, superpositum. Lædit
præguantes & lactentes, mensesque ducit.

De Sancti Iacobi flore. Cap.

CCLXXXIII.

NOMINA.

NVM hæc veteri-
bus Græcis & La-
tinis cognita fuerit, non
dum certò affirmare aut
inficiari audeo. Vulgus
tamen herbariorū san-
cti Iacobi florē aut her-
bam nominat. Offici-
nis incognita est. Ger-
mani [S. Iacobs blom]
Galli L'herbe S. Iaques
appellatur.

FORMA.

Herba est fruticosa,
cauliculo rnbente, mul-
tifariā striato, folijs exi-
guis



Herba S. Iacobi.

guis, Erucæ instar confectis: floribus luteis, forma Chamæ meli floribus haud dissimilibus, radice adnascantias multas habente.

LOCVS.

Nascitur in agrorum marginibus, & aquarum ripis, locisque arenosis.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Amara est & adstringit, ideoque calidam & siccam esse constat.

VIREs.

Recentiorum medicorum experientia cognitum est, herbam hanc vulneribus mirifice mederi, & ad interanea prodesse. Fistulas quoque ejdem curare, & ne vltra serpant prohibere impositum tradunt. Quæ sanè omnes facultates pulchrè ejus temperamento respondere videntur.

De Selino hortensi. Cap.

CCLXXXIII.

NOMINA.

ΣΕΛΙΝΟΡΚΗΧΑΙΟΝ Græcis, Apiū hortense aut satiuū Latinis vocatur. Officinæ Latinum retinuerunt nomen. Germanis [Epfich, oder Eppich,] Gallis *Persil cultiné, ou de iardin* nominatur. Selinon autem Græci vocant, quasi ἑλινον hoc est, paludibus impulsus: paludosis enim gaudet, & in ijs enatum lætius exurgit.

FORMA.

Apium hortense sæpe cubitalem æquat altitudinē: caule rotundo, tenuiter striato, multisque ramulis brachiato: folijs tripartito dissectis, & leniter crispis, in extremitatibus laciniatis: flosculis candidis, & quibus minores haud temerè reperias: semine exiguo, radice singulari, longa, capillata. Hæc itaque herba, cuius picturā damus, est verum Apiū quod illi omnes respondeant notæ, adeo ut temerè nonnulli putent esse vulgare nostrum Petroselinum.

LOCVS.

In

*Apium.*

VIRES EX DIOSCORIDE.

Ad oculorum inflammationes cum pane aut tenui polenta illitū prodest. Aestū stomachi mulcet. Mammis grumis induratas disijcit. Crudum aut coctum comestum urinam mouet. Decoctum eius radicūque potum, lethiferis medicamentis aduersatur, vomitum ciens. Alium cohibet. Semen efficacius urinā cit. Succurrit & ferarum moribus, & ijs qui lithargyrum hauserunt. Inflationes discutit. Misceatur etiam vtiliter medicamentis dolorem leuantibus, theriacis, & tussi medentibus.

EX GALENO.

Apium vsque adeò calidum est, vt & vrinās & menses cieat. Flatus quoque discutit, & magis semen quàm herba ipsa. Ori, stomachoq; gratissimum.

EX PLINIO.

Rami Apij largis portionibus per iura innatant, & in cōdimen-

In hortis satum prouenit: amat autem loca potissimū aquosa. Hinc est quod sua sponte nō procul à Canstadio Ducatus Vuirtenbergensis oppido, in paludosis proueniat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret ac semine prægans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, & siccum in medio tertij.

dimentis peculiatem gratiam habent. Oculis illitum cum melle, ita vt subinde foveatur feruenti succo decocti, alijsq; membrorum. Epiphoris per se tritū aut cum pane, aut polenta impositum, mirè auxiliatur. Pisces quoq; si ægrotent in piscinis, apio viridi recreantur. Verūm apud eruditos non aliud erutum terra in maiore sententiarum autoritate est. Ad cibos non est admittendum, imò omnino nefas, nam id defunctorum epulis feralibus dicatum existimāt. Ipsius quoq; visus claritati inimicum. Eos qui ederint sterilefcere mares foeminasque tradunt. In puerperijs verò ab eo cibo comitiales qui vbera hauriunt. Innocentio rem tamen esse marem. Eaq; causa est, ne inter nefastos frutices damnetur. Mammarum duritiam impositis folijs emollit. Suauiores aquas potui incoctum præstat. Succo maxime radicum cum vino, lumborū dolores mitigat. Eodem iure instillato grauitatem aurium. Semine urinam ciet, menstrua ac secundos partus. Et si foveantur semine decocto sigillata reddit color, cum oni albo illitum. Aut ex qua coctum potumq; renibus medetur. In frigida tritum oris vlceribus. Semē cum vino, vel radix cum veteri vino vesicæ calculos frangit. Semen datur ex tribus cyathis ex vino albo.

EX SIMEONE SETHI.

Vrinam cit, obstructions tollit, non inflat, magis verò flatus discutit, & menses ducit. Difficulter autem cōcoquitur, atq; ob eam causam oportet ipsum in medio ciborum sumi, Paululum quid ventrem listit. Proprietate vero quadam comitiales lædit, & oportet hos omnino abstinere. Sæpe enim quidā qui ferè ex hoc merbo cōualuere, parati autem in eū incidere, ex eius vsu iterū comitiales facti sunt. Offendit etiam testes. Semen autem quā folia validius et efficacius, & eo radix. Prodest ad singultus à crassis excrementis profectos. Abstergit renes & vesicā. Obstructions in venis & arterijs factas aperit. Semen præsumptum, ebrietatem arceat. Confert etiā ad bonum † corporis odore, multique crebriore huius vsu grauem † corporis odorem abegerunt. Mulieres ad rem veneream promptiores facit. Si in huius decocto calculosi desidant, calculos, vt ferunt,

† Alias
oris.

† Oris.

runt, eiicit, & difficultatem vrinæ sanat & renes curat. Lactantes mulieres oportet ab eius vsu abstinere: minuit enim lac.

De S. Barbaræ herba. Cap.

CCLXXXV.

NOMINA.

NEQVE huius herbæ aliud nomen, quàm quo vulgò appellatur, asserere potuimus. Superstitiõe enim quidam ducti prioris temporis herbarij, diuæ Barbaræ herbã nominarunt. Nec nos aliud nomen vtcunque inuestigantes ex herbariæ rei peritis extorquere potuimus. Germanis [S. Barbaruk raüt] Gallis l'Herbe de S. Barbe vocatur.

FORMA.



Caulem habet rotundum, solidum, striatũ, folia Erticæ modo lacinata, flores luteos, siliquas teretes, semine refertas, radicem ex obliquo prodeũtem, & oblongam.

LOCVS.

Pasim in campetribus nascitur.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret, ac subinde in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Gustanti primũ subacris esse, dein parum etiam adstringe

S. Barbaræ Herba.

stringere videtur, vt calidam & siccam esse nemo dubitare debeat.

VIRE S.

Vulnerariam herbam esse & temperamentum eius & experientia docet. His verò potissimum vlceribus medetur quæ impura sunt, & in quibus caro supercrescens fuerit: nam quia valenter siccatur, ideo sordes extergere, & carnes minuere potest.

Saxifraga maiore. Cap.

CCLXXXVI.

NOMINA.

AN veteribus Græcis & Latinis herba hæc cognita fuerit, nondum mihi constare ingenuè fateor. Vulgus herbariorum & Officinæ Saxifragam maiorem, & albam, quod

scilicet mirificam in comminuendis frangendisque calculis vim, ac flores albos habeat, hodie vocant. Germani [Hodē Steinbrech, vel vveifsen Steinbrech] appellant. Galli *Especce de Basfines blanc.*

FORMA.

Caulem habet lanuginosum, subrubicundum, folia exigua, rotunda, in extremitatibus incisa, flores candidos, radicem exilem, cui granula Coriandri seminis quantitatem referentia adhærēt, partim alba partim rubea, quibus Officinæ pro semine eius vtuntur.



Saxifraga alba.

LOCVS.

In pratis & montibus, potissimum siccis, prouenit.

TEMPVS.

Maior mense floret, dein statim euanescit.

TEMPERAMENTVM.

Quum flores, folia & radix gustanti amara sint, calidam & siccam in ordine tertio esse verisimile existit.

VIRE.

Vrinam mouet, calculos frangit & conterit. Strangu-
rie itaque confert: abstergit enim expurgatque, & quæ
in venis est crassitiem, sicut omnia alia quæ antea sunt, in-
cidit. Menses quoque cit, crassaque ac glutinosa ex thorace
educit.

De Saxifraga lutea. Cap.

CCLXXXVII.

NOMINA.

NOMEN hoc in præsentia fingere allubuit cum sci-
licet aliud quo herbam hanc appellaremus, non oc-
curreret, vt hac ratione à priori discerni posset. Saxifragam
autem vocare placuit, quod uimirum calculos frangat. Ad
quod sanè nomen alludentes Germani [Steinklee] nomi-
nant, quod idem valet, ac si Trifolium frangens lapidem
diceret. Alio nomine [gulden oder geelkree] & quod sen-
tentiam nostram confirmat, [Steinbrechen,] à cõmuniuen-
do lapide appellant. Luteam verò diximus à luteis floribus
volentes eam ab alba discriminare Saxifraga. Commodissi-
mè itaque Germanicè [geeler Steinbrech] vocabitur. Perpe-
ram ea officinæ nonnullæ pro Meliloto vsurpant, vt suo ce-
tiam loco indicaui.

FORMA.


Caulem cubiti ferè altitudine obtinet, folia sænogræco
similia, in quouis pediculo tria: floribus pisi, multò tamen
minoribus, luteis, odoratis, deorsum nutantibus, semine per
ramulos diffuso rotundo, radice subcandida.

LOCVS.

Passim in aruis & segetibus prouenit.

Y ij

TEM

*Saxifraga lutea.*

obstructionibus renum & vesicæ, earundemque partium calculis, hac herba vtendum esse docent. Succus etiam eius herbæ ac florum eiusdem ad caliginem oculorum instillatus confert.

TEMPVS.

Floret tota æstate, potissimum autem Iulio mense, in quo semen etiam producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse gustus abundè docet: amara enim & subacris existit.

VIRES.

Abstergit, expurgat, & quæ in venis est crassiciem incidit, atque adeò obstructions iecinoris & lienis tollit. Vrinam mouet, menses cit, lapidem frangit, & quæ in thorace sunt glutinosa extenuat & educit. Rectè itaque recentiores in

De Sisara. Cap. CCLXXXVIII.


NOMINA.

Σισαρορ Græcis, Siser Latinis, vulgò Pastinaca quòd ei congener sit, appellatur. Sunt qui ex tritis prioribus literis diminutrice forma, Serullum, aut Seruillam, aut Cheruillam, pro Siserulo nomenclant. Germani ad corruptam hanc appellationem respicientes, [Gerlin & Geirlin] Galli *Chernys ou Giroles* vocant.

G E N E R A.

Duo sunt Sifari, Plinio lib. 20. capitu. 5. autore, genera. Vnum satium, quod iterum duum est generum: vnum enim magnum dicitur, Germanis [groß zam Moren.] Alterum verò minus, quod ijdem priuatim [Geirlin, vveisz Morelen, Klein zam Moren] vel [Morchelen] nominant. Alterum erraticum, quod [V vild Moren] appellant. Officinis nonnullis Baucias dicitur.

F O R M A.



Sifarium satium magnum.



Sifarium satium minus.

Sifarium satium caulem habet angulosum, folia oblonga & in extremitatibus incisa: flores magnum luteos, minus verò candidos: semen latum & foliaceum, radices intus candidas, iucundi gustus, esuiq; gratissimas. Erraticum caule est bicubitali, folijs Pimpinellæ, sed maioribus, flore lu-



Sifarium sylvestre.

autem siccum quidem simul in primo ordine, quādoquidem Venerem stimulat: erraticum verò, quoniam adiectā habet amaritudinem quandam cum leuicula adstrictione, siccus existit.

VIRE EX DIOSCORIDE.

Suavis ori elixa Sifari radix, stomacho utilis, urinam cit, & appetentiam excitat.

EX GALENO.

Sifari radix cocta, stomacho grata est, & urinam mouet.

EX PAVLO.

Sifari radix cocta, stomacho utilis est, & urinæ cierendæ, Semen tenue est & discussorium, validumque: idcirco ijs quos singultus & tormina malè habent, cum vino exhibetur.

teo & umbella Anethi, semine lato & rotundo, vt satium, radice tenui ac longa.

LOCVS.

Copiosè in Germania nostra prouenit: gaudet enim frigidis locis. Satiuum quidem in hortis. Erraticum verò passim in incultis, vberius autè in apricis pratis.

TEMPVS.

Vtrunque æstate floret, atque subinde semē producit.

TEMPERAMENTVM.

Sifaron Paulus in tertio ordine, galenus autè rectius in secundo calidum esse statuit. Satiuū

EX PLINIO.

Sifer erraticum satiuo simile est & effectū. Stomachum excitat, fastidium discutit. Ex aceto laserpitijato sumptum, aut ex pipere & mulso, vel ex garo vrinam ciet, vt Opion credit, & Venerem. In eadem sententia est Diocles. Præterea cordi conuenire conualescentium, aut post multas vomitiones perquàm vtile. Heraclides contra argentum viuū dedit, & Veneri subinde offensanti, ægrisque se recoligentibus. Satiui priuatim succus eum lacte caprino potus sistit aluum.

ADNOTATIO.

Sisarum pingit quod in hortis hodie est frequentissimū, Panacis nomine à Cheruilla dicta diuersum, qua huic Sifer est satiuum.

De Syce. Cap. CCLXXXIX.
NOMINA.



Ficus sativa.

Σ Υελ *fige* & Græ-
cis, Ficus satiuæ La-
tinis & Officinis. Ger-
manis [Feigenbaum]
Gallis *Figuier* dicitur.

FORMA.

Ficus satiuæ arbor est non magnopere pro-
cera, quanquam amplis-
simæ quædam inueni-
tur, vel pyris æmulæ
magnitudine: caudice
breui, cortice læui, me-
dulla carnosa, folio per
quàm magno vmbro-
soque, profundè admo-

Y iiii) dum

dum laciniato, sine flore, pomo, quod supra folij pediculum nascitur, turbinato, molli, intus granoso: succo cum matnrescit lacteo, postea melleo: radicibus multis, obliquis ac longis.

LOCVS.

Iam in plerisque Germaniæ nostræ hortis plantatur, ac in paucissimis fructus maturos producit. Calidiora & aprica loca amat: arbor enim omnium ferè teneberrima & delicatissima, gelicidia & glaciēs horret.

TEMPVS.

Germinat sub Arcturum post ver, aut paulo ante solstitium.

TEMPERAMENTVM.

Ficus arbor calidæ temperaturæ est, tenuiûmq; partiû, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum vterque calidus est. Ficus quoque recentes & aridæ primo ordine completo calefaciunt, aut secundo incipiente: desiccant verò in medio primi.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Fici maturæ, teneræ recerêsvestomacho noxiæ. Aluum solvunt, sed faciliè ab eis contracta fluxio, sistitur. Exanthemata & tudes prouocant. Sitim sedant, calorem restinguunt. Siccæ nutriûnt, calefaciunt, sitim magis asserunt, bonam faciunt aluum. Fluxionibus tamen stomachi & vêtis inutiles, arteriæ verò vesicæ & renibus vtilis. Amicæ etiam ijs quos longa valetudo decolorauit, asthmaticis, comitiali morbo laborântibus & hydropicis. Decoctæ cû Hyssopo & potæ, quæ in thorace sunt, purgât. Veteri tussi, & diuturnis pulmonis affectibus profunt. Aluum molliunt, tussæ cum nitro & croco manducatæ. Decoctum earû arteriæ & tonsillarû inflammationibus gargarizati confert. Cû hordeacea farina cataplasmati miscetur, & in muliebria fomenta cum sænogræco, aut ptisana. Cum Ruta decoctæ, in torminibus infunduntur. Coctæ tritæ illitæque, duritias discutiûnt, parotidas ac furculos emolliûnt. Panos maturât, maximè iride, nitro, aut calce addita. Crudæ cû antedictis tussæ, eadem efficiunt. Cum malicorio, pterygia purgant.

Cum

Cum atramento sutorio difficiles curatu & maleficas tibia-
rum fluxiones sanāt. Quin cum vino decoctæ, addito ab-
sinthio & hordeacea farina, hydropicis illitæ auxiliantur.
Crematæ & cerato commixtæ, perniões sanant. Crudæ
& tritæ sinapi humido exceptæ, ac auribus impositæ, soni-
tus & pruriginēs curāt. Succus tam syluestris quàm fariuæ
Fici, coaguli modo lac coagulat, concretumq; vt acetū dis-
soluit. Exulcerat corpora, ac venarum ora aperit. Soluit
aluum. Vterum laxat, cum amygdala trita potus. Mēstrua
cier cum luteo oui appositus, aut thyrrenica cera. Podagri-
corum cataplasmati cum farina scænigræci & aceto utilis.
Lepras, lichenas, discolorē a sole cutē, alphas, scabies,
achoras, cum polenta expurgat. Instillatum plagæ percus-
sis a scorpionibus, venenatorum ictibus, & rabiosi canis
morsibus auxiliatur. Dentium doloribus lana exceptus
prodest, & cauis eorum inditus. Myrmeciam tollit cum
adipe, circumlita in ambitu carne.

EX GALENO.

Fici arboris liquor, & succus foliorum eius non mordicat
tantum, aut absterget vehemēter: sed & vlcera, & ora va-
forum referat, & myrmecias eiicit. Verum & purgare po-
test. Ficus aridæ tumores duos concoquunt, eosq; statim
discutiunt. Atque ipsæ per se illitæ eiusmodi vim obrinēt.
Sed & decoctum earum eiusdem vtiq; naturæ. Verum
vbi magis concoquere consilium est, miscēda est farina tri-
ticea: vbi verò plus digerere, hordeacea. Panis horū in me-
dio est. In præsentiarū hæc de caricis nouisse sufficiat. Sci-
re verò oportet, quod quæ pinguiorēs sunt, magis possunt
concoquere: quæ verò gustu aciores, magis tum extergere,
tum discutere. Cæterum quod ex ijs plurimum in aqua co-
ctis efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed &
facultate. Porro Ficus virides comestæ, propter admistā hu-
miditatem, facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen
aluum utræq; tum humidæ tum siccæ. Præterea Ficus totū
meabiles sunt, & facilē in totum corpus peruadunt, pene-
trantque, Nam & abstergendi vi pollent haud obscurā: cu-
ius gratia commansæ, è calculosis renibus arenularum vim

propellunt. Caricæ licet multiplici vtilitate commendentur, si quis tamen crebrò largitèrque esitauerit, sentiet non esse innoxias. Non admodum enim probum sanguinem gignunt, quapropter pediculorum quoq; agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique vim habent, quo nomine aluum stimulant ad excretionem, renésque expurgant. Iecori autem lienique inflammatione obsessis officiunt, velut Ficus quoque, communi ratione omnium dulcium epularum non peculiari quadam eximia facultate. Obstructis autem illis, aut scirrho tentatis, ipsæ ex sese proprijs viribus nihil prosunt, nec obsunt: sed incidentibus, extenuantibus, & abstergentibus iunctæ, non mediocriter auxiliantur: ideoque medici nonnulli in dictis lienis iecorisque affectibus eas longè antè cibum cum thymo, aut pipere, aut zingibere, aut pulegio, aut satureia, aut calamentha, aut origano, aut hyssopo dare soliti sunt. Ad eundem modum cum alio quouis acrem qualitatem, aut omnino incidendi extenuandique vim gerente, Caricas assumere, non solum ita affectis, sed sanis quoque ex vsu fuerit. Siquidem iecoris meatus, per quos fertur alimentum, patentes apertósque; seruari non solis laborantibus, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus extenuante sale, aceto garóque conditas vulgò comedunt: experimèto id vtile esse compertum habentes.

EX PLINIO.

Fici succus lacteus, aceti naturam habet, itaque coaguli modo lac contrahit. Excipitur ante maturitatem pomi, & in vmbra siccat ad aperienda vlcera, cienda menstrua, appositus cum luteo oui, aut potus cum amylo. Podagrís illinitur cum farina scœnigræci & aceto. Pilos quoq; detrahitis, palpebrarúmque scabiem emendat. Item lichenas & psoras. Aluum soluit. Lactis ficulni natura aduersatur crabronum, vesparúmque, & similibus venenis, priuatim scorpio-num. Idem cum axungia verrucas tollit. Folia & quæ non maturuere Fici, strumis illinuntur, omnibúsque quæ emollienda sunt discutiendave. Præstant hæc & per se folia. Et alij gus corú, tanquã in fricando liene et alopecijs, & quæcun-
que

que exulcerari opus sit, & aduersus canis morsus. Ramorū teneri cauliculi cuti imponuntur. Iidem cuni melle vlceribus, quæ ceria vocantur, illinūtur. Extrahunt infracta ossa cum Papaueris folijs syluestris. Canū rabiosorū morsus, folio trito ex aceto restringunt. E nigra ficu candidi cauliculi illinuntur furūculis, muris aranei morsibus cum cera. Cinis earum ē folijs, gangrænis, consumendisque quæ excrescūt. Fici maturæ vrinam ciunt, aluum soluunt, sudorem mouēt papulāsque. Ob id autumno insalubres, quoniam sudantia huius cibi opera corpora, refrigerescūt. Nec stomacho vtilēs, sed ad breue tempus. Nec voci contrariæ intelligūtur. Nouissimæ salubriores quàm primæ. Medicatæ verò nonnunquam iuuenum vires augent. Senibus meliorem valetudinē faciunt, minusque rugarum. Sitim sedant, calorem refrigerant: ob id non negandę in febribus cōstrictis, quas stegnas vocant. Siccæ Fici stomachum lædunt, gutturi & faucibus magnificē vtilēs, Natura ijs excalfaciendi: Sitim afferunt. Aluum molliunt, rheumatismis eius & stomacho cōtrarię. Vesicę semper vtilēs, & anhelatoribus, ac suspiriosis. Item iecinorum, renum, lienum vitijs. Corpus & vires adiuvant ob id antē athletæ hoc cibo pascebantur. Pythagoras exercitator, primus ad carnes eos transtulit. Recolligentibus se à longa valetudine vtilissimæ. Item comitialibus & hydropticis, omnibūque quę maturanda aut discutienda sunt, imponuntur. Efficacius calce aut nitro admixto. At coctæ cum hyssopo pectus purgant, pituitam, tussim veterē. Cū vino autem ad sedem, & tumorem maxillarum, & furunculos, panos, parotidas, decoctæ illinuntur. Vtilēs & decocto earum fouere scæminas. Decoctæ quoque eadem cum scæno-græco vtilēs sūt pleuriticis & peripneumonicis. Cum Ruta coctæ, torminibus prosunt. Tibiarum vlceribus cum æris flore. Pterygijs cum punico malo. Ambustis, perionibus cum cera. Hydropicis coctæ in vino, & cum abūnthio & farina hordeacea, nitro addito. Aluum sistunt manducatæ. Scorpionum ictibus cum sale tritæ illinuntur. Carbunculos extrahunt in vino coctæ & impositæ. Carcinomati, si sine vlcere est, quam pinguisimam Ficum imponi,
pene

pene singulare remedium est: item phagedænæ. Cinis non ex alia arbore aciem purgat acrior, conglutinat, replet, adstringit. Bibitur & ad discutiendum sanguinem concretū. Item percussis, præcipitatis, conuulsis, ruptis, cyathis singulis aquæ & olei. Datur tetanicis & spasticis. Item potus vel infusus cœliacis, dysentericis. Et si quis eo cum oleo perungatur, excalfacit. Item cum cera & rosaceo subactus, ambustis, cicatricem tenuissimam obducit. Lusciosos ex oleo illitus emendat, dentiumque vitia, crebro fricatu. Produnt etiam, si quis inclinata arbore supino ore aliquem nodum eius morfu abstulerit nullo vidente, atque in aluta illigatū licio è collo suspenderit, strumas & parotidas discuti. Cortex tritus cum oleo, ventris vlcera sanat. Crudæ grossi verucas & thymos nitro farinâq; additis tollunt, spodijque vicem exhibet fruticum à radice exeuntium cinis. Bis tostus adiecto psimmythio digeritur in pastillos, ad vlcera oculorum & scabritiem.

EX SIMEONE SETHI.


Ficus admodum nutriunt, non tamen adstrictam & robustam carnem efficiunt, ut patris ac caro, sed laxam. Ventrem flaribus implent, nisi probè coquantur. Minus verò quàm cetera sopora sunt mali succi, & ventrem proritāt, & faciliè exeunt. Efflatu dignam extergendi facultatem obtinent: proinde arenosa multa si edantur nephreticis excernuntur. Maturæ Ficus nihil ferè obsunt, proximèque ad caricæ accedunt, quæ multa vtilia habent. Malum hoc illis inest, quòd sanguinem non admodum bonum gignunt, vnde & pediculi procreantur. Oportet autem post vsum Ficuum, alimentum quod extenuet, ingerere. Ad hæc Fici pulmonem & thoracem inuant. Aiunt insuper contra venena facultatem habere, si quis singulis diebus ieiunus ijs vtatur. Caricæ pectus iuuant, & tussis. Vrinam ciunt, fatisque nutriunt, corporis etiam bonam habitudinem efficiunt. Antè cibum sumptæ, ventrem irritant, sed nisi celebrius ventrem pertranscant, nō bonum sanguinem gignūt. Quapropter si ad satietatem vsque eduntur, scabiem & pruritum excitant. Cibus autem bonus est, & aduersus venenā

nena remedium, si cum nucibus aut amygdalis comedantur. Renes expurgant, & iecoris, lienisque obstructions auferunt, verum calefaciunt, & sitim inferunt, & flauam in calidioribus temperamentis bilem procreant. Impositæ parotidibus & reliquis abscessibus, emolliunt & concoquunt, potissimum in ijs quibus sunt carnes molliores. Podagricis cum fenogrecæ & aceto impositæ, non parum iuuant.

De Sparto. Cap CCXC.

NOMINA.

Σπάρτον ἡ σπάρτιον Græcis, Spartum Romanis vocatur. Officinis incognitum. Germanis [Pfrimmen] Galliæ Genest appellari potest. Sparton verò dixerunt, quod funiculi ac vinculi vsum in alligandis vitibus præbeat.



Spartum.

FORMA.

Frutex est virgas longas proferens, sine folijs, validas, difficulter fragiles, quibus vites ligant. Siliquas phaseolorum modò fert, & in ijs femina lentis formâ habentia. Forem luteum, veluti Leucoion.

LOCVS.

Aridum solum amat estque veluti terræ iuncus.

TEM

TEMPVS.

Floret circa Idus Iunias, ac subinde siliquas producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse, & gustus & vires indicant.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Sparti semen & flores in aqua mulsa pota quinque obolorum pondere, per superna cum intentione veluti Elleborus citra periculū purgāt. Semen per inferna purgat. Quin etiam maceratis in aqua virgis eius, deinceps verò tufis, & expressis si succus cyathi vnus mensura ieiunis bibatur, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur. Quidam etiā muria, aut marina macerantes, ischiadicis clysterem infundunt. Strigmenta autem cruenta elicit.

EX GALENO.

Sparti, quo & vites apud nos alligant, tum semen, tum virgarum succus, non in strenuè trahentis est facultatis.

EX PAVLO.

Sparti quo vites ligant, & semen & flos cum mulsa pondere quinque obolorum pota, per superiora purgant & veratri modo sine periculo. Semē per inferiora quoque purgat. Virgæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

EX SIMEONE SETHI.

Sparti quo vites ligantur, semen & flores cū aqua mulsa si bibantur pondo obolorū quinque per superna purgant. vt Elleborus albus, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virgæ verò ischiadicis profunt.

ADNOTATIO.

Spartum iam Parisijs frequens in calathis ficum & ruarum passarum vsu frequentissimum.

De Smyrnio. Cap. CCXCI.

NOMINA.

Σ *Μδενιον* Græcis, Smyrnion Latinis, officinis Leuisticū Germanis [Liebstockel.] Gallis *Leuesse*, ou *Liesche* dicitur. Smyrnion dictū, quod huic idem sit odor qui Myrt hæ. Errant qui Leuisticum hodie nominatam herbam eam esse putant quæ Dioscoridi Ligusticum appellatur.

Ne

Neque enim caulem geniculatum, neque etiam folia Meliloti similia profert. Tolerabilior est sententia eorum qui arbitrantur secundam esse Dauci speciem.

FORMA.



Smyrniaceae.

Caulem habet Apio similem, adnascencias obtinentem multas. Folia latiora Apio, ad terram confecta, subpinguia, robusta, cum acrimonia odorata, medicataque, & colore sublutea. Umbellam supra caulem Anetho similem. Semen rotundum, nigrum, sapore acre. Radicem acrem, odoratam, teneram, succosam, fauces mordentem, foris nigram, intus pallidam, aut subalbidam. Cæterum si quis singulas has notas velit expendere, faciliè perpendet Smyrniaceam esse herbam quam hodie Le

uisticum nominant. Siquidem ea ut Apium caulem profert concauum, ac stolones multos. Folia quoque Apij, at latiora, ad terram confecta, subpinguia, firma cum quadam acrimonia odorata, odore tamen medicato, colore in luteum languido: muscariū in capitibus caulium Anetho simile: semen rotundum, nigrum, acri sapore: radicem odoratam, acrem, gustu fauces mordentem, succosam, mollem, foris atram, intus subalbidam, aut pallidam. His accedit quod Leuisticū forma & odore Apio valde simile est, ita ut nonnulli hac ratione moti putauerint esse Apij speciem quandam: ut congenerem esse herbam, quemadmodum testatur Galen

Galenus, nemini dubium esse debeat. Vnde iterum liquidò colligi potest esse Smyrnion, quòd certè statim ab Apio Dioscorides, tanquam similem congeneremq; herbam, idipsum describat. Conueniunt etiam vtrarumque herbarum facultates, vt paulò pòst monebimus. Itè Dioscorides scribit Pæoniæ fœminæ folia Smyrni habere. Quid verò folijs Pæoniæ fœminæ, quam folia Leuistici hodie nominati magis simile? Vt nemo dubitare debeat subinde Smyrnion esse Leuisticum.

LOCVS.

Nascitur hodie passim in hortis. Humida autè loca amat.

TEMPVS.

Floret æstiuo tempore.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum in tertio ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Calificandi facultatem habent radix, herba & semen. Olerum modo comeduntur folia muria macerata, aluumq; sistunt. Radix serpentium moribus pota succurrit. Tussis & orthopnœas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Illita, recentia œdemata, phlegmonas, & duritias discutit. Vulnera ad cicatricem perducit. Feruēfacta & subdita, abortus facit. Semen eius lienis, renum & vesicę vitijs prodest. Menses & secundas pellit. Commodè datur ischiadicis cū vino. Inflationes stomachi lenit. Sudores & ructus ciet. Potum peculiariter hydropicis, & febrim circuitibus prodest.

EX GALENO.

Smyrnion est eiusdem generis cum Apio & Petroselino: fueritque Apio quidem validius, Petroselino autem imbecillius. Menses itaque & vrinas mouet. Cilices in Amano monte natum Petroselinum vocant. Est quidem & ipsum Smyrnion: minus verò Petroselino & Smyrnio acre. Proinde & vlceribus imponi potest, quia videlicet sine molestia desiccet. Sed & digerere quæ indurata sunt, valet. Reliqua facultas eius Apio & Petroselino similis est. Quocirca & semine vtimur ad menses, vrinas & asthmata. Hæc Galenus. Ex ijs Galeni verbis liquidò apparet duplex esse

Smyr

Smyrnion, vnum quod alio nomine Hippofelion, de quo suo diximus loco, dicitur: alterum autem quod in Amano nascitur monte, de quo hic nobis sermo est.

EX PLINIO.

Vrinam & menses ciunt folia & radix. Alium sistit semen. Radix suppuraciones recentes, & collectiones discutit: item duritias illita. Prodest cōtra phalangia, ac serpentes, admixto cachry, aut polline, aut apiastro in vino pota, sed particulatim, quoniā vniuersa vomitiones mouet, quae de causa nonnunquam eum ruta datur. Partus adinuatur, & secundas pellit. Medetur tussi & orthopnoeae radix vel semen. Item thoracis, lienis, renum & vesicae vitijs. Radix autem ruptis, cōuulsis auxiliatur. Sudores ciēt & ructus, idē inflationē stomachi discutit. Vulnera ad cicatricē pducit. Datur ischiadicis in vino cum crethmo. Exprimitur succus radices, utilis sceminis, thoracis & prae cordiorū desiderijs: calefacit enim, cōcoquit, & purgat. Semen peculiariter hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur. Concoctiones facit. Saporē similima piperi, idē ad opsonia vtuntur cum mulso, oleo & garo, maximē in elixis carnibus.

APPENDIX.

Confer cum iam dictis facultatibus eas quas Leuistico recētiōres tribuunt, & cōperies prorsus eādem esse. Tradunt enim eius semen mouere mēses & vrinas, inflationes tollere, serpentium moribus mederi, calenlos confringere, sudores ciere, vulnera cōglutinare, lienisque obstructiones auferre: adeo vt hinc iterum cōstet, Leuisticum à Smyrnio non esse, saltem viribus, diuersum.

De Sulphio. Cap. CCXCII.

NOMINA.

Σ *Λασιον* Græcis, *Laser* & *Laserpitium* Latinis dicitur. Vulgò & Officinis corrupta voce, de flexa tamē quadam à *Laserpitio* pristini nominis vmbra, *Osteritium* vocatur. Primum siquidem vt dictum est, *Laserpitium*, dein deprauata nomē clatura, *Osteritium*, postremo *Ostritium* cepit appellari. Qui sanē lapsus facilis admodum fuit. Ab-

iecta nanque prima litera, Asteritium, & dein a mutato in o, Osteritium, ac postremò magis concisè Ostritium nominare imperiti ceperunt. Veteribus Germanis haud dubiè [Laseruvurtz] dicta est hæc herba, quam quidem vocem, utpotè semilatinā, posteri nō rectè intelligentes, in [Meystervurtz] mutarūt. Qua quidem appellatione adhuc hodie omnes utuntur Germani. Galli *Benioin, ou Angelicque.*

FORMA.



Laserpitium Germanicum.

Caulem ferulæ similè habet, folia verò Apij, aurei coloris, semè latū, foliaceum, radicem quæ corticem nigrum obtinet, à qua liquor etiam modicè rubens, trās-lucidus, myrrhāmq; redolens, ac odoratus destillat, Ex qua quidem descriptione luce clarius constat, herbam hanc cuius picturā damus, esse Laserpitium, saltē Germanicum, Caulis enim ei sceniculaceus, seu ferulæ, hoc est, geniculatus, folia Apij in auri colorē languescētia, semen foliaceū & latum, nēpe quod figura exile foliolum exprimit: ra-

dix crassa & multa, foris nigricans, intus candida, mirāque flagrans iucunditate: quæ si vulneratur, liquor profluit lentus, ac modicè rufus, suavisimūmq; spirans odorem, & linguam sua acrimonia vellicans, ut sanè nulla sit prorsus nota, quæ reclamare videatur. His accedit quòd facultates Ostritij nominati, à Laserpitij viribus nō discrepant, què admodum ex sequentibus patebit.

LOCVS.

Nascitur in Syria, Armenia, Media & Aphrica. Quod ex Armenia & Aphrica affertur, suauissimum odorem habet. præsertim Cyrenaicum, vnde & ~~id~~ id est, succus Cyrenaicus appellatur. Nec hoc Laserpitium aliud est quam cōcretus ille succus, quem officinæ Belzuinum, vel Ben Iuinū vocant. Quod verò ex Media & Syria affertur, Dioscoride teste, virosolum odorem obtinet, ac putrilagine resipit, ideoque videtur esse id quod hodie officinæ patrum Asiam ferti dam nominant. Quod etiam hinc colligi potest, quòd in hodiernū vsque diem ex Syria Alexandrina, & hinc Venetias deportatur. Nostrum in montosis locis prouenit, ac in omnibus ferè hortis nunc plantatur.

TEMPVS.

Iunio mense flores admodum exiguos ac candidos, instar Anisi protert, atque tubinde semen latum.

TEMPERAMENTVM.

Silphij liquor calidissimus est. Verumenimuerò & folia & caulis, & radix sat strenuè excalfaciunt. Nostrum etiam Laserpitium in vniuersum calidius atque acrius est pipere ipso, adeoque calefacit & exiccat in tertio ordine. Radix autem & semen folia & caulem superant, vt in eo etiam efficacissimus omnium aliarum partium sit liquor, secundo loco folia, postremo caulis.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Laserpitij liquor, acris est, inflat. Inunctus cū vino, pipere & aceto, alopecias sanat. Oculorum aciem exacuit. Lucipientes iussiones cū melle inunctus dissipat. Cauernis dentium in eorundem dolore inditur, aut cū thure in limbo circumponitur, aut colluitur eo os cū Hyslopo, & Ficus coctis in posca. His prodest, quos bestia in rabiem effera ta momorderit, vulneribus impolitū. Valet aduersus omnia animantia quæ virus eiaculantur, venenata tela, potus aut inunctus. Scorpionū plagis oleo dilutus circūlinitur. Gangrænis autem scarificatis immititur. Carbunculisque cum ruta, Nitro & melle, vel per se. Clauos, callosque prius circūscarificatos tollit, cerato, aut aridarum Ficum carne præmolitus. &c.

centes lichenas ex aceto sanat. Excreſcentiàs carnis, poly-
poſque, ſi aliquot diebus cum atramento ſutorio aut ærugi-
nie illinatur. Extuberantia cum forſice extrahit. Diutur-
nis aſperæ arteriæ aſperitatibus opitulatur. Vocem ſubitò
exaſperatam irraueſcentémve, dilutus aqua, & abſorptus
confeſtim reſtituit. Vuam cum melle inunctus reprimi-
t. Angina laborantibus ex aqua mulſa vtiliter gargarizatur.
Coloris bonitatem ijs qui eo veſcuntur auget. In ſorbili o-
uo datus tuſſi auxiliatur, pleuriticisq; in ſorbitionibus.
Suffuſus felle, & hydropicis cū aridis Ficis vtiliter exhibe-
tur. Cum pipere, thure & vino potus, rigores ſoluit. Ner-
uorū diſtentione laborātibus, opiſthotonicisq; datur obo-
li pondere deuorandus. Hærentes gulæ hirūdines, gargari-
zatum cum aceto deiicit. Ad lac intus in grumos concretū.
Comitialibus ex oxymelite ſumptus ſuccurrit. Menſes ciet
cum pipere & myrrha potus. Cœliacos in acino vuz ſum-
ptus iuuat. Cum lixiui potus, repētiniſ conuulſionibus &
rūpturis prodeſt. Ad poriones diſſoluitur amariſ amygdal-
liſ, aut ruta, aut calido pane. Foliorum liquor eadem poteſt
ſed multò minori efficacia. Cum oxymelite māditur ad ex-
pediendam aſperam arteriam, præſertim amiſſam vocem.
Vtuntur eo cum Lactucis, pro Eruca comedentes.

EX GALENO.

Omnes Silphij partes flatulentæ magis ſunt eſſentię, ac
proinde concoctu difficiles. Foris tamen impoſitæ corpori
efficaciores: & omnium potiſſimū liquor, admodum tra-
hentem facultatem obtinens. Attamen excreſcentias immi-
nuendi, & liquaudi vim quandam propter iam dictam tem-
periem habentē. Liquor Cyrenaicus quidem omnes & ca-
liditatē & tenuitate exuperat, ac proinde etiam omniū ma-
ximè diſcutit.

EX PLINIO.

Folia Silphij ad expurgandas vuluas, pellendosq; emor-
tuos partus decoquuntur in vino albo odorato, vt bibatur
mēſura acetabuli à balneis. Radix prodeſt arterijs exaſpe-
ratis, & collectionibus ſanguinis illinitur. Sed & in cibus
decoquitur ægrè. Inflationes facit & ruſtus. Vrinę quoque
noxia

noxia. Sugillatis eum vino & oleo amicissima, & cum cera strumis. Verrucę sedis crebriore eius suffitu cadunt. Liqueor eius per se algores exalfacit. Potum, neruorum vitia extenuat. Fœminis datur in vino. Et lanis mollibus admouetur vuluę ad menses ciendos. Pedum clauos circumsarificatos ferro, mixtus cerę extrahit. Vrinam ciet ciceris magnitudine dilutus. Andreas spondet, copiosius sumptum nec inflationes facere, & concoctioni plurimum conferre senibus, & fœminis. Item hyeme quàm æstate vtilius, veruntamen aquam bibentibus: cauendūque ne qua intus sit exulceratio. Ab egritudine recreationi efficax in cibo. Tempestiuē enim datus, cauterium obrinet: assuetis etiam vtilius quàm expertibus. Ad extera corporum, indubitatas confessiones habet. Venena telorum & serpentium, extinguit potus ex aqua vulneribus his circumlinetur. Scorpionum tantum plagis ex oleo. Vlceribus verò non maturefcentibus, cum farina hordeacea, vel fico sicca. Carbnuculis cum ruta, vel cum melle, vel per se visco superlitum vt hæreat. Sic & ad canis morsus. Ex crescentibus circa sedem, cū tegmine punici mali ex aceto decoctus. Clauis pedum, qui vulgo morticini appellantur, nitro mixto, antè subactus. Carnes replet cum vino & croco, aut pipere, aut murium fimo & aceto. Perniones ex vino fouet, & ex oleo coctū imponitur: sic & calli. Clauis pedum superrasis præcipuē vtilitatis. Contra aquas malas, pestilentes tractus, vel dies. In tussi, vna fellis veteri suffusione, hydropicis, raucitatibus: confestim enim purgat fauces, vocemque reddit. Podagras, in spongia dilutus posca lenit. Pleuriticis in sorbitione vinum potius datur, contra tractionibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine cera circumlitus. In angina gargarizatur. Anhelaroribus & in tussi vetusta, cum Porro ex aceto datur, atque ex aceto his qui coagulum lactis sorbuerint. Præcórdiorum vitijs, syntecticis, comitialibus in vino, in aqua mulsæ linguæ paralyfi. Coxendicibus & lumborum doloribus cum decocto melle illinitur. Non censuerim, quod auctores suadent, cauernis dentium in dolore inditum cera includi, magno experimento hominis qui se eadem causa præcipitavit ex alto.

FORMA.

*Stachys.*

Frutex est Marrubio similis, sed altior, folia ferens plura, sed rara, hirsuta, dura odorata incana. Virgas ab vna radice plures emittit, Marrubio candidiores. Ex hac descriptione p- spicuum sit omnibus, herbam quam pictam damus, esse Stachyn. Est enim fruticosa, Mar rubijque similitudinem refert, nisi quòd altior est: folia quoque plura, at rara obtinet, item hir suta, dura, odorata, & albicantia. Virgulas de- nique (etsi pictura idi- psum non ostendat) ab vna radice plures emit- tit, candidiores quàm

Marrubium. Quibus omnibus florum purpureorum ver- ticillatus accedit ambitus, ac orbes spicarum, qui caules cir- cundant.

LOCVS.

Asperis locis, montibus ac collibus prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Stachys gustu acri & amaro est, tertijque ordinis exal- faciētium. Vnde iterum liquet hanc herbam esse Stachyn, quòd gustata acris & amara videatur.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vim habet exalfactoriam & acrem. Ideòque decoctum foliorum eius potum, menses & secundas pellit.

EX GALENO.

Menses prouocat, abortum facit, & secundas eiicit.


EX PLINIO.

Pellit mēstrua.

De Secale. Cap. CCXCIII.

NOMINA.

SECALE dicitur Plinio lib. xviii. cap. xvj. Farrago. Germanis [Rocken & Korn] Gallis *Seigle* nominatur. Magno in errore versantur, qui hoc frumenti genus Siliginem esse existimāt. Siquidem ex hac, Plinio li. xviii. cap. ix. teste, lautissimus fit panis, tener, candidus, & primatum tenens: ex illo cibarius, ater, & pondere præcipuus, ad arcendam pauperum famem tantum utilis, qui veterascens acorem etiam contrahit. Item Siligo habet spicam erectam, Plinio loco iam citato, cap. x. autore, nec rorem continet, quæ rubiginem faciat: hoc vero procumbentem, & ideo quod imbres retineat, rubigini opportunum. Siligo præterea grano est candido, læui & multipliciter tunicato, hoc contra nigro striato, & glumis ferè explicito. Denique Siligo sine arista est, hoc vero aristis horret. Postremū ex Siligine pistrinarii opera fiunt laudatissima, ex Secale nullum ferè tentatū est. His itaque rationibus enidētissimū esse puto, hoc frumenti genus quod Germani nostri [Rocken] vocāt, nō esse Siliginē.

*Secale.*

FOR

FORMA.

Secale frumenti genus vulgò notissimum, stipula est culmo triticeo, graciliore & proceriore, geniculis vt plurimū quatuor, spica innocentioribus aristis horrente, non erecta sed semper propemodum procumbente, grano plumis explicito, & ob id caduco, tristi, nigricante, strigoso. Plinius, cap. xvj. lib. xvij. scribit Secale focunda, sed gracili stipula esse præditum, nigritia triste, sed pondere præcipuū. Quæ singula satis monstrant, frumentum quod [Rocken] vocant Germani, esse secalen, & non siliginem.

LOCVS.

Gignitur qualicunq; solo, ideòque passim in Germania, præsertim Rhetia, & Vindelica feritur.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, metitur autem Iulio.

TEMPERAMENTVM.

Magis videtur excalescere quàm Triticum, minus tamen refrigerare quàm Hordeum. Magis item exsiccare quàm Triticum, minus tamen quàm Hordeum aut Zea.

VIRE S.

Habet aliquid lentoris & obstruentis naturæ. Hinc panis ex eo confectus, potissimū si à furfuribus nō sit probè purgatus, stomacho grauis esse solet. Reliquæ vires ex capitibus de Tritico & Hordeo colligendæ.

De Sideritide prima.

Cap. CCXCV.

NOMINA.

Σ *Idipitis* Græcis, Sideritis prima Latinis dicitur. Magna officinarum pars hac herba pro Chamæpity vera vtitur, non sine errore, cum satis ex forma illius constet, vt paulò post monstrabimus, non esse Chamæpityn. Germanis [Glidkraut] Gallis *Espec de Tetrail* appellatur. Sideritis verò nominata, quod glutinandis vulneribus apta, præcipuum in bello habeat vsum.

Z v FOR

*Sideritis prima.*

Herba est folia Marrubio similia habens, longiora tamen, ad saluix aut quercus figurā accedentia, verūm minora & aspera. Caules fundit quadratos, dorantales, aut longiores, gustu non iniucundos, aliquo modo adstringentes, in quibus per interualla, velut in Marrubio verticilli in orbem circumacti & in his semen nigrum. Ex qua quidem delineatione sole clarius constat. herbam cuius hic picturam exhibemus, esse Sideritin primam. Siquidem folia Marrubij habet, sed longiora, ad saluix

similitudinem aspera & rugosa, minora tamen. Caulem quadratum & hirsutum non iniucundi gustus, aliquantum subadstringentis, quem per interualla verticillati orbes coronant, vt in Marrubio videre licet: in quibus flores subcandidi ac lutei, & subinde semen nigrum. Radicem exiguam & subluteam, quod silentio trāsiuit Dioscorides. Non esse verò hanc herbam Iuuam atthriticam, nec Chamæpityos generibus posse annumerari, hinc conijcere licet: primum, quòd non sit pumila, sed in altum surgat, fructis veriùs quàm herbæ speciei. Quòd verò neque primum neque secundum genus Chamæpityos dici queat, hinc manifestum fit: quòd vtrunque folijs Semperuiui minoris sit, à quibus saluix, qualia hæc habet, diuersissima sunt. Neque etiam tertium, quia folia eius non sunt exilia.

LOCVS.

Nascitur asperis, petrosis & incultis locis.

TEMPVS.

Iunio mense florere incipit, nec desinit nisi in Autumni fine.

TEMPERAMENTVM.

Sideritis habet quandam abstergendi facultatem, id quod amaritudo eius satis indicat: & pauculam adstrictionem. Plurima tamen eius pars humida est & mediocriter frigida.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Folia eius illita vulnera glutinare, & inflammationem arcere possunt.

EXGALENO.

Phlegmonem sedat, & glutinandi vim obtinet.

EXPLINIO.

Sideritis tantam vim habet, vt quamuis recenti gladiatoris vulnere illigata, sanguinem claudat.

De Sorgi. Cap. CCXCVI.

NOMINA.

PERGRINVM est hoc genus frumenti, & ex Italia ad nos allatum, ideoque Germani [Vuelchen Hirsz] Galli *Blé barbu*, ou *espece de Pani* vocant. Alij [Sorgsomen] quodd scilicet in Italia Sorgi nominetur. Neque constat quo nomine veteribus sit appellatum, nisi farris genus sit, quod in Gallia nunc rubrū & barbatum frumentū nuncupant. Probè enim illi hæc nomenclatura videtur cōuenire, quodd nimirum eius spica rubra & barbata sit. Certò tamen nihil affirmare audemus, nam Panicum etiam referre, quamuis magnitudo repugnet, videtur.

FORMA.

Culmos habet quatuor aut quinque, altos, crassos, geniculatos, rubicundos, folijs vestitos longis, latis, & in summitate acuminatis, hirundini non dissimilibus: spicam quā Panicum maiorem ac densiorem, rufam & barbaram, in qua semen rufum, rotundū, lentis magnitudine, & acuminatū.

Floré

& intolerando errore Serpentarias vocant, nō certē quod in nomenclatura tantū sit situm: sed quod forma & viribus: plurimū ab ea herba quam Græci *δρακοντιον* Latini autem Dracunculū ac Serpentariam nomināt, plurimū discrepēt, vt suo loco latius demonstrabimus. Germani nostri has herbas [Natervvvrtz] sua lingua appellant. Galli *Bistorte*,
 GENERA.

Duo sunt Serpentariæ recentiorū & officinarum genera, forma non multū variantia. Vnū quod læuibus admodum folijs, & radice in se cōtorta cōstat. Hinc est quod herbarijs nostri temporis Bistorta dicatur. Nos certioris discriminis gratia marē fecimus, germanicēque [Natervvvrtz] mennle vocabimus. Alterū rugosioribus folijs, maioriq̃ue radice, & minus intorta, ac multū capillata videtur. Vulgares herbarij Colubrinā nuncupant. Nos scēminā cōstitui-

tuimus, ideoq; germanicē [Natervvvrtz Vuci ble] vocauimus Serpentarias verò vtrūque genus dixerūt, propterea quod vbi primum ē terra prodeūt, linguæ serpentine pelle tenui vestitæ, formā obtinent.

FORMA.

Cauliculo constāt tenui ac iunceo, glabrescētē, per ima tantum foliato, spicoso florum vertice, quibus dilutioris purpureæ color inest: folio Rumicis à terra cæsis, supernè viridi & herbaeco: Radice, mas quidē draconis modo inuoluta & contorta, scēmina verò



Serpentaria mas, seu Bistorta.

verò oblonga, maiore ac capillata, extrà nigricante, intus rubescente.



*Colubrina seu Serpentina
fœmina.*

LOCVS.

Nascuntur locis vmbrosis & humidis, prætis potissimum Martianæ sylvæ.

TEMPVS.

Florent Maio mense & Iunio, quo maximè tempore, vt omnes aliz quæ floribus ornantur plantæ, dignosci ac inueniri possunt.

TEMPERAMENTVM.

Vtriusq; radix mirificè adstringit, vt refrigerandi ac exiccandi facultate prædita esse nemini sit dubium. Antiquus manuscriptus herbarius frigidas & siccas esse in tertio ordine censet.

VIRES.


Radices illarum glutinant vulnera, fœtum in vtero retinent, vomitum biliosum reprimunt, dienteriam sanant. Hæc antiquus herbarius: Nostræ verò ætatis medici aliorum errata impudèter sectâtes, ad longè diuersos vsus Serpentariæ vtriusque radices adhibet, nempe ad eos ad quos Dioscorides, Galenus & alij veteres suum Dracontium: cum tamè viribus inter se maximè discrepent, quod gustus etiã aundè testatur: cū Dracontij radix acris sit, illarum verò vehementer adstringat. Vt igitur errorem hunc relinquât,
subio

subinde medicos & seplafarios hortor, nisi fortè perdere magis quàm sanare in delicijs habeant: sciântque Serpentarias suas non alias quam Britannicam habere facultates, adstringendi nimirum, priuatim ad ea quæ in ore & tonsillis sunt depascentia vlcera accommodatas, & ad omnia alia quibus adstrictione opus est. Folia etiam in farinam trita labiles dentes confirmant.

De Scordio. Cap. CCXCVIII.

NOMINA.

Σκῆδιον Græcis, Latinis Trixago palustris dicitur. Officinis ferè omnibus incognita. Germanis allusione quadam ad Romanam appellationem aptè [Vuasserba-tenig] nominabitur: Gallis *Germandree d'ean*. Scordion autem Græcis ab Allijs dicta est herba hæc, quòd nimirum eius folia affricta Allij (quod Græcis Scordion vocatur) odorem referant. Ab hoc mali & ingrati odoris sensus, iisdem etiam *δύσχομον* appellata est. Vt verò Trixago dicta sit, similitudo fecit: Trixagini enim, quæ Græcis Chamædrys nominatur, similis est. Palustris autè quoniam humentibus, ac palustribus locis nascatur.



Scordium.

FORMA.

Folia Trixagini seu Chamædri similia habet, maiora tamen, nec sic in

fic in ambitu incisa, odore aliquantum Allium referentia, gustu adstringentia & amara. Caules quadrangulos, in quibus flos subrubescens. Hæc delineatio sic refert herbam hanc, cuius picturam damus, ut ouum ouo non sit tam simile. Folio siquidem est Trixaginis: maiore, & per ambitum non ita profundè ferrato, & inciso, odore aliquatenus Allium reddente, adstringentis & amari gustus, quadrangulis caulibus: flore in caulibus, instar Chamædryos & Teucrij, subrubro, & minimè in summis caulibus, ut aliqui putant, quemadmodum pictura ipsa abundè docet. Hæc itaq; herba in theriacos pastillos inserenda erit, & non sylvestre Allium, ut maximo in errore versentur seplasiarij institutores, qui pro re tam salutari atque omnibus putridis morboribus, Galeno lib. j. de antidotis autore, aduersante, sylvestre Allium usurpant. Sed indignius erratum, quàm quod multis explodi debeat. In hunc autè eisdem vicinitate vocabulorum potissimum incidisse errorem, lib. j. Paradoxorum, cap. xxiii. abundè monstrauius.

LOCVS.

Nascitur in montanis & humentibus locis. Nec inter se pugnant Dioscorides & Plinius, dum hic in campis humidis pinguibusq; ille autem in montanis nasci scribit. Vterque enim verum dixit: in campestribus siquidem & montanis, non tamen omnibus pronenit, sed (quod Dioscorides etiam adiecit) humentibus tantum. Plantatum autem Scordium non difficulter nascitur, & possunt de vno duntaxat ramo complures prouenire, modò solo humido committantur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, flos tamen non nisi diem vnum durare videtur, sic continuo vnus alium sequitur.

TEMPERAMENTVM.

Tum ex saporibus, tum etiam facultatibus paulò post exponendis satis constat Scordium calidum esse. Nam, Galeno etiam teste, amarum quid obtinet, & acre.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Herba vim calefaciendi habet, & urinam citè recens trita & pota.

& pota. Arida quoq; cum vino decocta contra serpentium morsus, & lethalia venena bibitur. Ad stomachi rosiones, dysenteriam, & urinæ difficultatem pondere duarū drachmarum cum hydromelite. Purgat crassa purulenta è thorace. Facit ad veterem tussim, rupta, conuulsa, cum nasturtio melle & resina in eclegmate arida cōmixta. Hypochondriorum vetustas inflānationes excepta cerato lenit. Succurrit eadem podagris cum acri aceto circūlita, aut ex aqua illita. Menses supposita mouet, vulnera glutinat, vetusta vlcera purgat, & cum melle ad cicatricem ducit. Siccata carniū excrescentias reprimat. Succus præterea ex ea expressus ad prædicta vitia bibitur.

EX GALENO.

Expurgat simulq; excalfacit viscera, tum menses urināque mouet. Præterea conuulsa ruptaq; & laterum dolores ab obstructione & frigore natos sanat potum. Deniq; viride illitum magnā vulnera conglutinat: verūm sordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum.

EX PAVLO.

Scordium varium existit, vt quod amarum, acerbū & acre sit. Purgat igitur simul & calfacit viscera, urinas & mēstrua cit, refrigerata omnia recalfacit, vulnera glutinat, repurgatque: aridum illitum cicatricem inducit.

ADNOTATIO.

Scordium iam notius est, quā vt sit pluribus declarandum, nomen retinet.

De Stichade. Cap. CCXCIX.

NOMINA.

ΣΤΙΧΑΣ Græcè, Stichas vel Stæchas Latinè appellatur. Officinæ cognomento Arabicam vocant. Germanis nominatur [Stichaskraut] Gallis *Stechados citrin, ou Arabic.* Stichas veidō nomen accepit à Stæchadibus ex aduerso-Malsiliæ sitis Galliæ insulis, in quibus prouenit. Arabæ factionis autores patriam Stichada reliquis omnibus prætulerunt, hinc sequaces illorum gentili cognomento Arabicam nuncuparunt.

*Stichas.*

Herba est tenuibus ramulis, comam similem Thymo habens, longiore tamen folio, & gustu acris, & aliquantum subamara. Haecenus Dioscorides, qui flores atque spicam prorsus omisit. Sunt autem flores, ut pictura abunde monstrat, exigui & caerulei, spica verò flavescent, semine referta exiguo, triquetro, & coloris spadicei. Radix illi est tenuis & lignosa.

LOCVS.

Nascitur, ut antea est commemoratum, in insulis Galliae è regione

Massiliae, quae Stichades appellantur, à quibus etiam gentilitiam appellationem accepit. Prouenit etiam in Arabia, alijsque compluribus locis, & in multis etiam Germaniae nostrae hortis.

TEMPVS.

Floret eo quo Lauandula tempore, nimirum ante Solstitium aestiuum, hoc est, Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Stichadis qualitas gustu quidem amara est, & mediocriter subastringens. Temperamentum verò compositum ex extrema essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex tenui, altera, quae terrena est, copiosiore, à qua vtrique amara est.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius quemadmodum & Hissopi, ad thoracis vitia efficax est. Miscetur antidotis vtiliter.

EX GALENO.

Obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareque; tum omnia viscera, tum totum corpus est iuta.

EX PLINIO.

Menses cit potu, thoracis dolores leuat. Antidotis quoque miscetur.

De Struthio. Cap. CCC.

NOMINA.

Σ *Τροσθιον* Græcis, Radicula, siue Lanaria herba Latinis, Mauritanis & Officinis Cōdisi, nonnullis herba fullonum, vulgò Saponaria, Germanis [*Seyffenkraut*] Gallicis *Herbe à Foulon* dicitur. Vnde verò Græci hanc herbam Struthium appellauerint, non satis cōstat, nisi fortè à foliorum positura, quæ auium alas quadantenus imitatur, nomen illi indiderint. Nam gens ea *τροσθις* & *τροσθιον* passerem & minores alias aues appellat. Vel forsitan quòd Venerè stimulet. Græci enim, vt dictum est, *τροσθις* passerem vocant, & ab eius auis salacitate lasciuos, & in venerem procliuiores homines *τροσθες*, quasi passeres vocant. Porro struthium, vt est apud Festum, nuncupant obscœnam virilem partem. Qua imitatione Martialis & Catullus passerem pro virili membro in suis versibus vsurpasse videtur. Lanaria verò dixerūt, quia ad cādorem & mollitiem lanarū ea vsa fuerit antiquitas. Nam cū succidæ lanæ æsypo spurcatæ colores respuerent, prolutæ huius radicis succo, ad quoscūque suffectus imbibendos preparabātur, quibus æsypū erat impedimento. Sic sordescētes lanas veteres hac herba eluebāt, ad munditiem contrahendam, quæ primum ab infectoribus quærebātur, sordidis colores aspernātibz. Sic quoque à præcipua & vtiliore parte. Radicula Romanis est appellata. Saponaria recentioribus dicta est, quoniam eluendis vestimentorum maculis, sordibusque lanarum expurgandis, saponis vicem exhibet. Herba autem fullonum nominata

Aa ij est,

est, quoddam interpolandis vestibus, & mangonio poliendis fullones vtantur.

FORMA.



Struthium.

Struthion herba est caule lanuginoso, folijs oleę prodeuntibus ex intervallo quasi geniculatim, plærunque quinis in vnum coeuntibus, in summo coliculorũ floribus candidis, radice (quam summo cespite non in altum vtrò citròque per longitudinem fundit) magna, tereti & oblonga, quæ cõciditur purgãdis lanis.

LOCVS.

Nascitur in Asia Syriaque, saxosis & asperis locis præcipuè. Nũc in hortis quibusdã platur.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio maximè mense, sed per duos continuos menses floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum temperamento, ex quarto quodammodo ordine,

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix eius acris est, urinã cit, iecinorosis auxiliatur, tussa & orthopnœis cũ mellẽ cochlearis mensura sumpta. Aluũ subducit. Eadem cum Panace & Capparis radice sumpta, calculos frangit, & per vriam exturbat. Lienem induratum

tum minnit. Subdita, menses elicit: & fœtū manifestè enecat. Cum polenta & aceto illita, lepras tollit. Cum farina hordeacea in vino elixa, tubercula discutit. Miscetur præterea collyrijs & mælagmatis quæ ad claritatem oculorum conficiuntur. Sternutamenta cit, & trita cum melle naribus infusa, per os purgat.

EX GALENO.

Struthij radice potissimum utimur, gustu acri quidem existente. Sed & abstergit, & irritat: idèoque sternutamenta mouet, cetera omnia quæ gustu acria sunt, & temperamento calida.

EX PLINIO.

Medetur morbo regio ipsa radix decocta, & ius potum: item thoracis vitijs. Urinam cit, aluum soluit, & vuluas purgat. Ea & ex melle prædest magnificè ad tussim orthopnoæ cochlearis mensura. Cum polenta verò & aceto lepras tollit. Eadem cum Panace & Capparis radice calculos frangit pellitque. Panos discutit, cum farina hordeacea & vino decocta. Miscetur & malagmatis & collirijs, claritatis causa. Ad sternutamenta utilis inter pauca. Lieni quoque ac iccino. Eadem pota denarij vnius pōdere ex mulsa aqua, sulphoriosos sanat.

De Scilla. Cap. CCCI.

NOMINA.

Σκίλλα Græcis, Scilla Latinis, Squilla, exemplo Varronis, omnibus nūc Officinis vocatur. Germanis autem [Merzvvibel] Gallis *Stipouille, ou Charpentaire*.

FORMA.

Scillæ radix cepæ modo multipliciter tunicata corticosaque: ex qua prius, ut in croco, caulis prosilit, tū ex eo flos in luteo candidus emergens insidit, qui cum senuerit, folia demum multis post diebus emicant lata, nullo nixa pediculo, cepitia quadam specie, & plæraque ex ijs in terram deflecta.

LOCVS.

Scilla vndique, ut Cepæ & Allia, prouenit.

Aa ij

TEM

ita vt ne taleolæ inuicem se contingant. Sic igitur secta, ad oleum, vinum, acetumq; scilliticum vtimur. Ad rimas verò pedum crudæ Scillæ interanea pars in oleo seruata, aut cum resina liquefacta imponitur. Decocta in aceto demorsis à vipera cataplasma est. Assæ eiusdem pars vna tosti salis partibus octo subigitur, datúrque ieiunis cochlearis vnus duorumve pondere ad emolliendam aluū. Additur portionibus & odorientarijs medicamentis, & ijs cum quibus vrinam ciere voluerimus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatât cibi, & morbo regio, torminibus, in vetere tussi, asthmaticis, cruenta reijciētibus. Trium verò obolorum pondus in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur eadem cū melle, sumitúrque in cibo ad eadem, maximæ coctionem adiuvans. Strigmentitia per aluum ducit. Cocta & simili modo sumpta, idem potest. Cauendus Scillæ vsus ijs quibus interaneum aliquod exulceratum erit. Prodest verrucis & pernionibus assam inungere. Semen eius tritū, cum caricis aut melle, exceptum, si manditur, aluū emollit. Pro foribus domus suspensa tota amuletum est.

EX GALENO.

Præstat assam aut elixam sumere, sic enim virium eius vehementia exoluitur.

EX PLINIO.

Scillarum in medecina, alba est quæ masculus, fœmina nigra. Scilla quæ candidissima fuerit, vtilissima erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquum è vino est, consutum suspenditur lino modicis interuallis, postea arida frustra in cadum aceti quàm asperrimi pendentia immerguntur, ita ne vlla parte vas contingant. Hoc fit ante Solstitiū diebus quadraginta octo. Gypso deinde oblitus cadus, ponitur sub tegulis, totius diei solem accipientibus. Post eum numerum dierum tollitur vas, Scilla eximitur, acetum transfunditur. Hoc clariorē aciem facit. Salutare est stomachi laterumq; doloribus, parū sumptum binis diebus. Sed tāta vis est, vt auidius haustum extinctæ animæ momento aliquo speciē præbeat. Prodest & gingiuis & dētibus, vel per se cōmāducata. Tineas & reliqua vētris animalia pellit ex aceto

A a iij & melle

& melle sumpta. Linguae quoque recens subiecta praestat ne hydropici situm sentiant. Coquitur pluribus modis in olla, quae coniiciatur in clibanum aut furnum, vel adipe aut luto illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccatur, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vfus sic coctae ad hydropicos. Ad urinam ciendam tribus obolis cum melle & aceto potae. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus innatet cibus. Ad tormina, regios morbos, tussim veterem cum suspirio. Discutit & ex folijs strumas, quadrinis diebus soluta. Furfures capitis, & vlcera manantia illita, ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maxime uti coctione faciat. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, & mixta resina. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Pythagoras Scillam in limine ianuam suspensam, malorum medicamentorum introitum pellere tradit.


De Staphide agria. Cap. CCCII.

NOMINA.

Σταφιδάγρια Græcis, herba Pedicularis & Pituitaria Latinis, Officinis Staphisagria, Germanis [Biszmntz] Gallis l'Herbe aux poux. Pedicularis autem Pituitariaque Latinis à viribus quas habet, dicta est: erumpentibus enim è corpore pediculis ex oleo inuncta aduersatur, & eomanducata feruore multam pituitam trahit.

FORMA.

Folia habet Labruscae, incisuris diuisa, coliculos rectos, molles, nigrosque, flores Isati similes, semen in vasculis viridibus similibus Ciceri triangulum, asperum, in nigro subrufum, intus candidum, gustu acre. Hæc descriptio herbæ huic cuius hic effigiem damus per omnia quadrat, floribus tantum exceptis, qui minime Isati similes sunt, neque in colore, neque in quantitate. Isatis enim flores lutei sunt, & exigui, huius contra subcaesij, ac multo maiores: ut hinc ferè suspicer eam herbam non esse quam veteres pingunt Staphida agriam. Cæterum cum proximè tamen ad picturam accedat, neque

*Staphis Agria.*

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Quum vr̃di vim habeat Staphis agria, cõsequitur eandem in quarto ordine esse excafacientium & desiccantiũ.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Eius grana quindecim, si quis trita in aqua mulsa dederit, crassa per vomitum purgāt. Sed qui biberint ambulare debent. Quinetiam assidue attendere oportet, & aquam mulsam potui dare, quod strangulationis pericula inferant, & fauces deurant. Trita eadem, & ex oleo inuncta, pediculationi, prurigini & scabiei auxiliatur. Plurimam cit pituitā commāducata. Decocta in aceto, dentium dolori, si ea colluantur, subuenit. Gingiuarum rheumatismum sistit. Vlce ra oris, aphthas nominant, cum melle sanat. Miscetur præterea vrentibus malagmatis.

Aa v EX

neque viribus distet admodũ, inter Staphidis agrias species recte à plerisque hodie herbariæ rei studiosis connumeratur. Folia enim fert plærunque septem, aliquando etiã paucioribus incisuris diuisa, coliculus rectos, nigros, in folliculis herbaceis semen triquetrum, in nigro subrufum, intus candidum, gustu acre, ita vt illi omnes notæ demptis floribus, respondeant.

LOCVS.

Nascitur, Plinio auctore, in opacis, Ea cuius picturā exhibemus nũc passim i hortis plātatur.

EX GALENO.

Vehementer acrem obtinet facultatem, adeò vt ex capite purget pituitam, abstergatque valenter. Itaque ad scabiem accomodata est. Sed & vrendi vim aliquam habet.

EX PLINIO.

Nucleis eius ad purgationes vti non censuerim propter ancipitem strangulationem, nec ad pituitam oris siccandam: fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquū corpus liberant triti. Facilius admixta sandaracha. Item pruritu & psoris. Ad dentium dolores decoquuntur in aceto. Ad aurium vitia, rheumatismum ginginarum, vlcera oris manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur. Semen enim abdicauerim, propter nimiam vim odoris. Quidam eam Pituitariam vocant, & plagis serpentium utique illinunt. Item phthiriasi, qua Sylla dictator consumptus est. Nascuntur quoque in sanguine ipso hominis animalia exesura corpus. Resistitur Staphidis agrias succo, cum oleo perunctis corporibus. Hæc quidem in aceto decocta, etiam vestes eo tædio liberat.


De Sefeli masiliensi. Cap. CCCIII.

NOMINA.

ΣΕΣΙΛΙ τὸ μασιλιώτικόν Græcis, Sefeli Masiliense Latinis Officinis Siler montanum dicitur. Semen tamen quod à seplasiarijs hoc nomine veditur, non Masiliensis, sed si amaritudinem respicias, Aethiopici, vel quod magis verò simile est, Peloponesiaci (neutrius enim integrā imaginem vidimus) Sefeli semen est: latius enim, odoratius, & carnosius Masiliensi existit. Germanis incognita hætenus planta fuit, ob id [Sefel] recte illam appellabunt.

FORMA.

Folia gerit Fœniculi, crassiora tamen. Caulem vegetiorem, umbellam Anetho similem in qua semen est oblongū, angulosum, & degustanti cōfestum acre: radicem longam, & odoratam. Ex qua Dioscoridis delineatione satis cōstat stirpem, cuius picturam damus, esse Sefeli Masiliense, quòd huic nimirum, nulla prorsus nota reclamante, tota descriptio

*Seseli Masiliense.*

men subinde producit.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccet in secundo ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Semen & radix calefaciendi vim obtinent. Stranguriæ, orthopnææ, vteri suffocationibus & comitialibus pota medentur. Menses & fœtus ex vtero ducunt. Interancis omnibus prosunt, & diutinas tussis sanant. Ipsum semen cum vino potum coctioni confert, tormina discutit, & epialis febribus vtile est. Ad arcenda in itinere frigora cum pipere & vino bibitur. Datur capris alijsq; quadrupedibus bibendū vt partus iuuet.

EX GALENO.

Seseli & radix & semen vsque aded excafcit, vt admodum

ptio suffragetur. Quid multa? Dato etiā quod singulæ illi nō responderent notæ, tamen cū eas quas veteres Sefeli attribuerunt facultates obtineat, citra omne periculum pro eo vsurparetur.

I. OCVS.

Optimū iuxta Masiliam, teste Dioscoride, Galliæ urbem nascitur: vnde etiam cognominatum est Masiliense. Prouenit autem alijs quoque in locis calidioribus & nunc in plærisque Germaniæ hortis, sed non nisi satum & cultū.

TEMPVS.

Floret æstate, & se-

dum vrinam mouere queat. Sed tenuium est partium, vt & comitialibus, & orthopnoëis competat.

EX PLINIO.

Prodest homini ad tussim veterem, rupta, cōuulsa, in vino albo potum. Item opisthotonicis, & iecinorum vitijs, & torminibus, & strāgurię, duarū aut trium ligularum mensura. Sunt & folia vtilia, vt quę partus adiuuent etiam quadrupedū. Hoc maximè pasci dicuntur ceruę pariturę. Illinitur & igni sacro. Multū in summo cibo coctionibus cōfert vel folio, vel semine. Quadrupedū quoque aluum sistit, siue tritum potui infusum, siue mandendo commanducatū ē sale. Boum morbis medetur, vel si contritum infunditur.

De Sanguisorba. Cap. CCCIIII.

NOMINA.

QVVM ignoraremus quo nomine stirpem hanc veteres Græci & Latini (si modo ijs cognita fuit) appellarent, maluimus interea vulgari vt nomenclatura, donec aliud certius nomen inuenerimus. Elatinen tamen esse iudicarem, si folia pusilla, pilosa, & rotunda obtineret. Nunc quum neque pusilla, neque pilosa, neque rotunda, sed mucronata esse videantur, certi statuere nihil possum. Sanguisorba verò dicta est hæc herba; non quòd vulneribus iniecta ferrum & spicula faciliè & citra sensum doloris exigat, vt nonnulli arbitrantur; id ipsum enim non posse mirifica quę illi inest adstringendi facultas, abudè ostendit: sed potius quòd ei in sistendo sanguine vndecūque emanarit, mira admodum insit efficacia, adeò vt hunc ipsum quasi absorbere videatur. Erroris autem huius nulla alia causa est, nisi quòd hanc stirpem multi cum ea quę hodie Pimpinella vocatur, confundant: quę certè propter caliditatem quā obtinet haud exiguam, quādam etiam trahendi facultatem habere videtur, adeò vt infixæ corpori extrahere faciliè q̄at. Quòd verò cum Pimpinella confuderint non alio factum est nomine, quā quòd huius folia proximè ad Pimpinellæ folia (quę itidem vt hæc serrata sunt) accedere videntur. Sed hæc confusio non caret errore, vt paulò post dicemus.

Ger

Germanis hæc herba [Rolbleskraut,] à capitellis quæ rufescētibus punctis maculata sunt, dicitur. Nōnulli etiā Germanorū [Hergots Bartlin] nominant. Quidam etiā à sistēdo sanguine [Bluotkraut] Bona pars Gallorum *Pimpenelle* eam vocant.

G E N E R A.

Duo sunt eius herbæ quæ *Sanguisorba* vocatur genera. Vna enim maioribus constat folijs ac longioribus, coliculis tamen tenuioribus, ideoque ab hac foliorum forma, maior à nobis dicta est. Altera minoribus folijs, colicalis autē maioribus esseprehenditur, quare ab ista foliorū effigie recte minor appellari potest, vt inter eas aliquod discrimen esse herbariæ rei studiosi hac ratione animaduertant.

F O R M A.

*Sanguisorba maior.**Sanguisorba minor.*

Herba est à radice crassa & longa, statim foliosa, minor potissimū, coliculos habens plurimos rubentes, folia aspe-
ra

ra in extremitatibus latè crenàta & ferrata, in summo colliculorum capitella rubescentibus punctis maculata, quæ si hiant flores exeunt herbacçi, in medio croceam comam ostendentes.

LOCVS.

Nascuntur locis incultis, aridioribus, & soli expositis. Vnde iterum colligere licebit non esse Elatinen, vtcunque à facultatibus illius non discrepet, quòd Dioscoride & Plinio testibus, Elatine in cultis & segetibus proueniat.

TEMPVS.

Florēt Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Gustantibus adstrictionem haud vulgarem ac viscositatem herba præ se ferre videtur. Quapropter siccam admodum consistentiam hæta est, simulque corpora contrahere, & constringere potest: atque adeò emplastice, eò quòd glutinosa sit, facultatem obtinet.

VIRE S.


Ex ijs quæ diximus abundè cõstat vtrunque Sanguisorbam in restringendis ac suppressendis sanguinis profluuijs esse efficacissimas, adeò vt nonnulli constanter asserat, eas etiam manibus gestatas sanguinem vndecunque manantem sistere posse. Experientia certè compertum est, ad muliebrem profluuium sanandũ, nullum posse reperiri præsentius ijs stirpibus præsidium. Glutinant etiam vulnera illarum folia, carcinomatisque & fistulis medetur. Generosum denique ac strenuum remedium easdem esse ad dysenterias, & reliquos ventris fluxus, si ex aqua aut vino bibantur, nemini non notum est. Quid multa? Elatines herbæ, cuius certè hæ duæ stirpes genus esse videntur, facultates habent. Quare toto cœlo errant qui herbas has, vt supra etiam commemoratum est, cum Pimpinella confundunt, quòd hæc ipsa acris admodum sit & multum calida: illæ contrà sapore haud secus, atque Elatine, adstringente. Verùm non tantum differunt facultatibus, imò etiam odore, coloréque foliorum, maximè verò florum diuersitate, vt cuius ex vtriusque herbæ picturæ collatione statim deprehendet.

De Scolymo. Cap. CCCV.

NOMINA.

Σκῖλυμ Græcis, Carduus & Strobilus Latinis, Columellæ Cinara dicitur. Sunt, qui hodie Arcocum corrupta voce nominant, primam vocis syllabam articuli vice præponentes. Alij paulò rectius Alcocalum vocant. Cocali siquidem nomine, nux pinea, cui Scolymi capitulum simile est, venit. Nunc vulgò herbariorum ab Articulo statim duabus interiectis literis Articocalus, aut expuncta vocali a, Articoclus, vel magis curtato, vt serè fit, vocabulo, Articols vel Articoca nuncupatur. Germani instar vulgi [Articoca,] nominabunt, aut [Strobildorn,] Galli *Artichaut*. Strobilum autem Romani hanc stirpem non alia ratione dixerunt, quàm quòd eius capitulum, vt diximus,

structili nucleorum serie pineam nucem referre videtur, Cinaram verò sunt qui appellatam putent, quòd satum & cultum cineribus gaudet. Alij à Cinara potius puella, quæ in eius speciei Carduum mutata est, dictam esse volunt.



Scolymus.

FORMA.

Folia habet Chamæleontis, & spinæ albæ vocatæ similia, nigriora tamen ac crassiora.

Caulem emittit oblongum, foliosum, in quo capitulum spinosum. Radicem verò nigram

gram & crassam. Hæc Dioscorides. Cæterum caput eius & vertex in squarosum extuberat globum, corticosis vnguib; turgentem, spicisq; squamatim coagmentatum, quorum orbis exterior viret, interior niueo candore nitescit. Flos purpureo rutilat colore, qui tandem euanescit in pappos. Caput vetustate tandem dissilit in corticeas laminas, semen ostendens Cnici figura. Nos tamen integram Scolymi faciem ac picturam hoc tempore dare non potuimus, quod primo anno fructum suum nõ ostendat. Curabimus autem alio tempore vt studiosi integram eius habeant picturam.

LOCVS.

Nusquam, quod sciam, in Germania prouenit Cinara, nisi sata & culta. Quare Scolymus, qui in hortis colitur & plantatur, verè Cinara existit. Quod ideò monendum esse duximus, quia inter Græcos esse constat, vt est Paulus & Aetius, qui Scolymum à Cinara discrimināt. Non est autem aliud inter eas stirpes discrimen, quàm quòd Scolymus ferus est & syluester, Cinara verò domita cultu, ideòque à nonnullis Carduus altilis nominatur.

TEMPVS.

Quum Solstitium æstiuum agitur, Scolymi flos erumpit, Hesiodo in lib. ij. cui titulus Opera & dies, teste, qui ea florente cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audidissimas, viròsq; in coitum pigerrimos, capite, genibus, ac toto corpore præ Sirij æstu arefcentibus, scribit.

TEMPERAMENTVM.

Quæ secundum qualitatem editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamentum indicat, siccum verò in secundo.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Radix Scholymi illita graueolentiam alatum, & totius corporis emēdat. Item si decocta in vino bibatur. Vrinam etiam copiosam fœtidamq; pellit. Herba cùm Recens nascitur tenerescitve, asparagorum modo in olera transit.

EXGALENO.

Scholymi radix copiosam vrinā græcolentem elicit, si quis

quis eam in vino coctam bibat: idcoque graecolentiam sanat, tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc sanè medicamento ex tota inest essentia, utpote eius succo existènte purgatorio. Et in libro secundo de alimentorum facultatibus, Praui succi edulium est Ciuara, præcipuè cum iam durior euaserit: tum enim biliosi humoris copia abundat, totaq; eius substantia durior existit, adeoq; ut ex ipsa melancholicus, ex succo verò eius tenuis et biliosus humor producat. Proinde coctam edere præstiterit adiecto coriandro, dein ex oleo, garo, vinoque sumatur. Si tamen in Patina aut sartagine ad esum præparetur, absque ijs comedatur. Plèrique enim sic eius, veluti cacumina comedunt, quæ spondylos nominant.

EX PLINIO.

Vrinam ciere Scolymum præcipuè traditur. Sanare lichenas & lepras ex aceto. Venerem stimulare in vino, Hesiodo & Alcæo testibus, qui florète ea cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis auidissimas viròsq; in coitum pigerrimos scripsere, velut prouidentia naturæ hoc adiumento tunc valentissimo. Item graecolentiam alarū emendat radice emedullatæ vncia, in vini salerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balneo ieiuno, itémque post cibum cyathis singulis pota. Mirum est, quod Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per vrinam effluere.

De Sphatula fœtida. Cap. CCCVI.

NOMINA.

HERBA quam Officinæ Sphatulam fœtidam vocāt, quod grauem exhalet odorem, quomodo veteribus sit appellata nondum certò scire possum. Nomen quidem ipsum Xiphij seu Gladioli speciem esse docet: Sphata siquidem Latinis gladium significat. Non esse autem Xiphium radix eius euidenter admodū ostendit, quæ non est bulbosa, nec gemina, ita ut altera alteri infideat, sed capillamētis fibrata. Neque etiam Sparganium esse partim folia eius, quæ in terram nō procumbunt, partim etiam semina, quæ non in pilulis, sed folliculis aut siliquis profert. Non vide-

tur etiam esse Xyris, quòd illa radicem habeat longam & rufam, Sphatula verò fœtida nec longam nec rufam, sed rotundam, albam & capillatam. Tamen quicquid sit gentilem ijs esse foliorum similitudine constat. Germani eam [V vandtleusz kraut,] à necandis cimicibus appellât. Gal. li *Sphatule puante*,

FORMA.

*Sphatula fœtida.*

Folia Iridi similia habet, minora tamen & angustiora. Caulem ex se mittit, in cuius summo folliculos aut siliquas Pœoniæ fœminæ non dissimiles profert, quibus dehiscētibus semen in ijs apparet rotundum & rubrum. Radicem obtinet capillamentis multis fibratā.

LOCVS.

Circa sepes & dumeta nascitur, frequēs in Italia, nusquam tamen in Germania, quod sciam, nisi sata provenit.

TEMPVS.

Fructum seu siliquas suas autumnoprofert, ac subinde in ijs, ubi dehiscunt, semen ostendit.

TEMPERAMENTVM.

Vehementer acrem qualitatem obtinet, adeò vt gustata, fauces quasi vrere videatur. Proinde calidam & siccam admodum esse constat.

VIRE S.

Non multum à Staphidis agræ viribus abesse apparet: valenter enim abstergit. Hinc ad scabiem, eius potissimum succus abigendam utilis est. Surculos etiam & spicula perinde atque Xiphium & Xyris, sine dolore extrahit. Cimices quoque necat atque fugat.

ADNOTATIO.

Sphatuliæ fetida cum Xyride magis conuenit.

De Trichomane. Cap. CCCVII.

NOMINA.

T *Περίχλωρις* Græcè, Trichomanes, Capillaris Latinè vocatur. Officinis Politricon falsò dicitur: id enim



nominis Adiāto herbæ, quam hodie Capillum Veneris vocant, Dioscoride & veteribus alijs testibus, debetur. Germanicè [Vvidertodt, oder Abthron] Galli *Polythris* ou *Polytrichō* appellatur. Trichomanes autem à facultate sua Græci nominauerunt, quod scilicet fluentem capillum expleat, & subnasci faciat: *μειν* enim ea gens rarum vocant, *τελμα* autem capillum. Hoc etiam nomine Capillarem Latini dixerunt.

FORMA.

Filici simile est Tri-

Trichomanes.
chomanes, paruum admodum. Ex vtraque parte
Bb ij ordi

ordine quodam folia habet tenuia, Lentis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splendentibus, subnigris & austeris. Cuius equidem descriptionis notæ omnes, nulla penitus reſamante, herbæ illi quàm hodie officinæ Polytrichum vocant, pulchrè quadrant. Siquidem cauliculis iuncis, quincuncialibus, à radice ſtatim penè foliatis conſtat, folijs rotundis lenticulæ forma, aduerſis inter ſe pediculis, ramulis ſubnigris & nitentibus, ſine flore, ſine ſemine,

LOCVS.

Nafeitur in paluſtribus atque ymbroſis locis, humentibus muris, & iuxta fontes, haud ſecus atque Adiantum,

TEMPVS.

Capitur æſtate & autumnii initio.

TEMPERAMENTVM.

Trichomanes in caliditate quidem & frigidityte ſymmetrum eſt, verùm deſiccatur, extenuatur & digerit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Eadem poteſt quæ Adiantū, Cū itaque Adiantū aliud in Germaniam ſit deportandum, & Trichomanes paſſim proueniat, licebit hoc in alterius inopia vti. Et conſultius multò vſ Trichomane vſatur Officinæ, quàm Adianto adulterino. Prodeſt igitur Trichomanis decoctū potū aſthmaticis, dyſpnoicis, ſelle ſuffuſis, lienosis, vrinæque difficul-
tatibus, Calculos frangit. Aluum ſiſtit. Venenatorum morſibus, & ſtomachi fluxionibus in vino potū medetur. Menſes & ſecundas ducit, ſanguinis autē reiectiones ſiſtit. Crudū illinitur venenatorum morſibus. Alopecias explet, ſtrumas diſſicit. Furſures & achores cum lixiuiō exterit. Cum ladan-
no, myrtino, ſuſino, aut hyſſopo & vino capillos deſſuētes continet. Decoctum etiam eius cū lixiuiō & vino ſi eo abſtergantur, idem poteſt,

EX GALENO.

Alopecias denſat, & ſtrumas & abſceſſus diſcutit, lapides que frangit potum. Viſcoſorum craſſorumque ex thorace pulmonēque exereationibus non mediocriter conſert. Ven-
tris profluuium ſiſtit, nullam tamen manifeſtam calidita-

tem affert, sicut nec frigiditatem.

EX PLINIO.

Calculos è corpore mirè pellit, frangitque vtique nigrū. Qua de causa potius quàm quod in saxis nasceretur, & à nostris Saxifragū appellatum crediderim. Bibitur è vino quātum terni decerpere digiti. Vrinam cient. Serpentiū & araneorum venenis resistunt. In vino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex ijs sedat. Cōtra scolopēdrę morsus illinuntur, crebrò auferendi ne pereant. Hoc & in alopecijs. Strumas discutiunt, surfuresq; in facie, & capitis manantia vlcera. Decoctum ex his prodest suspiciosi, & icciori & lieni, & felle suffusis, & hydropicis. Strangurię illinuntur, & renibus cum Absinthio. Secundas cient & menstrua. Sanguinem sistunt ex aceto, aut Rubi suceo poti. Infantes quoque vlcerati perunguntur ex ijs cum rosaceo & vino prius. Folium in vrina pueri impubis, tritum quidem cum aphronitro, & illitum ventri mulierum, ne rugosus fiat, præstare dicitur. Perdices & gallinaceos pugnatiores fieri putant, in cibum eorum additis, pecoriq; esse vtillissimos.

De Teli. Cap. CCCVIII.

NOMINA.

TΗΛΙ, καπαιτις ἀγυρίης, Βοόκερας Græcis, Fornumgræd cum Latinis: Officinæ genuinum nomē retinuerunt Germanis [Bochshorn, oder Kuehorn.] Gallis *Senegré*, ou *Fenugrec* dicitur. Magna græcarum appellationum pars à siliquarum quas producit figura desumpta est: hæ enim corniculis similes existunt. Hinc Ceraitis à cornu simpliciter dici cœpit: κέρας enim Græcis cornu est. Aegoceros autem à caprini cornu similitudine, quemadmodum à bubuli Buceros: quod sane nomen Theophrastus libro quarto de historia plantarum illi imposuit. Cum itaque corniculis similes habeat siliquas, factum est vt illam Columella simpliciter Siliquam nominauerit. Plinius Siliciam, Varro Siliculam.

*Fœnumgræcum.*

Cauliculis emicat exilibus, rubicundis, foliis penè Trifolij, flore candido & exiguo, semine in siliquis oblongis, ac cornu instar incuruis fuluo. Radice subrotunda & oblonga innititur.

LOCVS.

Satum Fœnogræcum passim ferè prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, & vnà siliquas producit. Semen tamen in Augusto maturum legitur.

TEMPERAMENTVM.

Fœnumgræcum calidum est secundi ordinis, desiccatur primo.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Molliendi & disijciendi facultatem habet Fœnogræci farina. Facit ad inflammationes quæ intus forisquæ sunt si cum aqua mulsa decocta trita illinatur, Lienem cum nitro & aceto subacta & illita minuit. Decoctum eius in seculo ad muliebria mala, quæcunque per inflammationes aut præclusiones cōsistunt, vtile est. Expressus Fœnogræci in aqua decocti succus, capillos, furfures & achores exterit. Cum anserino adipe pessi vice apponitur, loca quæ iuxta vterum sunt, emolliens & relaxans. Viride cum aceto imbecillus & exulceratis locis prodest. Decoctū eius aduersus tenesmos,
&

& grauiter olentia dysentericorum excrementa confert. Oleum eius cum myrtino capillos & in genitalibus cicatrices abstergit.

EX GALENO.

Fœnumgræcum feruentes inflammationes irritat. Quæ verò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

EX AETIO.

Fœnum græcum habet etiam abstergendi vires. Varijs modis comeditur, sed copiosius sumptum caput tentat. At cremor decocti Fœnogræci cum modico melle exhibitus, omnes deprauatos intestinorum humores educit, Permodi cum esse oportet quod permiscetur mel ne erodat. In diuturnis verò doloribus qui sine febris thoracem infestât, pingues simul palmulæ elixantur, inde succo expresso mellèq; admixto suppositis carbonibus rursus decoquantur vsque ad congruam consistentiam. Datur id diu ante cibum, obseruariq; oportet ne ijs exhibeatur quibus facilè caput dolet: palmulæ enim capiti infestæ sunt.

EX PLINIO.

Vis eius siccare, mollire, dissoluere. Succus decocti fœminarum pluribus malis subuenit: siue duritia, siue tumor, siue contractio sit vuluæ, fouetur, insidunt. Infusum quoque prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur. Item ex aceto. Sic iecinori decoctum. Diocles difficilè patientibus semen eius dedit acetabuli mensura tritum in nouem cyathis sapæ ad tertias partes bibere, vt qui biberent in calida lauarentur. Et in balneo sudantibus dimidium ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquum, pro summo auxilio. Farinam Fœnogræci cum hordeo aut lini semine decoctam aqua mulsâ contra vuluæ cruciatus subiecit. Itémque imposuit imo ventri. Lepras, lentigines, sulphuris pari portione mista farina curauit, nitro antè præparata cute, sæpius die illinens, perungique præcipiens. Theodorus Fœnogræco miscuit quartam partem purgati Nasturtij acerrimo aceto ad lepras. Damion Fœnigræci semen acetabuli dimidia mensura cum sapæ & aquæ no-

uem cyathis ad menses ciendos dedit potu. Nec dubitatur quin decoctum eius vilissimum sit vuluis, interaneisque exulceratis, sicuti semen articulis atque præcordijs. Si verò cum Malua decoquatur, postea addito mulso potus, ante cætera vulnis interaneisque laudatur: quippe cum vapor quoque decocti plurimum possit. Alarum etiam graecolentiam decoctum Fœnogræci semen emendat. Farina porrigines capitis surfurisque cum vino & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem decocta addita axungia genitalibus medetur. Item paroridi, podagræ, chiragræ, articulis, carnibusque quæ recedunt ab ossibus, Aceto verò subacta luxatis. Illinitur & lieni decoctæ in aceto, & melle tantum. Carcinomata, subacta ex vino purgat, mox addito melle per sanat. Sumitur & sorbitio è farina ad pectus exulceratum, longamque tussim. Diu decoquitur donec amaritudo desinat, postea mel additur.

ADNOTATIO.

Fænugracum corruptè, vulgus per S, loco F, Senegree.

De Telephio. Cap. CCCIX.

NOMINA.


TΕΛΙΦΙΟΝ, ἢ ἀνιζων ἄγριον Græcis, Telephium & Illecebra Latinis, Officinis & vulgo Crassula maior appellatur. Sunt qui Fabam crassam, à foliorum quam cum faba habent similitudine, nominent. Germanis [Vvundkraut, Knabenkraut, Forz zvvang, Fotz vvein,] Gallis quibusdā Grassète, Alijs Orpin, Alijs Chicotrin dicitur. Telephiū verò dictum est, quòd vlcenibus malignis & deploratis, quibus Telephus Mysiæ rex ab Achille vulneratus conuenit, quæ eam etiā ob rem Telephia vocatur, auxilietur.

GENERA.

Dioscorides duo genera facit. Vnū floribus albis, quod nobis Telephium album nominare placuit, Germanicè [Vvundtkraut das vveible.] Alterum floribus luteis, quod Norimbergæ me vidisse memini. Damus pro illo Telephiū purpurascensibus floribus emicans, quod ad differētiā prio

ris *Telephium purpurascens* appellare voluimus. Germanicè [Vundkraut das mennle.] Præter flores, qui in primo candidi sunt, in hoc autem purpurascens, foliorum etiam colore differunt, qui in candido viridis & herbaceus existit, in purpurascens autem paulò pallidior. Cætera omnia in ijs similia apparent, folia potissimū, quæ fabacea prorsus sunt, nisi quod pinguiora, & crassiora existunt.

FORMA.



Telephium album.



Telephium purpurascens.

Folijs & caule *Portulacæ* similis herba *Telephium*. Alas binas in singulis foliorū geniculis inhærentes habet. Ramuli à radice senī septenive prodeunt, referti folijs cœruleis, crassis, glutinosis, carnosis: flores illi lutei, vel albi, vel purpurascens: radix ima (quod *Dioscorides* omisit) innumeris tuberibus scatet. Non est autem cur diuersum *Tele-*

phium hoc nomine ab ea herba, quā herbarij hodie crassulam maiorem nominant, suspicemur, cum omnes reliquæ notæ à Dioscoride commemoratæ, illi admodum conueniant. Et solemne certè est Dioscoridi ut multas notas, in his potissimum herbis quas ipse nō vidit, atq; adeo ex aliorum fide pingit, easq; maximè quidem necessarias omittat, & silentio transeat. Quibus etiam accedit locus natalis, & facultates Telephij, quæ eadem sunt cum ijs quas Crassulæ maiori recentes herbarij adscribunt. Sunt qui alterum acetabulum esse putent, quorum sanè sententiam non admodum absurdam esse iudico.

LOCVS.

Nascitur, inter vites, locis cultis, humidis.

TEMPVS.

Vere statim profilit, Iulio autem & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Telephium exiccat ordine secundò intenso, aut certè principio tertij, non tamen insigniter calida, verum in hoc forsitan quispiam ipsum primi esse ordinis censeat.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Folia senis horis illita, albas vitiliginis sanant: sed oportet postea hordeacea farina illinire locum. Quinetiam alphas tollunt cum aceto in sole inuncta. Sed ubi inaruerint, absterguntur.

EXGALENO.

Telephium detergendi & exiccandi facultate est præditum: proinde ad putrida vlcera conuenit, & leucas & alphas cum aceto sanat.

EXPLINIO.

Illinitur lentigini, & cum inaruit teritur. Illinitur et vitiligini, ternis ferè mēsis horis noctis aut diei, postea farina hordeacea illinitur. Medetur et vulneribus et fistulis.

APPENDIX.

Recentiores herbarij sua Crassula maiori in curandis vulneribus, & sistendo sanguinis profluuium vtuntur, ut eandē esse cum Telephio vel hoc saltē nomine nemo dubitare debeat.

beat. Magnam autem efficaciam habere in internis potissimum vulneribus & vlceribus, mirificęque herniolis prodesse ijdem tradunt.

ADNOTATIO.

Telephium pingit vulgò Gallorum Orpin dictam herbam, in qua tamen quadam desiderantur.

De Trinitatis Herba. Cap. C C C X.

NOMINA.

QUO nomine priuatim planta hæc Græcis aut Latinis appellata sit medicis, ignorare me fateor. Cõstat tamen Violæ inodoræ genus esse, & mea quidem sententia Iouis florem. Vulgus à triplici colore floris, herbam Trinitatis nominat. Sunt qui Iaceam, & herbam clauellatam appellant. Germani [Dreyfeltigkeyt bluomen, & Freyschamkraut,] Galli Herbe de la Trinité ou pensee vocant.

FORMA.

Herba hæc folio est initio rotundo, per ambitum serrato, processu temporis oblongiore, cauliculo triângulo, intus cauo, leuiter striato, & interuallis geniculato: prodeuntibus ex alarũ sinu pediculis lōgis, in quibus summatim elucet flores figura & specie violarum purpurearum, superiore parte purpurei, in medio candidi, anteriori verò lutei, radijs quibus



Herba Trinitatis.

busdam nigris distincti. Quibus decidentibus semina protuberant

LOCVS.

Sua sponte in aruis interdum prouenit. In hortis tamen vt plurimum plantatur, speciosiorque nascitur.

TEMPVS.

Vere viola hæc post purpuream emicat, & tota æstate floret.

TEMPERAMENTVM.

Herba in gustu lentorem quandam, atque modicā acrimoniam seu mordacitatem præ se fert, atque adeò à Simphyti temperamento non admodū abesse videtur, id quod etiā ex facultatibus quas illi recentiores tribuunt faciliè deprehenditur. Calida itaque & sicca est.

VIREs.

Quum acrimonie ratione incidendi vim quampiā habeat, idè rectè recentiores asthmaticis, pulmonisq; phlegmonibus prodesse tradunt: collectum siquidem in thorace & pulmone pus expurgare potest. Hac ratione puerorum etiam comitialibus morbis auxilio esse solet. Cæterū non parū ad pruritum & scabiem cōfert, omniaq; cutis vitia emendat, idque mediocris acrimonie & siccitatis ratione. Vlcera etiam, quia viscositatem obtinet glutinare potest.

ADNOTATIO.

Herba trinitatis, nobis Pensée.

De Teutlo. Cap. CCCCXI.

NOMINA.

TΕΥΤΛΟΝ, ἢ σΙΥΤΛΟΝ Græcis. Beta Latinis appellatur. Germanis [Mangolt, oder Pießeln.] Gallis *Pourree*, *Bette*, *Reparee*, *Iotte*. σΙΥΤΛΟΝ autē Græci ab impulsu nominarunt: etenim cultus ratione quadā incrementū capescit arboris neque vlli hortensium latitudo foliorū maior. Betæ nomē sibi adsciuit, quoniam figuram β literæ græcæ dum semine turget, referre videtur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtinet. Id quod testatū nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu hortorum ita canens.

Nomi

Nomine tum graio, seu litera proxima prima,
 Pangitur in cera docti mucrone magistri:
 Sic & humo pinguis ferrata cuspidis iclu
 Deprimitur: folio viridis pede candida Beta.

G E N E R A.

Eius à colore omnes duo genera faciunt, candidam & nigram Candida alio nomine Sicula, vt Theophrastus libro octauo de historia plantarum, & Plinius libro decimono- no capitulo octauo, memoriae prodiderunt, appellatur. Et nunc ex trita litera vna ferè omnibus nostri seculi medicis Sicla nominatur. Germanicè [vveisser Mangolt] Nigra ad atrum videtur tendere colorem, & à Germanis [roter Mangolt] vocatur.

F O R M A.

*Beta candida,**Beta nigra.*

Cau

Caulem habet striatum, bicubitalem, folium ferè Atriplicis, flores exiguos, luteos, semen in caulibus copiosum: radicem vnicā in longum protensam, è cuius lateribus alix, modò singulæ, modò binæ: nonnunquam ternæ funduntur, fibris multis refertæ.

LOCVS.

In hortis passim & cultis nascuntur locis Betæ.

TEMPVS.

Julio & Augusto mensibus floribus & semine turgent.

TEMPERAMENTVM.

Nitrosa qualitate particeps est. Nigra tamen adstrictionis quippiam adiunctum habet, & magis in radice quā in alijs partibus. Simeon Sethi calidā & siccā esse in tertio ordine asserit.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Nigra Beta cum Lente cocta aluum efficacius cohibet. multoque magis radix. Cādida aluo utilis est. Vtraque vero propter nitrosam vim quā habet mali succi est. Vnde succus earum cum melle naribus inditus caput purgat. Aurium etiam doloribus auxiliatur. Decoctum radicum & foliorū surfures & lendes deterget. Perniones foru mitigat. Crudis folijs alpos nitro prius perfriictos, alopecias prurientes, atque depascentia vlcera illini prodest. Cocta exanthematis, erysipelatis, & ambustis medetur.

EXGALENO.

Beta nitrosæ facultatis est particeps, quia tū extergit, tū digerit, & per nares purgat. Cæterum cocta nitrositatem omnē exuit, fitque facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter discentientis. Porro ad detergendum digerendumque validior est Beta alba. Nam nigra adiunctum habet quippiam adstrictionis, & magis in radice quā alijs partibus. Betæ itaque absterforius inesse succus conspicitur, adeò vt aluū ad excretionem extimulet, & nonnunquam stomachū demordeat, præsertim ijs quibus ille sensilior obtrigit: coque largius commansa, stomachum infestat. Huins ceu aliorū olerum exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quā Malua, aptius accommodatur, magis autem vbi cū Sinapi estur,

estur, aut aceto. Lienosos item similiter manducata, mirificè iuuat.

EX PLINIO.

Nec Beta sine remedio est vtraque: siue candidæ, siue nigræ radix recens & madefacta, suspensa funiculo, contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida Beta cocta, & cum Allio crudo sumpta, contra tineas. Nigræ radices ita in aqua coctæ, pruriginem tollunt, atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres & vertigines, item sonitum aurium sedat, infusus ijs. Ciet vrinam. Medetur dysentericis iniecta, & morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus. Et contra serpentium ictus valet, sed huius radices duntaxat expressus. Ipsa verò decocta, pernionibus occurrit. Albæ succus epiphoras sedat, fronte illita. Aluminis pauco admixto, ignem sacrum. Sine oleo trita licet, adustis medetur. Et contra eruptiones papularum cocta. Eadem contra vlcera quæ serpunt. Illinitur & alopecij crudæ: Et vlceribus quæ in capite mauant. Succus eius cum melle naribus inditus, caput purgat. Coquitur & lenticula addito aceto, vt ventrem molliat. Validius cocta, fluctuationes stomachi sistit & ventris.

EX SIMEONE SETHI.

Eius succus mediocriter abstergit. Hic etiam ventrem ad effluxum proritat, & stomachum aliquando vellicat, eorum præsertim qui hunc valde sensilem obtinent. Quapropter edulium est stomacho infestum, si plurimum comedatur. Exiguum est eius alimentum, sicut cæterorum olerum. Vtilis verò est ad iccoris obstructions cum aceto comesta. Pari modo si edatur, & lienis obstructionibus bonum fit medicamentum. Constat autem Beta ex contrarijs facultatibus. Succus enim eius calidus est, ventrem constringit, & sitim affert. Eius verò corpus crassarum partium, flatuosum, concoctu difficile & frigidum, ventremque sistit, maximè si qua in aqua coctum est, subinde abijciatur.

DE-

De Tinctorio flore. Cap. CCCXII.

NOMINA.

AN herba hæc veteribus cognita fuerit nondum compertum habemus: quapropter ad germanicâ alludentes appellationem, Tinctoriû florem interim dum certius nomē nacti fuerimus, nominabimus. Germani [Gilb oder Streich oder Ferbblumen,] quòd florum illius in tingendis libris & alijs quibusdam vsus sit, nuncupant. Sunt qui [Ackerpfrimmen] vocant. Galli *Herbe à iauuir*.

FORMA.

Genistæ non admodum dissimilis est hæc herba: ramos enim herbaceos, vt illa habet, ac scabros, folia tamen paulò longiora & latiora, ad Hyssopi serè formam accedētia: florem luteû, Piso similem: semen in siliquis Lenticulæ haud adsimile: radicem planè ligneam.

LOCVS.

Prouenit locis altis, incultis & aridis, atque pratis nonnullis.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atque deinceps semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Amara est haud aliter quàm Genista, vt calefacere illam & siccare in altero ordine sit euidentissimum.

VI.

*Tinctorius flos.*

VIRE S.

Vt forma & temperamento Genistæ similis est, sic etiam facultatibus haud dubiè eidem respondet. Has igitur suo loco reperies.

De Tordyllo. Cap. CCCXIII.

NOMINA.

TΟρδύλιον, ἡ τordύλιον, ἡ εἰς αἰ κρηλικόν Græcis: Tordylon & Tordylion, & Sefeli Creticum Latinis, Paulus Gordylion appellat. Germanis [Beervurtz] Gallis *Sefeli* dicitur, vt suprà in capite de Dauco quoque diximus. Nam cum Dauci semen hirsutum sit, vtcunque cætera respondeant, hoc verò minimè: non est cur Daucū esse credamus.

FORMA.

Fruticosa est herbula, semen habens rotundum, geminatum, clypeo simile, subacre & odoratum. Quæ sanè omnes notæ huic herbæ, quæ à Germanis [Beervurtz] dicitur, respondent: vt eius pictura, quam in capite de Dauco reperies, abundè docet. Hanc autem propter radicum similitudinem, inter Daucorum effigies habere locum volumus.

LOCVS.

Nascitur in Amano Ciliciæ monte. In multis etiã Germaniæ nostræ locis copiosissimè prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calfacit & exiccat, vt ex facultatibus eius abundè colligere licet.

VIRE S EX DIOSCORIDE.

Potum eius semen contra vrinæ difficultatem, & ducentis mensibus prodest. Succus verò caulis seminisque adhuc virentis, trium obolorum pondere haustus decem diebus in passo, nephriticos sanat. Efficax etiam radix: cum melle siquidem lucta, quæ in thorace sunt educit.

EX PAVLO.

Gerdylon alij Sefelli appellant, vrinæ & mensibus du-

C c cendis

cendis habile. Radix ipsius ex melle linctā, quæ in thorace hærent, educit.

EX PLINIO.

Combusta potu ciet menses, & pectoris excreationes, efficaciore etiamnum radice. Succus eius ternis obolis haustus renes sanat. Additur radix eius & in malagmata.

De Tithymalis. Cap. CCCXIII.

NOMINA.

T^{Τιθυμάλειος, ἢ τιθυμάλιον} Græcis, Lactaria herba, & Lactuca caprina aut marina Latinis, barbaris & Officinis Esula, Germanis [vvolffs milch] Gallis *Esperge, ou herbe à lait* dicitur. Lactariam autem herbam cōmuni appellatione, ob commune omnibus lac, vniuersum hoc genus vocauerunt. Lactucam verò ab eadem causam, quia scilicet ex hac herba haud secus atq; ex Lactuca secta lac fluit.

Caprinam, quòd capræ Tithymalis vescantur.

G E N E R A.



Septem sunt, Dioscoride & alijs veteribus testibus, Tithymalorum genera. Primus Characias, id est, vallis dicitur, quòd vallis septisq; muniendis idoneus sit. Secundus Myrsinites, à Myrti foliorum figura: aut à nucibus, quibus similem fert fructum, Caryites nominatur. Hunc fructum sunt, qui Nucem vomicam, Germanis [Kronaglin] vocatam, esse putent. Tertius Paralys, id est, marinus, quòd in maritimis nascatur, appellatur. Quartus Helio



Tithymalus Helioscopius.

Helioscopius, hoc est, solisequus, quia eius coma ad solis cursum circumagitur, nominatur. Germanicè [Söuen vuende de vvolffs milch] vocari potest. Alijs nominatè. [großz vvolffsmilch,] Quintus Cyparissias à Cupressi similitudine nūcupatur. Germanicè [Cypressene vvolffsmilch] nominari potest. Sextus Dendroudes, à ramorum copia dicitur. Septimus Platyphyllos, id est, latifolius, à latitudine foliorum nominatur, Germanicè [Breytblettert vvolffsmilch,] alij [großz Teuffelz milch] vocant. Nos ex ijs generibus tria tantum depicta damus, quòd reliqua videre nondum nobis licuerit. Proferent fortè alij longè plura.

FORMA.

*Tithymalus Cyparissias.**Tithymalus Platyphyllos.*

Nos ea tantùm genera quorum picturas exhibemus, omisissis, alijs, describemus. Helioscopius itaque Portulacæ similis

milia folia obtinet, tenuiora tamen atque rotundiora. Ramos autem à radice prodeuntes quatuor aut quinque mittit, dodrantales, tenues & rubentes, copioso lactis liquore plenos. Caput huic est anetho simile, & semen veluti in capitulis inclusum. Circum agitur huiuscoma cum sole, vnde & Helioscopij nomen accepit, Cyparissias caulem emittit dodrantalem, aut maiorem subrubrum, ex quo geminant folia Pini similitudine, teneriora tamen ac tenuiora. Et in vniuersum Pino nuper natæ similis est. vnde & nomen traxit. Abundat hæc etiam succo candido. Platyphyllos Verbasco similis est, longioraq; reliquis folia habet.

LOCVS.

Helioscopius in ruderibus potissimum, & circa oppida nascitur. Cyparissias in campestribus frequentissimus occurrit. Platyphyllos verò in syluis,

TEMPVS.

Semen Tithymalorum Autumno legitur, succus verò incipiente pomorum lanugine.

TEMPERAMENTVM.

Vincentem habent acrem calidamq; facultatem, inest verò & amaritas. Ex quarto itaque calefacientium sunt ordine, & valenter desiccant.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Vim habet Characiæ liquor lacteus aluum per inferna purgandi, pituitam & bilem ducens, duorum obolorum pondere ex posca sumptus. Cum melicrato autem vomitum cit. Appetente vindemia lacteus colligitur liquor. Depilat liquor hic recens ex oleo in sole inunctus, renascentesque flamos & exiles efficit, tandemque omnes destruit. Cauernis dentium inditur, leuatq; dolores: sed eera dentes oblinendi, ne effluens fauces aut linguam vitiet. Idem inunctus myrmecias, achirochordonas, thymos & impetigines tollit. Valet etiam aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas, gangrænas, fistulasque. Semen & folia eadem lacteo succo præstât, dimidij acetabuli pondere pota. Radix drachmæ pondere cum hydromelite insparfa & pota per inferna purgat. Decocta cum aceto, colluto ore, dentium dolori auxiliatur. Helioscopius eandem priori vim habet, non tamen usque adeo
intem

intensam. Nec diuersam facultatem obtinent. Cyparissia & Platyphyllos.

EX GALENO.

Validissimus Thymalorū liquor est. Secundum locum tenet semen & folia, Sed & radix earundem facultatū particeps est, sed non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maximè qui illis erosīs proueniūt. At liquores vt qui valentiorē vim habeant, in foramina quidē ipsa dentium induntur. Cæterū si aliam corporis partem contigerint, cōtinuò adurunt, vlcera tūc: quapropter foris illis cera circumlinitur. Sic pilos quoque succus inūctus tollit. Porro quum vehementior sit, oleo miscetur: & si id sæpe fiat, tandem prorsus radices pilorū adustæ corrūpentur, corpusq; depile reddetur. Eadem facultate myrmecias acrochordonas, pterygia & thymos auferunt, detergentq; lichenas & pforas, quia scilicet abstergēdi illis facultas inest propter amaritudinem. Præterea vlcerū phagedænica, anthracæde & gangrænæde, quia valenter calefaciunt & abstergunt, si in tempore & moderatè quis vtatur, luuare poterunt. Verumenimuerò & fistularum callos, eadem facultate adimunt. Porro hæc omnia genere quidē similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos vtī assolēt. Celerrimè nanque ab illis in verriginem acti, ac semimortui redditī, ad aquæ superficiem feruntur. Cæterū quum septem sint eorum genera, valentissimus est quē Characiā nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur ad modū arboris: deinceps qui Verbasco adsimilis est, & Cyparissias: post Paralius, denique Helioscopius. Proportione verò cōprehensæ illorum facultatis & cinis & lixiuium erit.

EX PLINIO.

Tradunt tories purgari hydropicos sico sumpta, quot guttas lactis Characiæ exceperit. Est & semen in vsu cum melle decoctum ad catapotia soluendæ alui gratia. Semen & dentium cauis cera includitur. Colluntur & dentes succo radice decoctę in vino, aut oleo. Illinunt & lichenas succo, bibuntque cum vt purgent vomitiones, & aluo soluta, aliàs stomacho inutile. Trahit pituitā sale adiecto in potu

bilem aphronitro. Si per aluū purgari libeat, in posca: si vomitione, in passo aut aqua mulsa. Media potio tribus obolis constat. Ficos à cibo sumpsisse melius est. Fauces vrit leniter. Est enim tam feruentis naturæ, vt per se extrà corpori impositum, pustulas ignitum modo faciat, & pro caustico in vsu sit. Helioscopius trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo. Cæteri vsus qui Characiæ. Cyparissæ eadem vis quæ Helioscopio aut Characiæ. Platyphyllos pisces necat, aluum soluit, radice vel folijs, vel succo in mulso, aut aqua mulsa drachmis quatuor. Detrahit priuatim aquas.

ADNOTATIO.

Tithimalorum genera passim Luxuriant. Reueille matin Galis dicuntur, opinor quòd vrente acrimonia insomnia pariant.

De Triphyllo. Cap. CCCXV.

NOMINA.

Tριφυλλος Græcis, Trifolium odoratū Latinis, Officinis simpliciter Trifoliū dicitur. Germanis [Sibengezeit,] propterea qd singulis diebus septies odorē suū habeat & toties etiā amittat, quandiu in horto creuerit. Decerptū enim & exiccatum, odorem suum perpetuò retinet. Qui certè pluuiosa temporis constitutione ac tempestate instāte multò vehementior est, sic sanè vt totas ædes, in quibus hæc herba reposita est, odore suo compleat. Potest etiam appellari commodissimè [Vuoltriechender Klee.]

FORMA.

Frutex est cubito altior, virga habens tenues, nigris, iunctisq; adnascentijs multis præditas, in quibus folia Loto arbori similia sunt, terna in singulis germinationibus. His recens enatis odor Rutæ inest, austis verò iam bituminis. Florem emittit purpureum, semen modicè latum & sub hirsutum, ex altero extremo apicem obtinens. Radix illi tenuis, longa, valida. Ex qua quidem delineatione satis constat herbam, cuius picturam damus, esse Trifolium odoratum: siquidem cubito altior est, caules tenues obtinens, vnde ramusculi multi nigricantes quodammodo, ac iunccioriuntur, qui singuli terna folia producant odorata Flores.

*Trifolium odoratum.*

TEMPERAMENTVM.

Calidum est & siccum in tertio ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Semen & folia in aqua pota lateris dolore laborantibus, difficultati vrinx, comitialibus, incipienti aquæ inter cutē, valuzq; strangulationibus auxiliatur. Menses etiā ducūt. Oportet autem seminis tres, foliorum verò quatuor drachmas dare. Succurrunt & venenatorum moribus folia trita cum oxymelte & pota. Referunt quidam, si totius fruticis radicis & foliorum decocto foueantur, facti ex serpentium moribus dolores, eos mitigari. Si verò aliud vlcus habens eodem illo decocto quo quīpiam sanatus fuerit foueatur, eadem sentit quæ morfi à serpētibus. Dant quidam etiam in tertianis bibenda folia eius tria, aut toridem semina cum vino, in quartanis autem quatuor, veluti quæ circuitus solvere possunt. Miscetur verò eius radix & antidotis.

Cc iij EX

Flores etiam habet in purpureo cæruleos: Semen quoq; Milio haud dissimile ī folliculis modicè latis, pilosis, & in summitate aculeum habentibus, profert. Radicem denique longā, candidam ac validam habet vt prorsus nihil sit quod descriptioni nō respondeat.

LOCVS.

Sponte sua in Germania non prouenit. Satū verò nulla difficultate prodit.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde semē producit.

EX GALENO.

Triphyllum potum laterum dolores ab obstructione
natos iuuat, urinam & menses prouocat.

EX PLINIO.

Trifolium scio credi præuakre cōtra serpentū iētus &
scorpionū. ex vino aut posca, seminis granis viginti potis,
vel folijs, & tota herba decocta, serpētēsque nunquā in Tri-
folio aspici. Præterea celebratis autoribus contra omnia
venena pro antidoto sufficere vigintiquinque grana eius.

APPENDIX.

Debet eius Trifolij odorati vsus esse subinde in omnibus
Officinis, quod mirificè venenis aduersetur et ad vicia ma-
lefica sananda perquam utile sit.

APPENDIX ALTERA.

Non latet hanc herbam propè accedere ad descriptionē
Loti syluestris. Caulem namque fert bienbitalem, & aliquan-
do maiorem, numerosis alarum cauis. Folia Trifolio quod
in pratis nascitur similia: semen Fœnogræco ita respōdens,
ut nisi minus esset, vix ab inuicem discerneres: sapore item
medicato. Tamen non minus accedit etiam ad Trifolij a-
cuti picturā. Frutex enim verius esse quā herba videtur,
cubito maior, virgas habens tenues, nigras, iuncosa adnata
obtinentes, in quibus sunt folia Loti in singulis pediculis
tria, in ambitu cuspidibus serrata, ut hinc cōmodissimè dici
mereatur ῥόσπυλλον. Hæc etiam odorata sunt vehemēter, ut
nonnullis caput offendant: & ad bituminis certè odorem
proximè accedunt, sed non parum tamen suauior & mēu-
dior est. Flore in præterea ex se mittit purpureum, hoc est,
ad purpuræ colorem nonnihil accedentē: ex albo enim pur-
pureus, aut subcæruleus est. Semen etiam modicè latum, et
sub hirsutū, ex altero fine veluti cornu obtinēs. Quod ego
non de ipso quidem nudo semine, sed de eius potius follicu-
lo, quod in cacumine planè aculeatum ac veluti cornutum
existit, intelligendū puto. Radix denique illi longa, gracilis,
& tenax existit. nihilque est in tota descriptiōe quod ei aptis-
simè non quadret. Accedit præterea amaritudo quæ in se-
mine nō est obscura, pulchrè sibi etiam Trifolij odorati fa-
cultas

cultates vendicans: mouent enim quæ amara sunt vrinam, menses ducunt, comitialibus profunt, aliæque quæ Dioscorides Trifolio huic adscribit effigere possunt. Quare ijs rationibus motus, à concepta sententia discedere uondum queo, nisi contingat nobis aliam intueri stirpem, cuius semina, atque adeo grana ipsa hirsuta, & cornuta existant. Quanquam non lateat parum admodum referre verā sententiam, nostram aut aliorum amplectaris, cum Lotus & Trifolium facultatibus non multum aut ferè nihil distent. In hoc tamen semine, quod nos Trifolij odorati esse cōten dimus, nulla inesse apparet adstrictio, quam tamen in Loti semine Dioscorides requirit. Quod pro confirmanda nostra sententia adijcere volumus.

De Trifolio pratensi. Cap. CCCXVI.

NOMINA.

Tριφυλλον ἢ χροκοκίσιον γινώσκοντες Græcis, Trifolium pratense Latinis dicitur. Officinæ Latinum nomen retinuerunt, & simpliciter Trifolium vocant. Utendum verò illis esset odorato Trifolio, quemadmodum altero ab hinc capite diximus. Germanis [Vvyfenklee,] Gallis *Trefle* nominatur.

GENERA.

Tria apud nos passim in pratis prouenientia Trifolij inueniuntur fastigia: quorum primum à floribus purpureis, Trifolinum pratense purpureum, Germanicè [braun Vvyfenklee] Gallicè *Trefle purpuree*. Alterum itidem à floribus suis candidis, Trifolium pratense candidum, Germanicè [Vveisz vvyfenklee] Gallicè *Trefle blanc*. Et tertium luteum, Germanicè [geel Vvyfenklee] Gallicè *Trefle ianne* appellauimus. Quòd ad folia ipsa attinet, non admodum differunt: quoduis enim horum generum tribus constat folijs, quæ in primo sunt latiora & herbacea, in secundo autem longiora & angustiora, magisque palleſcentia candicantiāve: in tertio sunt minora & rotunda, atque ad Fœnigræci folia accedentia. Sunt qui hoc genus Lagopum esse putent. Sed de Lagopo suo diximus loco.



Trifolium pratense purpureum. *Trifolium pratense album.*

Caulem rotundū, cubitalem obtinent, ramos exiles, folia per interualla tria: flores in summo aut purpureos, aut candidos, aut luteos: radicem longam & lignosam.

LOCVS.

Scatent ijs prata omnia, vnde etiam nomen nata.

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Adstrictoriæ cuiusdam qualitatis sensum gustu præ se ferunt, nō tamen multum admodum, vt nihilominus sint tenuium partium & exicatoria, quandoquidem etiam exigua quasi acrimonia prædita videantur.

*Trifolium pratense luteum.*

VIREs.

Haud dubiè mediocriter concoquendi & exiccandi vim possident, vt non temerè quidam ex recentioribus herbarijs tradāt Trifolia hæc albo muliebri pfluuio mirificè conferre. Eadem etiā inflammationibus imposita, eas cōcoquūt, & ad maturationem perducunt.

De Tragopogone.
Cap.

CCCXVII.

NOMINA.

Tραγώγων, ἡ κομή Græcis nominatur, Latinis Hirci barba, & Coma: officinis ignota est herba. Germanis [Bocksbart, & Gauchbrot] Gallis Barbe de Bouc dicitur. Hieronimus herbarius Braunschuuigensis magno errore hypocisthida in hac herba nasci putauit. Sic autem eā Græci vocarunt, quoddā à calyce eius promissæ pendeāt barbæ, vel rectius quod lutei illius flores in volucres barbular cuanescent.

FORMA.

Caulem habet exiguum, longum tamen, & bicubitalem interdum, geniculatum: folia crocæ similia, radicem longam

*Tragopogon.*

gam & dulcem, supra
caulem calycem magnū
& in eius summo semen
nigrum, florem luteum,
qui in canescentes bar-
bulas fathiscit. Hæc etiā
cū carpitur lacte ma-
nat.

LOCVS.

Sua sponte in pratis
nascitur.

TEMPVS.

Maior & Iunior men-
sibus floret.

TEMPERA-
MENTVM.

Dulcedo quæ in radi-
ce ac tota ferè plāta ap-
paret, satis monstrat eā

esse caliditate tepida præditam, & modicè humidam.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Herba & cruda & cocta edendo est.

APPENDIX.

Ex recentiorum traditione, & temperamenti ratione,
æstuantis stomacho utilis est herba, thoracis & iecoris vitis-
renū item & vesicæ malis. Succus eiusdem mirificè laterū
doloribus auxiliatur.

De Typha. Cap. C C C XVIII.

NOMINA.

TΥΦΑ Græcis, Typha Latinis, officinis inusitata. Ger-
manis [Mosz, oder Narrenkolb] dicitur, A nonnullis
[Knospen vnd Liefzen. Gallis Marteau ou Plante semblable
aux masses de Bedeaux.

FOR

FORMA.



Folium profert Cyperi simile, caulem læuē, enodem, cuius in summo capite flos obducitur densus, euadens in pappū seu lanuginem. Quę descriptio huic plāte sic quadrat, vt nulla sit nota quę reclamet. Folio siquidem Cyperi diserumpit, caule alto, leui, plano, enodi, cuius cacumen densa florū cōgeriæ stipatur, & veluti ipissa cingitur lanugine, quę in pappos tandem euanescit.

LOCVS.

Gignitur in palustribus & stagnantibus aquis.

TEMPVS.

Iulio mense caulis lanosa floccorū densitate obducitur, Augusto autem in pappos abit, & euanescit.

TEMPERAMENTVM.

Quantum ex viribus eiusdem colligi potest, nō euidenter, potissimū eius flos, calefacit & refrigerat, modicęque abstergit, atque ad eō exiccat. Quum enim ambustis medetur, & ambusta. Paulo libro quarto, capite xj, teste, medicamenta quę mediocriter citra insignem caliditatem aut frigiditatem abstergunt, requirāt: sequitur hoc quale diximus temperamentum obtinere.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Flos eius cum suillo adipe vetusto eloto exceptus, ambustis medetur.

AD

ADNOTATIO.

Thypha in stagnis frequens: Marteau quibſdā dicitur, quod flos dura densitate longus, mallei formā & pondus imitetur, Cetera omiſimus, quod vel eſſent medicis nota, vel nomen vulgō & officinis nō haberent, aut ſaltem non aliud quā quod à Faſchſio diligentiffimè ſcribitur. Cuius deſus & magnis Laboribus gratia imprimis eſt habenda quos in plantis non ſolum deſcribendis, ſed etiam aſſabre pingendus in ſtudioſorum gratiam inſumpſit. Longe interim valere iuſſis, qui omnia calumniari, nihil vtile meditari ſolent.

De Turcico frumēto. Cap. CCCXIX.

NOMINA.

HOC frumentum, vt alia multa, ex eorum eſt genere quæ aliundè ad nos tranſlata ſunt. E Græcia autem & Aſia in Germaniam venit, vnde Turcicum frumentum appellatum eſt: ſiam enim vniuerſam hodie immaniſſimus Turca occupat. Germani etiam ad loca vnde afferitur reſpicientes, [*Turckiſh korn,*] Galli *Blé de Turquie* nominant.


GENERA.

Quatuor huius frumenti reperiuntur genera. Quoddā enim grana ruſa, quoddam verò purpurea, aliquod lutea, aliquod ſubcandida grana profert. Spicarum ſeu panicularum etiā in ijs eſt diuerſitas: etſi enim omnes muticæ ſint, tamen alia candidos, alia luteos, alia purpureos, prout ſcilicet grana colorata erunt, flores obtinet. Aliās, quod ad formam attinet, in ijs nulla eſt differentia.

FORMA.

Culmum habet craſſum, rotundū, altū longūmve, infima eius parte purpureum, geniculis interſectū: folia oblōga & harundinacea, in ſummitate paniculas, aut ſpicā muticam, & granis vacuam, inſtar *Secales* florentem, nunc luteo, nūc cādido, nūc purpureo colore, prout fructus quem profert coloratus eſt. Fructum verò & grana triangula, diuerſis iam cōmemoratis coloribus tinēta, in foliaceis rotundis ac craſſis mēbranis ac vaginis, quæ è lateribus geniculorū ſerē ſingulorum prodeunt, cōtenta obtinent, coacer-

uata

*Triticum Frumentum.*

uata ac penitissimè iuncta, inque octo aut decē versus ordine digesta. E. fastigio vaginarum capilli tenues, iam candido, iam luteo, nunc purpureo colore maculati dependent, vt pictura satis ostendit: quæ vnica quidem tibi omnia genera repræsentabit. Hæc in vna vagina quatuor tibi granorū colores monstrat, cum tamen quæuis vnus duntaxat coloris grana: nempe aut lutea, aut purpurea, aut rufa, aut subcandida omnia habeat. Quod nos, ne aliquem pictura deciperet, monendum esse diximus.

LOCVS.

E Græcia vel Asia, vt dictum est, primum ad nos peruenit. Nunc autem passim in omnibus hortis prouenit.

TEMPVS.

Seritur, mense Aprili, nec nisi sub finem Augusti & initia Septembris ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedinem & lentorem quendam grana gustu præ se ferunt, vt haud dubie idem cum Tritico habeat temperamentum.

VIRE S,

Cum idem cum tritico habere videatur temperamentum, easdem etiā obtineat facultates necesse est. Grana itaque teruntur in candidissimā farinā, quæ in panificia subinde

inde cogitur. Panis tamen ille lentoris quidam & obstruētis naturæ habet. Hinc est quòd in Asia & Turcia illius nulum in cibo vsum esse, nisi cum annonæ præmit inopia, dicunt. Cæterum foliorum succum refrigerandi facultatem obtinere tradunt, hinc ad erysipelata vtilem admodum esse coniiciunt.

De Thymo.

Cap. CCCXX.

NOMINA.

Θϋμϋ Græcis, Thymus Latinis, herbarijs vulgaribus Serpyllum Romanum, haud dubiè ab odore què cum Serpillo communem habet, dicitur. Officinæ antiquum nomen retinuerunt. Germanis [Thym, et Romischer quen del] Gallis Tyn, ou Thym, ou Mariolaine d'Angleterre vocatur. Thymus autem Græcis ab excitando, quod θυμ dicunt, nomen inuenit. Nonnullis potius hoc placet etymum, vt

Thymos quasi thymos, hoc est, sanguinem impellens dicatur.

FORMA.



Thymus.

Thymus furculosus frutex est, minutis multis & angustis folijs circumdatus, in summo capitula floribus purpureis referta habens. Ex qua sanè delineatiōe omnibus cōspicuum fit, herbam cuius picturam damus esse Thymū. Dodrātalis enim & furculosus frutex est, folijs exiguis, flosculis ex purpurea candicantibus, suauissimi odoris, capitella spe

specie complicatarum formicarum, radice lignosa, enascen-
tias virides multas obrinente, quibus in terra radicator.

LOCVS.

Nascitur petrosis & tenuibus locis: neque enim locum
pinguem, neque stercoreatum, sed apicum desiderat. Nunc
in hortis multis Germaniæ prouenit.

TEMPVS.

Floret serò (quod Theophrastus etiam libro sexto de
historia plant. capi. ij. testatur) circa Solstitia, cum & apes
decerpunt, & augurium mellis est.

TEMPERAMENTVM.

Thymus vehementer calefacit. Itaque in calefaciendo
& exiccando in tertio ordine statuendus est.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Potus cum sale & aceto, pituitam per aluum ducit. De-
coctum eius cum melle orthopnoicis & asthmaticis prodest.
Lumbricos ventris, menses, fetus & secundas pellit. Vrinā
ciat. Mixtus melle in eclegmate, excreabilia efficit thoracis
vitia. Recentia ordemata cum aceto illitus discutit. Sangu-
inis grumos dissoluit. Tymos & verrucas pensiles tollit.
Ischiadicis cum vino & polenta impositus auxiliatur. He-
beribus oculis in cibo sumptus opitulatur. Vtilis etiam pro
condimento in sanitatis usu.

EXGALENO.

Thymus incidit, & calefacit manifestè: ob id & urinam
& menses prouocat, fetus euellit, & viscera potus expur-
gat, educendis ex thorace & pulmone confert.

EXAETIO.

Hæc experimentis de Thymo comperta sunt. Dato iei-
nis articulari morbo laborantibus Thymi aridi minutissi-
mi drachmas quatuor cum oxymelitis cyathis: Bilem enim
reliquosque humores atque acrem semen euacuat. Facit &
ad vesicæ mala. Ventre inflatis, vbi intumescere cœperint,
drachmam vnam dato ieiuno cum cochleari aquæ mulsæ.
Ad lumborum coxendicūque dolorem, laterisque & tho-
racis, ac hypochondriorum suspensiones, ac inflationes,
pondere trium drachmarum cum oxymelite temperato,

Dd mca

mensura cochlearij ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mēte turbatis, timorēque detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati cochleari præbeto. Dato itē ieiunis & ante cœnam aduersus lippitudinem, & vehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motū omnino interceperit, cum vino vtilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes, ieiunis triū drachmarum pondere exhibeatur.

EX PLINIO.

Oculorum claritati multum conferre existimatur, & in cibo, & in medicamentis. Item diutinæ tussi eclegmate faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguinem crescere non paritur è melle. Longas Faucium destillationes extrà illita cum Sinapi extenuat. Item stomachi & ventris vitia. Modicè tamen vtendum est, quoniam excafcacit, quamuis sistat aluum: quæ si exulcerata sit, denarij pondus in sextariū aceti & mellis addi oportet. Item si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace. Præcordijs medentur ex aceto cum melle: quæ potio datur & in alienatione mentis & melancholicis. Datur & comitialibus, quos correptos olfactus excitat Thymi. Aiunt & dormire eos oportere in molli Thymo. Prodest & orthopnoicis & anhelationi, mulierūq; mensibus retardatis. Vel, si emortui sint in vtero partus, decoctū in aqua ad tertias. Viris verò contra inflationes, cum melle & aceto. Et si venter turgeat, testēsve aut vesicæ dolor exigat. E vino tumores & imperus tollit impositum. Item cum aceto, callum & verrucas. Coxendicibus imponitur cū vino. Articularibus morbis triū obolorum pondere in tribus cyathis aceti & mellis. Et in fistidio, tritum cum sale.

De Teucurio. Cap. CCCXXI.

NOMINA.

TΕΥΚΡΙΟΝ, ἢ χαμαίςβρυς Græcis, Teucrion Latinis appellatur. Officiniis ignotum. Germanis [groß Bathengel] dicitur. Teucrium autem vocatū est Græcis pariter & Latinis, q̃ Teucer Aiakis frater hoc inuenerit. Inuentum
verò

verò ab eo sic tradit Plinius. Quum extra in sacrificio super id proiecta fuissent, heni adhæsit, eumque exinanuit. Proinde quod casus ostenderat, obseruatumque à Teucro fuit: ad æternum humani beneficij decus & famam illi accreuit. Diuersum tamen hoc Teucrium ab Hemionitide, quòd à Plinio etiam Teucrium appeilari diximus. Chæmædry autem nominata est hæc herba, quòd Chamædry similima sit, adeò vt vicissim etiam Chamædry hoc nomine vt suo dicemus loco, dicta sit Teucrium. Maius tamen est Teucrium quàm sit Chamædry, vt meritò Germanis [groß Bathengel] nuncupari queat. Galli *Germandree bastarde* vocant.

FORMA.

*Teucrium.*

Herba est virgæ referens effigiem, Chamædry similis, tenui folio, non multùm Ciceri dissimile. Hæc quanquam breuissima sit Teucrij delineatio, tamen abundè monstrat herbà hanc cuius picturam exhibemus, esse verum Teucrium, cùm nihil Chamædry magis simile dici queat, si diligenter vtriusque plantæ notas expendas.

LOCVS.

Nusquam, quod sciã, sponte sua in Germania pronenit. Satum tamen copiosè nascitur. In Cilicia plurimum habetur.
Dd ij TEM

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus: ac subinde semē producit.

TEMPERAMENTVM.

In secundo excalefacientium, tertio autem exiccantium existit ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Viride cum posca potum, aut aridum decoctū ac haustū lienem potenter minuit. Lienosis cum ficis & aceto illinitur. Venenatorum autem moribus cum aceto sine ficis.

EX GALENO.

Teucrium incidentis, & tenuium partium facultatis est, quare lienes sanat.

EX PLINIO.

Recens Teucra in posca, vel sicca deferuefacta, potu lienem efficaciter consumit. Item ex aqua illinitur. Pota arida & decocta quantum manus capiat, in aceti heminis tribus licni medetur. Ad vulnus illinitur eadem cū aceto, aut si tolerari non possit, ex fico vel aqua. Serpentium plagis imponitur cum aceto tantum.

De Hyperico. Cap. CCCXXII.

NOMINA.

YΠΕΡΙΧΟΝ, ἄνθος βασιμον, χαμαίρις Græcis, Hypericum Latinis dicitur. Nomen latinum in Officinis seruat. Vulgus herbariorum Perforatam vocat, quod folia soli obiecta innumeris foraminibus scatere, & omni ex parte punctis quibusdam pertundi videantur. Herbam quoque diui Ioannis appellant. Germanis [S. Iohans Kraut] Gallis *Mille pertuis* ou *Trucheran*, nominatur. Androsæmon ob florem qui digitis confricatus sanguineum emittit liquorem, dixerunt. Chamæpitys verò ab odore seminis refinaceo nominata est. Fugam dæmonum aliqui, quod superstitione quadam inducti, fugare posse dæmones crediderint, appellauerunt.

FORMA.

Folia Rutæ similia habet, furculosus frutex, dodrātalis, rubescens. Florem luteum, qui digitis attritus sanguineum emittit

*Hypericum.*

emittit succum, qua ratione Androsæmū quasi humanum dixeris sanguinem, appellatur. Siliquas gerit hirsutas, in rotunditate obliōgas, hordei magnitudine, in quibus semen nigrum, resinam obolens. Cuius nimirum descriptionis notæ ita herbæ illi, quam Perforatam vocant nostri temporis herbarij, respondent: ut nemo, nisi prorsus præfæcto sit animo, Hypericum esse deinceps reclamare possit. Siquidem surculosa est herba dodrantalis, subrubens, folio Rutæ, flore luteo, quem si digitis libeat terere, manus pro-

fecto inuenies sanguineo succo cruentatas. Siliqua denique terere, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo itaque in Perforata inueniuntur, quæ esse Hypericum certam tibi faciunt fidem: cruentus nempe floris triti succus, odorq; seminis resinacens. Qui diuersum sentiūt. haud dubiè Marcelli Florentini interpretatione falsa seducti sunt, qui flore albo constare Hypericum asserit: cum tamen in Dioscoride sit, ἄνθος ἰχθυοειδὲς, hoc est, florem luteum habens.

LOCVS.

Gignitur in cultis, & asperis locis.

TEMPVS.

Æstate floret, Iulio potissimùm & Augusto mensibus.

Dd iij

TEM

TEMPERAMENTVM.

Hypericam calefacit & exiccat, tenuisque substantiæ est.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, menstrua ducit appositum. A tertianis quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta.

EX GALENO.

Menses & urinas prouocat: sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Cum folijs illitus viridis ad cicatricem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Cæterum si sicca contusa inspergas, humida & putredinosa ulcera sanabis. Sunt nonnulli qui ischiadicis bibendum exhibent.

EX PLINIO.

Natura semini Hyperici spissandi. Aluum sistit, urinam cit, ad calculos vesicæ cum vino bibitur.

De Hyoscyamo. Cap. CCCXXIII.

NOMINA.

Υοσcυμ. Græcis, Hyoscyamus. Apolinaris Latinis dicitur. Arabicus Plinius Altercum vocari testatur. Officinis corrupta voce Iusquiamus dicitur. Germanis [Bilsamkraut.] vel simpliciter [Biseti.] Gallis *Iusquame, ou Hanebane*. Hyoscyamon autem Græci videntur appellare quasi fabam suillam aprinamve, quod (vt in historia sua Hehanus inquit) pastu huius herbæ cōuellantur sues aprive, præsentis mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Adeuntque aquas non vt proluant se tantum, verum etiam vt caneros venantur, ijs enim natæ protinus sanitati restituantur. Atque hinc est quod à nonnullis etiam Germanis [Sevvbon] nomenclatur. Apollinarem verò Latini ab Apolline medicinæ inuentore dixerunt.

GENERA.

Tria sunt Hyoscyami genera. Vnum purpur eos fer
flores

flores, folia Smilaci similia, semen nigrum, cytinus duos & spinosos. Hoc nigrum herbarij appellant. Alterum flores luteos ceu mali effigie, folia & siliquas teneriores, semen subflauum ceu Irion: flauum vocât. Et hoc est, quod pictum damus. Tertium vtile ad medicinam, placidissimum existens, pingue, tenerum, lanuginosum, flore & semine candido: album nominât. Quodd si verò illud non ad sit, vtendum flauo erit. Nigrum vt deterrimum improbandum.

FORMA.



Hyoscyamus flauus.

Frutex est caules emit-
tens crassos, folia lata,
oblonga incisa, nigra,
hirsuta. Per caulē deinceps
flores prodeunt veluti
mali punici cytini,
clypeolis septi, semine,
vt Papaueris, plenis.

Quid multa? Frutex est
tristi aspectu, folio lato,
lōgo, pingui, hirsuto, venoso,
& laciniato: caulibus
crassis, ē quorum latere
flores prodeunt tāquam
mālorum punicorum
cytini, muricatis calycibus,
ramos continuae serie
vestientibus, semine
intus Papaueris refertis.

LOCVS.

Primum genus in Galatia nascitur. Alterum pascim circa littora, & inter ruinas & rudera prouenit. Tertium in maritimis & ruderibus.

TEMPVS.

Semen nullum nisi postquam inaruerit legendum. Flo-

Dd iij ict

ret ferè per integram ætatem, potissimùm Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Candidus ex tertio quodammodo ordine refrigerantium est. Reliqua duo genera venenosa.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Exprimitur succus ex tenero semine, folijs, caulibusque in quem vsum tunduntur omnia, expressusque in sole siccat. Vfus eius ad annum vsque: facile enim putrescit. Exprimatur priuatim etiam succus ex arido semine, aqua calida perfuso, tuso & expresso. Est verò succus liquore præstantior, & magis dolores finit. Herba autem virens contusa, & trimestri farinæ mixta in pastillos conformatur & reconditur. Prior verò succi expressio, & quod à semine exprimitur, collyrijs dolorem lenientibus commodè miscetur, & contra acres calidâsq; fluxiones, dolores auris, & vulvæ vitia. Cum farina autem aut polenta, contra oculorum, pedum, aliâsq; inflammationes. Semē eadem potest. Facit ad tussim, destillationem, oculorum fluxionem, vehementes dolores, muliebria profluvia, aliâsq; sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaveris semine, & aqua mulsa potum. Confert podagris, testibus inflatis, mammisq; à partu turgentibus, si tritum cum vino illinitur. Miscetur vtiliter & alijs cataplasmatidis dolorem leuantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per se, & cum polenta mixta vtiliter illinuntur. Recentia ad mitigandos omnes dolores illinuntur. Tria aut quatuor cum vino pota, hepialas febres sanant. Decocta olerum modo, & triblij mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si in colo vlcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

EXGALENO.

Hyoscyamus cuius semen atrum est, insaniam & soporem affert. Huic is cui semē mediocriter sanum est propinquam facultatem obtinet. Fugendi autem utrique sunt vti inutiles & venenosi. Cæterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est.

EX

EX PLINIO.

Hyoscyamum contra canum morsus valet, inq; vulnera cum melle imponitur. Contusum cum folijs ex vino datur peculiariter contra aspidas. Eius succus sanguinem excreantibus medetur. Nidor quoque accensi tussientibus. Vsus seminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & caulibus folijsque vtuntur, & radice, temeraria in totum (vt arbitror) medicina. Quippe etiam folijs constat mentem corrumpi, si plura quam quatuor bibantur. Etiam antiqui in vino febrem depelli arbitrabantur. Et oleum fit ex semine, quod ipsum auribus infusum tentat mentem.

De Hyacintho. Cap. CCCXXIIII.

NOMINA.

YAKIVBΘ Græcis, Hyacinthus Latinis, Officinis inognitus, Germanis [Blav Mertzenbluemlin,] quod videlicet cū Viola purpurea in Martio & primo vere erumpat, appellatur. Gallis *Iacinthe*, ou *vacet*.

GENERA.

Duplices sunt Hyacinthi, albi, & cœrulei, vt ex hoc Columellæ carmine colligi potest: Necnon vel niueos, vel cœruleos hyacinthos. Albos verò non intelligas prorsus candidos, sed eos potius qui, si cum cœruleis conferas, pallefcere videntur, quemadmodum pictura affabrè tibi demonstrat. Germani album fœminam, sicut cœruleum marè vocant. Sunt qui ad ætatem hanc differentiam coloris referre volunt, quorū ego sententiam veriore esse existimo: cū enim adolefcunt, pallefcere incipiunt. Cœruleum autem Hyacinthum nostra terra triplicem producit, vt è pictura manifestè cernere licet: maximum, maiorem, & minorem. Minor floribus differt plurimum à maiore: in illo enim maiores ac patentiores, in hoc autem minores & quasi orbiculati sunt flores. Omnibus autem descriptio (vt ex ijs quæ statim subiciemus planum fiet) pulchrè conuenit, vt hinc congeneres herbas esse conijcere cuius liceat.

Dd v

FOR



Hyacinthus cæruleus
maximus.



Hyacinthus cæruleus
maior.

Folia Bulbo similia habet, caulem dodrantalem, laeuem minimo digito tenuiorem, viridem, commâ adiacentem incuruam, plenam florum purpureorum, radicem & ipsam bulbosam. Hæc cerè descriptione ita picturis, quas damus quadrat, ut nulla prorsus sit eius nota quæ illas non appositissimè exprimat. Folia siquidem Bulbi protinus à radice prodeunt, caulis dodrantalis, laevis, & minimo digito tenuior, herbaceus, coma procumbens incurua, plena florum purpureorum, radix bulbacea. Verùm posset aliquis cautilati, hos quos descripsimus flores non esse Hyacinthos, quod in ijs discurrentibus venis Græcarum literarum figuræ (ut Plinius lib. xxj. cap. xj.) producit, ut Poëtæ fabulantur) haud inscripta legatur. Cui sic respondemus. Hyacinthum,



*Hyacinthus cæruleus
minor.*



*Hyacinthus albicans.
seu sœmina.*

thum, quem Dioscorides & alij historici describunt, diuersum esse ab eo de quo Poete fabulatur. Cuins rei testis est Pausanias, qui refert florem qui natus est extincto Aia-
ce apud Salamina, non esse Hyacinthum, sed literis Hyacintho similem videri, ex candido rubentem, ac Lilio minorem, quemadmodum Ouidius, itemque Vergilius describunt. Idem etiam autor Cosmofandalon dici florem apud Her-
mionenses, Træcenij confines testatur. Cum itaque constet duplicem esse Hyacinthum, alterum rubentem, cum literis illis inscriptis, qui à Poetis describitur: alterum verò purpureum seu cæruleum (nihil enim refert vtrum dixeris, quod Dioscorides per purpureum colorem violaceum dilutum, hoc est clariorem & apertiore, quem cæruleum vocamus, intellexerit nam & Plinius lib. 37. cap. 9. Hyacinthi colorem
vio

violaceum dilutū vocauit) sine literis, à Dioscoride alijsq; historicis descriptum: nihil enim Dioscorides in suo Hyacintho de literis commemorat. Haud igitur temerè in Vergilio ferrugineos hyacinthos, non cœruleos, sed rubentes ad similitudinem ferruginis quispiam interpretabitur: potissimum cum Poetarum Hyacinthus, non cœruleus, sed rubens sit, quemadmodum alibi Vergilius & Pausanias docere. Rubet etiam color ferrugineus. Neque obstat quod Nonius ferrugineos hyacinthos cœruleos interpretatus est: is enim cœruleum tantum Hyacinthū nouerat. Quod si verò hæc morosis quibusdam non probabuntur, sed prorsus funestas literas inscriptas esse contendant: ijs ita responsū volo: Quas in Hyacintho literas appellāt Poetæ, veras non esse, sed potius notas quasdam nigras: id quod hinc palā fit. Plinius libro decimo octauo, capitulo duodecimo. vbi de leguminibus loquitur, literas lugubres in flore etiam fabæ ex sententia M. Varronis reperiri tradit: in quo tamen flore non literas vllas, sed nigras tantum notas, vt res ipsa & pictura docent, inspicere licet. Quod si nec ista satisfecerint, dicemus tum penitus fabulosum esse quod regum nominibus inscriptum Poeta florem hunc canit. Sic enim id credendum erit, credendum etiam, quod idem ex puero transformato natus sit. Vel (quod verò similis est) de regijs florum appellationibus. Poeta iocum struxisse videtur, cum pastorem inducit sciscitantem, quibus in terris inscripti nomina regum nascuntur flores: sunt enim complures flores quibus à suis inuentoribus regibus nomina sunt indita. Neque nunc vlla prorsus regum permultorum extaret memoria, nisi in florum nomenclaturis, qui nominibus regum inscripti sunt, asserueretur.

LOCVS.

Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod Galli, apud quos, Plinij etiam testimonio, eximiè prouenit, vt in suis commentarijs de natura stirpium vir eruditione clarns Ioānes Ruellius auctor est, nemoralem vel agrestem cepam nominant. Et eius certè magna est copia verno tēpore in nemo-

re hand procul à vico Lufchenau iuxta Tubingam fito, vt
vel ex natali etiam satis constat flores hos quos pictos exhi-
bemus, esse genuinos Hyacinthos.

T E M P V S.

Vere, mensibus nimirum Februario & Martio, cum vio-
la purpurea, Theophrasto lib. 6. de Stirpiū historia, capit.
vltimo teste, erumpit: hinc Martium florem Germanis no-
stris dictum esse supra monstrauius. Hoc potissimū tem-
pore prorumpit is, quem Hyacinthū minorem nominaui-
mus. Exit etiam, eodem Theophrasto autore cū Gladio-
lo, qui vernus etiam flos est. Quo sanè tempore is maximè
flore, quem maiorem appellauimus. Proinde cū tempus
etiam conueniat, nemo est qui deinceps veros esse Hyacin-
thos, dubitare meritò possit, aut debeat.

T E M P E R A M E N T V M.

Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccand-
do, secundi verò completi, aut incipientis in refrigerando.
Semen autem tertio quadātenus ordine desiccat, in medio
caliditatis & frigiditatis consistens.

V I R E S E X D I O S C O R I D E.

Hyacinthi radix pueris cum vino albo illita impuberes
seruare creditur. Sistit aluum. Pota vrinā ducit, & phalan-
giorum moribus auxiliatur. Semen magis adstringit, &
cœliacis prodest. Potum cum vino regium morbum e-
mendat.

E X G A L E N O.

Radix pueros diutissimè seruare impuberes in vino il-
lita creditur. Semen regio morbo affectis, in vino exhi-
betur.

E X P L I N I O.

Radix Hyacinthi in vino dulci illita, pubertatem coer-
cet, & non patitur erumpere. Torminibus & araneorum
moribus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes &
scorpiones, morbumque regium, semen eius cum Abroto-
no datur.

D E

De Hyssopo. Cap. C C C X X V.

NOMINA.

Υ ^{Ξωπ} Græcè, Hyssopus & Hyssopū Latine, Officina nomen legitimum retinuerunt. Germanicè [Isphen oder Isop,] Gallicè Hyssoppe vocatur.

GENERA.

Duum generum Dioscoridi Hyssopus est, hortensis & montana. Hortensis quæ in hortis prouenit, ac culinarum causa colitur, [garten Isphen] Germanis vocatur. Montana quæ in montibus nascitur, & Germanicè [Birg Iscen] appellari potest.

FORMA.



Hyssopus hortensis.

ciam obtinentem. Id quod verum est.

Herba est pedali altitudine hortensis, fruticosa, folio Satureiæ fatiæ, floribus in cæruleo purpurascens, thyrsos spicæ modo vestientibus, radice lōga & lignosa, Mōtana prior laud dissimilis est. Errant qui nostram Hyssopū hortensem non esse verā putāt: habet enim planè foliū origani, nisi quod angustius est. Nec plures sunt eius apud Dioscoridē noræ. Nam quæ de umbella quidam obijciunt, nihil ad hyssopum attinent: cum simpliciter scribat Dioscorides, Origanum nō habere umbellam rotæ spe

LOCVS.

In hortis, vt diximus, hortensis, in montibus verò montana nascitur. Cæteris præfertur quæ in Tauro monte prouenit.

TEMPVS.

Aestate floret, quo etiã potissimum tẽpore carpenda venit.

TEMPERAMENTVM.

Hyssopum calefacit & desiccet ordine tertio: sed & tenuium est partium.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Vim habet extenuandi & calefaciendi. Decocta cum ficis, aqua, melle, ac ruta, & pota, perispnemonicis, asthmaticis, tussis vetustæ, destilationis & orthopnœæ opitulatur. Lumbricos necat. Cum melle linctâ idem præstat. Decoctû eius cum oxymelite potum crassitudinem per aluû ducit. Estur cum ficis viridibus, aluum subducens. vehementius purgat adiecto illi cardamomo, aut iride, aut erysimo. Colorem bonum præbet. Cum fico & nitro illinitur ad lienē. aquam intercutē. Cum viuo ad inflammationes. Discutit sugillata cum aqua feruenti illita. Angina laborantibus cû decocto ficorum optimum gargarisma. Decocta cum aceto, dentium dolorem collutione mittigat. Inflammationes quæ circa aures sunt, suffitu soluit.

EX PLINIO.

Hyssopum in oleo contritum phthiriasi resistit, & prurî gini in capite. Stomacho est cōtrariû. Purgat cû fisco sumptum per inferna, cum melle vomitionibus. Putât & serpentium ictibus aduersari, tritum cum melle & sale & cummulo.

De Hydropipere. Cap. CCCXXVI.

NOMINA.

Υδροπίπερι Græcis, Hydropiper Latinis, Officinis inco-
gnitum. Germanis [Vualserpfeffer, oder Mucken-
kraut] Gallis *Curage* nominatur. Hydropiper autem à locis
quibus nascitur, & piperis sapore quem præ se fert quasi di-
xeris piper aquatile, appellatum est. Muscæ denique ab eo
vehementer abhorret: neque enim id quod succo eius asper-
sum

sum est, attingunt, hincque adeò alteram appellationem Germani illi indiderunt.

FORMA.



Hydropiper.



Hydropiper rubrum.

Caulē æditgeniculatum, robustum, circa quem alarum cōcavitates, & folia Menthæ similia, maiora, teneriora, cãdidioraq; gustu piperis acri nō tamen odorato. Semē in ramulis fert secūdum folia nascens, cōtinua serie congestum, racemosum, & acre. Radicē exiguā & inutilem. Ex qua descriptione satis constat herbam hanc, cuius imaginem damus esse *Hydropiper*: nulla siquidē nota est, quæ illi non cōueniat. Caulis enim eius geniculatus, solidus, circa quem alæ panduntur, & folia Menthæ consimilia, maiora tamen, hoc est longiora multò, tenuiora & albiora. Quæ singula faciliè diligens quispiam oculis lustrabit. Si
verò

verò linguam consulat, folia meram piperis acrimoniam resipiunt, nullam tamen odoris suauitatem in eis deprehēdet. Quòd si reliquam faciē excusserit, offendet semē prope folia enatum racematim cōgestum & quadam serie cohærens, ipsumque acre. Accedunt denique natales: facultates, & alia, vt nullus planè ambigendi locus relictus sit. Damus hic etiam alterius herbæ quæ in aquis prouenit picturam, quam nonnulli Hydropiperis speciē esse arbitrantur, quæ ferè Hederæ folia obtinet, & secundum ea semen, Ari semini haud dissimile. Nos à colore seminis appellauimus Hydropiper rubeū, Germanicè [rot Vvasser pfeffer. Huius herbę & racemosus fructus, & folia acrimonia sunt prædita.

LOCVS.

Gignitur prope stantes aquas, aut quæ leuiter fluunt. Copiosè prouenit ad flumen Pegnicum haud procul à Norimberga.

TEMPVS.

Floret Augusto mense floribus albis spicatim cohærentibus, ac subinde semen minutum profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est, nō tamen vsque adeò vt piper, & siccum: id quod gustus abundè docet.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Folia cum semine illita, ædemata, veteresq; duritias discutiant. Sugillata delent. Siccata & tusa pro pipere sali & opsonijs miscentur. Radix parua, nullius in medicina vsus.

EXGALENO.

Hydropiper à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cum pipere gustu est, nomen sortitum est. Cæterum calidum est, sed minùs quàm piper. Atque herba ipsa etiamnum viridis cum semine cataplasinatis in modū imposita, sugillata, induratos tumores digerit.

EXAETIO.

Hydropiper herba est in aquosis nascent, ramusculis ac folijs Menthæ similis, maior tamen, gustu acerrima vt piper, per exigua semina singulis folijs ferens. Calida quidem

Ec est,

est, non tamen accedens piperi: quæ recens illita, sugillata ac duritia sanat. Hanc nonnullis condimentis piperis loco addunt.

APPENDIX.

Cum interea temporis dum sub prælo sunt nostri cōmē tarij, quomodo veteribus sit appellata herba, quam Hydro piper rubeum vocauimus, diligentius cogito: tertiam Dracontij apud Pliniū lib. 24. cap. 16. speciem esse cōperio: hanc enim ita pingit, Tertia demonstratio fuit folio maiore quā Cornus, radice harūdinca, totidē (vt affirmabāt) geniculata nodis, quot haberet annos totidemq; esse folia. Hi ea ex vino vel aqua cōtra serpētes dabant. Quæ quidē notē huic etiam herbę cōpetere videtur. Est enim folio maiore quā Cornus, radice harūdinca, nodisq; geniculata. An verò tot nodis sit geniculata, quot habet annos, totidemq; folijs: nō dum obseruare potuimus. Quinetiā vniuersa tum foliorū tum fructus forma, acrisque sapor, Ari ac Dracontij genus esse euidenter ostēdunt. Facultas deniq; cōtra serpentes, quā Dioscorides suis etiā tribuit Dracōtjjs, abundē quod contendimus docet. Non est autē (vt quidā existimant) Plinij Aris, quod eius radix oliuæ grandis magnitudinē atq; formam nō referat. Hanc nostram de hac stirpe sententiā hoc loco referre placuit, ne quis nos illam Hydropiperis esse genus pertinaciter asserere ac tueri velle existimet.


De phlomo. Cap. CCCXXVII.

NOMINA.

Φάριμα Græcè, Verbascum, Latine, Officinis. Tapſus barbatus dicitur. Sunt qui Cadelā regis, Cadelariam, Lanariāmque nōninent. Germanicè [Vlkrut, Kertzenkraut, vnholden Rertz, Himelbrant, Brēnkraut] Galliçè *Boillon blanc, ou noir* vocatur. Phlomon autē haud dubiē dixerūt Græci, quod ea pro ellychnijs vtatur. Cadelaria quoque recentiores nominarūt, quod caulibus eius adipe, seuo, vel aliquo pingui illitis, nonnulli pro lucernis vtantur.

GENERA.

Verbasculū omnium veterū testimonio duo habet summa genera


*Verbascum candidum mas.**Verbascum candidum fœmina.*

genera. Candidum enim alterum folijs, nigrum alterum est. Candidum rursus in marem & fœminam digeritur. Præter tria hæc, & sylvestre habetur. [V vild V vullkraut] Germani appellant. Sunt etiam Verbascula duo, quæ à nostris herbarijs herbæ paralyfis, & vulgò arthericæ, cùm arthriticæ dicendum esset, vocantur. Germanicè [Schlijffel bluomen.] Gallicè *Cogner*. Horum vnũ est odoratum, alterum odoris expers. Prius Germanicè simpliciter [Schlijffel bluomen, oder gelb Schlijffel bluomen, Himelschlijffel, oder S. Peters schlijffel,] alterum [V vild Schlijffel bluomen, oder V versz Himelschijffel] appellant. Est & tertiũ Verbasculũ, quodd Lychnitum, alij autem Tryallida appellant, Germani [Marienrosen] vocant. Hæc sunt genera Verbasci quemadmodum à Dioscoride & Galeno cõmemorantur, quorũ

Ec ij fanè

sanè omnium picturas damus, excepto vltimo, quod hoc tempore nondum floruerat. Quanquam distingui genera hæc (vt Plinius libro xxxv. cap. x. ait) pene superuacuum sit, cum sint eiusdem effectus omnia,

FORMA.



Verbascum nigrum.



Verbascum sylvestre.

Verbascum candidum foemina, Brassicæ similia folia habet, multò tamen hirsutiora, latiora & candida. Caulis eius cubitalis & amplior, candidus, subhirsutus. Flores albi aut subpallidi. Semen nigrum. Radix longa, acerba, crassitudine digiti. Candidum mas à foliorum candore *Leucophyllò* Græcis dictum, oblongioribus & angustioribus folijs, & tenui caule. Nigrum in cunctis candido simile, nisi latioribus nigrioribusque constaret folijs. *Sylvestre* virgas fert altas & arborescentes, folia *Saluæ* similia. Habet verò circa vir-

gas ramulos Marrubij modo. Florem luteum, auri fulgore. Verbascula duo hirsuta, terræ inhærentia, humiliâve: folijs rotundis, & multò minoribus, rugosis, è quibus medijs stylus exilit tenuis, palmi altitudine, incanus, in cuius vertice terni, quaterni, & plures etiâ dependent flores lutei, summis labris denticulati, in altero odorati, in altero inodori: calyculo in album pallefcente, Lychnitis siue Thryallis folijs ternis, aut quaternis, aut etiâ plusculis, crassis, pinguibus, hirsutisque, ad lucernarum lumina vtilibus: floribus purpureis.

LOCVS.

*Verbasculum odoratū.**Verbasculum non odoratū.*

Câdidum & nigrum in campestribus, & in syluis etiâ proueniunt. Syluestre in câpestribus, potissimū siccis & la-

pidosis, nascitur. Verbascula duopassim in pratis & hortis
producuntur. Lychnitis similiter alijs in campestribus na-
sci solet.

TEMPVS.

Verbascula duo primo statim vere emicant, certique hu-
ius appetentis nuncij. Hoc sanè tempore carpenda veniunt,
quod confestim fugacia euanescent vita enim illis cū plu-
rimū menstrua, nec temerè ad summum scsquimensē ex-
cedunt. Reliqua genera Autūno, dum florent & semen pro-
ferunt, colligenda.

TEMPERAMENTVM.

Omnia folia desiccandi & detergendi vim possident.

VIRESEX DIOSCORIDE.

Radix priorū duorū adstringit: vnde tali ludicri magni-
tudine in alui profluuiū vtiliter cū vino in potu datur. De
coctū eiusdem ruptis, cōuulsis, cōtufis, & antiquæ tussi au-
xiliatur. Dētiū dolorem collutione mitigat. Verbasculum,
cui flos aurei coloris, capillos tingit, & quocunque repona-
tur blattas in se contrahit. Folia in aqua decocta aduersus
œdemata, & oculorum inflammationes illinuntur. Sydera-
ta vlcera cū melle aut vino, cū aceto autem vulnera sanat.
Cōtra scorpionum ictus auxilio sunt. Sylvestris folia am-
bustis illinūtur. Ferunt fœminæ folia caricis interposita, in
corruptas atque à putrefactione immunes seruare.

EXGALENO.

Priorum duorū radix gustu acerba est, & fluxionis affe-
ctibus prodest. Sed & addentium dolorē eam nōnulli col-
luunt. Folia tamen digerendi vim habent. Sic etiam aliorū
folia, potissimū autem eius quæ aureos flores obtinet. Ca-
pillis quoque flavescere faciunt.

EXPLINIO.

Contra scorpiones bibitur radix cum Ruta ex aqua ma-
gna amaritudine, sed effectu pari. Verbasculum, priuatim tō-
tillīs in aqua potum medetur. Tribus obolis bibitur. Ver-
basculū cuius flos aureus est, cōtra omnia pectoris vitia, tus-
sem, & purulenta excreantibus. Tanta huic vis est, ut iumē-
tis etiam non tussientibus modo, sed ilia trahentibus auxi-
lietur

lietur potus. Lateris & pectoris dolores Verbascum cū Ru-
ra ex aqua sedat. Panos sanat cum sua radice tusum, vino
aspersum & ita cinere calfactum, vt imponatur calidū. Se-
mē ex vino decoctum & contritum luxatis medetur, do-
lorē & tumorē tollens. radici medulla collyrij tenuitate in
fistulam additur. Contusis, euersis, & si febris sit, potatur
in aqua Verbasculū, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto
imponuntur in struma. Semine ac folijs decoctis in vino
ac tritis, omnia corpori infixā extrahuntur.

APPENDIX.

Recentiores duobus Verbasculis hos effectus assignāt.
Trita imponuntur efficaciter articulorū doloribus. Radi-
cis decocto vesicæ renumque obstructions soluantur. Ius
herbæ propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata & li-
uētia. Quod verò hæc eadem possint, teperamētum eorū-
dem palām docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, a-
mara, & modicē acria sunt: vt hoc nomine desiccādi & de-
tergēdi facultatem, quam illis Galenus ascribit, habere, ne-
mo dubitare debeat. Nostri etiam temporis herbarij calida
& sicca esse statuunt. Et mulieres formæ studentes, succo ē
floribus illorum expresso faciem illinunt, quod maculas ru-
gāsque, & alia eiusdem vitia mirifice detergeāt. Vt hinc eni
dentissimum sit herbas, quas [Schlijsselbluomen] vocant
Germani, esse Verbascula.

De fragaria. Cap. CCCXXVIII.

NOMINA.

GRÆCIS Vt herba quæ fraga gerit nominata sit,
certò constituere nobis nondum licet. Sunt tamē qui
βατόρι ἰδαία, hoc est, Rubum Idæum esse putent, eum potis-
simū qui sine spinis inuenitur. Quorum certē sententiā
ob multas variāsque causas (vt in sequentibus dicemus) mi-
nimè repudiādum existimamus. Apuleius Græcis κημαροῖ ἀπ
pellari scribit: quod si verū est, alia sit à Comaro quā Dio-
scorides, Galenus & alij quidam depingunt, necesse est: hæc
enim arbor est, illa autem herba. Ego tamen vidi codicē ma-
nuscriptū, in quo hæc verba: Comarō Græci, Romani Fra-

Ec iij gum -

gum nūcupant, non habebātur. Quicquid verò sit, ex numero Mororum esse constat eius fructū optimi odoris hinc à frago verbo, quod odorē reddo significat, herba ipsa Latinis Fragaria, & fructus fragum dici cœperunt. Germani Erdtbeer. [Galli Fraises, ou herbe portant Fraises] vocāt. Græci autem Comaron appellarunt, ob fructum arboris eiusdem nominis, qui fragis ijs terrestribus similis est, haud dubiè sic dixerunt.



Fragaria maior & minor.

GENERA.

Duo Fragariæ sunt genera. Vna flores fructusq; paulo maiores, altera minores obtinet, nos vna pictura vtranque expressimus.

FORMA.

Humi sine caule spargitur, multis à radice lanuginosis pediculis, quorū alij flores candidi coronantur: alij trigemino
com

comantur: folio per ambitum serrato atque venoso: alij fructum gerunt exiguus quidem Moris haud absimilem, cæterum sui generis, solidum, callosum, tenerum, quum maturuit rubentem, tum gustu tum etiam odore suauissimū. Ra dice foris atra aut rubescente intus candida, multo fibrata capillitio.

LOCVS.

In syluis, dumetis, & in opacis mōtibus, ac secus vias spōte nascitur. Vnde etiam colligi potest esse Rubum Idæum, quando & is in lucis proueniat. In hortis etiam nō nunquā vt grandio rem fructum ministret, colitur Fragaria.

TEMPVS.

Floret vere & tota æstate, inq; maximam autumnī partem. Fructus tamen eius fugax, raro nisi æstatis initio inueniri potest.

TEMPERAMENTVM.

De temperamento Fragariæ recētiore diuersa tradūt. Serapio calidam & siccam in secundo ordine tradit. Alij frigidam & humidam in primo: nonnulli (qui tamen prorsus meo iudicio hallucinari vidētur) in tertio ordine scribunt. Nos folia ipsa gustu modicè esse amara, & adstringere deprehendimus, vt siccam esse hac ratione, & minimè humidam oporteat. Quapropter in tanta sententiarū de eius temperamento diuersitate animaduertendum, idem de Fragaria, quod de Rubo sentiendum esse: nempe quod folia, flores, fructus & radix adstringant. Differt tamen inter se, q; folia potissimū recens nata, plurimū in se habeant aqueę substantiæ, parum vero adstringant: adē vt verisimile sit de ijs locutos esse, qui frigidam & humidam in primo ordine Fragariam statuerunt. Est enim eorum temperies ex terrena frigida essentia, & aquea tepida. Fructus immaturos frigida terrea substantia præditus est, vt frigidus & siccus hoc nomine dici mereatur. Maturus aut nō parū succi temperati calidi, qui dulcis est, modicamq; adstrictionem habet ita vt calidus & siccus dicendus veniat. De fructu itaq; intelligendi erunt, qui Fragariam calidam & siccam esse affirmant. Quare vbi de temperamēto Fragarię agitur, non

simpliciter, sed cum prædicta distinctione respondendum est. Vnde cum idem ferè cum Rubo temperamentum habeat Fragaria, iterum hanc ab Idæo Rubo nihil differre verisimile est.

VIRE S.

Quum recetiores in commemorandis Fragariæ facultatibus partim eas quas Dioscorides Rubo Idæo, partim etiã quas Comoro tribuit Apuleius, vires Fragarię ascripserint opere precium me facturum arbitror, si vtriusque de ijs verba præmiserò: vt nimirum quisque hac ratione, qua propter iuniores ijs facultatibus Fragariam ornauerint, certius intelligere queat.

EX DIOSCORIDE.

Idæus Rubus eadem potest quæ Rubus. Amplius eius flos cum melle tritus & illitus. oculorum inflammationibus auxiliatur. Sacros ignes extinguit. Stomachicis cum aqua potui datur.

EX APVLEIO.

Ad lienis dolorem herbæ Fragi succû ex mellis vncia potui datum, mirificè proficere certum est. Ad suspiriosos eiusdem succus cum pipere albo & melle mixtus, potui datus, mirificum est remediû. Has facultates etiam antiquus manuscriptus herbarius Fragariæ adscribit, nomine tamè Apuleij in Dioscoridis nomen immutato. Addit tamè huius fructum comestum stomacho conferre, & ex succo eius os contra fetorem collui, id quod Serapion quoque tradit.

EX RECENTIORIBVS.

Herba Fragaria in cibo sumpta medetur lienosis, item succus ex melle potus, Idem cum pipere candido datur suspiriosis. Fraga sitim sedant, stomacho proiunt, sed præsertim bilioso. Succus Fragis exprimitur, verustate vires accipiens, præsentaneo remedio ad faciei vlcera, oculorum suffusiones, neque non epiphoras. Radicis decoctum iecinoris feruores mulcet matutino & meridie potum. Vtuntur hodie frequenter Fragaria ad glutinâda vulnera, aluum sistendam, menstrua cohibenda, gingiuas confirmâdas, oris
vlcera

viscera, eiusdemque factorem tollendum, quæ singula Rubus etiam Idæus potest, ut inde rursus conijcere liceat Fragariam ab eodem nihil differre.

De Phu Germanico. Ca. CCCXXIX.

NOMINA.

Φού, ἡ ἀγρία ὑκπός Græcis, Phu & Nardus sylvestris Latinis, .Valeriana officinis & herbarijs nostri temporis, Germanis [Baldrion, Dennenmarek, oder Kotzenkraut oder Augenvurtzel] appellatur, quod scilicet cati odore radices eius, quo eorum oculi roborantur, impense delectentur, Gallicè *Valeriane*.

GENERA.

Duo sunt præcipua Phu genera. Magnum quod alio nomine Theriacaria vocatur. Hoc descriptioni per omnia respondet. Germanicè [groß, Baldrion & Triacks] appellatur. Vulgus herbariorum Valerianam maiorem nominat. Alterum vulgare, quod alio nomine Valeriana etiam vulgaris nūcupatur. Germanis [gemein Baldrion, & Katzenvurtzel] dicitur. Hoc etiam genus à pictura Dioscoridis, ut paulò post fusius docebimus, non abhorret.

FORMA.

Folia Elaphobosco, siue Olusatro similia habet. Caulem cubitalem, aut proceriorem, læuem, tenerum purpurascentem, in medio concavum, geniculis intersectum. Flores ad Narcissi flores accedentes, minores & teneriores, in subalbido purpurascentes. Radices in superiore parte minimi digiti crassitudine. Adnascentes etiam radículas obliquas veluti iuncus odoratus, aut veratrum nigrum, inuicè implicitas, subflauas, bene odoratas, Nardum in gustu referètes, cum quadam virosa grauitate. Ex qua certè descriptione sole clarius fit, herbam quam vulgarem hodie Valerianā nominant, esse Dioscoridis Phu: quod omnia ferè sic illi respōdeatur, ut prorsus nulla reclamare nota videatur. Folia namque huius cum primùm erumpunt. Elaphobosci præ se fe-

runt

*Phlomis magnum.**Phlomis Germanicum.*

runt imaginem: postea verò, dum adolescit in Olusatrâ modum laciniantur. Caulis quoque eius cubitalis, & maior (non enim rarò ad trium cubitorum longitudinem caulis, à nobis visus est) lævis, potissimùm in infima eius parte denique tener, purpurascens, in medio concavus, geniculatus. Flores eiusdem, qui summis caulibus emergunt, Narcissi certam exprimunt effigiem, quanvis minores sint, atque adeò teneriores. Vt hoc nomine cum Ruelio in Græcis codicibus Dioscoridis *ῥίονα μίζονα* legendum esse putem. Nisi quis existimet Phlomis Ponti, quod Dioscorides potissimùm describit, fauentis cæli beneficio maiusculos habere flosculos. Prædicti etiam flores acervatim coeuntes in purpuram candicant. Radices quoque in superiore parte minimi digiti crassitudinem obtinent, multaque radículas obliquas, Schœni, aut nigri Veratri modo sibi ipsi impli-

citas

eitas, subflauas, odoratas, Nardum, cum virofa tamen grauitate, imitantes. Quum itaque hæ omnes notæ, Valerianæ nostrę respondeant, multorumque consensus nobis subscribat, & facultates eius quas illi recentiores tribuunt, planè cum ijs quas Dioscorides Phu adscribit cōueniant: quid impediat cur non certò affirmemus Valerianā hanc vulgarem esse Phu Dioscoridis, non video: præsertim cū manu scriptus etiam herbarius Phu esse Valerianam apertè doceat, ita vt mirari satis non queam, cur aliquot docti viri in Germania nostra, diuersum astruere voluerint.

LOCVS.

Nascitur in humectis locis, & prope aquas, hæcque ad mirandam altitudinem surgit. Prouenit etiam in lucis & cædis syluis, sed hæc in tantam proceritatem non emergit.

TEMPVS.

Floret integra æstate.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse in secundo ordine tradunt.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Phu calefacit. Sicca pota vrinam mouet. Potest idem & decoctum eius. Ad lateris dolorem prædest. Menses ducit, & antidotis miscetur.

EXGALENO.

Odorata quodammodo est huius herbæ radix, Nardo viribus similis, sed tamen ad plurima infirmior. Vrinā plus mouet quàm Indica, aut Syriaca Nardus, similiter autem vt Celtica.

EXPLINIO.

Radix Phu datur potui trita, vel decocta ad strangulationes, vel pectoris dolores, vel laterum. Menses quoque cit. Bibitur cum vino.

APPENDIX.

Magni Phu radice hodie multi, magno cū errore, ꝑ calamo aromatico vtuntur, quod hoc in loco monere placuit.

De Phaco. Cap.

CCCCXXX.

NO

NOMINA.

Φ ^{Αλεξ, & φακί} Græcis, Lens & Lenticula Latinis dicitur, Officinis & herbarijs latinum nomē retinuit. Germani [Linsen] Galli *Lensille* appellant.

FORMA.

*Lens.*

Lens racemosum legumen est, folijs Viciæ, sed minoribus, floribus exiguis in candido purpurascentibus, siliquis paruis, molliter in latitudinem fufis, in quibus tria aut quatuor grana, inter legumina minima sunt.

LOCVS.

Prouenit passim in agris satum.

TEMPVS.

Iulio mense floret, & deinceps in siliquis grana profert.

TEMPERAMENTVM.

Lentes mediū tenent caliditatis & frigiditatis,

desiccant tamen in secundo ordine.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Lens crebrò comesta, oculorū acie hebetat. Aegrè cōcoquitur. Stomacho nocet, eumque & intestina inflat. Aluū cū cortice suo comesta sistit. Præstat que faciliè concoquitur, & nihil atri in maceratione reddēs. Vim habet adstrictorijā: quapropter aluū sistit, si detractō antea cortice accuratè coquatur, primāq; aqua inter coquendū effundatur. Primū enim eius decoctū aluū soluit. Somnia tumultuosa & grauiā facit. Nervis, pulmōni & capiti inutilis. Melius suo fungetur officio cōtra alui fluxiones, admixto illi cū aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut myrto, aut cortice pu

ce punici mali, aut rosis ficcis, aut mespilis, aut sorbis, aut pyris Thebanis, aut cotaneis malis, aut cichonio, aut plâta gine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, aut rhois quæ obionijs inspargitur. Accetum autem cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi triginta grana lenis suis corticibus denudata, deuorata protunt. Decocta cum poietâ, & illita, podagram lenit. Sinus cû melle glutuat. Crustas iupit, & vlcera purgat. Decocta in aceto durities & strumas discutit. Cû meliloto, aut coroneo malo, in edetur inflammationibus ocnlorû & sedis, addito rosaceo. In maioribus sedis inflammationibus & sinu amplo cum malicorio aut ficcis rosis, adiecto melle decocta. Contra uomas gangranicas similiter vtiuntur, aut adiuncta maris aqua, Aduertus autem pustulas, herpetas, erysipelata, pernionesque, vt antea dictum est. Contra mammas grumolû lac continentes, & lactis copia turgentes, in aqua maris cocta & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Lentes nõ valenter adstringunt. Ipsum itaque earû corpus desiccât, & sistit ventrem: cæterum decoctum irritat, Proinde etiâ prior aqua abijcitur, vbi retentionis causa adhibentur. Cortex esus vehementer adstringit, carnea substantia tenuiter, quæ & crassi succi & terrestris est. Succus porro Lentis adstringenti est contrarius. Quocirca si elixæ in aqua iusculum sale, garo, oleoque conditû bibatur, aluum deijciet. At quod ex his decocta Lente ferculum apparatus, contrariam succo vini obtinet. Nam quæ ventri obueniunt fluxiones desiccât, os ventriculi, intestina, & totum denique ventrem corroborans. Quamobrem cæliaci & dysentericis accommodatus est cibus. Lens verò decorticata, vt illam adstringendi vehementiam, cumque hac alia videlicet omnia quæ consequuntur, amittat: ita alibilior quàm integra illa efficitur, crassum prauumque succum gignens, tardè cômear, alui tamen flores haud desiccât, vt ea quæ cortice non est spoliata. Iurè igitur qui modum in hoc edulio non seruât, elephantiasim, quam vocant, & caucrum incurrunt. Siquidem crassa siccaque cibaria faciliè in melancholicos humores

vertun

vertuntur. Quare ijs duntaxat quibus vitiosa est habitudo ob aquam in carne diffusam, Lens cibo vtiliter præbetur, ceu aridis & squalentibus admodū dānosē. Eandē ob causam visum integrū & inculpatū hebetat, immoderatē exiccans. Ei verò qui contrario modo se habet, humidiori videlicet opitulatur. Menstruis purgationibus inepta est: crassum enim & tardifluum sanguinem facit. At muliebri appellato profluo conuenientissima.

EX PLINIO.

Lens optima quæ facilius coquitur, eaq; quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidem oculorū obrundit, & stomachum inflat: sed aluū sistit in cibo, magisq; discocta celesti aqua. Eadē soluit minus percocta. Crustulas vlcerum rumpit, eaq; quæ intra os sunt, purgat & adstringit. Collectiones omnes imposita sedat, maximeq; exulceratas & rimosas. Oculorum autem epiphoras cum meliloto aut cotoneo. Contra suppuratiā cum polenta imponitur. Decoctæ succus ad oris exulcerationes & genitalium adhibetur. Ad sedem, cum rosaceo aut cotoneo. In ijs quæ acius remediū exigunt cum putamine punici, melle modico adiecto. Ad id demū ne celeriter inarescat, adiiciunt & Betæ folia. Imponitur & strumis panisque, vel maturis, vel maturescentibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua mulsā, & grangrenis cum punici tegmine. Item podagris, cū polenta, & vnluis, & renibus & pernionibus, vlceribus difficilē cicatricem trahentibus. Propter dissolutionem stomachi triginta grana Lentis deuorantur. In choleris quoque & dissenteria, efficacior est in tribus aquis cocta, in quo vsu melius semper eam torrere aut tundere, vt quam tenuissima detur, vel per se, vel cū cotoneo malo, aut pyris, aut myrto, aut intubo eratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, neruosisque omnibus, & felli, nec somnō facilis. Ad pustulas vtilis, igniq; sacro, & mammis, in aqua marina decocta: in aceto autē, duritias & strumas discutit. Stomachi quidē causa, polentæ modo potionibus inspergitur. Quæ sunt ambusta, aqua semiscocta curat, postea trita, & per cribrū effuso fursure, mox procedente curatione
addi

addito melle. Ex posca coquitur ad guttura.

EX SIMÉONE SETHI.

Crassi succi est, & austeram vim atque qualitatem possidet. Si quis ergo in aqua coquat, & eam aquæ, oleo & sapè cum sale misceat, potionem faciet quæ ventrem subducatur. Bis autem cocta, ventriculum & ad ipsum defluxus sistit. Inducit autem stomacho robur, & intestinis, & vniuerso ventri. Quapropter utilis est cibus celiacis & dysentericis. Si verò cortice ablato sumatur, vehementiam adstringendi abijcit, magis verò neutrit, cū tardi sit transitus, & crassi succi, non tamen adeò siccatur, ut antea dixi. Qui verò hoc edulio crebrò vtūtur, elephantiam contrahunt, & cancrōs, & duritias, & neruorum dolores, & melancholicos affectus. Aptus enim est crassus & siccus sanguis, ut fiat succus melancholicus. Quibus igitur habitus quispiam malus aquosus in carne est, ijs solis vtile est edulium, quemadmodum siccis & squalidis maximè noxium. Similiter visum salubriter se habentem nimium exiccando hebetat, contrā verò affectum iuuat. Neque etiam ad menstruas purgationes vtilis est, eò quòd crassum & difficulter fluentem sanguinē efficiat. Ad hæc veneris appetentiam semen exiccando, extinguit: idèò castè viuere volentibus ad hoc maximè confert. Grauiā etiam somnia facit, eò quòd ex ea melancholici succi in totum distribuuntur corpus. Cum Mentha decocta, plurimum inflationis deponit. Nonnulli & Betam huius rei gratia eo quo decoquitur tempore iniiciunt. Lens verò probè decocta & trita, si vulneribus ex iaculo aut telo factis imponatur, sanguinis fluxum vehementer compescit. Paruæ verò Lentis decoctum sumptum, difficilem partum soluit. Auribus ex quibus pus emanat instillatum, succurrit.

De phillyra. Cap. CCCXXXI.

NOMINA.

Φιλλυρα Græcis, Tilia Latinis & Officinis, Germanis [Linden] Gallis *Tulier* appellatur. Alia ab hac est arbor quæ Dioscoridi *φιλανθρα* vocatur. Quod non animaduertentes


Ff viri

viri etiam nonnulli doctissimi, vtrasque arbores magno errore confundunt, quod forma admodum discrepent, vt ex ijs quæ paulò post dicemus, & è Dioscoride & Theophrasto libro. 3. de plantarum historia, capitu. 10. inuicem collatis, abundè constabit. Differunt itaque inter se Philyra & Phillyrea, neque vna vtraque voce arbor significatur, sed diuersæ.

GENERA.

Tiliæ, Theophrasto loco iam citato autore, duo habentur genera, mas scilicet & fœmina. Distantq; inter se, tum materie, tū totius corporis forma, & quod altera fructifera, altera sterilis. Materies mas dura, flaua, nodosior, spinosiorque: fœminæ candidior: & cortex mas crassior, detra-

ctusque inflexibilis propter duritiam est: fœminæ candidior flexibiliorque, ex quo cunas faciunt: item fœminæ odoratiores. Et mas sterilis, nulloque flore est: fœmina, cuius tibi picturam damus, & florem & fructum gignit.



Tilia fœmina.

men prætenue quantum Atriplicis, omnibus animantibus

FORMA.

Folio est hederaceo, molliore, & in angulum acutiorem rotundiore et prolixiore, & in orbem lentè crispato atque serrato: flore tantisper dum calyculo cōtinetur herbaceo, vbi emerfit flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semen

bus ingratum, cū foliorum pabulo maximè ducantur, eorumque mira dulcedine capiantur. Nunc cum ijs confer ea quæ Dioscorides de Philyrea tradit, & senties esse diuersissima. Nam quis vnquam dixit Tiliam habere folia oleæ, & fructum ferre subdulcem ad similitudinem Lentisci, nigrum, vuarum more congestum? Philyræ enim seu Tiliæ folia sunt liederacea atque serrata, adeoque ab oleæ folijs dissidentia: fructum denique fert non modò non subdulcem, sed qui à nullo mandi potest.

LOCVS.

Montes & valles diligit Tilia, sed plus montibus gaudet aquosis.

TEMPVS.

Floret Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse Tiliam, vel ex eo liquet, quòd frigidis cerebri malis, epilepsiæ, & id genus alijs inirifice conferat. Amaritudo etiam cum glutinositate quadam in ea reliquis qualitatibus præualere videtur, si hanc degustes. Quare ab stergendi plane facultatem cū modica adstrictoria, perinde atque vlmus (cuius facultates illi Plinius, vt ex ijs quæ paulò post subiiciemus planum fiet, tribuit) habere euidentissimum est.

VIRES EX GALENO.

Vlmi folijs aliquando recens vulnus glutinauimus confidentes adstringentem pariter & extergentem illis inesse facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est & adstrictorins, itaque cum aceto lepram sanat. Porro viridis etiamnum & recens si vulneribus deligaturæ vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem vim obtinent: proinde & decocto earum quidam perfundunt fracturas quibus callo inducto opus est.

EX PLINIO.

Cortex interior Tiliæ lepras sedat, & folia ex aceto illita. Multi corticem commandacatum vulneribus utilissimū esse putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori, Humor quoque è medulla castratæ arboris effluens, capillum red-

dit capiti illitus, defluentisque cōtinet. Humor denique citi nitorem inducit, faciēque gratiorem præstat. Folia ad infancium vlcera in ore commāducata profunt: decocta & pota, urinam ciunt & menses.

APPENDIX.

Quū Plinius ferē omnes facultates Vlmi etiā Tiliæ adscribat, vt ex eiusdem verbis patet, ideò ē Galeno, quæ ille de Vlmo tradit, produximus. Si verò quispiam vires quæ à recentioribus Tilię tribuuntur, probè expendat: nihil ab ijs quæ ex Plinij & Galeni sententia retulimus, differre cōpērit. Nam maculas faciei abstergere scribunt Tiliam, si illa eius succo lauetur. Mederi etiā morbo comitali bibitum eius liquorem stillatitium, oculis claritatem inducere, calculum sanare, tumores discutere ijsdem docēt. Quid multa omnes facultates Vlmi obtinet Tilia: ideoque vulneribus etiā recentibus succurrit, & alia quæ à Dioscoride & Galieno in Vlmi historia commemorantur, potest.

De Chelidonio maiore. Cap.

CCCCXXXII.

NOMINA.

XΕΛΙΔΩΝΙΟΝ *μύρα* Græcis, Chelidoniū maius Latinis, Officinis chelidonia, germanis [Schelkraut, Schelvvurtz, grofz Schvvalbenkraut,] Gal. *Chelidome*, ou *Efelere* dicitur. Chelidonio autem, vel si maius Hirundinariæ, auis Hirundo, quæ Græcis *Χελιδών* vocatur, nomen indidit; vel vt autor est Plinius, quod hanc primū inuenit, & ea oculis pulorum in nido restituit visum, vt quidam tradunt, etiam erutis: vel quod floret aduentu hirundinum, discessuque cōmarcescit: id quod de minore verē dicitur.

FORMA.

Caulem emittit cubitalem & maiorem, gracilem, adnata folijs plena habentem, Folia Ranunculo similia, teneriora tamen, & colore subælia, iuxtaque singula folia florem Leucio similem. Succus illi croceus, acris, mordax, cum aliqua amaritudine & odoris grauitate. Radix supernè singula



Chelidonium majus.

vellicantem. Radix in superiore parte vna, in inferiore parte multis luteis fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in opacis & parietinis.

TEMPVS.

Chelidonium hirundinum aduentu florem excitat, atq; ad eò toto deinceps vere & æstate floret, quibus etiam temporibus carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Herba hæc tertij ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Succus Chelidoniij mixtus melli, & in æneo vate in carbonibus decoctus, contra oculorum caliginem prodest. Expriimitur autem succus ex folijs, radicibus & floribus incipiente æstate, siccaturque in vmbra, & in pastillos conformatur.

℞ iij

Radix

gularis, infernè autè plures. Fructus cornuti Papaueris instar tenuis, lōgis veluti galeæ conus, in quo exigua semina sunt. Papaueris semine maiora. Huius descriptionis notæ omnes chelidonio nostro respondent. Siquidem fruticosa est herba, cubitali altitudine, cauliculis lanuginosis, teneris: folio Ranunculi, magis anguloso tenuiori, aduersa parte cæsis, auersa incano: flore luteo, Leucoio consimili: semine Papaueris, quod in corniculis seu siliquis lōgis exilibus clauditur. Vulnerata succū croceum emittit, gustū

Radix cū Aniso & vino albo pota, regio morbo medetur. Sanat herpes cum vino illita. Dentium dolores comman-
ducata sedat.

EX GALENO.

Chelidonium admodum extergentis & calidæ facultatis est. Sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur dis-
cussione indigens. Vbi sunt quidam radice eius ad morbum regium à iecoris obstructione proficiscentem, in vino albo eam potui exhibentes cum Aniso. Pari modo mæsa, dentiū doloribus confert.

EX PLINIO.

Florentibus succus exprimitur, & in æreo vase cum melle Attico leniter cinere seruenti decoquitur, singulari reme-
dio contra caligines oculorum. Vtuntur & per se succo in collyrijs, que Chelidonia appellantur ab ea. Eadem oculo-
rum aciem adiuvat, si addita aqua foueantur. Succus eius cum melle culices, nubeculas, obscuritatēque discutit, eica-
trices extenuat. Albugines etiam iumentorum.

De Chelidonio minore. Cap.

C C C X X X I I I .

NO MINA.

XΕΛΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΝ Græcis, Chelidonium minus Latinis, Officinis Scrofularia minor vocatur, quòd strumosa radix multis granorum frumenti grumis videatur coaluisse (q̃ vel strumis, quas imitatione Græca Scrophulas vocāt) medeatur. Germanis [Feigvartzten oder Blattenkraut,] id est Ficariam, [Pfaffenhoeln, klein Schelvvurtz, oder Schvvalbenvvurtz. oder Meyenkrout] nominatur. Chelidonium autem hæc herba vocata est haud dubiè quòd, ut Theophrastus libro septimo, cap. xiii. hirūdinum aduentu florem excitet. Gallicè *Eclere petite*.

FORMA.

Herbula est à stolonibus pediculisve pendens, sine caule, folijs Hederæ figura, rotundioribus minoribusque, item te-
neris



Chelidonium minus.

rem aceruatim collectas, quarum tres vel quatuor in longum protenduntur. Flos ei Ranunculi vt maiori, luteo colore nitens. His accedunt locus, tempora, vires, & alia quæ iam commemorabuntur, quæ singula Scrofulariæ minori adamussim quadrant, vt nemo hanc Chelidonium minus esse inficias ire sine magna impudentia possit.

LOCVS.

In Palustribus, prope aquas, & in limitibus humidis omnibusque vliginosis tractibus ac ortis passim gignitur.

TEMPVS.

Verno tempore, Maio mense, & præsertim Hirūdinum aduentu floret, nec longo pōst tempore marcescens euanescit, sic vt irrigui limites, qui largo foliorum florūque sti-

neris & aliquatenus pinguibus. Radices habet paruas multas ex eodem callo prodeuntes, tritici modo aceruatim congestas, quarum tres aut quatuor in longitudinem progrediūtur. Hæc Dioscoridis delineatio prorsus herbæ illi quam Scrofulariam minorem vulgò nominant, cōuenire videtur. Nam hæc herbula est à prædiculis pēdens, vidua caule, folijs Hederæ, rotundioribus multò minoribūsq; , teneris & modicè pinguibus. Radices ostēdit ex eodem callo prodeūtes, barbas cōplures in granorum tritici mo-

milis ac terrestris quercus, quòd scilicet folia Quercus habeat, & huius respectu, quasi humi repat. Sunt qui Serratam nominatam ideo putent, quòd ab ea, serra inuenta sit. Dioscorides hanc Teucrium etiam, propterea quòd Teucrio similis admodum sit, appellari à nonnullis scribit.



Chamædryas vera mas.



Chamædryas vera femina.

GENERA.

Et si Dioscorides alijque veteres vnicam faciant Chamædryn, tamen nos, quia plures herbas ad eius formam ac picturam accedere videmus, duo eius genera produximus. Quorum sanè primum vera Chamædryas existit, & Germanicè [Klein Bathengel] nominatur. Illius autem rursus duo sunt genera. Vnū enim q̄ præ ceteris omnibus picturæ Dioscoridis maximè accedit, mas dicitur: Alterū verò femina:

Ff v neque

neque enim aliter nobis discrimen indicare licuit, nisi sexus ratione. Alterum genus vulgare est Chamædrys, quod iterum duum est genus, mas scilicet & foemina. Mas Germanicè [Erdtvveiranch] Foemina verò [Gamenderle Blavvmenderle Vergifzmein nit] appellatur.

FORMA.



Chamædrys vulgaris mas.



Chamædrys vulgaris foemina.

Frutex dodantralis: folijs exiguis, forma & diuisuris quernis similibus, amarisque: flore subpurpureo: exili semine in calyculis atro. Quæ utique descriptio ita herbis illis quas pictas exhibemus, respondet: ut nulla prorsus nota reclamare videatur. Sunt enim herbæ palmum altæ ut plurimū, exili folio, effigie & diuisura Quercus, amaro: flore penè purpureo & exiguo, ita ut mirari satis non possim, cur nonnulli alteram speciem genninam Chamædryn esse negent: cum tamen Germanica etiam appellatio pulchrè ad antiquum

quum atque adeo græcum nomen alludat. Sed instabit for-
sitam quispiam dicens. Chamædrys Dioscoridis palmum
alta est: hæc tua mensuram hanc excedit. Fateor sanè, at-
tamen non multum exuperat: quod si etiam plus exupera-
ret, non tamen hoc nomine alterius speciei herba putanda
esset: neque enim adeò statam atque certam mensuram her-
bis tribuit Dioscorides, vt quandoque vltra citraque con-
sistere non liceat: verum cum alicui herbæ mensuram ad-
scribit, id ea ratione facit, vt maiori parti indiuiduorum il-
lius speciei quadrare existimet. In prioris itaque inopia al-
terius vsus esse potest.

LOCVS.

Nascitur asperis & pétrosis locis, interdum etiam in mō-
tosis & campestribus solidis.

TEMPVS.

Primum genus Iunio & Iulio mensibus floret. Alte-
rum autem vere potissimum. Carpuntur semine prægnan-
tia.

TEMPERAMENTVM.

Ex tertio ordine calefacientium & desiccantiū facit Ga-
lenus. Germanicæ tamen minus calefacere & desiccare vi-
dentur, vt potè in regione frigidiore natæ.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Recens ac viridis in aqua decocta & pota, conuulsis, tuf-
sientibus, lieni indurato, vrinæ difficultatibus, hydropicis
inter initia auxiliatur. Cit menses, fœtusque extrahit. Lie-
nem ex aceto pota minuit. Aduersus venenata cū vino po-
ta & illita efficax est. Trita ad prædicta in pilula confor-
matur, cum melle vetera vlcera purgat. Cum oleo trita, in-
uncta & illita, oculorum caliginem discutit.

EXGALENO.

Chamædrys vincentem qualitatem amaram habet, & est
quodammodo acris. Quocirca meritò lienem colliquat, vri-
nam & menses monet, crassitudinem humorum incidit, &
viscerum obstructions expurgat.

EXTHEOPHRASTO.

Trissaginis folia adrupta, vulneraque, in oleo trita valèt,
& ad

& ad depascentia vlcera. Semen bilem extrahit, & oculis quoque beneficum est. Folium ad albugines tritum in oleo prodest.

EX PLINIO.

Aduersus serpentium venena potu illituque efficacissima. Item stomacho, tussi vetustæ, pituitæ in gula cohærescenti, ruptis, conuulsis, lateris doloribus. Lienem consumit. Vrinam & menses cit, obid incipientibus hydropicis efficax, manualibus scopis eius in tribus heminis aquæ decoctis vsque ad tertias. Sanat & vomicas, & sordida vlcera cum melle. Fit & vinum ex ea pectoris vitijis. Foliorum succus cum oleo, caliginem oculorum discutit. Ad splenem ex aceto sumitur.

De Chamæcyparisso. C. CCCXXXV.

NOMINA.

X *Αμαξικυπρίσος*. Plinio dicta est, quasi pumila Cupressus. Apud Græcos, quod sciam, eius fruticis nulla fit mentio. Vulgò Cypressus, Germanis [Cypresz] Gallis *Cypres* nominatur. Cypressus ab odore & forma foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris vocata est.

FORMA.

In arbusculi formam fruticat, folijs incanis, Abrotoni fœminæ modo scissis. Floribus in summo auri instar fulgentibus. Totus frutex odoratus est. Errât qui Chamæpitin esse arbitrantur: neque enim vt illa humi serpit, sed altius à terra, vt pictura monstrat.

LOCVS.


In hortis passim ac figulinis prouenit.

TEMPVS.

Æstate floret. Paucos autem frutices inuenies in quibus flores intueri liceat, quando per vniuersam vitam non nisi vnum hunc, cuius picturam damus, fruticem in quo flores apparuerint, viderim.

TEMPERAMENTVM.

Apparet in ea, sicut gustus testificatur, leuis quidem acrimonia, sed maior amaritudo, multoque etiâ plus acerbita-



Chamæcyparissus.

ta, contra sanguinis reiectionem, dysenterias, alui fluxiones, orthopnoeam, tussimque profunt. Decoctum earum idem potest. Tussæ cum fico duritias emolliunt, & polypos in naribus sanant. Leprosos vngues cum aceto decoctæ & tritæ adiectis lupinis tollunt. Intestinorum ramices illitæ coercet. Folia idem possunt. Pilulæ cum coma suffitæ culices abigere creduntur. Folia trita & illita vulnera glutinât, sanguinemque supprimunt. Cum aceto autem trita, capillos tingunt. Illinitur per se aut cum polenta ad erysipelata herpetas, carbunculos, & oculorum phlegmonas. Cerato mixta & imposita ventriculum firman.

EX GALENO.

Cupressi folia, germina, pilulæ recentes & molles, magna vlcera in duris corporibus glutinât. Ex quo clarû est, quòd resiccandi vim habeat, absque insigni acrimonia & caliditate. Tanta inest ei acrimonia caliditasque, quanta sa-

tis in tota planta. Resiccatur itaque absque insigni caliditate.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Quum easdem quas arbor Cyparissus qualitates habeat Chamæcyparissus, necesse est ut etiam facultates easdem obtineat. Arboris igitur hæ sunt vires. Adstringit & refrigerat. Folia eius cum passio & myrrha modica pota, vesicæ fluxionibus & urinæ difficultati medentur. pilulæ tussæ, & cum vino po-

tis sit deducendæ in altum acerbitati nullâ tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficit. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates, sine molestia tutôque depascitur: quûque calefaciunt & desiccant, eas quidem quæ contentæ sunt absumant, ceterum acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic intestinorum ramice affectos iuuat: siquidem exicat & robur addit corporibus præ humiditate laxis, ut pote quum adstrictio in altum subeat, eo quod caliditas quæ illi admixta est, deducat, ad eam quidem mensuram perueniens, ut præire quidem valeat, nondum tamen mordicare. Quidam ea vtuntur ad carbunculos & herpetas polentæ miscentes, tanquã absumat citra calefactionem eos morbos efficientem humiditatem. Sunt qui ad erysipelata vtantur, admixta nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

EX PLINIO.

Cupressi folia trita serpentû ictibus imponuntur, & capiti cum polenta, si à sole doleat. Item ramici, qua de causa bibuntur. Testium quoque tumori cum cera illinuntur. Capillum denigrant ex aceto. Eadem trita cum duabus partibus panis mollis, & è vino Aminxo subacta, pedum ac nervorum dolores sedant. Pilulæ aduersus serpentum ictus bibuntur, aut si eijciatur sanguis. Collectionibus illinuntur. Ramici quoque teneræ tusæ cum axungia & lomêto profunt. Bibuntur ex eadem causa. Parotidi & strumæ cû farina imponuntur. Exprimitur succus tusus cum semine, qui mixto oleo, caliginem oculorû aufert. Item victoriati pondere in vino potus illitusque, cum fico sicca pingui, exemptis granis vitia testium sanat, tumores disecutit, & cum fermento strumas. Radix cum folijs trita potaque, vesicæ & stranguriæ medetur, & contra phalangia. Ramenta pota menses ciunt, scorpionum ictibus aduersantur. Chamæcyparissos herba ex vino pota contra venena serpentium omniû scorpionumque pollet.

De Chamacisso. Cap.

CCCXXXVI.

NOMINA.

X *Αμυγδαλος ή γένε σίφνας* Græcis, Hederæ terrestris, Terræ corona Latinis appellatur. Officinæ nomen Hederæ terrestris retinuerunt. Germanicè [Bundelreb] corrupto sanè nomine vocatur: cùm dicendum esset [Grundreb] hoc est, humi repens viticula. Nominatur etiam Germanis [Erdephevv, & Erdeukrentzlin] Galicè *Lierre terrestre*, Chamæcissos verò dicta est, quòd nunquam non repat humi, folijs hederæ similibus. Corona terræ, quòd ramulos suos per terram spargens, foliis veluti serpo eandem coronare videatur.

FORMA.

*Chamæcissos.*

Folia Hederæ similia habet, minora tamen & tenuiora. Ramulos dodrantes multos, folijs plenos, à terra quinque aut sex prodeuntes, Flores Leucois similes, minores tamen, & in gustu vehementer amaros. Radix illi est tenuis alba. & inutilis. Ex hac historia satis cõstat herbam hodie vocatam Hederam terrestrem, esse Dioscoridis Chamæcissos. Siquidem folijs Hederæ constat, minoribus tamen & tenuiori-

bus, ac in circuitu incisis. Legendum enim esse *μικρότερα*, & non *μακρότερα*, res ipsa docet: nam etsi folia Chamæcissi aliquatenus Hederæ similia sint, tamen rotundiora, atq; adeò minora etiam & tenuiora existunt. Et est hi:

lupus

lappus abi, in α , apud Dioscoridem frequens, vt ex alijs etiã locis suprã notatis liquet. Ramulis etiam dodrantalibus multis, foliosis, qui tamen antequam scindãtur quinq; aut sex à radice procedunt. Flores denique eius Leucois similes sunt, nō quidem luteis, albis aut purpureis, sed cœruleis: ita vt vehementer errent qui eius flores, neque figura, neque colore floribus Chamæcissi, qui Leucois adsimilantur, esse similes putāt. Et si enim colore neque albi, neque lutei sint, cœruleos tamen (qui color Leucoiorum est) esse constat. In gustu denique, sicut etiam folia, amari sunt. Radix quoque eius tenuis, & nullius prorsus vsus est. His omnibus accedit, quod nomen etiam pulchrè quadrat: neque enim Græcis aliud sonat Chamæcissos, nisi humilem ac humi repentem Hederam. Cæterum non esse Elatinen, præter alia multa, quæ referre superuacaneū arbitror, sapor manifestè ostendit: qui in Hedera terrestri amarus & modicè acris est, atque admodò calorem præ se fert. Elatine verò refrigerat atque adstringit. Sic nō esse Asclepiada (vt taceam quod Securidacæ simile semen non proferat) vel vnus locus natalis satis monstrat. Asclepias enim in montibus, Hedera autem terrestris in decliuibus locis & vallibus, vt Germanicum nomen [Brundtreb] abundè indicat, prouenire solet. Quæ autem herba sit Asclepias, suo loco dictum à nobis est.

LOCVS.

Nascitur in cultis locis, iuxta etiam sepes & dumeta.

TEMPVS.

In Martio statim erumpit, & floret in magnam vsque ætatis partem.

TEMPERAMENTVM.

Amari tudo exiguaq; acrimonia foliorum & florum satis monstrant herbam hanc calidam & siccam esse, ita vt hi, qui frigidam esse statuunt, reprehensione non careant.

VIRESEXDIOSCORIDE.

Folia eius trioboli pondere in aquæ cyathis tribus, quadragenis aut quinquagenis diebus pota, ischiadicis profunt. Morbum quoque regium in senos septenōsve dies similiter pota, emendant atque expurgant.

EX GALENO.

Chamæcisi flos quum sit admodū amarus, iecoris obstructions soluit. Sunt qui illum etiam ischiadicis exhibeant.

EX PLINIO.

Chamæcisson appellant Hederam nō attolentē se à terra. Et hæc contusa in vino acetabuli mensura leni medetur. Eius folia bibūt ischiadici tribus obolis, ī vini cyathis duobus, septem diebus, admodum amara portione.

APPENDIX.

Has omnes iam commemoratas facultates Hederę terrestri recēiores tribuunt: neque dubium est, quum sit admodum amara, quin eandem habeat, & alia etiam possit quę illi adscribunt, vt euocare suppressos menses, vrinam mouere, obtusum auditum remouere. Contra pestem etiam tradunt efficacem esse: id quod equites quoque sciunt: hi enim quoties fibula dicta pestis equum corripuerit, hac contra eandem herba magna efficacia vtuntur.

De Chrysanthemo. Cap. CCCXXXVII.

NOMINA.

X^{χρυσάνθεμον} Græcis, Chrysanthemum Latinis, Officinis inusitatum. Germanis [Goldtbluom, Schmalzbluom, à pinguedine quę conerito digitis flosculo apparet, & [Dratbluom] Gallis *Marguerites blanches* nominatur. Chrysanthemon verò à flosculis auri splendorem & colorem præ se ferentibus, dictum est.

FORMA.

Herba est tenera, fruticis tamen speciem obtinens, læues proferens caules, & multifida folia luteos flores, vehementer splendentes, & oculi iustar circulares. Ex qua sanè descriptione satis clarum est, herbam quam pictam damus, esse Chrysanthemon, quòd illi omnes à Dioscoride traditę notę, nulla prorsus reclamante, cōueniant. Quibus Democrii in Hydrosopico accedit testimonium, qui herbam hanc quę Batrachio similis est, Chrysanthemon Græcis appellari scribit, folijsq; Apij esse, maioribus tamen, flore auri colore splendēte. Addit denique ab Aquilegijs mirè celebratam esse, cò quòd aquā subesse certum sit, vbi solet emi-

G g care.

*Chrysanthemon.*

care. Quæ quidē singula
herbæ illi, quā depictam
exhibemus, respondent.
Nā, vt cætera omittam,
vbi hæc nascitur, aquæ la-
tices subesse non est du-
biū. Quidam perperam
Vasserhanenfuosqz Ger-
manicè nomināt: nā hoc
nomine appellata herba
alia ab ea est, vt in capite
de Batrachio docuimus.
Nā cum hæc nostra acri-
monia vacet, quanquam
Batrachijs similis sit, ta-
men in numero illorum
esse hoc nomine non po-
test.

LOCVS.

Nascitur prope vrbes,
in pratishumidis, & alijs
locis aquosis.

TEMPVS.

Maior mense eius floribus prata & loca humida splende-
scunt.

TEMPERAMENTVM.

Eiusdem esse cum Bupthhalmo temperamenti, & gu-
stus & facultates declarant. Calidum itaque esse & siccum
constat.

VIREs EX DIOSCORIDE.

Eius flores cum cerato triti, steatomata discutere pro-
duntur. Regio morbo correptis coloris bonitatem tem-
pestiuè reddit, à balneo post longiorem in eo moram exitu
pota.

EX PLINIO.

Vesicæ calculos Chrysanthemon eiicit.

De

De Chamæleone albo. Cap. CCCXXXVIII.

NOMINA.

X *Αμυγδαλινός* Græcis, Chamæleon albus, Carduus suarius & variis Latinis, Officinis & barbaris Cardo pacium appellatur. Quod nomen haud dubiè corruptum est, deductumque à dictione Pancration, nam sic olim esse nominatum Chamæleonem Apuleius testatur: aut à Carduo vario, à qua dictione, v, scilicet litera in p, & r in t mutata, in Cardopatium facilis est lapsus. Germanis [Ebervvurtz,] eleganti allusione ad Carduū suariū, nuncupatur, Gallis *Carline, ou Artichaut sauvage* Chamæleō autē à filiorū varietate dici cœpit. Mutat enim cū terra colores Plinio teste: hic niger, ille viridis, aliubi cyaneus, aliubi croceus, atque alijs coloribus videtur. Suarius autem Carduus dictus

est, quod sues, si in polenta exhibeatur, perimat. Ob quam etiam causam [Ebervvurtz] germanis nuncupatum puto.

FORMA.

Folia habet Silybo aut Scolymo similia, asperiora autē, acutiora, nigroq; Chamæleone validiora. Caule vacat, verū è medio spinam tchinomarinum, aut Cinaræ similem erigit. Flores purpureos, veluti capillos, qui in pappos evanescent. Semine Cnico simile. Radicē in pinguibus collibus crassam, in mōtosis verō graciliorem, in profundo albā aliquatenus aromaticā, graueolentem: & dulcem. Plinius libro 22.

Gg ij capi.



Chamæleon albus.

cap. 18. breuius herbam hanc depingit, sic inquit: Asperiora folia habet, serpit in terra Echini modo spinas erigens, radice dulci, odore grauissimo. Quæ certè notæ in vniuersum omnes, herbæ quæ hodie barbara & corrupta voce Cardopatium vocatur, adamussim respōdent, ita vt nemo nō esse Chamæleonem perspicuè intelligat. Huc accedit q̃ facultates etiam eadē sint. Radix enim Chamæleonis albi hausta, venenis resistit. Radix etiam Cardopatij ex recētorum traditione, mirificè venenis aduersari, & contra pestilentiam populatim sæuientē, vt paulò pōst dicemus, efficacissimum esse remediū dicitur. Quodd si tamen rectiora quis protulerit, non grauabimur hic, vt in alijs quoque, mutare sententiam.

LOCVS.

In glabretis montium prouenit, & in syluis, vt hinc etiā syluaticus Carduus cognominatus sit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus cū suis floribus effodi potest.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius calefacit secundo ordine absoluto, desiccatur autem tertio.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix pota acetabuli mensura, latos lumbricos pellit. Sumitur autē in vino austero, cū decocto Origani. Hydropicis commodè drachma in vino datur: etenim eos extenuat. Cōtra difficultatem vrinæ decoctum eius propinatur. Protheriaca cum vino pota est. Occidit canes & sues. Mures itē necat subacta cum polenta, aut hydrelæo madefacta.

EX GALENO.

Radix eius potui datur acetabuli mensura contra latos lumbricos cum vino austero. Exibent etiam aqua inter cūrem laborantibus.

EX PLINIO.

Hydropicos sanat succo radice decoctæ. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorū animalia acetabuli mēsurā succi eiusdē in vino austero cum Origani scopis. Facit ad difficultatem vrinæ. Hic succus occidit canes suesq; in polenta. Addita aqua & oleo contrahit in se mures & necat, nisi prota

protinus aquam sorbeant. Radicem eius aliqui concisam seruari iubent funiculis pendentem, decoquuntque in cibo contra fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant.

APPENDIX.

Recentiores radicem Cardui suarij drachmæ pōdere in vino sumptam cōtra pestilentix contagia prodesse tradūt. Eandem etiā in aceto decoctā, contra scabiē, impetiginē, & omnes cutis scēditates curatu difficiles conferre scribunt, si eius decocto lauentur. Idem dentium etiā dolori succurrit.

De chamaleone nigro. Cap. CCCXXXIX.

NOMINA.

X *Ἀμαλάνθη* Græcis, Cārdus niger aut Vernilagiū Latinis dicitur. Officinis hæc planta incognita existit. Germanis allusione ad latinam nomenclaturā [Schvartzer Gartendistel] Gallis *Chardonette*, vocari potest, quod scilicet in hortis tantūm culta proueniat. Sunt qui eā a candore foliorū nominent [Vvelch Vveisz Distel:] sed prior appellatio ad discriminandas plantas melior existit. Chamaleon verò dictus est à varietate foliorum, quæ pro terre & locorum differentia, aut admodum viridia, aut subalba aut cærulea aut rubra inueniūtur. Niger verò haud dubiè à radice appellari cœpit.

FORMA.

Folijs Scolymo similis est, minora tamen, tenuioraq; & rubentia ea habet. Caulē emittit digitali crassitudine, do drantalem, subrubrum, qui in summo habet umbellam, & spinosos flores tenues, hyacinthi æmulos, versicolores. Radicem crassam, nigram, densam, & aliquādo corrosam, quæ dissecta subflauescit, & commanducata mordet. Hæ quidē notę quanquam plantę, cuius hic picturam damus, serè omnes videantur quadrare (caulē enim euehit dodrantalem, & altiorem etiam, digitum equantem crassitudine, subrubrum, folia instar Scolymi, minora, subalba & leniter punicea: candidum ac hispidum florem, hyacinthina purpurea variatum: radicem nigram & subflauam) tamen cūm nō ad modum linguam vellicet commanducata radix, sit vt non



Chamæleon niger.

Nascitur autem Chamæleon niger, Dioscoride autore, siccis, campestribus, cliuosisque, & maritimis locis.

TEMPVS.

Iunio mense floret, ac subinde in capitulis rotundis Augusto mense semen hispidum profert.

TEMPERAMENTVM.

Chamæleontis nigri radix sicca est in tertio ordine, calefacit verò in secundo absoluto.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix trita additis exiguo atramento sutorio, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigere potest. Abstergit etiam impetigines, admixtis sulphure & bitumine. Decoctū eius collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cera

tera oblita, dolētibus dentibus auxiliatur. Quinetiam fouentur ea dentes, quum decocta in aceto, & calens imposta fuerit. Scriptorio stylo dolēti denti calida admota, eum frangit. Cum sulphure decolorem ob solē faciem, & alphos emendat: Miscetur medicamentis erodentibus. Phagedænas ferinæque ac tetra vlcera illata, ad mitiorē habitum transferens sanat.

EX GALENO.

Radix quiddam lethale obtinet, quamobrem eius foris vsus ad scabies, impetigines, alphos, & in summa ad omnia quæ deterfionem postulant. Præterea emollientibus & discutientibus medicamentis miscetur, ac illita phagedænica vlcera sanat.

EX PLINIO.

Radice eius lichenes curantur, cum sulphure & bitumine vna coctis: commanducata vero dentes mobiles, aut in aceto decocta. Succo scabiem etiam quadrupedum sanant, & ricinos canum necant.

De Chamæpitys. Cap. CCCXL.

NOMINA.


X *αμαξιτος* Græcis, Aiuga siue Abiga, autore Plinio Latinis dicitur. Inuenitur & Ibiga vocari, quod nomen, Hermolao teste, serè seruant hodie Illyrici, Hinc abiectis duabus literis i & g, Iba, & ab Aiuga abiectiōne literarum a & g, Iua manauit in vulgi nomenclationem. Officinæ suam cognomento muscatam appellāt: Germani [ye lenger ye liber] Galli *Iue Muscate ou artetique* Cæretum Chamæpitys dicta est, quasi humilis & breuis humique depressa picea: nam eius folia piceam olent. Abiga verò vocata propter abortus, quos educendis ijs quæ in vtero sunt, excitare solet.

GENERA.

Tria eius sunt genera. Vna folijs Sedi seu Aizoi, quam nos fœminam fecimus. Altera ramis anchoræ modo incuruis, quam nondum vidimus. Tertia mas dicitur etiam

Dioscoridi. Harum discrimina è descriptionibus certis
cognosces.

FORMA.



Chamapitys prima.



Chamapitys tertia.

Prima, herba est per terram serpens subcurua, folia mi-
nori Aizoo similia habens, multò tamè tenuiora, pinguio-
ra, hoc est, vt Serapion interpretatur, super se plus humidi-
tatis tenacis habentia, & hirsuta, circa ramos frequentia, o-
dore piceæ, flores exiguos, luteos aut candidos, radicem Ci-
chorij. Altera cubitalibus est ramis, anchoræ modo in-
curuis, tenuibus, coma supradictæ simili: flore candido, se-
mine nigro. Olet autem & ipsa piceam. Tertia quæ ma-
scula appellatur, herbula est foliolis tenuibus, candidis &
hirsutis: caule aspero, candido: flosculis luteis, semine secus
alas pusillo. Piceam & hæc olet.

LOCVS.

Sua sponte, quod sciam, in Germania non prouenit. Nūc tamen in hortis plantari cœpit. Plinius tertiam in petris nasci tradit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Chamæpitys gustu quidem amarum saporem acri validiorem obtinet. Est autem in calefaciendo secundi, in siccando verò tertij ordinis.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Folia primæ septem diebus in vino pota, regio morbo medentur. Quadraginta verò ex hydromelite, ischiadicos sanāt. Dantur peculiariter iecinorosis, vrinę difficultatibus & renum vitijis. Profunt etiam torminosis. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cū pōlēta iure decocti macerata. Trita & cū fico pro pilulis data aluum emollit. Excepta melle, squama æris, & resina, purgat. Apposita ex melle, ex vtero ducit. Mammarū duritias discutit. Vulnera glutinat. Vlcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet. Secunda & tertia eandem vim obtinent, non tamen vsque adeo efficacem.

EX GALENO.

Effectu expurgat Chamæpitys, abstergitque viscera plus quàm calfacit. Proinde regio morbo correptis, & omnino quibus facilè iecur obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum apposita cum melle. Sed & vrinæ mouendæ aptum est medicamen. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis decoctam in melierato. Herba porro ipsa viridis magna vulnere conglutinat, & vlcera putrescentia sanat. Mammarum præterea durities discutit.

EX PLINIO.

Profunt aduersus scorpionum ictus. Item iecinori illita cum palmis aut coronis. Renibus & vesicæ, decoctum eorum cum farina hordeacea. Morbo quoque regio, & vrinæ

difficultatibus, ex aqua decocta bibuntur, Nouissima contra serpentes valet cum melle. Sic & apposita vulvas purgat. Sanguinem densatum extrahit pota. Sudores facit, peruntis ea. Peculiariter renibus utilis est. Fiunt ex ea & hydro-picis pilule, cum ficu aluum trahentes. Lumborum quoque dolorem victoriati pondere in vino finit, & tussim recentem. Mortuos fetus ex aceto cocta potaque, eijcere protinus dicitur.

APPENDIX.

Recentiores herbarij, & magna officinarum pars, aliam Chamæpityn ostendunt, folio Saluæ rimoso, angustiore tamen, & ad radicem maiore, flore subcandido ac luteo, & semine nigro: quæ tamen legitima Chamæpitys non est, sed prima potius Sideritidis, vt suo diximus loco, species. Desinunt igitur subinde hac herba pro Chamæpity vera vt, ac illius loco has, quarum nunc picturas damus, vsurpent. Erroris autem huius nulla alia fuit causa, quam quod Chamæpitys etiam veteribus alio nomine dicta sit Sideritis. Hinc plerique decepti, eam herbam quæ priuatim ac proprie sic nominatur, pro Chamæpity vsurpare coeperunt. Sideritis autem nulla alia de causa dicta est Chamæpitys, nisi quod illi vulnere glutinandi insit facultas.

De psillio. Cap. CCCXLI.

NOMINA.

ΨΥΛΛΙΟΝ Græcè herba Pulicaris Latine: nomen græcum in officinis retinet. Germanicè [Psilienkraut] Gallicè *Herbe a Puce*s nominantur. Tam græcam autem quam latinam appellationem à pulice, cuius effigiem semine eius refert, sortita est herba. Vel, vt nonnullis videtur, quia si viridis in domum ferratur, generari in ea pulices prohibeat.

FORMA.

Psyllion folia Coronopo similia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantaes. Tota herba ad fœni graminisve formam accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut terna in summo contracta conuolutaue, in quibus semen pulicibus simile, nigrum durumque.

*Psyllium.*

LOCVS.

In aruis & incultis nascitur. Nusquam tamen quod sciam, in Germania nisi satum prouenit.

TEMPVS.

Flores tota ferè æstate ex capitulis eius, quæ spicæ formam obtinent, erumpentes dependent, canino capiti haud dissimiles, vt pictura abundè monstrat. Semen verò autumno profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen eius ex secundo refrigerantium est ordine, in deficcando verò & humectando medium quodammodo & symmetrum. Commentum Mesues de substantia eius interiore calida nihil moror.

VIRÈS EX DIOSCORIDE.

Vis Psyllio refrigeratoria. Cum rosaceo aceto, aut aqua illitum articulorum doloribus, parotidibus, tuberculis, cedematis, luxatis, capitisque doloribus prodest. Enterocælis seu intestinorum ramicibus puerorum, & vmbilicis prominentibus cum aceto illitum medetur. Oportet autem acetabuli mensura tusum in aquæ heminis duabus madere, & vbi aqua concreuerit, illinire: egregiè siquidem refrigerat: deiectum enim in feruentem aquâ, calorem eius reprimi-

Prodest

Prodest erysipelatis, Perhibent si viridis domum importetur. prohibere ne in ea pulices generetur. Tusa cum adipē, sordida & maligna vlcera expurgat. Succus eius cum melle ad aures fluxione tentatas, & vermiculosas conducit.

EX PLINIO.

Vis ad refrigerandum ingens. Semen in vsu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura, sextario aque densat ac contrahit. Tunc terere ac erassitudinem illinere oportet cuicunque dolori, & collectioni inflammationi q̃; Tenasmo in aqua cum radicibus decoctū medetur. Omnibus articulorum morbis salutare est huius semē madefactū in aqua, admistis in hemianam seminis duobus resinæ colorphonæ cochlearibus, thuris vno.

De Pseudonardo. Cap. CCCXLII.

NOMINA.

Υ *Ευδία* & Græcè & Latine nominatur, quodd scilicet non sit vera & genuina Nardus, cuius Dioscorides & alij veteres meminerunt.


GENERA.

Duum cernitur generū. Alterum procerius est, & maiorem spirat odorē, nec minus quā Nardus placet. Hoc nos Pseudonardum marem diximus. Officinæ & vulgus herba fiorū Spicam à spicatis floribus nominant, Germani [*Spicanardi*] Galli *Narde ou Aspic*. Alterum amplitudine & odore minus, quod nos Pseudonardū fœminam appellauimus. Officinæ & herbarij recentiores Lauandulam vel Lauen-dulam (eo quod balneis & hominum lauacris expetatur, et lotaque omnia si permisceatur odoris commendet suauitate) vocant. Germani ad hoc nomen alludentes [*Lauendel*] Galli *Lauende* nuncupant.

FORMA.

Frutex est folio crassiore, carnosō, angusto, colore lægido, in candidum vergente, piloso, frequentibus spicis in aristas sparsis: flosculis in spica ferè cœruleis, in Lauendula autem purpureis.

LO

*Pseudonardus mas.**Pseudonardus femina.*

LOCVS.

Gaudet apricis & petrosis, tanta suauitatis fragrantia, vt penè flores odoris iucunditate vincant, qua dote vestibus inferuntur.

TEMPVS.

Vtraque perpetua coma exitu veris canescit, Iunio & Iulio mense spicatur, floribusque prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur ordine secundo, tenuibusque constat partibus, haud multum à natura Celticæ Nardi dissidens.

VIRE.

Antiquus manuscriptus herbarius easdem ferè facultates Pseudonardo, quas Celtica habet, tribuit, dum in hunc modum scribit: Stomachi dolorem frigidum eiusdem inflammatione

tiones, vteri dolores, lienis duritiem, iecinorisque obstructions tollit. Stranguriæ & difficultati urinæ auxiliatur. Capiti admodum calefacit, eiusque humiditates exiccat. Hinc est quod recentiores tantisper eius usum in frigidis cerebri & nervorum morbis, apoplexia, paralyfi, & similibus commendunt.

De Ocimo. Cap. CCCXLIII.

NOMINA.



Ωκίμοι Græcis, Ocimum Latinis, recentioribus Græcis βασιλικόν id est regium appellatur: quod nomen apud omnes nostræ ætatis herbarios & officinas usurpatur. Sūt tamen quibus Ocimum gariophyllatum nominetur. Germanicè [Basilien, vel Basilgram,] Gallicè *Basilic* dicitur. Ocimum autem quibusdam à nascendi celeritate dictū est, siquidem à satū tertio statim die emicat. Quod verius Ocimo videtur cōuenire, quod pabuli & farraginis quoddam genus est, sic nominatum ab ωκίς Græca dictione quæ citò significat. Proinde sunt qui significantius per ζ scribendum ducant Ozimum, ab ὀζω, quod redolere denotat, quoniam herba tota suauissimum spiret odorem. Ab eodem odore quod basilica & regia domo dignum sit, Basilicum hodie nuncupatur.

GENERA.

Sunt qui duo Ocimi comminiscantur genera: vnum latiora folia habens, quod priuatim Basilicum: alterū angustiora, quod Ocimum gariophyllatum appellant. Nos tria tibi exhibemus ex vno promiscuè semine nobis nota. Primum maioris discriminis ratione Ocimum exiguum, Germanicè Klein Basilien,] nominauimus. Alterū mediocre, Germanicè [Mittel Basilien.] Tertium magnum. Germanicè groß Basilien] vocauimus. Neque enim nisi folijs solis distare videntur: quæ in primo genere exigua admodū sunt, in altero verò paulò latiora, in tertio primi respectu latissima. Odor autem omnibus tribus vnus idemque est.

FORMA.

Ocimum pedali altitudine profilit, surculosum, ramulis rotun

*Ocimum exiguum.**Ocimum mediocre.*

rotundis, folio Mercurialis, diluti viroris. Floret particulatim, primò parte inferiore, demum superiore: flosculo candido, semine pullo nigrove, cui cortex obducitur. Radix vna descendit in altitudinem, crassior & lignosa, cæteræ à lateribus funduntur exiles ac prolixæ.

LOCVS.

Pasim in figulinis vasis mulieres extra fenestras ædium fouent Ocimum. In hortis etiam satum prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, dein semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, cum exsiccamentitia quadam humiditate.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Copiosè comestum oculorum aciem hebetat, aluū emol-
lit, fla

*Ocimum magnum.*

idē herba efficit. Porro instante sternutamento oculos comprimere oportet. Sunt qui Ocimum cauent minimēque comedunt, quandoquidem manducatum, & in sole positum vermes gignat. Libyes autem adiecerunt, quod si feriantur à scorpione qui Ocimum ederint, nullo dolore cōfictari.

EX GALENO.

Ocimum excrementitiam humiditatem habet, proinde nec commodum est, quod in corpus sumatur. Ceterum foris illitum, ad digerendum & concoquendum utile est. Plærique hoc etiam ut opsonio utuntur, ex oleo & garo offerētes, Vitiosioris autem succi est. Admentiuntur ob hoc quidam dicentes, si tritū fictili nouo indatur, celerrimē intra paucos dies scorpiones gignere, præsertim vbi quis quotidie ollam soli expositā talsecerit. Sed hoc sanē à verō abest. Id porro verē de eo dixeris, prauī succi, stomacho inimicum, & concoctu pertinax olus esse.

EX

EX PLINIO.

Ocimum Chrysippus grauiter increpuit, inutile esse dicens stomacho, vrinæ, oculorum quoque claritati. Præterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris vitia, ideoque capras id aspernari: hominibus quoque fugiendum censet. Adsciunt quidam, tritū si operiatur lapide, scorpionem genere: commanducatum, & in sole positum, vermes afferre. Alij verò, si eo die feriatur quispiam à scorpione, qui ediderit Ocimum, sanari non posse. Quinimò tradūt aliqui, manipulo Ocimi cum cancris decem marinis vel fluuiatilibus trito, cōuenire ad eum scorpiones à proximo omnes, Dioscoridis in empiricis, etiam pediculos facere Ocimi cibum. Secuta ætas alacriter defendit, nam id esse capras, nec minus quàm mentham & rutam scorpionum terrestrium ictibus, marinorumque veniens mederi cum vino, addito aceto exiguo. Vsu quoque compertum deficientibus ex aceto odoratum salutem esse. Item lethargicis, & inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cū rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris positū ex vino. Stomacho quoque esse vtile, inflationes & ructum ex aceto dissoluere sumptum. Aluum sistere positum. Vrinā ciere. Sic & morbo regio & hydropicis prodesse. Choleræ eo & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiam cœliacis Philistio dedit, & coctū dysentericis & colicis Plistonicus. Aliqui & in tenasmo, & sanguinem excreantibus, in vino. Contra duritiam præcordiorum illinitur mammis. Extinguit quoque lactis prouentum. Auribus vtilissimum infantium, præcipuè cum adipe anserino. Semē tritum & haustū naribus, sternutamenta mouet, & destillationes capiti quoque illitum. Vuluas purgat in cibo ex aceto. Verrucas mixto atramento sutorio tollit. Venereæ stimulat.

EX SIMEONE SETHI.

Basilica ocima olfacta cor & caput iuuant. Si aqua irrigantur, humidiora fiūt, & somnum cōciliant. Semen eorum cardiacis affectibus succurrit. Animi mœrorē ex atrabile ortam, in hilaritatem & lætitiā mutat.

APPENDIX.

Vides in referendis Ocimi facultatibus non parum inter se dissentire Dioscoridem, Galenū, & Plinium, ita vt vix pugnantes illorum sententias conciliare possis. Quare consilium erit vt hic, quemadmodum in alijs etiā, Galeni amplectaris opinionem, qui quodāmodo inter hoc medius interiectus, commēdat exteriorem eius vsum in ijs quę *σύνεσις*, *καὶ διαφύσις*, id est, concoctionem & discutionem desiderant: damnat verò internum, ob excrementitium humorem quo grauat & lædit interanea. Et ad hunc etiam scopum respiciens, plerasque alias Dioscoridis & Plinij contradictiones tollere poteris.


De Ocimaestro. CAP CCCXLIII.

NOMINA.

Οκισμός Græcis, Ocimastrum Latinis dicitur. Officinis inusitatum atque incognitum. Germanis [Vild Basilig] Gallis *Basilic sauuage* appellatur. Ocimoides verò Græcis haud alia ratione dictū est, quā quod Ocimo, suis potissimum folijs, simile sit. Ocimastrum autem Latini quasi sylvestre Ocimum appellauerunt. Nam sic ipsum vocare videtur lib. 20. cap. 13. Plinius.

FORMA.

Folia habet Ocimo similia, ramulos dodrantaes, eosdēque hirsutos, siliquas Hyoscyamo persimiles, semine nigro plenas, Melanthio seu Nigellæ simili: legendum enim in Dioscoride *τοῖς ὄκκισ*, & non *τοῖς ὄκκισ*, vt habent aliqua exemplaria. Radix illi est gracilis & inutilis. Ex qua quidem delineatione omnibus palām fit, stirpem, cuius effigiem atque picturam damus: esse Ocimastrum: siquidem folia fert Ocimi, ramulos palmares & quadratos (quod Dioscorides omisit) hirsutos, flores purpureos (quos itidem Dioscorides non explicauit) forma Ocimi floribus similes, qui tamen colore, qui illis candidus est, distant: decidentibus floribus siliquas Hyoscyamo similes, seminis nigri, Melanthio similis, plenas ostēdit. Radice etiam nititur tenui & supenuacua. His omnibus etiam accedit odor, qui planē Ocimū refertur

*Ocimastrum.*

referre videtur: ita vt ne
mo dubitare debeat,
quin hæc herba verum
sit Ocimastrum, potissi-
mum cum illi Dioscori-
dis descriptio sic quadret
vt nulla prorsus nota re
clamare videatur.

LOCVS.

Nascitur arenosis in
locis. Copiose autē iuxta
Nirtingam ad Nicerū
oppidulū prouenit, vbi
idipsum primum vidi,
ac reperi: aliās, quod
sciam, mihi nunquam
visum.

TEMPVS.

Floret in fine Septem-
bris & Octobri mense, atq; simul in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Ocimastrum, maximè eius semen, est calidæ & siccæ tem-
peraturæ, quod sapor etiam satis ostendit, qui cum modica
adstrictione amarus est.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Semen Ocimastri in vino potum, medetur viperarum &
aliarum serpentium moribus. Ischiadicis datur cum myr-
rha & pipere.

EX GALENO.

Ocimoides quidam Philiterium cognominant. Radix su-
peruacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantis
citra mordacitatem facultatis est.

EX PLINIO.

Syluestri Ocimo vis efficacior ad eadem omnia, quæ sa-

H h ij tino.

tiuo. Peculiaris ad vitia quæ vomitionibus crebris contrahuntur. Vomitisque vuluæ, contrâque bestiarum morsus radix in vino est efficacissima.

APPENDIX.

Vel sylvestre Plinij Ocimum diuersum est ab Ocimastro, aut in verbis eiusdem iam productis, error subest. Quû enim Ocimastri radix, Dioscoridis & Galeni testimonio, inutilis sit, non rectè à Plinio dicitur quòd eius radix in vino contra bestiarum morsus efficacissima sit: sed hoc potius Dioscoride teste, semini tribuendum erit. Quare in Plinio legendum, contraque bestiarum morsus semen in vino est efficacissimum. Quam sane lectionem Dioscoridis autoritas abundè confirmat, qui Ocimastri semen cum vino potum, contra viperarum & aliorum reptilium ictus efficax esse tradit.

COMMENTARIORVM DE
STIRPIVM HISTORIA
FINIS.

EXPLICATIO QVAVNDAM VOCVM

TOTO HOC OPERE PAS-
SIM OCCVRRENTIVM, IN

quibus assequendis non admo-
dum peritus lector hære-
re posset.



Cetabula ab aceto denominata videntur, quanuis alij ab accipiendo dictū putent, atq; hinc est qd scribant acceptabulū: vasculaque fuerunt orbiculata, concaua, sine marginis latitudine, quæ aceto plena ad intinctus ponebantur. Dehinc vox ad omnia alia quæ similem concauitatem habent, translata fuit. Primūque sic concauas partes in polyporum flagellis, quibus id animal nititur, & velut adminiculis fultum exurgit, nominarunt. Translata etiam vox ad sceminarum locos, vocaueruntq; acetabula venarum arteriarumque ora, quæ in vterū scrūtantur hiantia. Transtulerunt postremò etiam hoc nomen ad herbam, quam eam ob causam Acetabulum dixerūt, quòd folia acetabulo similia in orbem circumacta, sensimque, sicut sensum fallant, in concauam lacunam descendencia habeat. κοτυλιδόνι Græcè nominantur.

Acinus non tantūm grana interna vix, quemadmodum quidam existimant, sed totum fructum, qui ex succo, & parte quæ veluti caro est, & ex vinaceis, & ambiente forinsecus cute constat, significat. Testis Galenus, qui lib. 2. de facultatibus alimentorum sic scriptum reliquit: Acini corpus ex quatuor partibus constat, ex ea scilicet quæ eius veluti caro est: ex quæ humore per eam disperso, vnde vinum: præterea ex nucleo, atque eo quod omnia hæc foris circumcludit membranoso tegumento. πᾶσι Græcis dicitur.

Aculei, quæcūque duriuscula in cuspidem turbinata punctionem insigunt, spiculorum modo, nominantur.

Acus purgamentum frumenti, leuissimum scilicet in eo quod ventilabris extra arcam iaculatur.

VOCVM DIFFICILIVM

Adnata, vel Adnascencia, siue Appendices, ramuli dicuntur quos caulis nonnunquam ex se mittit, quasi nonam adscititiamque prolem. Sic autem vocantur, quod quasi cauli adnascantur & superaccedant. Græci *παράφυλλας*, quod circum caulem erumpentes accrescant, appellarunt.

Alæ, caui inter caulem & ramulos anfractus, unde sinuatim noua proles egreditur, facta ab humanis alis translatio ne, dicuntur. Græci *μυαχέλας* vocant.

Alabastra sunt seruandis odoribus ex solidissima & frigidissima materia facta vascula, sic dicta Græcis, quod ob læuorem suam capi tenerique manibus non facile possent, lubricaque dilaberentur. Hinc Alabastrites lapis, quem nunc Alabastrum vocant, quoniam ex eo Alabastra fierent, denominatus est.

Aluta pellis seu corium dicitur postquam ad usum & opus calceorum & aliarum rerum concinnatum est. Hinc Alutamen, siue Alutamentum, opus ex concinnatis pellibus factum. Et Alutarij, pellium & coriorum concinnatores.

Alsiosa non dicuntur ea quæ frigidis locis gaudent, sed contra potius quæ algores ferre non possunt.

Amuleta remedia sunt præsentanea aduersus venena & fascinationes, qualia quidam in annulis, & è collo suspensa gestare solent.

Amphora mensura est quæ capit duas urnas, seu octo congios.

Apices quæ in medio calycis seu folliculi quo flos clauditur, erumpunt. Stamina sunt, quæ veluti filamenta ab intimo floris sinu prosiliunt. Habent apices sæpius in summo quidpiam crassiculum, à qua similitudine nomen acceperunt.

Arbor est quicquid à radice statim simplici caudice, brachiatum ramis, surculosum, dissolutumque cõtumax assurgit.

Articuli sunt partes quæ in nodos quosdam intumescunt, à quibus persæpe ramuli prodeunt.

Arista, est quæ vt acus tennis, longa, eminet à gluma. In summa, Aristæ quasi apices & cornua sunt spicarum.

Aspa

E X P L I C A T I O.

Asparagi, quæ primum in lucem prodeunt olerum germina, priusquam in folia explicentur, recentissimiq; turiones qui edendo sunt, dicuntur.

B Accæ sunt fœtus minutiores herbarum, fruticum, arborumve, qui dispersius rariusque enascuntur: vt sunt partus lauri. Atque in hoc ab acinis differunt, quod ij densius proueniant.

Brachia sunt plantarum, præcipue autem arborum ramuli, quod instar brachiorum in homine extendantur.

Bulbi radices sunt rotundæ tunicatæ, quales sunt hyacinti, asphodeli, & colchici.

C Achryes sunt oblonga panicularum modo nucamentæ, quæ squamatim compacta propendent è ramis.

Crescunt hyeme, vere dehiscunt in stauescentes squamulas, & folio prodeunte, decidunt: qualia in Abiete, Picea, & alijs permultis videre licet. Plinius pilulas nominat.

Calathus est rectus turbo: hoc est, id quod ex angustijs in latitudinem se diffundit. Calathi effigiem planè referunt flores liliorum.

Calyx folliculus est, quo flos primum, mox seminis fœtus clauditur.

Cappillamenta particulæ teretes & oblongæ in capilli modum extenuatæ dicuntur.

Caput est id quod sursum deorsumve in globum extuberat, aut in orbem glomeratur. Si magnitudine cesserit, capitulum nominatur. Extremam tamen vitis partem caput etiam vocant, id est, vltimum & productissimum flagellum.

Capreoli sunt coliculi intorti veluti cincinni quidam in ipsis pampinis tenioribus apparentes, quibus vitis veluti manibus quibusdam adminicula complectitur, ac comprehendit. Ij enim vt vitem teneant, serpunt ad locum capiendum: vnde à capiendo capreoli dicti sunt.

Caro dicitur id quod cortici subest.

Caudex dicitur in arboribus & fructibus, id quod à radice supra terram simplex assurgit, & in quod à radice fertur alimonia,

VOCVM DIFFICILIVM

Caulis verò idem quod supra solum simplex profilit, in herbis nominatur. Sic utique caudex ad frutices & arbores, caulis ad herbas duntaxat pertinet.

Cervix est pars illa à capitis radicibus prodiens, prælonga, teresq; sic dicta, quòd in colli speciem figuretur.

Cyathus Græcis ἀπὸ τοῦ χύειν, id est, à fundendo dictus est duodecima pars sextarii.

Cymæ herbarum delicatiores tenioresq; coliculi, quos à prima germinatione, & in summa stirpe proferunt. Nam cum vernum tempus appetit, primo quoq; foliorum pullu latu, præclufis adhuc florum calycibus, quosdam quasi turiones, olus subministrat, in quibus floris primùm, mox seminis fortus concluditur.

Cirri sunt capillamenta quæ contorta crispantur.

Claviculæ coliculi sunt, quibus quasi manibus prorepans vitis adminicula comprehendit.

Coma est quicquid hilari venustate criniû modo, summa ramorum vel coliculorum exornat.

Congius, qui græcè χοῦς dicitur, sex sextariorum capax mensura est. Eadem etiam congiarium appellatur.

Conus Græcis, vel pyramis, est inuersus turbo, hoc est, id quod ex latitudine in arctius protrahitur, ac fastigiatur: cui Calathus, ut diximus, contrarius existit.

Cor est quod in medio ligni residet, & tertium à cortice continetur, veluti in ossibus medulla.

Ab alijs matrix, à nonnullis medulla nominatur.

Corymbus est hederarû vna dependentibus acinis coacta. Transfertur tamen ad multos herbarum fructus.

Cortex pars est vltima à subiecto corpore separabilis, veluti crusta quædam ad tegendum data.

Cotyle vox est in Græcia nata, nam Romani heminx vocabulo vtuntur. vide in dictione Hemina.

Crenæ sunt quædam in extremis oris incisuræ, à quibus crenata herbarum folia vocantur, hoc est, serrata, per ambitumque secta.

Cubitus est mensura quanta patet à cubiti flexura vsq; ad summum medium digitum, quæ sex palmis digitisve

viginti quatuor constat.

Culmus frumenti calamus est, qui spicam sustinet.

Decussis antiquis ad X literę figuram fiebat, quę apud Latinos decem significat. Hinc decussari est in specię literę X diduci.

Dilutū dicitur, quod est mixtum, vnde vinum aqua mixtum dicitur dilutum, Dilutum verò substantium factū, est id liquidum, in quo aliquid certo tempore maceratum & infusum fuit: vt si in vas vini appositum absinthium fuerit, deinde post interiectum tempus abstractum, id vinum absinthij dilutum vocatur.

Dodrans est mensura duodenum digitorum. alias palmus maior Latinis, & Gręcis *πυγμή* dicitur. Dodrantalis itaque cauliculus vocatur, qui longitudine duodenos æquat digitos.

Echinus est quicquid numerosa congerie aculeorum sitatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumen fuerit: sic dictus quod globoso spinarum agmine, maris herinaceum mentiatur.

Fibrę capillamentis germanę sunt, quę herbarum arborumque minutiores sunt radiculę, in quas velut extremas, crassiores effusę sparguntur.

Fimbrię sunt vestium extremitates, a quibus & fimbriata folia dicuntur, quę in ambitu in quasdā fimbrias exeūt.

Flagella dicuntur cymę arborū & ipsarum summę partes, quę ad cuiusq; venti flatum mouentur: vnde etiam nomen traxerunt ab eo quod flatibus petantur. Flagella etiā sunt vitium rami oblongiores, & productiores, alijs tamen minores, ab ipsis brachijs sursum ascendentes: dicta stabella prius a venti flatu scilicet.

Folliculus theca rei cuiuslibet, quę granum vel semen continet inuolutum. Sic membranosa cutis acini folliculus dicitur.

Fructus, quod carne & semine compactum est. Frequenter tamen pro eo, quod inuolucro perinde quasi carne & semine coactum est, accipi solet.

Frutex est quod a radice caudice multiplici, romosumq;

sese attollit, vt rubus.

Frons interdum pro ramo ponitur. Propriè tamen dicitur id quod ipse ramus circūquaque producit, multa interdum folia habens, & nonnihil corticis, ac veluti cauliculi.

Gemma in vite idem est quod oculus, quia veluti ocellus quidam conspicuus, aut gemma quædam excellēs conspici possit, cū primum è vite prodit, aut sarmento. Hæc incunte vere sese ostendit, & ab ea primum flos, deinde fructus prodit tam in ipsis vitibus, quàm arboribus.

Geniculi siue genicula sunt nodi qui in herbis aut leguminibus, aut etiam sub fructibus apparent. Sic geniculatæ radices nominantur, quæ nodis quibusdam interstinctæ protuberant, rotundæ & leniter capitulatæ.

Gluma est folliculus grani quod in spica continetur, vel grani theca.

Grossi appellantur fici, quæ non maturescunt. Priuatim tamen in bisera fico eas intelligunt, quæ per menses maturantur. Hos grossulos Græci vocant *βρόνθοι*.

Hemina Romana vox est, ex Græco quidē *ἡμισ*, quòd dimidia sextarij pars sit, deriuata. Græcis *κοίσι* nominatur. Capit vncias decem mensurales, vt copiosè in annotationibus nostris in quartum de tuenda sanitate librū Galeni demonstrauius.

Herba est quod à radice foliatum, siue caudice prouenit, sæpiusque semen in caule fert.

Internodium, quod inter artus vel genicula medium intercedit, dici consuevit.

Interuenium, quod inter venas intercipitur.

Iuba est harūdinacea coma effusa, qualis in milio est: metaphora desumpta à iubis, hoc est crinibus animalium à collo pendentibus.

Iulus tam Græcis quàm Latinis est quod in corylo compactili callo racematim cohæret, & veluti prælongus vermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructū præcedit.

Lachryma est is humor, qui statim defecto caudice, vel ramo, aut tantum ipso ligno, prosilit, & apparet.

Lacinix, partes sunt extremæ, particulatim decoris cau-

E X P L I C A T I O.

Ta concisæ, orarumque summarum cæsuræ. Inde folia membratim per flexuras digesta, vel natiuis segminibus discreta, lacinia vocitantur. Sunt tamen qui laciniosum pro sinuoso vsurpent.

Lanugo in herbis atque arboribus lanata quædã est hirsuties, qua folia, coliculi que canescunt.

Liber, pars corticis interior quæ ligno præsertim adheret. Is quibus scribimus libris nomen dedit.

Libra Romana capit uncias duodecim mensurales.

Ligula quarta pars cyathi dicitur, hoc est, semiuncia, demptis scilicet duobus scriptulis.

Locumenta sunt seminum inuolutra, quæ veluti parvæ capsulæ ea recludunt.

Lomentum fabarum farina est.

Malicorium est mali punici putamen. Malleolus novellus est palme, innatus prioris anni flagello, cognominatus à similitudine rei, quod in ea parte, qua deciditur ex vetere sarmento, prominens, vtrinque malleoli speciem præbet. Vel, quod capillatur vtrinque & surculatus solebat feri.

Matrix, vide in dictione Cor.

Medulla, ibidem.

Mucro est acumen in quod pars quæcunque desinit. Sic foliorum multorum, siliquarum quarundam, & spinarum omnium extrema in mucronem acuminantur.

Muscus est id quod in ipsa corticis superficie quarundam arborum lanuginosum apparet, veluti caui quidam ipsarum arborum villi. In quibusdam etiam quædam ipsarum arborum quæ visitur villosa flosculorum congeries, quæ quod conferta sit densaque florescat, muscus dici consuevit: vt in Ligustro, & compluribus alijs.

Muscaria sunt in orbem radiatæ herbarum comæ, cacuminæque in fascies coactæ: à flabii similitudine, cuius ventillatu, muscæ conuiuijs abiguntur, dicta.

NVeamenta dicuntur ea quæ callo squamatim compactili pendent è ramis nucum, roborum, piccarum: sic dicta

VOCVM DIFFICILIVM

dicta, quod sint quasi quædam naturæ rudimenta, pineam nucem facere condiscitis.

Oculus gemmula illa in herbarum furculis, primum germinationis argumentum dicitur.

Palma dicitur maius vitis flagellum, unde nascuntur vugæ. Palmus veteribus duplex fuit. Minor digitorum quatur habebatur, Græcis *παρακτις* vocatus. Maior digitorum duodecim, *παρακτις* Græcis dictus.

Palmites dicuntur qui è stirpibus ac furculis quotannis prodeunt: sic nominatur, quod in modum humanarum palmarum virgulas quasi digitos ædant.

Pampini sunt frondentium ramusculorum comæ coliculae, quæ fructum fouentes, & ab impendente vindicantes iniuria. Hinc pampinare, est pampinos superfluos ex vinea detrudere, posteaquàm frondit.

Panicula dici potest quicquid sublonga vel subrotunda effigie tumet, vt quæ pendet è picearum ramis. Lanosam quoque comam in milio, panico, arundine, & qualem in aruis complures herbæ, & in palustribus iunci gerunt, Latini paniculam dixere.

Pappus tam Græcis quàm Latinis est lanugo ex floribus aut fructibus, decidua. Sic etiam lanosi quidam villi, qui de florecentibus aliquot herbis remanent, & postmodum in auras euanescent, pappi sunt, vt in senecione, soncho, & plerisque alijs fit.

Pediculus, siue quod idem habetur, Petiolus, id est quo folium, fructus, aut flos dependet.

Pedamenta quibus stat recta vinea dicuntur, hoc est, quibus veluti pedibus nititur.

Nominantur etiam à quibusdam pedamina.

Pilula, vide Cachris.

Pyramis, vide Conus.

Propago dicitur vitis vetula depressa, atque in terram per inflexos arcus submersa, vt ex vna plures emergant.

Pulpa in arboribus est, quod nos in animalium corporibus musculum appellamus.

Puluinus est quod inter sulcos eminulum protumet, sic dictus

E X P L I C A T I O .

dictus quòd quandam referat puluinorum in quibus sedemus, similitudinem.

Quincuncialis figura, eius figuræ quæ Decussim antiquis significabat, media est. Fiebat verò Decussis ad x literæ formam, quæ quidem apud Latinos decem significat. Atque hæc si per medium secetur, remanebit V figura, quæ quinarium numerum, atque adedò quincuncem demonstrat. Sed hæc quidem multoties tum superius, tum etiam inferius multiplicata, figuram facit, quæ quincuncialis appellatur.

Racemus pro Vua accipitur. Neque tantùm ipfius vitis est, sed etiam hederæ, & aliarum herbarum, aut fruticum vuas quasdam producentium. Dicitur etiam ramosum id, quo dependent acini.

Rami sunt, qui in caule fissi multiplices sparguntur.

Sarmenta prælongæ sunt vitium virgulæ, in quas vitis luxurians spargitur: hoc est, vitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tam dum sunt in ipsa vite, quàm dum excisa, & exenipta sunt.

Scapus est caulis qui in styli modum sursum proreptat, aut in altum fertur, ducta à columnaribus scapis, similitudine.

Scopus ramosum id, quo dependent acini.

Sesqui vocabulum cum aliqua mensura vel modi, vel numeri, vel temporis collocatum, non integrum modò id cui iungitur explicat, sed integrum & semis. Sic sesquilibra, libram vnā & semis significat. Sesquimensis, integrum mensē cum dimidio.

Sextarius capit vncias viginti mensurales.

Silique tegumentum est, quo vel grana leguminum, vel herbarum semina concluduntur. Nam non modò legumina, sed & complures quoque & herbæ & frutices siliquas proferunt.

Sinus alarum cana sunt.

Spica est quod culmus extulit. Hanc antiquitus rustici spicā vocabant, & à spe videtur nominata: eam enim quod sperant fore, serunt. Tria verò continet, granum, glumam & aristam. Spica mutica est, quæ non habet aristam. Et mutica

VOCVM DIFFICILIVM

ica quasi mutila nominatur.

Spongas antiqui olitores vocarunt radículas illigatas & connexas. Hinc Asparagi satiui & altius radices multis irritæ capillamentis coalescentes, & inter se implicatæ, ac quasi in viuitatem coeuntes spongiolæ, & spongiæ spongiolæque appellantur.

Stamina sunt qui in medio calycis erūpunt apices: sic dicta, quod veluti filamenta ab intimo floris sinu profiliant.

Stipulæ folia sunt culmū ambientia. Striæ partes sunt quedam, quæ protuberant & eminent. Hinc striatus caulis, qui huiusmodi strijs est præditus, aut striaturis exasperatus Strigiles etiam, si Vitruuius credimus, appellantur.

Stolones appellantur coliculorum soboles, inutilisquæ è radicibus fruticatio.

Suffrutices sunt, quæ compluribus ramulis furculisq; lignosis scatent, sed minutis cōstant folijs. Sursculus, quod ex ramis simplex ac indiuiduum oritur, estq; velut germen quoddam ex ipso trunco vel caudice productum.

Thyrsus est caulis. Idq; nomē sibi vēdicauit: quod virgulæ iu modum, vel tili rectitudinem consurgat.

Tomentum Latinis omne id quo culcitæ ad molliorem & calidiorē quietem infarciantur, dicitur: siue id lana sit siue pluma, siue quod voluerit aliquis, excipiendis molliter & fouendis calore corporibus nostris aptum. Sic Dictamni folia, quod mollia videntur esse, tomētia & lanea dicuntur à Dioscoride, hoc est, *γυμναλινδι*. Topiariū opus est quod ex arbore, frutice, vel herba ad decorem componitur, in testudines aut cameras fornicatum. Hinc Topiariæ dici merentur arbores vel herbæ, quæ nimirum huic operi, quod flexiles sunt, ac suo lentore sequaces, accommodantur.

Tori prominētes partium calli, & in se pulparū modo collecti nominantur. Græci *κονδύλους* vocant. Hinc *κονδυλώδες* id est, torosus, quod idem Latinis est, ac nodi formam præ se ferens.

Triens quatuor cyathi.

Tunica est tenuis cortex & veluti membranaceus, quæ vel arbor, vel radix inuestitur. Sic cepe folliculis est tunicatū,

Tur

E X P L I C A T I O.

Turbo dicitur quicquid ex acumine tendens in amplius spaciatur. Hinc Turbinatum, quod ex angusto continenter in latius prodit. Sic turbinata conspicitur pyrorum forma. Permulta etiam herbarum folia in mucronem turbinantur. Turiones sunt teneritates summitatum ipsarum arborum, quæ singulis annis crescunt.

V Ascula, seminum innolucra sunt. Venæ sunt quæ in plantarum folijs apparent, & ramulos & humorem habentes. Vermiculatum quod rosæ modo, quasi purpurisso, rutilat, dicitur. Verticillum florû vel foliorum ambitus, qui coliculos aut ramulos herbarum coronat, existit: ab instrumētī muliebris similitudine dictû quod fuso vertendi gratia solitum est adhiberi.

Vinacei, grana sunt acinorum, *ῥιζα* Græcis nominatur, quæ prelsis viuis cum folliculo abijciuntur. Virga est quæ ex radicibus, aut caudicis lateribus exit. Anōnullis virgæ appellatæ sunt soboles. Virgultum surculus is est, qui terræ committitur, vt in arborem insurgat. Viticulæ non palmites aut sarmenta sunt, sed flagella quæ vitis modo repantia longè lateq; vagantur, ac vicinos frutices nata, sic intricant eos, vt ijs perinde quasi pedaminibus abutantur: vel scandentia suis irretiunt clauiculis, quibus quasi digitis hærent, quales in cucumeribus, cucurbitis, & plærisq; alijs inueniuntur.

Vmbella est floris seminisve pedamentum, in plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodē orti, in Latius continuò radiantur, singuliq; vel florem, vel semen sustinent, in orbem circumactum. Græci hunc floris habitum *οὐδδισον*, Latini verò quoniam vmbellæ, qua mulieres vultum vindicant à sole, & æstum arcent, circinatam effigiem gerit, vmbellam dixerunt. Umbilicus id in pomis est, quod in eis medium vel prominet, vel conditur.

Vngues in rosis & foliatis floribus intellexerunt veteres, imas suorum foliorum partes, quibus in capite suo cohærent, decolorcsq; dependent. Vel breuius: Vnguis infima pars foliorum rosæ alba appellatur.

F I N I S.

EXCVDEBAT

BALTHAZAR

ARNOLLETVS.

Fugdum Bataro.

1551-1596-



